

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号

特開2023-2709
(P2023-2709A)

(43)公開日 令和5年1月10日(2023.1.10)

(51)国際特許分類		F I			
A 6 1 K	39/00 (2006.01)	A 6 1 K	39/00	H	
A 6 1 K	39/002 (2006.01)	A 6 1 K	39/00	K	
A 6 1 K	39/12 (2006.01)	A 6 1 K	39/002		
A 6 1 K	9/127(2006.01)	A 6 1 K	39/12		
A 6 1 K	47/18 (2006.01)	A 6 1 K	9/127		
		審査請求 有	請求項の数 23	O L	(全56頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2022-168831(P2022-168831)	(71)出願人	504389991		
(22)出願日	令和4年10月21日(2022.10.21)		ノバルティス アーゲー		
(62)分割の表示	特願2020-139108(P2020-139108)		スイス国 パーゼル リヒトシュトラーセ		
)の分割		3 5		
原出願日	平成23年7月6日(2011.7.6)	(74)代理人	100091096		
(31)優先権主張番号	61/361,830		弁理士 平木 祐輔		
(32)優先日	平成22年7月6日(2010.7.6)	(74)代理人	100118773		
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)		弁理士 藤田 節		
(31)優先権主張番号	61/378,837	(74)代理人	100111741		
(32)優先日	平成22年8月31日(2010.8.31)		弁理士 田中 夏夫		
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)	(74)代理人	100169971		
			弁理士 菊田 尚子		
		(74)代理人	100170221		
			弁理士 小瀬村 暁子		
(特許庁注：以下のものは登録商標)		(72)発明者	ギール, アンドリュー		
	最終頁に続く			最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 RNA送達に有利な p K a 値を有する脂質を含むリポソーム

(57)【要約】 (修正有)

【課題】動物を免疫するための、改善された核酸の送達の方法を提供する。

【解決手段】免疫原をコードするRNAは、免疫の目的で、リポソーム中で送達される。上記リポソームは、5.0~7.6の範囲のpKaおよび好ましくは、三級アミンを有する脂質を含む。これらリポソームは、生理学的pHにおいて本質的に中性表面電荷を有し得、免疫に有効である。一実施形態において、水性コアを封入する脂質二重層を有するリポソームが提供され、ここで：(i)該脂質二重層は、5.0~7.6の範囲のpKaを有する脂質を含み；そして(ii)該水性コアは、免疫原をコードするRNAを含む。

【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

水性コアを封入する脂質二重層を有するリポソームであって、ここで：(i) 該脂質二重層は、5.0～7.6の範囲のpKaを有する脂質を含み；そして(ii) 該水性コアは、免疫原をコードするRNAを含む、リポソーム。

【請求項 2】

5.0～7.6の範囲のpKaを有する前記脂質は、三級アミンを有する、請求項1に記載のリポソーム。

【請求項 3】

5.0～7.6の範囲のpKaは、5.7～5.9の間である、前記請求項のいずれかに記載のリポソーム。 10

【請求項 4】

5.0～7.6の範囲のpKaを有する前記脂質は、RV01、RV02、RV03、RV04、RV05、RV06、RV07、RV08、RV09、RV11、RV12、RV16もしくはRV17について本明細書で示される式を有する、請求項1に記載のリポソーム。

【請求項 5】

20～220nmの範囲の直径を有する、前記請求項のいずれかに記載のリポソーム。

【請求項 6】

前記RNA分子は、(i) 該RNA分子からRNAを転写し得るRNA依存性RNAポリメラーゼ、および(ii) 免疫原をコードする、前記請求項のいずれかに記載のリポソーム。 20

【請求項 7】

前記RNA分子は、2個のオープンリーディングフレームを有し、そのうちの第1のものは、アルファウイルスレプリカーゼをコードし、そのうちの第2のものは、前記免疫原をコードする、請求項5に記載のリポソーム。

【請求項 8】

前記RNA分子は、9000～12000ヌクレオチド長である、前記請求項のいずれかに記載のリポソーム。

【請求項 9】

前記免疫原は、細菌、ウイルス、真菌もしくは寄生生物に対してインビボで免疫応答を誘発し得る、前記請求項のいずれかに記載のリポソーム。 30

【請求項 10】

前記免疫原は、呼吸器系合胞体ウイルス糖タンパク質Fに対してインビボで免疫応答を誘発し得る、前記請求項のいずれかに記載のリポソーム。

【請求項 11】

前記請求項のいずれかに記載のリポソームを含む、薬学的組成物。

【請求項 12】

脊椎動物において防御的免疫応答を惹起するための方法であって、該方法は、該脊椎動物に、有効量の、請求項1～10に記載のリポソーム、または請求項11に記載の薬学的組成物を投与する工程を包含する、方法。 40

【請求項 13】

RNA含有リポソームを調製するためのプロセスであって、該プロセスは、リポソーム形成の際に、(a) RNAと、脂質とを、該脂質のpKa未満であるが4.5を上回るpHにおいて混合する工程；次いで、(b) 該pHを、該脂質のpKaを上回るように上昇させる工程、を包含する、プロセス。

【請求項 14】

請求項13に記載のプロセスであって、ここで、工程(a)において使用されるRNAは、前記脂質の有機溶液と混合して、混合物を与えるために、水性溶液中に存在し、該混合物は、次いで、希釈されて、リポソームを形成し；そして前記pHは、リポソーム形成後 50

に、工程（b）において上昇させられる、プロセス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本出願は、米国仮出願第61/361,830号（2010年7月6日出願）、および同第61/378,837号（2010年8月31日出願）の利益を主張し、上記両方の米国仮出願の全容は、全ての目的のために、参考として本明細書に援用される。

【0002】

（技術分野）

本発明は、免疫のためのRNAの非ウイルス性送達の分野にある。

10

【背景技術】

【0003】

（背景技術）

動物を免疫するための核酸の送達は、数年間にわたり目標であった。種々のアプローチが、試験されてきており、それらとしては、DNAもしくはRNAの使用、ウイルスもしくは非ウイルス性送達ビヒクルの使用（またはさらには「裸の」ワクチンにおいて、送達ビヒクルなし）、複製もしくは非複製ベクターの使用、またはウイルスもしくは非ウイルス性ベクターの使用が挙げられる。

【0004】

さらに改善された核酸ワクチンへの必要性が存在している。

20

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0005】

（発明の開示）

本発明によれば、免疫原をコードするRNAは、免疫の目的で、リポソーム中で送達される。上記リポソームは、5.0～7.6の範囲のpKaを有する脂質を含む。理想的には、この範囲のpKaを有する脂質は、三級アミンを有する；このような脂質は、四級アミン基を有する脂質（例えば、DOTAPもしくはDC-Chol）とは異なって挙動する。生理学的pHにおいて、5.0～7.6の範囲のpKaを有するアミンは、中性のもしくは低下した表面電荷を有するのに対して、DOTAPのような脂質は、強力にカチオン性である。本発明者らは、四級アミン脂質（例えば、DOTAP）から形成されるリポソームが、三級アミン脂質（例えば、DLiNDMA）から形成されるリポソームより、免疫原をコードするRNAの送達には適切性において劣ることを見いだした。

30

【0006】

従って、本発明は、水性コアを封入する脂質二重層を有するリポソームであって、ここで：（i）上記脂質二重層は、5.0～7.6の範囲のpKaを有する脂質、および好ましくは、三級アミンを有する脂質を含み；そして（ii）上記水性コアは、免疫原をコードするRNAを含むリポソームを提供する。これらリポソームは、脊椎動物細胞への上記RNAのインピボ送達に適切であるので、それらは、種々の疾患に対して被験体を免疫するための薬学的組成物における成分として有用である。

40

【0007】

本発明はまた、RNA含有リポソームを調製するためのプロセスであって、（a）RNAと、脂質とを、上記脂質のpKa未満であるが、4.5を上回るpHにおいて混合して、上記RNAが封入されているリポソームを形成する工程；および（b）得られたリポソーム含有混合物のpHを、上記脂質のpKaを上回るように上昇させる工程、を包含するプロセスを提供する。

【0008】

（リポソーム）

本発明は、免疫原をコードするRNAが封入されているリポソームを利用する。従って、上記RNAは、（天然ウイルスにおけるように）上記リポソームの脂質二重層によって

50

任意の外部媒体 (external medium) から分離されており、そしてこの方法での封入は、RNAase 消化から RNA を保護することが見いだされた。上記リポソームは、いくらかの外部 RNA (例えば、それらの表面に) を含み得るが、上記 RNA のうちの少なくとも半分 (および理想的には、そのすべて) は、上記リポソームのコアに封入される。リポソーム内の封入は、例えば、参考文献 1 で開示される脂質 / RNA 複合体とは異なる。

【0009】

種々の両親媒性脂質は、RNA 含有水性コアをリポソームとして封入するための水性環境において二重層を形成し得る。これら脂質は、アニオン性、カチオン性もしくは両性イオン性の親水性頭部基を有し得る。本発明のリポソームは、5.0 ~ 7.6 の範囲の pKa を有する脂質を含み、この範囲の pKa を有する好ましい脂質は、三級アミンを有する。例えば、それらは、1, 2 - ジリノレイルオキシ - N, N - ジメチル - 3 - アミノプロパン (DLINDMA; pKa 5.8) および / もしくは 1, 2 - ジリノレニルオキシ - N, N - ジメチル - 3 - アミノプロパン (DLENDMA) を含み得る。三級アミンを有する別の適切な脂質は、1, 2 - ジオレイルオキシ - N, N - ジメチル - 3 - アミノプロパン (DODMA) である。図 3 および参考文献 2 を参照のこと。参考文献 3 のアミノ酸脂質のうちのいくつかはまた、参考文献 4 のアミノ脂質のうち特定のものが使用できるように、使用され得る。それらの頭部基において三級アミンを有するさらに有用な脂質は、参考文献 5 (その完全な内容は、本明細書に参考として援用される) に開示されている。

10

20

【0010】

本発明のリポソームは、単一の脂質もしくは脂質の混合物から形成され得るが、ただし、上記脂質のうちの少なくとも 1 種は、5.0 ~ 7.6 の範囲の pKa (および好ましくは、三級アミン) を有する。この pKa 範囲内では、好ましい脂質は、5.5 ~ 6.7 (例えば、5.6 ~ 6.8 の間、5.6 ~ 6.3 の間、5.6 ~ 6.0 の間、5.5 ~ 6.2 の間、もしくは 5.7 ~ 5.9 の間) の pKa を有する。上記 pKa は、上記脂質が完全に荷電される点と、上記脂質が完全に荷電していない点との間の中間点にある、上記脂質のうちの 50% が荷電している pH である。上記 pKa は、標題「pKa 測定」の節において、以下で開示される方法を使用して測定される。上記 pKa は、代表的には、他の脂質 (例えば、参考文献 6 において行われるようなものではなく、個々の脂質の pKa ではなく SNALP の pKa においてみられる) もまた含む混合物の状況において、上記脂質についてよりむしろ、上記脂質単独について測定されるべきである。

30

【0011】

本発明のリポソームが脂質の混合物から形成される場合、所望の範囲内の pKa を有するそれら脂質の割合が、脂質の総量のうちの 20 ~ 80% の間 (例えば、30 ~ 70% の間、もしくは 40 ~ 60% の間) であるべきであることは、好ましい。例えば、有用なリポソームは、以下に示され、ここで上記総脂質のうちの 40% もしくは 60% が、所望の範囲にある pKa を有する脂質である。残りは、例えば、コレステロール (例えば、35 ~ 50% コレステロール) および / もしくは DMG (必要に応じて、PEG 化される) および / もしくは DSPC から作製され得る。このような混合物は、以下で使用される。これら % 値は、モルパーセンテージである。

40

【0012】

リポソームは、親水性部分が PEG 化されている (すなわち、ポリエチレングリコールの共有結合によって改変されている) 両親媒性脂質を含み得る。この改変は、上記リポソームの安定性を増大させ得、非特異的吸着を妨げ得る。例えば、脂質は、参考文献 6 および 7 において開示されるもののような技術を使用して、PEG に結合体化され得る。PEG は、上記リポソームに有利な薬物動態特性を付与し得るコートを提供する。RNA (特に、自己複製 RNA) の効率的封入、5.0 ~ 7.6 の範囲の pKa を有するカチオン性脂質、および PEG 化表面の組み合わせは、複数の細胞タイプ (免疫細胞および非免疫細胞の両方を含む) への効率的な送達を可能にし、それによって、PEG 化なしで四級アミ

50

ンを使用する場合より強力かつ良好な免疫応答を誘発する。種々の長さの P E G は、例えば、0 . 5 ~ 8 k D a の間で使用され得る。

【 0 0 1 3 】

本発明で使用される脂質は、飽和であっても不飽和であってもよい。リポソームを調製するために少なくとも1種の不飽和脂質を使用することは、好ましい。図3は、3種の有用な不飽和脂質を示す。不飽和脂質が2つの尾部を有する場合、両方の尾部が、不飽和であり得るか、またはそれは、一方に飽和尾部および一方に不飽和尾部を有し得る。

【 0 0 1 4 】

D S P C、D L i n D M A、P E G - D M G およびコレステロールの混合物は、実施例において使用される。本発明の独立した局面は、D S P C、D L i n D M A、P E G - D M G およびコレステロールを含むリポソームである。このリポソームは、好ましくは、R N A (例えば、自己複製 R N A (例えば、免疫原をコードする)) を封入する。

10

【 0 0 1 5 】

リポソーム粒子は、通常は、3つの群に分けられる：多層小胞 (M L V) ; 小さな単層小胞 (S U V) ; および大きな単層小胞 (L U V) 。 M L V は、各小胞において複数の二重層を有し、いくつかの別個の水性区画を形成する。 S U V および L U V は、水性コアを封入する単一の二重層を有する； S U V は、代表的には、直径 5 0 n m を有し、 L U V は、直径 > 5 0 n m を有する。本発明のリポソーム粒子は、理想的には、5 0 ~ 2 2 0 n m の範囲の直径を有する L U V である。様々な直径を有する L U V の集団を含む組成物に関しては：(i) 少なくとも 8 0 % (数で) は、2 0 ~ 2 2 0 n m の範囲の直径を有するべきであり、(i i) 上記集団の平均直径 (Z a v (強度で)) は、理想的には、4 0 ~ 2 0 0 n m の範囲にあり、そして / または (i i i) 上記直径は、多分散指数 < 0 . 2 を有するべきである。参考文献 1 のリポソーム / R N A 複合体は、6 0 0 ~ 8 0 0 n m の範囲の直径を有し、高い多分散性を有すると予測される。上記リポソームは、実質的に球状であり得る。

20

【 0 0 1 6 】

適切なリポソームを調製するための技術は、当該分野で周知である (例えば、参考文献 8 ~ 1 0 を参照のこと)。1つの有用な方法は、参考文献 1 1 に記載され、(i) 脂質のエタノール溶液、(i i) 核酸の水性溶液、および (i i i) 緩衝液を混合する工程、続いて、混合、平衡化、希釈および精製の工程を包含する。本発明の好ましいリポソームは、この混合プロセスによって得られ得る。

30

【 0 0 1 7 】

(混合プロセス)

上記のように、本発明は、R N A 含有リポソームを調製するためのプロセスであって、(a) R N A と、脂質とを、上記脂質の p K a 未満であるが、4 . 5 を上回る p H において混合する工程；次いで、(b) 上記 p H を、上記脂質の p K a を上回るように上昇させる工程を包含するプロセスを提供する。

【 0 0 1 8 】

従って、カチオン性脂質は、工程 (a) におけるリポソーム形成の間に正に荷電されるが、その後の上記 p H 変化は、上記正に荷電した基の大部分 (もしくはすべて) が中性になることを意味する。このプロセスは、本発明のリポソームを調製するために有利であり、工程 (a) の間に 4 . 5 未満の p H を回避することによって、上記封入された R N A の安定性は、改善される。

40

【 0 0 1 9 】

工程 (a) における p H は、4 . 5 を上回り、理想的には、4 . 8 を上回る。5 . 0 ~ 6 . 0 の範囲の、もしくは 5 . 0 ~ 5 . 5 の範囲の p H を使用すると、適切なリポソームが提供され得る。

【 0 0 2 0 】

工程 (b) における増大した p H は、上記脂質の p K a を上回る。上記 p H は、理想的には、9 未満、および好ましくは、8 未満の p H へと上昇する。上記脂質の p K a に依存

50

して、工程 (b) における pH は、従って、6 ~ 8 の範囲内であるように (例えば、pH 6.5 ± 0.3 へと) 上昇し得る。工程 (b) の pH 上昇は、上記リポソームを適切な緩衝液へと (例えば、リン酸緩衝食塩水へと) 移すことによって達成され得る。工程 (b) の pH 上昇は、理想的には、リポソーム形成が起こった後に行われる。

【 0 0 2 1 】

工程 (a) において使用される RNA は、上記脂質の有機溶液 (例えば、参考文献 1 1 におけるように、エタノール性溶液) と混合する間、水性溶液中に存在し得る。次いで、その混合物は希釈されて、リポソームを形成し得、その後、その pH は、工程 (b) において上昇させられ得る。

【 0 0 2 2 】

(RNA)

本発明は、免疫原をコードする RNA のインビボ送達に有用である。上記 RNA は、その送達部位において非免疫細胞によって翻訳され、上記免疫原の発現をもたらす、そしてまた、それは、免疫細胞に、I 型インターフェロンおよび / もしくは炎症促進性サイトカイン (これらは、局所的なアジュバント効果を提供する) を分泌させる。上記非免疫細胞はまた、上記 RNA に応答して I 型インターフェロンおよび / もしくは炎症促進性サイトカインを分泌し得る。

【 0 0 2 3 】

上記 RNA は、プラス鎖であるので、それは、いかなる介入複製ステップ (*intervening replication step*) (例えば、逆転写) も必要とせず、非免疫細胞によって翻訳され得る。それはまた、免疫細胞によって発現される TLR7 レセプターに結合し得、それによって、アジュバント効果を開始し得る。

【 0 0 2 4 】

好ましいプラス鎖 RNA は、自己複製性である。自己複製 RNA 分子 (レプリコン) は、あらゆるタンパク質なしで脊椎動物細胞に送達される場合でも、上記自己複製 RNA 分子自体からの転写によって (上記自己複製 RNA 分子自体から生成するアンチセンスコピーを介して) 、複数の娘 RNA の生成をもたらす。自己複製 RNA 分子は、従って、代表的には、細胞へ送達された後に直接翻訳され得るプラス鎖分子であり、この翻訳は、RNA 依存性 RNA ポリメラーゼを提供し、次いで、これは、上記送達された RNA からアンチセンス転写物およびセンス転写物の両方を生成する。従って、上記送達された RNA は、複数の娘 RNA の生成をもたらす。これら娘 RNA、ならびに同一線上 (*collinear*) のサブゲノム転写物は、それ自体が翻訳されて、コードされた免疫原のインサイチュ発現を提供し得るか、または転写されて、上記送達された RNA と同じセンスのさらなる転写物 (上記免疫原のインサイチュ発現を提供するように翻訳される) を提供し得る。この一連の転写の全体的な結果は、上記導入されたレプリコン RNA の数における非常に多くの増幅であり、よって、上記コードされた免疫原は、上記細胞の主なポリペプチド生成物になる。

【 0 0 2 5 】

以下に示されるように、自己複製活性は、RNA がアジュバント効果を提供するのに必要とされないが、それは、サイトカインのトランスフェクション後分泌を増強し得る。上記自己複製活性は、非免疫細胞による免疫原の高レベル発現を達成するために特に有用である。それはまた、上記非免疫細胞のアポトーシスを増強させ得る。

【 0 0 2 6 】

自己複製を達成するための 1 つの適切なシステムは、アルファウイルススペースの RNA 複製を使用することである。これらプラス鎖レプリコンは、細胞への送達後に翻訳されて、レプリカーゼ (もしくはレプリカーゼ - 転写酵素) を与える。上記レプリカーゼは、上記送達されたプラス鎖 RNA のゲノムマイナス鎖コピーを作り出す複製複合体を提供するように自己切断するポリプロテインとして翻訳される。これらマイナス鎖転写物は、これ自体が、上記プラス鎖親 RNA のさらなるコピーを与え、そしてまた、免疫原をコードするサブゲノム転写物を与えるように転写され得る。従って、上記サブゲノム転写物の翻訳

10

20

30

40

50

は、上記感染した細胞による上記免疫原のインサイチュ発現をもたらす。適切なアルファウイルスレプリコンは、シンドビス・ウイルス、セムリキ森林ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルスなどに由来するレプリカーゼを使用し得る。変異型ウイルスもしくは野生型ウイルスの配列が使用され得る（例えば、VEEVの弱毒化TC83変異体は、レプリコンにおいて使用されてきた[12]）。

【0027】

好ましい自己複製RNA分子は、従って、(i)上記自己複製RNA分子からRNAを転写し得るRNA依存性RNAポリメラーゼ、および(ii)免疫原をコードする。上記ポリメラーゼは、アルファウイルスレプリカーゼ（例えば、アルファウイルスタンパク質nsP1、nsP2、nsP3およびnsP4のうち1種以上を含む）であり得る。

10

【0028】

天然のアルファウイルスゲノムが、上記非構造レプリカーゼポリプロテインに加えて、構造的ビリオンタンパク質をコードするのに対して、本発明の自己複製RNA分子は、アルファウイルス構造タンパク質をコードしないことが好ましい。従って、好ましい自己複製RNAは、細胞においてそれ自体のゲノムRNAコピーの生成をもたらし得るが、RNA含有ビリオンの生成はもたらさない。これらのビリオンを生成できないことは、野生型アルファウイルスとは異なり、上記自己複製RNA分子が、感染性形態においてそれ自体を永続させられないことを意味する。野生型ウイルスにおいて永続に必要な上記アルファウイルス構造タンパク質は、本発明の自己複製RNAには存在せず、それらの位置は、上記目的の免疫原をコードする遺伝子によってしめられている。その結果、上記サブゲノム転写物は、上記構造的アルファウイルスビリオンタンパク質ではなく、上記免疫原をコードする。

20

【0029】

従って、本発明で有用な自己複製RNA分子は、2個のオープンリーディングフレームを有し得る。第1の(5'側)オープンリーディングフレームは、レプリカーゼをコードし；第2の(3'側)オープンリーディングフレームは、免疫原をコードする。いくつかの実施形態において、上記RNAは、例えば、さらなる免疫原（以下を参照のこと）をコードするために、もしくは補助ポリペプチドをコードするために、さらなる（例えば、下流の）オープンリーディングフレームを有し得る。

【0030】

自己複製RNA分子は、上記コードされたレプリカーゼと適合性である5'配列を有し得る。

30

【0031】

自己複製RNA分子は、種々の長さを有し得るが、それらは、代表的には、5000~25000ヌクレオチド長（例えば、8000~15000ヌクレオチド、もしくは9000~12000ヌクレオチド）である。従って、上記RNAは、siRNA送達において認められるものより長い。

【0032】

本発明で有用なRNA分子は、5'キャップ（例えば、7-メチルグアノシン）を有し得る。このキャップは、上記RNAのインビボ翻訳を増強し得る。

40

【0033】

本発明で有用なRNA分子の5'ヌクレオチドは、5'トリホスフェート基を有し得る。キャップをしたRNAにおいて、これは、5'から5'への架橋を介して、7-メチルグアノシンに連結され得る。5'トリホスフェートは、RIG-I結合を増強し得、従って、アジュバント効果を促進し得る。

【0034】

RNA分子は、3'ポリA尾部を有し得る。それはまた、その3'末端付近にポリAポリメラーゼ認識配列（例えば、AAUAAA）を含み得る。

【0035】

本発明で有用なRNA分子は、代表的には、一本鎖である。一本鎖RNAは、一般に、

50

T L R 7、T L R 8、R N Aヘリカーゼおよび/もしくはP K Rに結合することによって、アジュバント効果を開始し得る。二本鎖形態(d s R N A)で送達されたR N Aは、T L R 3に結合し得、このレセプターはまた、一本鎖R N Aの複製の間か、または一本鎖R N Aの二次構造内のいずれかで形成されるd s R N Aによって誘発され得る。

【0036】

本発明で有用なR N A分子は、便宜上、インビトロ転写(I V T)によって調製され得る。I V Tは、細菌においてプラスミド形態において作られ、増やされたか、または合成で作製された(例えば、遺伝子合成および/もしくはポリメラーゼ連鎖反応(P C R)操作法によって)(c D N A)テンプレートを使用し得る。例えば、D N A依存性R N Aポリメラーゼ(例えば、バクテリオファージT 7、T 3もしくはS P 6 R N Aポリメラーゼ)は、D N AテンプレートからR N Aを転写するために使用され得る。適切なキャッピングおよびポリA付加反応は、必要時に使用され得る(しかし、上記レプリコンのポリAは、通常、上記D N Aテンプレート内にコードされる)。これらR N Aポリメラーゼは、転写される5'ヌクレオチドについてストリンジェントな要件を有し得、いくつかの実施形態において、これらの要件は、上記I V T転写R N Aが、自己がコードするレプリカーゼの基質として効率的に機能し得ることを確実にするために、上記コードされたレプリカーゼの要件とマッチしなければならない。

【0037】

参考文献13において考察されるように、上記自己複製R N Aは、(任意の5'キャップ構造に加えて)改変された核酸塩基を有する1個以上のヌクレオチドを含み得る。従って、上記R N Aは、以下を含み得る：m 5 C (5 - メチルシチジン)、m 5 U (5 - メチルウリジン)、m 6 A (N 6 - メチルアデノシン)、s 2 U (2 - チオウリジン)、U m (2' - O - メチルウリジン)、m 1 A (1 - メチルアデノシン)；m 2 A (2 - メチルアデノシン)；A m (2' - O - メチルアデノシン)；m s 2 m 6 A (2 - メチルチオ - N 6 - メチルアデノシン)；i 6 A (N 6 - イソペンテニルアデノシン)；m s 2 i 6 A (2 - メチルチオ - N 6 イソペンテニルアデノシン)；i o 6 A (N 6 - (c i s - ヒドロキシイソペンテニル)アデノシン)；m s 2 i o 6 A (2 - メチルチオ - N 6 - (c i s - ヒドロキシイソペンテニル)アデノシン)；g 6 A (N 6 - グリシニルカルバモイルアデノシン)；t 6 A (N 6 - スレオニルカルバモイルアデノシン)；m s 2 t 6 A (2 - メチルチオ - N 6 - スレオニルカルバモイルアデノシン)；m 6 t 6 A (N 6 - メチル - N 6 - スレオニルカルバモイルアデノシン)；h n 6 A (N 6 - ヒドロキシノルバリルカルバモイルアデノシン)；m s 2 h n 6 A (2 - メチルチオ - N 6 - ヒドロキシノルバリルカルバモイルアデノシン)；A r (p) (2' - O - リボシルアデノシン(ホスフェート))；I (イノシン)；m 1 1 (1 - メチルイノシン)；m' I m (1, 2' - O - ジメチルイノシン)；m 3 C (3 - メチルシチジン)；C m (2 T - O - メチルシチジン)；s 2 C (2 - チオシチジン)；a c 4 C (N 4 - アセチルシチジン)；f 5 C (5 - ホルミル(f o n n y l)シチジン)；m 5 C m (5, 2 - O - ジメチルシチジン)；a c 4 C m (N 4 アセチル2 T Oメチルシチジン)；k 2 C (リシジン)；m 1 G (1 - メチルグアノシン)；m 2 G (N 2 - メチルグアノシン)；m 7 G (7 - メチルグアノシン)；G m (2' - O - メチルグアノシン)；m 2 2 G (N 2, N 2 - ジメチルグアノシン)；m 2 G m (N 2, 2' - O - ジメチルグアノシン)；m 2 2 G m (N 2, N 2, 2' - O - トリメチルグアノシン)；G r (p) (2' - O - リボシルグアノシン(ホスフェート))；y W (ワイプトシン)；o 2 y W (ペルオキシワイプトシン)；O H y W (ヒドロキシワイプトシン)；O H y W* (改変下(undermodified)ヒドロキシワイプトシン)；i m G (ワイオシン)；m i m G (メチルグアノシン)；Q (キューオシン)；o Q (エポキシキューオシン)；g a l Q (ガラクトシル(g a l t a c t o s y l) - キューオシン)；m a n Q (マンノシル - キューオシン)；p r e Q o (7 - シアノ - 7 - デアザグアノシン)；p r e Q i (7 - アミノメチル - 7 - デアザグアノシン)；G (アルカエオシン(a r c h a e o s i n e))；D (ジヒドロウリジン)；m 5 U m (5, 2' - O - ジメチルウリジン)；s 4 U (4 - チオウリジン)；m 5 s 2 U (

10

20

30

40

50

5 - メチル - 2 - チオウリジン) ; s 2 U m (2 - チオ - 2 ' - O - メチルウリジン) ; a c p 3 U (3 - (3 - アミノ - 3 - カルボキシプロピル)ウリジン) ; h o 5 U (5 - ヒドロキシウリジン) ; m o 5 U (5 - メトキシウリジン) ; c m o 5 U (ウリジン 5 - オキシ酢酸) ; m c m o 5 U (ウリジン 5 - オキシ酢酸メチルエステル) ; c h m 5 U (5 - (カルボキシヒドロキシメチル)ウリジン) ; m c h m 5 U (5 - (カルボキシヒドロキシメチル)ウリジンメチルエステル) ; m c m 5 U (5 - メトキシカルボニルメチルウリジン) ; m c m 5 U m (S - メトキシカルボニルメチル - 2 - O - メチルウリジン) ; m c m 5 s 2 U (5 - メトキシカルボニルメチル - 2 - チオウリジン) ; n m 5 s 2 U (5 - アミノメチル - 2 - チオウリジン) ; m n m 5 U (5 - メチルアミノメチルウリジン) ; m n m 5 s 2 U (5 - メチルアミノメチル - 2 - チオウリジン) ; m n m 5 s e 2 U (5 - メチルアミノメチル - 2 - セレノウリジン) ; n c m 5 U (5 - カルバモイルメチルウリジン) ; n c m 5 U m (5 - カルバモイルメチル - 2 ' - O - メチルウリジン) ; c m n m 5 U (5 - カルボキシメチルアミノメチルウリジン) ; c n m m 5 U m (5 - カルボキシメチルアミノメチル - 2 - L - Oメチルウリジン) ; c m n m 5 s 2 U (5 - カルボキシメチルアミノメチル - 2 - チオウリジン) ; m 6 2 A (N 6 , N 6 - ジメチルアデノシン) ; T m (2 ' - O - メチルイノシン) ; m 4 C (N 4 - メチルシチジン) ; m 4 C m (N 4 , 2 - O - ジメチルシチジン) ; h m 5 C (5 - ヒドロキシメチルシチジン) ; m 3 U (3 - メチルウリジン) ; c m 5 U (5 - カルボキシメチルウリジン) ; m 6 A m (N 6 , T - O - ジメチルアデノシン) ; r n 6 2 A m (N 6 , N 6 , O - 2 - トリメチルアデノシン) ; m 2 ' 7 G (N 2 , 7 - ジメチルグアノシン) ; m 2 ' 2 ' 7 G (N 2 , N 2 , 7 - トリメチルグアノシン) ; m 3 U m (3 , 2 T - O - ジメチルウリジン) ; m 5 D (5 - メチルジヒドロウリジン) ; f 5 C m (5 - ホルミル - 2 ' - O - メチルシチジン) ; m 1 G m (1 , 2 ' - O - ジメチルグアノシン) ; m ' A m ((1 , 2 - O - ジメチルアデノシン)イリノメチルウリジン) ; t m 5 s 2 U (S - タウリノメチル - 2 - チオウリジン) ; i m G - 1 4 (4 - デメチルグアノシン) ; i m G 2 (イソグアノシン) ; もしくは a c 6 A (N 6 - アセチルアデノシン)、ヒポキサンチン、イノシン、8 - オキソ - アデニン、7 - 置換されたその誘導体、ジヒドロウラシル、シュードウラシル、2 - チオウラシル、4 - チオウラシル、5 - アミノウラシル、5 - (C 1 - C 6) - アルキルウラシル、5 - メチルウラシル、5 - (C 2 - C 6) - アルケニルウラシル、5 - (C 2 - C 6) - アルキニルウラシル、5 - (ヒドロキシメチル)ウラシル、5 - クロロウラシル、5 - フルオロウラシル、5 - プロモウラシル、5 - ヒドロキシシトシン、5 - (C 1 - C 6) - アルキルシトシン、5 - メチルシトシン、5 - (C 2 - C 6) - アルケニルシトシン、5 - (C 2 - C 6) - アルキニルシトシン、5 - クロロシトシン、5 - フルオロシトシン、5 - プロモシトシン、N 2 - ジメチルグアニン、7 - デアザグアニン、8 - アザグアニン、7 - デアザ - 7 - 置換グアニン、7 - デアザ - 7 - (C 2 - C 6) アルキニルグアニン、7 - デアザ - 8 - 置換グアニン、8 - ヒドロキシグアニン、6 - チオグアニン、8 - オキソグアニン、2 - アミノプリン、2 - アミノ - 6 - クロロプリン、2 , 4 - ジアミノプリン、2 , 6 - ジアミノプリン、8 - アザプリン、置換された7 - デアザプリン、7 - デアザ - 7 - 置換プリン、7 - デアザ - 8 - 置換プリン、または無塩基ヌクレオチド。例えば、自己複製RNAは、1つ以上の改変されたピリミジン核酸塩基(例えば、シュードウリジンおよび/もしくは5 - メチルシトシン残基)を含み得る。しかし、いくつかの実施形態において、上記RNAは、改変された核酸塩基を含まず、改変されたヌクレオチドを含まなくてもよい(すなわち、上記RNA中のヌクレオチドのすべては、標準的なA、C、GおよびUというリボヌクレオチドである(任意の5'キャップ構造を除く。これは、7' - メチルグアノシンを含み得る))。他の実施形態において、上記RNAは、7' - メチルグアノシンを含む5'キャップを含み得、最初の1個、2個もしくは3個の5'リボヌクレオチドは、リボースの2'位においてメチル化され得る。

【0038】

本発明で使用されるRNAは、理想的には、ヌクレオチド間にホスホジエステル結合のみを含むが、いくつかの実施形態において、それは、ホスホロアミデート結合、ホスホロ

チオエート結合、および/もしくはメチルホスホネート結合を含み得る。

【0039】

理想的には、リボソームは、10種より少ない異なる種のRNA（例えば、5種、4種、3種、もしくは2種の異なる種）を含み；最も好ましくは、リボソームは、単一のRNA種（すなわち、上記リボソーム中のすべてのRNA分子が、同じ配列および同じ長さを有する）を含む。

【0040】

1リボソームあたりのRNAの量は変動し得る。1リボソームあたりの個々の自己複製RNAの数は、代表的には、1リボソームあたり50個（例えば、<20個、<10個、<5個、もしくは1~4個）である。

10

【0041】

（免疫原）

本発明で使用されるRNA分子は、ポリペプチド免疫原をコードする。上記リボソームの投与後に、上記RNAは、インピボで翻訳され、そして免疫原は、レシピエントにおける免疫応答を誘発し得る。上記免疫原は、細菌、ウイルス、真菌もしくは寄生生物に対して（あるいは、いくつかの実施形態において、アレルゲンに対して；および他の実施形態において、腫瘍抗原に対して）免疫応答を誘発し得る。上記免疫応答は、抗体応答（通常は、IgGを含む）および/もしくは細胞媒介性免疫応答を含み得る。上記ポリペプチド免疫原は、代表的には、対応する細菌、ウイルス、真菌もしくは寄生生物（またはアレルゲンもしくは腫瘍）ポリペプチドを認識する免疫応答を誘発するが、いくつかの実施形態において、上記ポリペプチドは、細菌、ウイルス、真菌もしくは寄生生物のサッカリドを認識する免疫応答を誘発するように、ミモトープとして作用し得る。上記免疫原は、代表的には、表面ポリペプチド（例えば、アドヘシン、ヘマグルチニン、エンペローブ糖タンパク質、スパイク糖タンパク質など）である。

20

【0042】

自己複製RNA分子は、単一のポリペプチド免疫原もしくは複数のポリペプチドをコードし得る。複数の免疫原は、単一のポリペプチド免疫原（融合ポリペプチド）として、または別個のポリペプチドとして提示され得る。免疫原が、別個のポリペプチドとして発現される場合、これらのうちの1種以上は、上流のIRESもしくはさらなるウイルスプロモーターエレメントとともに提供され得る。あるいは、複数の免疫原は、短い自己触媒性プロテアーゼ（例えば、口蹄疫ウイルス2Aタンパク質）に融合された個々の免疫原をコードするポリプロテインから、またはインティンとして発現され得る。

30

【0043】

参考文献1および14とは異なり、上記RNAは、免疫原をコードする。不確かさを避けるために、本発明は、ホタルルシフェラーゼをコードするRNA、E. coli - ガラクトシダーゼの融合タンパク質をコードするRNA、緑色蛍光タンパク質（GFP）をコードするRNAを含まない。また、上記RNAは、全マウス胸腺RNAではない。

【0044】

いくつかの実施形態において、上記免疫原は、これら細菌のうちの1種に対して免疫応答を誘発する：

40

Neisseria meningitidis：有用な免疫原としては、膜タンパク質、例えば、アドヘシン、オートトランスポーター、毒素、鉄獲得タンパク質、およびH因子結合タンパク質が挙げられるが、これらに限定されない。3種の有用なポリペプチドの組み合わせが、参考文献15に開示される。

【0045】

Streptococcus pneumoniae：有用なポリペプチド免疫原は、参考文献16に開示される。これらとしては、RrgB線毛サブユニット、-N-アセチル-ヘキソサミニダーゼ前駆体（spr0057）、spr0096、一般的なストレスタンパク質（general stress protein）GSP-781（spr2021、SP2216）、セリン/スレオニンキナーゼStkP（SP1732）、

50

および肺炎球菌表面アドヘシン PsaA が挙げられるが、これらに限定されない。

【0046】

Streptococcus pyogenes : 有用な免疫原としては、参考文献 17 および 18 に開示されるポリペプチドが挙げられるが、これらに限定されない。

【0047】

Moraxella catarrhalis

Bordetella pertussis : 有用な百日咳免疫原としては、百日咳毒素もしくはトキソイド (PT)、線維状ヘマグルチニン (FHA)、ペルタクチン、ならびに凝集原 2 および 3 が挙げられるが、これらに限定されない。

【0048】

Staphylococcus aureus : 有用な免疫原としては、参考文献 19 に開示されるポリペプチド (例えば、溶血素、esxA、esxB、フェリクロム結合タンパク質 (sta006) および / もしくは sta011 リポプロテイン) が挙げられるが、これらに限定されない。

【0049】

Clostridium tetani : 代表的な免疫原は、破傷風トキソイドである。

【0050】

Corynebacterium diphtheriae : 代表的な免疫原は、ジフテリアトキソイドである。

【0051】

Haemophilus influenzae : 有用な免疫原としては、参考文献 20 および 21 に開示されるポリペプチドが挙げられるが、これらに限定されない。

【0052】

Pseudomonas aeruginosa

Streptococcus agalactiae : 有用な免疫原としては、参考文献 17 に開示されるポリペプチドが挙げられるが、これらに限定されない。

【0053】

Chlamydia trachomatis : 有用な免疫原としては、PepA、LcrE、ArtJ、DnaK、CT398、OmpH 様、L7 / L12、OmcA、AtoS、CT547、Eno、HtrA および MurG (例えば、参考文献 22 に開示されるとおり) が挙げられるが、これらに限定されない。LcrE [23] および HtrA [24] は、2 つの好ましい免疫原である。

【0054】

Chlamydia pneumoniae : 有用な免疫原としては、参考文献 25 に開示されるポリペプチドが挙げられるが、これらに限定されない。

【0055】

Helicobacter pylori : 有用な免疫原としては、CagA、VacA、NAP、および / もしくはウレアーゼ [26] が挙げられるが、これらに限定されない。

【0056】

Escherichia coli : 有用な免疫原としては、腸毒素産生性 *E. coli* (ETEC)、腸管凝集性 *E. coli* (EAggEC)、分散接着性 (diffusely adhering) *E. coli* (DAEC)、腸病原性 *E. coli* (EPEC)、腸管外病原性 *E. coli* (ExPEC) および / もしくは腸管出血性 *E. coli* (EHEC) に由来する免疫原が挙げられるが、これらに限定されない。ExPEC 株としては、尿路病原性 *E. coli* (UPEC) および髄膜炎 / 敗血症関連 *E. coli* (MNEC) が挙げられる。有用な UPEC ポリペプチド免疫原は、参考文献 27 および 28 に開示される。有用な MNEC 免疫原は、参考文献 29 に開示される。いくつかの *E. coli* タイプに有用な免疫原は、AcfD である [30]。

【0057】

10

20

30

40

50

B a c i l l u s a n t h r a c i s

Y e r s i n i a p e s t i s : 有用な免疫原としては、参考文献 3 1 および 3 2 に開示されるものが挙げられるが、これらに限定されない。

【 0 0 5 8 】

【 化 1 】

Staphylococcus epidermis

Clostridium perfringens もしくは *Clostridium botulinum*

Legionella pneumophila

10

Coxiella burnetii

Brucella, 例えば *B.abortus*, *B.canis*, *B.melitensis*, *B.neotomae*, *B.ovis*, *B.suis*, *B.pinnipediae*.

Francisella, 例えば *F.novicida*, *F.philomiragia*, *F.tularensis*.

Neisseria gonorrhoeae

Treponema pallidum

20

Haemophilus ducreyi

【 0 0 5 9 】

【 化 2 】

Enterococcus faecalis もしくは

Enterococcus faecium

Staphylococcus saprophyticus

Yersinia enterocolitica

30

Mycobacterium tuberculosis

Rickettsia

Listeria monocytogenes

Vibrio cholerae

Salmonella typhi

40

Borrelia burgdorferi

Porphyromonas gingivalis

Klebsiella

いくつかの実施形態において、上記免疫原は、これらウイルスのうちの 1 種に対して免疫応答を誘発する：

オルソミクソウイルス：有用な免疫原は、インフルエンザ A、B もしくは C ウイルスに

50

由来し得る（例えば、ヘマグルチニン、ノイラミニダーゼもしくはマトリクスM2タンパク質）。上記免疫原がインフルエンザAウイルスヘマグルチニンである場合、それは、任意のサブタイプ（例えば、H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H9、H10、H11、H12、H13、H14、H15もしくはH16）に由来し得る。

【0060】

パラミクソウイルス科のウイルス：ウイルス免疫原としては、肺炎ウイルス（例えば、RSウイルス、RSV）、ルブラウイルス（例えば、ムンプスウイルス）、パラミクソウイルス（例えば、パラインフルエンザ・ウイルス）、メタニューモウイルスおよびモルビリウイルス（例えば、麻疹）に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0061】

ポックスウイルス科：ウイルス免疫原としては、オルトポックスウイルス（例えば、真正痘瘡（大痘瘡および小痘瘡が挙げられるが、これらに限定されない））に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0062】

ピコルナウイルス：ウイルス免疫原としては、ピコルナウイルス（例えば、エンテロウイルス、ライノウイルス、ヘパルナウイルス、カルジオウイルスおよびアフトウイルス）に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。一実施形態において、上記エンテロウイルスは、ポリオウイルス（例えば、1型、2型、および/もしくは3型のポリオウイルス）である。別の実施形態において、上記エンテロウイルスは、EV71エンテロウイルスである。別の実施形態において、上記エンテロウイルスは、コクサッキーAもしくはBウイルスである。

【0063】

ブンヤウイルス：ウイルス免疫原としては、オルソブンヤウイルス（例えば、カリフォルニア脳炎ウイルス）、フレボウイルス（例えば、リフトバレー熱ウイルス）、もしくはナイロウイルス（例えば、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス）に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0064】

ヘパルナウイルス：ウイルス免疫原としては、ヘパルナウイルス（例えば、A型肝炎ウイルス（HAV））に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0065】

フィロウイルス：ウイルス免疫原としては、フィロウイルス（例えば、エボラウイルス（ザイールエボラウイルス、アイボリーコーストエボラウイルス、レストンエボラウイルスもしくはスーダンエボラウイルスを含む））またはマールブルグウイルスに由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0066】

トガウイルス：ウイルス免疫原としては、トガウイルス（例えば、ルビウイルス、アルファウイルス、もしくはアルテリウイルス）に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。これは、風疹ウイルスを含む。

【0067】

フラビウイルス：ウイルス免疫原としては、フラビウイルス（例えば、ダニ媒介脳炎（TBE）ウイルス、デング（1、2、3もしくは4型）ウイルス、黄熱ウイルス、日本脳炎ウイルス、キャサヌール森林ウイルス、ウエストナイル脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ロシア春夏脳炎ウイルス、ポワッサン脳炎ウイルス）に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0068】

ペスチウイルス：ウイルス免疫原としては、ペスチウイルス（例えば、牛ウイルス性下痢（BVDV）、豚コレラ（CSFV）もしくはボウダ病（BDV））に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0069】

ヘパドナウイルス：ウイルス免疫原としては、ヘパドナウイルス（例えば、B型肝炎ウ

10

20

30

40

50

ウイルス)に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。組成物は、B型肝炎ウイルス表面抗原(HBsAg)を含み得る。

【0070】

他の肝炎ウイルス：組成物は、C型肝炎ウイルス、デルタ型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルス、もしくはG型肝炎ウイルスに由来する免疫原を含み得る。

【0071】

ラブドウイルス：ウイルス免疫原としては、ラブドウイルス(例えば、リッサウイルス(例えば、狂犬病ウイルス)およびベシクロウイルス(VSV))に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0072】

カリシウイルス科：ウイルス免疫原としては、カリシウイルス科(例えば、ノーウォークウイルス(ノロウイルス)、およびノーウォーク様ウイルス(例えば、ハワイウイルスおよびスノーマウンテンウイルス))に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0073】

コロナウイルス：ウイルス免疫原は、SARSコロナウイルス、トリ伝染性気管支炎(IBV)、マウス肝炎ウイルス(MHV)、およびブタ伝染性胃腸炎ウイルス(TGEV)に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。上記コロナウイルス免疫原は、スパイクポリペプチドであり得る。

【0074】

レトロウイルス：ウイルス免疫原としては、オンコウイルス、レンチウイルス(例えば、HIV-1もしくはHIV-2)またはスプマウイルスに由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0075】

レオウイルス：ウイルス免疫原としては、オルトレオウイルス、ロタウイルス、オルビウイルス、もしくはコルチウイルスに由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0076】

パルボウイルス：ウイルス免疫原としては、パルボウイルスB19に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0077】

ヘルペスウイルス：ウイルス免疫原としては、ヒトヘルペスウイルス(例えば、例示に過ぎないが、単純ヘルペスウイルス(HSV)(例えば、HSV1型および2型)、水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)、エプスタイン・バー・ウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス(CMV)、ヒトヘルペスウイルス6(HHV6)、ヒトヘルペスウイルス7(HHV7)、およびヒトヘルペスウイルス8(HHV8))に由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。

【0078】

パポバウイルス：ウイルス免疫原としては、パピローマウイルスおよびポリオーマウイルスに由来するものが挙げられるが、これらに限定されない。上記(ヒト)パピローマウイルスは、血清型1、2、4、5、6、8、11、13、16、18、31、33、35、39、41、42、47、51、57、58、63もしくは65のもの(例えば、血清型6、11、16および/もしくは18のうちの1種以上に由来する)であり得る。

【0079】

アデノウイルス：ウイルス免疫原としては、アデノウイルス血清型36(Ad-36)に由来するものが挙げられる。

【0080】

いくつかの実施形態において、上記免疫原は、魚類に感染するウイルス(例えば：伝染性サケ貧血ウイルス(ISAV)、サケ腭臓病ウイルス(SP DV)、伝染性腭臓壊死症ウイルス(IPNV)、アメリカナマズウイルス(CCV)、魚類リンホシスチス病ウイ

10

20

30

40

50

ルス (FLDV)、伝染性造血器壊死症ウイルス (IHNV)、コイヘルペスウイルス、サケピコルナ様ウイルス (大西洋サケピコルナ様ウイルスとしても公知)、ヤマメウイルス (LSV)、大西洋サケロタウイルス (ASR)、マスイチゴ病ウイルス (TSD)、銀ザケ腫瘍ウイルス (CSTV)、もしくはウイルス性出血性敗血症ウイルス (VHSV) に対する免疫応答を誘発する。

【0081】

真菌免疫原は、皮膚糸状菌類 (Dermatophytrés) (以下が挙げられる :

【0082】

【化3】

Epidermophyton floccusum,
Microsporium audouini, *Microsporium canis*, *Microsporium distortum*, *Microsporium equinum*,
Microsporium gypsum, *Microsporium nanum*, *Trichophyton concentricum*, *Trichophyton equinum*,
Trichophyton gallinae, *Trichophyton gypseum*, *Trichophyton megnini*, *Trichophyton mentagrophytes*,
Trichophyton quinckeanum, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton schoenleini*,
Trichophyton tonsurans, *Trichophyton verrucosum*, *T. verrucosum* var. *album*, var. *discoides*, var.
ochraceum, *Trichophyton violaceum*, および/もしくは *Trichophyton faviforme*; または *Aspergillus fumigatus*,
Aspergillus flavus, *Aspergillus niger*, *Aspergillus nidulans*, *Aspergillus terreus*, *Aspergillus sydowi*,

10

20

【0083】

【化4】

Aspergillus flavus, *Aspergillus glaucus*, *Blastoschizomyces capitatus*, *Candida albicans*, *Candida enolase*,
Candida tropicalis, *Candida glabrata*, *Candida krusei*, *Candida parapsilosis*, *Candida stellatoidea*,
Candida kusei, *Candida parakwsei*, *Candida lusitaniae*, *Candida pseudotropicalis*,
Candida guilliermondi, *Cladosporium carrionii*, *Coccidioides immitis*, *Blastomyces dermatidis*,
Cryptococcus neoformans, *Geotrichum clavatum*, *Histoplasma capsulatum*, *Klebsiella pneumoniae*,
Microsporidia, *Encephalitozoon spp.*, *Septata intestinalis* および *Enterocytozoon bieneusi*; それほど
一般的でないものは、*Brachiola spp.*, *Microsporidium spp.*, *Nosema spp.*, *Pleistophora spp.*,
Trachipleistophora spp., *Vittaforma spp.* *Paracoccidioides brasiliensis*, *Pneumocystis carinii*,
Pythium insidiosum, *Pityrosporum ovale*, *Sacharomyces cerevisiae*, *Saccharomyces boulardii*,
Saccharomyces pombe, *Scedosporium apiosperum*, *Sporothrix schenckii*, *Trichosporon beigeli*,
Toxoplasma gondii, *Penicillium marneffeii*, *Malassezia spp.*, *Fonsecaea spp.*, *Wangiella spp.*,
Sporothrix spp., *Basidiobolus spp.*, *Conidiobolus spp.*, *Rhizopus spp.*, *Mucor spp.*, *Absidia spp.*,
Mortierella spp., *Cunninghamella spp.*, *Saksenaea spp.*, *Alternaria spp.*, *Curvularia spp.*,
Helminthosporium spp., *Fusarium spp.*, *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*, *Monolinia spp.*, *Rhizoctonia*
spp., *Paecilomyces spp.*, *Pithomyces spp.*, および *Cladosporium spp.* である)

30

40

に由来し得る。

【0084】

いくつかの実施形態において、上記免疫原は、*Plasmodium* 属 (例えば、*P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* もしくは *P. ovale*) に由来する寄生生物に対する免疫応答を誘発する。従って、本発明は、マラリアに対して免疫するために使用され得る。いくつかの実施形態において、上記免疫原は、*Caligidae* 科に由来する寄生生物、特に、*Lepeophtheirus* 属および *Cal*

50

ig us 属に由来する寄生生物（例えば、*Lepeophtheirus salmonis* もしくは *Caligus rogercresseyi* のようなフナムシ）に対する免疫応答を誘発する。

【0085】

いくつかの実施形態において、上記免疫原は、以下に対する免疫応答を誘発する：花粉アレルゲン（樹木花粉、草本花粉、雑草の花粉、および草の花粉のアレルゲン）；昆虫もしくは蛛形類のアレルゲン（吸入、唾液および毒液のアレルゲン、例えば、ダニアレルゲン、ゴキブリアレルゲンおよび小虫アレルゲン、膜翅類毒液アレルゲン（*hymenoptera venom allergen*））；動物の毛およびふけのアレルゲン（例えば、イヌ、ネコ、ウマ、ラット、マウスなどに由来する）；ならびに食物アレルゲン（例えば、グリアジン）。樹木、草および草本に由来する重要な花粉アレルゲンは、*Fagales*、*Oleales*、*Pinales* の分類学上の目およびスズカケノキ科（*platanaceae*）（カバノキ（*Betula*）、ハンノキ（*Alnus*）、ハシバミ（*Corylus*）、シデ（*Carpinus*）およびオリーブ（*Olea*）、シーダー（*Cryptomeria* および *Juniperus*）、プラタナス（*Platanus*）が挙げられるが、これらに限定されない）、*Poales* の目（属 *Lolium*、*Phleum*、*Poa*、*Cynodon*、*Dactylis*、*Holcus*、*Phalaris*、*Secale*、および *Sorghum* の草が挙げられる）、*Asterales* および *Urticales* の目（属 *Ambrosia*、*Artemisia*、および *Parietaria* の草本が挙げられる）から由来するそのようなものである。他の重要な吸入アレルゲンは、属 *Dermatophagoidea* および *Euroglyphus* のチリダニ類、コナダニ類（*storage mite*）（例えば、*Lepidoglyphys*、*Glycyphagus* および *Tyrophagus*）、ゴキブリ、小虫およびノミに由来するもの（例えば、*Blattella*、*Periplaneta*、*Chironomus* および *Ctenocephalides*）、ならびに哺乳動物（例えば、ネコ、イヌおよびウマ）に由来するもの、毒液のアレルゲン（刺咬昆虫（*stinging or biting insect*）に由来するようなもの、例えば、*Hymenoptera* の分類学上の目（蜂（*Apidae*）、スズメバチ（*Vespidae*）、およびアリ（*Formicoidae*）が挙げられる）が挙げられる）に由来するものである。

【0086】

いくつかの実施形態において、上記免疫原は、以下から選択される腫瘍抗原である：（a）がん - 精巣（*cancer - testis*）抗原、例えば、*NY - ESO - 1*、*SSX2*、*SCP1* ならびに *RAGE*、*BAGE*、*GAGE* および *MAGE* ファミリーのポリペプチド（例えば、*GAGE - 1*、*GAGE - 2*、*MAGE - 1*、*MAGE - 2*、*MAGE - 3*、*MAGE - 4*、*MAGE - 5*、*MAGE - 6*、および *MAGE - 12*）、これらは、例えば、黒色腫、肺、頭頸部、*NSCLC*、乳房、胃腸、および膀胱の腫瘍に対処するために使用され得る；（b）変異した抗原、例えば、*p53*（種々の固形腫瘍（例えば、結腸直腸がん、肺がん、頭頸部がん）と関連）、*p21/Ras*（例えば、黒色腫、膵臓がんおよび結腸直腸がんと関連）、*CDK4*（例えば、黒色腫と関連）、*MUM1*（例えば、黒色腫と関連）、*カスパーゼ - 8*（例えば、頭頸部がんと関連）、*CIA 0205*（例えば、膀胱がんと関連）、*HLA - A2 - R1701*、*- カテニン*（例えば、黒色腫と関連）、*TCR*（例えば、T細胞非ホジキンリンパ腫と関連）、*BCR - ab1*（例えば、慢性骨髄性白血病と関連）、*トリオースホスフェートイソメラーゼ*、*KIA 0205*、*CDC - 27*、および *LDLR - FUT*；（c）過剰発現された抗原、例えば、*ガレクチン4*（例えば、結腸直腸がんと関連）、*ガレクチン9*（例えば、ホジキン病と関連）、*プロテイナーゼ3*（例えば、慢性骨髄性白血病と関連）、*WT 1*（例えば、種々の白血病と関連）、*炭酸脱水酵素*（例えば、腎がんに関連）、*アルドラーゼA*（例えば、肺がんに関連）、*PRAME*（例えば、黒色腫と関連）、*HER - 2/neu*（例えば、乳がん、結腸がん、肺がんおよび卵巣がんに関連）、*マンマグロビン*、*- フェトプロテイン*（例えば、肝がんに関連）、*KSA*（例えば、結腸直腸がんに関連）、*ガストリン*（

例えば、膵臓がんおよび胃がんに関連)、テロメラーゼ触媒タンパク質、MUC-1 (例えば、乳がんおよび卵巣がんに関連)、G-250 (例えば、腎細胞がんに関連)、p53 (例えば、乳がん、結腸がんに関連)、ならびにがん胎児性抗原 (例えば、乳がん、肺がん、および胃腸管のがん (例えば、結腸直腸がん) と関連); (d) 共通抗原 (shared antigen)、例えば、黒色腫-メラノサイト分化抗原、例えば、MART-1/Melan A、gp100、MC1R、メラノサイト刺激ホルモンレセプター、チロシナーゼ、チロシナーゼ関連タンパク質-1/TRP1およびチロシナーゼ関連タンパク質-2/TRP2 (例えば、黒色腫と関連); (e) 前立腺関連抗原 (例えば、PAP、PSA、PSMA、PSH-P1、PSM-P1、PSM-P2 (例えば、前立腺がんに関連)); (f) イムノグロブリンイディオタイプ (例えば、骨髄腫およびB細胞リンパ腫と関連)。特定の実施形態において、腫瘍免疫原としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない: p15、Hom/Mel-40、H-Ras、E2A-PRL、H4-RET、IGH-IGK、MYL-RAR、エプスタイン・バー・ウイルス抗原、EBNA、ヒトパピローマウイルス (HPV) 抗原 (E6およびE7を含む)、B型肝炎ウイルスおよびC型肝炎ウイルスの抗原、ヒトTリンパ球向性ウイルス抗原、

10

【0087】

【化5】

TSP-180, p185erbB2, p180erbB-3, c-met, mn-23H1, TAG-72-4, CA 19-9, CA 72-4, CAM 17.1, NuMa, K-ras, p16, TAGE, PSCA, CT7, 43-9F, 5T4, 791 Tgp72, ベータ-HCG, BCA225, BTAA, CA 125, CA 15-3 (CA 27.29\BCAA), CA 195, CA 242, CA-50, CAM43, CD68/KP1, CO-029, FGF-5, Ga733 (EpCAM), HTgp-175, M344, MA-50, MG7-Ag, MOV18, NB/70K, NY-CO-1, RCAS1, SDCCAG16, TA-90

20

(Mac-2結合タンパク質/シクロフィリンC関連タンパク質)、TAAL6、TAG72、TLP、TPSなど。

【0088】

(薬学的組成物)

本発明のリポソームは、種々の疾患に対して被験体を免疫するための薬学的組成物中の成分として有用である。これらの組成物は、代表的には、上記リポソームに加えて、薬学的に受容可能なキャリアを含む。薬学的に受容可能なキャリアの詳細な考察は、参考文献33において入手可能である。

30

【0089】

本発明の薬学的組成物は、1種以上の低分子免疫強化因子を含み得る。例えば、上記組成物は、TLR2アゴニスト (例えば、Pam3CSK4)、TLR4アゴニスト (例えば、アミノアルキルグルコサミニドホスフェート (例えば、E6020))、TLR7アゴニスト (例えば、イミキモド)、TLR8アゴニスト (例えば、レシキモド) および/もしくはTLR9アゴニスト (例えば、IC31) を含み得る。任意のこのようなアゴニストは、理想的には、分子量<2000Daを有する。RNAが封入される場合、いくつかの実施形態において、このようなアゴニストもまた、上記RNAとともに封入されるが、他の実施形態において、それらは、封入されない。RNAが粒子に吸着させられる場合、いくつかの実施形態において、このようなアゴニストもまた、上記RNAと一緒に吸着させられるが、他の実施形態において、それらは吸着させられない。

40

【0090】

本発明の薬学的組成物は、上記リポソームを、ただの水 (plain water) (例えば、w.f.i.) もしくは緩衝液 (例えば、リン酸緩衝液、Tris緩衝液、ホウ酸緩衝液、コハク酸緩衝液、ヒスチジン緩衝液、もしくはクエン酸緩衝液) 中に含み得る。緩衝塩は、代表的には、5~20mM範囲において含まれる。

【0091】

本発明の薬学的組成物は、5.0~9.5 (例えば、6.0~8.0) のpHを有し得

50

る。

【0092】

本発明の組成物は、張度を与えるために、ナトリウム塩（例えば、塩化ナトリウム）を含み得る。10 ± 2 mg / ml NaClの濃度が代表的である（例えば、約9 mg / ml）。

【0093】

本発明の組成物は、金属イオンキレート化剤を含み得る。これらは、ホスホジエステル加水分解を加速し得るイオンを除去することによって、RNA安定性を延長し得る。従って、組成物は、EDTA、EGTA、BAPTA、ペンテト酸などのうちの1種以上を含み得る。このようなキレート化剤は、代表的には、10 ~ 500 μM（例えば、0.1 m M）で存在する。クエン酸塩（例えば、クエン酸ナトリウム）はまた、キレート化剤として作用し得るのと同時に、有利なことには、緩衝化活性も提供し得る。

10

【0094】

本発明の薬学的組成物は、200 mOsm / kg ~ 400 mOsm / kg（例えば、240 ~ 360 mOsm / kg、もしくは290 ~ 310 mOsm / kg）の重量オスモル濃度を有し得る。

【0095】

本発明の薬学的組成物は、1種以上の保存剤（例えば、チオメルサールもしくは2-フェノキシエタノール）を含み得る。水銀非含有組成物が好ましく、保存剤非含有ワクチンが調製され得る。

20

【0096】

本発明の薬学的組成物は、好ましくは、無菌である。

【0097】

本発明の薬学的組成物は、好ましくは、非発熱性である（例えば、1用量あたり < 1 EU（エンドトキシユニット、標準尺度）、および好ましくは、1用量あたり < 0.1 EUを含む）。

【0098】

本発明の薬学的組成物は、好ましくは、グルテンを含まない。

【0099】

本発明の薬学的組成物は、単位用量形態において調製され得る。いくつかの実施形態において、単位用量は、0.1 ~ 1.0 ml（例えば、約0.5 ml）の容積を有し得る。

30

【0100】

上記組成物は、注射物として調製され得る（溶液もしくは懸濁物のいずれかとして）。上記組成物は、微細スプレーを使用する、肺投与（例えば、吸入器による）のために調製され得る。上記組成物は、鼻、耳もしくは眼への投与（例えば、スプレーもしくは滴剤として）のために調製され得る。筋肉内投与のための注射物が、代表的である。

【0101】

組成物は、免疫学的に有効量のリポソーム、ならびに任意の他の成分（必要であれば）を含む。「免疫学的に有効な量」とは、個体への投与量が、単一用量においてもしくはシリーズのうちの一部としてのいずれかで、処置もしくは予防に有効であることを意味する。この量は、処置されるべき個体の健康状態および身体的状態、処置されるべき個体の年齢、分類学上の群（例えば、非ヒト霊長類、霊長類など）、上記個体が抗体を合成する免疫系の能力、所望される防御の程度、ワクチンの処方、その処置している医師の医学的状況の評価、および他の関連因子に依存して変動する。上記量は、慣用的な治験を通じて決定され得る比較的広い範囲に入ると予測される。本発明の組成物のリポソームおよびRNA含有量は、一般に、1用量あたりのRNAの量に関して表される。好ましい用量は、100 μg RNA（例えば、10 ~ 100 μg（例えば、約10 μg、25 μg、50 μg、75 μgもしくは100 μg））を有するが、発現は、遙かに低いレベル、例えば、1 μg / 用量、100 ng / 用量、10 ng / 用量、1 ng / 用量などにおいてみられ得る。

40

50

【0102】

本発明はまた、本発明の薬学的組成物を含む送達デバイス（例えば、シリンジ、ネブライザ、噴霧器、吸入器、皮膚パッチなど）を提供する。このデバイスは、上記組成物を脊椎動物被験体に投与するために使用され得る。

【0103】

本発明のリポソームは、リポソームを含まない。

【0104】

（処置方法および医学的使用）

参考文献14で開示される粒子とは対照的に、本発明のリポソームおよび薬学的組成物は、目的の免疫原に対する免疫応答を誘発するためのインビボでの使用のためのものである。

10

【0105】

本発明は、本発明のリポソームもしくは薬学的組成物の有効量を投与する工程を包含する、脊椎動物において免疫応答を惹起するための方法を提供する。上記免疫応答は、好ましくは、防御的であり、好ましくは、抗体および/もしくは細胞媒介性免疫を含む。上記方法は、ブースター応答を惹起し得る。

【0106】

本発明はまた、脊椎動物における免疫応答を惹起するための方法において使用するための本発明のリポソームもしくは薬学的組成物を提供する。

【0107】

本発明はまた、脊椎動物における免疫応答を惹起するための医薬の製造における本発明のリポソームの使用を提供する。

20

【0108】

これら使用および方法により上記脊椎動物における免疫応答を惹起することによって、上記脊椎動物は、上記で考察されるように、種々の疾患および/もしくは感染から（例えば、細菌疾患および/もしくはウイルス疾患から）防御され得る。上記リポソームおよび組成物は、免疫原性であり、より好ましくは、ワクチン組成物である。本発明に従うワクチンは、予防的である（すなわち、感染を妨ぐ）か、もしくは治療的である（すなわち、感染を処置する）のいずれかであり得るが、代表的には、予防的である。

【0109】

上記脊椎動物は、好ましくは、哺乳動物、例えば、ヒトもしくは大型の獣医学的哺乳動物（例えば、ウマ、ウシ、シカ、ヤギ、ブタ）である。上記ワクチンが予防的使用のためのものである場合、上記ヒトは、好ましくは、小児（例えば、幼児もしくは乳児）またはティーンエイジャーである；上記ワクチンが治療的使用のためのものである場合、上記ヒトは、好ましくは、ティーンエイジャーもしくは成人である。小児用に意図されたワクチンはまた、例えば、安全性、投与量、免疫原性などを評価するために、成人に投与され得る。

30

【0110】

本発明に従って調製されるワクチンは、小児および成人の両方を処置するために使用され得る。従って、ヒト患者は、1歳未満、5歳未満、1~5歳、5~15歳、15~55歳、もしくは少なくとも55歳であってもよい。上記ワクチンを受けるのに好ましい患者は、高齢者（例えば、50歳、60歳、および好ましくは、65歳）、若年者（例えば、5歳）、入院患者、ヘルスケアワーカー、軍従事者、および軍職員、妊婦、慢性疾患患者、もしくは免疫不全患者である。上記ワクチンは、これら群にのみ適切であるわけではなく、より一般に、集団において使用され得る。

40

【0111】

本発明の組成物は、一般に、患者に直接投与される。直接送達は、非経口注射によって達成され得る（例えば、皮下、腹腔内、静脈内、筋肉内、皮内、もしくは組織の間隙空間に；参考文献1とは異なり、舌内（intraglossal）注射は、代表的には、本発明で使用されない）。代替の送達経路としては、直腸、経口（例えば、錠剤、スプレー

50

)、口内、舌下、膺、局所、経真皮 (transdermal) もしくは経皮 (transcutaneous)、鼻内、眼、耳、肺もしくは他の粘膜投与が挙げられる。皮内および筋肉内投与は、2つの好ましい経路である。注射は、針を介してであってもよい (例えば、皮下針) が、針なしの注射が、代わりに使用され得る。代表的な筋肉内用量は、0.5 ml である。

【0112】

本発明は、全身免疫および/もしくは粘膜免疫を誘発するために、好ましくは、増強された全身免疫および/もしくは粘膜免疫を誘発するために、使用され得る。

【0113】

投与量は、単一用量スケジュールもしくは複数用量スケジュールによってであり得る。複数用量は、一次免疫スケジュールにおいて、および/もしくはブースター免疫スケジュールにおいて使用され得る。複数用量スケジュールにおいて、種々の用量が、同じ経路もしくは異なる経路 (例えば、非経口の一次と粘膜のブースト、粘膜の一次と非経口のブーストなど) によって与えられ得る。複数用量は、代表的には、少なくとも1週間間隔を空けて (例えば、約2週間、約3週間、約4週間、約6週間、約8週間、約10週間、約12週間、約16週間など) 投与される。一実施形態において、複数用量は、生後約6週間、10週間、および14週間で (例えば、世界保健機関の Expanded Program on Immunisation (「EPI」) においてしばしば使用されるように、6週齢、10週齢および14週齢において) 投与され得る。代替の実施形態において、2回の一次用量が、約2ヶ月間隔を空けて (例えば、約7週間、8週間もしくは9週間間隔を空けて) 投与され、続いて、1回以上のブースター用量が、2回目の一次用量の約6ヶ月から1年後に (例えば、2回目の一次用量の約6ヶ月後、8ヶ月後、10ヶ月後もしくは12ヶ月後) 投与される。さらなる実施形態において、3回の一次用量が、約2ヶ月間隔を空けて (例えば、約7週間、8週間もしくは9週間間隔を空けて) 投与され、続いて、1回以上のブースター用量が、3回目の一次用量の約6ヶ月から1年後に (例えば、3回目の一次用量の約6ヶ月後、8ヶ月後、10ヶ月後もしくは12ヶ月後) 投与される。

10

20

【0114】

(一般)

本発明の粒子は、別段示されなければ、化学、生化学、分子生物学、免疫学および薬理学の、当該分野の技術内の従来の方法を使用する。このような技術は、文献中に十分に説明されている。例えば、参考文献34~40などを参照のこと。

30

【0115】

用語「含む (comprising)」は、「含む (including)」ならびに「からなる (consisting)」を包含し、例えば、Xを「含む (comprising)」組成物は、Xから専らなってもよいし、何かさらなるものを含んでいてもよい (例えば、X+Y)。

【0116】

数値xに関して用語「約」とは、選択的であり、例えば、 $x \pm 10\%$ を意味する。

【0117】

語句「実質的に」とは、「完全に」を排除せず、例えば、Yを「実質的に含まない」組成物は、Yを完全に含まない場合もある。必要な場合、語句「実質的に」は、本発明の定義から省略され得る。

40

【0118】

電荷、カチオン、アニオン、両性イオンなどへの言及は、pH7において取り扱われる。

【0119】

TLR3は、Toll様レセプター3である。これは、先天的免疫系において重要な役割を果たす一回膜貫通レセプターである。既知のTLR3アゴニストは、ポリ (I:C) を含む。「TLR3」は、このレセプターをコードする遺伝子の承認されたHGNC名で

50

あり、その特有のHGNC IDは、HGNC:11849である。ヒトTLR3遺伝子のRefSeq配列は、GI:2459625である。

【0120】

TLR7は、Toll様レセプター7である。これは、先天性免疫系において重要な役割を果たす一回膜貫通レセプターである。既知のTLR7アゴニストは、例えば、イミキモドを含む。「TLR7」は、このレセプターをコードする遺伝子の承認されたHGNC名であり、その特有のHGNC IDは、HGNC:15631である。ヒトTLR7遺伝子のRefSeq配列は、GI:67944638である。

【0121】

TLR8は、Toll様レセプター8である。これは、先天性免疫系において重要な役割を果たす一回膜貫通レセプターである。既知のTLR8アゴニストは、例えば、レシキモドを含む。「TLR8」は、このレセプターをコードする遺伝子の承認されたHGNC名であり、その特有のHGNC IDは、HGNC:15632である。ヒトTLR8遺伝子のRefSeq配列は、GI:20302165である。

【0122】

RIG-I様レセプター(「RLR」)ファミリーは、先天性免疫系において重要な役割を果たす種々のRNAヘリカーゼを含む[41]。RLR-1(RIG-Iもしくはレチノイン酸誘導性遺伝子Iとしても公知)は、そのN末端付近にある2つのカスパーゼリクルートドメインを有する。上記RLR-1ヘリカーゼをコードする遺伝子の承認されたHGNC名は、「DDX58」(DEAD(Asp-Glu-Ala-Asp)ボックスポリペプチド58(DEAD(Asp-Glu-Ala-Asp)box polypeptide 58)について)であり、その特有のHGNC IDは、HGNC:19102である。ヒトRLR-1遺伝子のRefSeq配列は、GI:77732514である。RLR-2(MDA5もしくは黒色腫分化関連遺伝子5(melanoma differentiation-associated gene 5)としても公知)はまた、そのN末端付近にある2つのカスパーゼリクルートドメインを有する。RLR-2ヘリカーゼをコードする遺伝子の承認されたHGNC名は、「IFIH1」(ヘリカーゼCドメイン1で誘導されるインターフェロン(interferon induced with helicase C domain 1)について)であり、特有のHGNC IDは、HGNC:18873である。ヒトRLR-2遺伝子のRefSeq配列は、GI:27886567である。RLR-3(LGP2もしくは遺伝学および生理学研究室2(laboratory of genetics and physiology 2)としても公知)は、カスパーゼリクルートドメインを有さない。RLR-3ヘリカーゼをコードする遺伝子の承認されたHGNC名は、「DHX58」(DEXH(Asp-Glu-X-His)ボックスポリペプチド58について)であり、特有のHGNC IDは、HGNC:29517である。ヒトRLR-3遺伝子のRefSeq配列は、GI:149408121である。

【0123】

PKRは、二本鎖RNA依存性プロテインキナーゼである。これは、先天性免疫系において重要な役割を果たす。「EIF2AK2」(真核生物翻訳開始因子2-キナーゼ2(eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2)について)は、この酵素をコードする遺伝子の承認されたHGNC名であり、その特有のHGNC IDは、HGNC:9437である。ヒトPKR遺伝子のRefSeq配列は、GI:208431825である。

【図面の簡単な説明】

【0124】

【図1】図1は、染色されたRNAを有するゲルを示す。レーンは、(1)マーカー、(2)裸のレプリコン、(3)RNase処理後のレプリコン、(4)リポソームに封入されたレプリコン、(5)RNase処理後のリポソーム、(6)RNaseで処理し、次いで、フェノール/クロロホルム抽出に供したりポソーム、を示す。

10

20

30

40

50

【図2】図2は、リボソームの電子顕微鏡写真である。

【図3】図3は、DLiNDMA、DLenDMAおよびDODMAの構造を示す。

【図4】図4は、染色されたRNAを有するゲルを示す。レーンは、(1)マーカー、(2)裸のレプリコン、(3)リボソームに封入されたレプリコン、(4)RNaseで処理し、次いで、フェノール/クロロホルム抽出に供したリボソームを示す。

【図5】図5は、ビリオンパッケージングされたレプリコン(四角)として、裸のRNA(菱形)として、もしくはリボソーム中(+ = 0.1 μg、x = 1 μg)においてRNAを送達した後、1日目、3日目および6日目でのタンパク質発現を示す。

【図6】図6は、リボソーム封入RNAの4種の異なる用量を送達した後、1日目、3日目および6日目でのタンパク質発現を示す。

【図7】図7は、ビリオンパッケージングされたレプリコン(VRPもしくはVSRP)、1 μg 裸のRNA、および1 μg リボソーム封入RNAを与えられた動物における抗F IgG力価を示す。

【図8】図8は、VRP、1 μg 裸のRNA、および0.1 gもしくは1 μgのリボソーム封入RNAを与えられた動物における抗F IgG力価を示す。

【図9】図9は、VRP、または0.1 gもしくは1 μgのリボソーム封入RNAのいずれかを与えられた動物における中和抗体力価を示す。

【図10】図10は、裸のRNA(丸)、リボソーム封入RNA(三角および四角)、またはリボプレックス(Lipoplex)(逆三角)としてレプリコンを送達した後の発現レベルを示す。

【図11】図11は、レプリコンを裸のRNAとして(0.01~1 μg)、リボソーム封入RNAとして(0.01~10 μg)、またはビリオンとしてパッケージングされたものとして(VRP、10⁶ 感染単位もしくはIU)、送達した後のF特異的IgG力価(2回目の用量後2週間)を示す。

【図12】図12は、レプリコンを裸のRNAとして(1 μg)、リボソーム封入RNAとして(0.1もしくは1 μg)、またはビリオンとしてパッケージングされたものとして(VRP、10⁶ IU)、送達した後のF特異的IgG力価(丸)およびPRNT力価(四角)を示す。ナイーブマウスの力価もまた、示す。実線は、幾何平均を示す。

【図13】図13は、2回目の用量の4週間後、Fタンパク質中の主要なエピトープを表す合成ペプチドで再刺激した後の細胞内サイトカイン生成を示す。y軸は、CD8+CD4-の%サイトカイン+を示す。

【図14A】図14は、仔ウシの免疫後63日間(図14A)および210日間(図14B)にわたるF特異的IgG力価(平均log₁₀力価±標準偏差)を示す。その3つの線は、63日目において容易に区別され、下から上へ:PBS陰性コントロール;リボソーム送達RNA;および「Triangle 4」製品である。

【図14B】図14は、仔ウシの免疫後63日間(図14A)および210日間(図14B)にわたるF特異的IgG力価(平均log₁₀力価±標準偏差)を示す。その3つの線は、63日目において容易に区別され、下から上へ:PBS陰性コントロール;リボソーム送達RNA;および「Triangle 4」製品である。

【図15】図15は、上記リボソームにおいて使用される脂質のpKaに対する6日目のSEAP発現(相対強度)を示す。丸は、DSPCを有するリボソームについてのレベルを示し、四角は、DSPCなしのリボソームについてのレベルを示す;ときおり、四角と丸は重なっており、上記四角だけが所定のpKaについて見えるようにしている。

【図16】図16は、Fタンパク質をコードするレプリコンの第1の投与の2週間後の、抗F力価の発現(RV01, 100%に対して)を示す。上記力価は、図15におけるのと同じようにしてpKaに対してプロットされている。星印は、他の脂質より高いpKaを有するカチオン性脂質を使用したRV02を示す。三角は、DSPCを欠いているリボソームについてのデータを示す;丸は、DSPCを含んだリボソームについてのデータである。

【図17】図17は、左から右に、RV01、RV16、RV17、RV18もしくはR

10

20

30

40

50

V19を使用するリボソームにおけるレプリコン送達後の、総IgG力価を示す。バーは、平均値を示す。各場合における上側のバーは、2wp2（すなわち、第2の投与の2週間後）であるのに対して、下側のバーは、2wp1である。

【図18】図18は、13の Maus群におけるIgG力価を示す。各々の丸は、個々の Mausであり、実線は、幾何平均を示す。水平な破線は、アッセイの検出限界である。上記13の群は、左から右に、以下に示されるようにAからMである。

【図19】図19は、pDCによって放出された(A)IL-6および(B)IFN (pg/ml)を示す。4対のバーがあり、左から右に：コントロール；RNA+DOTAPで免疫；RNA+リポフェクタミンで免疫；およびリボソーム中のRNAで免疫である。各対において、その黒いバーは、野生型 Mausであり、灰色は、rsq1変異体である。

10

【発明を実施するための形態】

【0125】

(RNAレプリコン)

種々のレプリコンは、以下で使用される。一般に、これらは、ベネズエラウマ脳炎ウイルス(VEEV)に由来する非構造タンパク質、シンドビス・ウイルス由来のパッケージングシグナル、およびシンドビス・ウイルスもしくはVEEV変異体に由来する3'UTRを有するハイブリッドアルファウイルスゲノムに基づく。上記レプリコンは、約10kb長であり、ポリA尾部を有する。

【0126】

アルファウイルスレプリコンをコードするプラスミドDNA(名称：pT7-mVEEV-FL-RSVFもしくはA317；pT7-mVEEV-SEAPもしくはA306；pSP6-VCR-GFPもしくはA50)を、インビボでのRNA合成のテンプレートとして供した。上記レプリコンは、RNA複製に必要とされるアルファウイルス遺伝的エレメントを含むが、粒子アセンブリに必要な遺伝子産物をコードするエレメントを欠いている；構造タンパク質は、代わりに、目的のタンパク質(レポーター(例えば、SEAPもしくはGFP)または免疫原(例えば、全長RSVFタンパク質)のいずれか)によって置き換えられるので、上記レプリコンは、感染性粒子の生成を誘導できない。上記アルファウイルスcDNAの上流にあるバクテリオファージ(T7もしくはSP6)プロモーターは、インビトロで上記レプリコンRNAの合成を促進し、上記ポリ(A)尾部の直ぐ下流にあるデルタ型肝炎ウイルス(HDV)リボザイムは、その自己切断活性を介して正確な3'末端を生成する。

20

30

【0127】

適切な制限エンドヌクレアーゼで上記HDVリボザイムの下流で上記プラスミドDNAを直線状にした後に、ランオフ転写物(run-off transcript)を、T7もしくはSP6バクテリオファージ由来DNA依存性RNAポリメラーゼを使用して、インビトロで合成した。転写を、製造業者(Ambion)によって提供される指示書に従って、ヌクレオシドトリホスフェート(ATP、CTP、GTPおよびUTP)の各々の7.5mM(T7 RNAポリメラーゼ)もしくは5mM(SP6 RNAポリメラーゼ)の存在下で、37°Cにおいて2時間にわたって行った。転写の後、上記テンプレートDNAを、TURBO DNase(Ambion)で消化した。上記レプリコンRNAを、LiClで沈殿させ、ヌクレアーゼ非含有水中で再構成した。キャップのないRNAを、ScriptCap m7Gキャッピングシステム(Epicentre Biotechnologies)を使用して、ユーザーマニュアルに概説されるとおり、ワクシニアキャッピング酵素(VCE)で転写後にキャップした；このようにキャップしたレプリコンに、「v」の接頭文字を付ける(例えば、vA317は、VCEによってキャップされたA317レプリコンである)。転写後キャップされたRNAを、LiClで沈殿させ、ヌクレアーゼ非含有水中で再構成した。上記RNAサンプルの濃度を、OD_{260nm}を測定することによって決定した。上記インビトロ転写物の完全性を、変性アガロースゲル電気泳動によって確認した。

40

50

【0128】

(リポソーム封入)

RNAを、参考文献11および42の方法によって作製したリポソーム中に封入した。上記リポソームを、10% DSPC (両性イオン性)、40% DLi nDMA (カチオン性)、48% コレステロールおよび2% PEG結合体化DMG (2kDa PEG) から作製した。これら割合は、総リポソーム中の%モルに言及する。

【0129】

DLi nDMA (1, 2 - ジリノレイルオキシ - N, N - ジメチル - 3 - アミノプロパン) を、参考文献6の手順を使用して合成した。DSPC (1, 2 - ジアステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン) を、Genzymeから購入した。コレステロールを、Sigma - Aldrichから得た。PEG結合体化DMG (1, 2 - ジミリストイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホエタノールアミン - N - [メトキシ (ポリエチレングリコール), アンモニウム塩]、DOTAP (1, 2 - ジオレオイル - 3 - トリメチルアンモニウム - プロパン, 塩化物塩) およびDC - chol (3 - [N - (N', N' - ジメチルアミノエタン) - カルバモイル] コレステロールヒドロクロリド) は、Avanti Polar Lipidsからであった。

【0130】

簡潔には、脂質をエタノール (2ml) 中に溶解し、RNAレプリコンを、緩衝液 (2ml, 100mM クエン酸ナトリウム, pH6) 中に溶解し、これらを2mlの緩衝液と混合し、続いて、1時間平衡化させた。上記混合物を6mlの緩衝液で希釈し、次いで、濾過した。得られた生成物は、リポソームを含み、約95%の封入効率であった。

【0131】

例えば、1つの特定の方法において、新鮮な脂質ストック溶液を、エタノール中で調製した。37mgのDLi nDMA、11.8mgのDSPC、27.8mgのコレステロールおよび8.07mgのPEG - DMGを秤量し、7.55mLのエタノール中に溶解した。新たに調製した脂質ストック溶液を、37において約15分間にわたって穏やかに振盪して、均質な混合物を形成した。次いで、755μLの上記ストックを、1.245mL エタノールに添加して、作業脂質ストック溶液2mLを作製した。この脂質量を使用して、250μg RNAを有するリポソームを形成した。RNAの2mL 作業溶液をまた、100mM クエン酸緩衝液 (pH6) 中の約1μg / μLのストック溶液から調製した。3つの20mL ガラスバイアル (攪拌子有り) を、RNase Away 溶液 (Molecular BioProducts) ですすぎ、使用前に多量のMilliQ水で洗浄して、上記バイアルのRNaseの汚染を除去した。上記バイアルのうちの1つを、上記RNA作業溶液に使用し、他のものを脂質およびRNA混合物を集めるために使用した (後に記載されるとおり)。作業脂質溶液およびRNA溶液を、37において10分間にわたって加熱し、その後、3cc ルーアーロックシリンジに入れた。2mL クエン酸緩衝液 (pH6) を、別の3cc シリンジに入れた。RNAおよび脂質を含むシリンジを、FEPチューブ (フッ化エチレン - プロピレン; 使用したすべてのFEPチューブは、2mm内径および3mm外径を有する) を使用して、Tミキサー (PEEK™ 500μm ID接合部, Idex Health Science) に接続した。上記Tミキサーからの出口もまた、FEPチューブであった。上記クエン酸緩衝液を含む第3のシリンジを、別個の1つのFEPチューブに接続した。次いで、すべてのシリンジを、流量7mL / 分においてシリンジポンプを使用して作動させた。上記チューブ出口を、20mL ガラスバイアルに上記混合物を集めるように配置した (攪拌しながら)。上記攪拌子を取り出し、上記エタノール / 水性溶液を、室温へと1時間にわたって平衡化させた。上記混合物のうちの4mLを、5cc シリンジに入れ、これを、FEPチューブの1つに接続し、別の5cc シリンジを、等しい長さのFEPチューブに接続し、等量の100mM クエン酸緩衝液 (pH6) を入れた。上記2本のシリンジを、上記シリンジポンプを使用して7mL / 分の流量において作動させ、最終の混合物を、20mL ガラスバイアルに集めた (攪拌しながら)。次に、第2の混合工程 (リポソーム) が

ら集めた上記混合物を、Mustang Q膜 (Pall Corporationから得られる、結合してアニオン性分子を除去するアニオン交換支持体) を通過させた。上記リポソームに関してこの膜を使用する前に、4 mLの1 M NaOH、4 mLの1 M NaClおよび10 mLの100 mM クエン酸緩衝液 (pH 6) が、連続してこの膜を通過した。リポソームを、10分間にわたって37 °Cにおいて加温し、その後、上記膜を通過させた。次に、接線流濾過を使用することによって、リポソームを2 mLに濃縮し、10 ~ 15 容積の1 x PBSに対して透析し、その後、最終生成物を収集した。上記TFEシステムおよび中空ファイバー濾過膜を、Spectrum Labs (Rancho Dominguez) から購入し、上記製造業者のガイドラインに従って使用した。100 kD孔サイズカットオフおよび8 cm² 表面積を有するポリスルホン中空ファイバー濾過膜を使用した。インビトロおよびインビボ実験に関しては、処方物を、1 x PBSで、必要とされるRNA濃度へと希釈した。

10

【0132】

図2は、これら方法によって調製されるリポソームの例示的な電子顕微鏡写真を示す。これらリポソームは、封入された、全長RSV F抗原をコードするRNAを含む。1つのバッチの動的光散乱は、平均直径141 nm (強度で) もしくは78 nm (数で) を示した。

【0133】

封入されたRNAのパーセンテージおよびRNAの濃度を、Quant-iT Ribogreen RNA試薬キット (Invitrogen) によって、製造業者の指示書に従って決定した。上記キット中に提供されたリポソームRNA標準を使用して、標準曲線を作成した。リポソームを、1 x TE緩衝液 (キットから) 中で、10 x もしくは100 x に希釈し、その後、色素を添加した。別個に、リポソームを、0.5% Triton Xを含む1 x TE緩衝液中で10 x もしくは100 x に希釈し、その後、色素を添加した (上記リポソームを破壊するため。従って、総RNAをアッセイするため)。その後、等量の色素を各溶液に添加し、次いで、色素添加後の約180 μLの各溶液を、二連において、96ウェル組織培養プレートに入れた。蛍光 (励起485 nm, 発光528 nm) を、マイクロプレートリーダーで読み取った。すべてのリポソーム処方物を、封入されたRNAの量に基づいて、インビボで投与した。

20

【0134】

リポソームにおける封入は、RNase消化からRNAを保護することを示した。実験では、3.8 mA UのRNase A / μg RNAを使用し、30分間にわたって室温においてインキュベートした。RNaseを、プロテイナーゼKで、55 °Cにおいて10分間にわたって不活性化した。次いで、サンプル 対 25 : 24 : 1 v / v / v, フェノール : クロロホルム : イソアミルアルコールの1 : 1 v / v 混合物を添加して、上記RNAを上記脂質から水相へと抽出した。サンプルを、数秒間にわたってボルテックスすることによって混合し、次いで、12 k RPMにおける15分間にわたる遠心分離に置いた。上記水相 (上記RNAを含む) を取り出し、上記RNAを分析するために使用した。ローディング前に (400 ng RNA / ウェル)、上記サンプルすべてを、ホルムアルデヒドローディング色素とともにインキュベートし、10分間にわたって65 °Cにおいて変性させ、室温へと冷却した。Ambion Millenniumマーカースを使用して、上記RNA構築物の分子量を概算した。上記ゲルを、90 Vにおいて泳動した。上記ゲルを、室温において1時間にわたって振盪することによって、製造業者のガイドラインに従って、水中の0.1% SYBRゴールドを使用して染色した。図1は、封入の非存在下でRNaseがRNAを完全に消化することを示す (レーン3)。RNAは、封入後に検出不能であり (レーン4)、これらリポソームがRNaseで処理されても全く変化が認められない (レーン4)。RNase処理リポソームをフェノール抽出に供した後、消化されていないRNAが認められる (レーン6)。4 °Cにおいて1週間後ですら、上記RNAを、いかなるフラグメント化もなしに認めることができた (図4, 矢印)。インビボでのタンパク質発現は、4 °Cにおいて6週間および1回の凍結融解サイクル後にも変

30

40

50

化しなかった。従って、リポソーム封入RNAは安定である。

【0135】

上記RNAのインビボ発現を評価するために、免疫原ではなく、レポーター酵素（SEAP；分泌型アルカリホスファターゼ）を、上記レプリコン中にコードさせた。発現レベルを、化学発光アルカリホスファターゼ基質を使用して、1×Phosphatase-Light希釈緩衝液中で1：4希釈した血清中で測定した。8～10週齢BALB/cマウス（5匹/群）に、0日目に、0.1μgもしくは1μg RNA用量で50μl/脚を筋肉内に注射した。同じベクターを、1μgにおいて上記リポソームなしで（RNase非含有1×PBS中で）も投与した。ビリオンパッケージングされたレプリコンもまた、試験した。本明細書で使用したビリオンパッケージングされたレプリコン（「VRP」と呼ぶ）を、参考文献43の方法によって得た。ここでアルファウイルスレプリコンは、変異VEEVに由来するか、またはシンドビスウイルスの3'UTRおよびシンドビスウイルスパッケージングシグナル（PS）を含むように操作されたVEEVのゲノムから得られるキメラであり、シンドビスウイルスキャプシドおよび糖タンパク質遺伝子をコードする欠損性ヘルパーRNAと共にBHK細胞へと共エレクトロポレーション（co-electroporating）することによってパッケージングした。

10

【0136】

図5に示されるように、封入は、1μg用量においてSEAPレベルを約1/2対数増大させ、6日目に、0.1μg封入用量からの発現は、1μg非封入用量で認められたレベルに匹敵した。3日目までに、発現レベルは、VRPで達成されたものを超えた（四角）。従って、発現は、裸のRNAコントロールと比較して、10×低用量においてすら、上記RNAが上記リポソーム中に処方された場合に増大された。発現はまた、上記VRPコントロールと比較して高かったが、発現の動態は、非常に異なっていた（図5を参照のこと）。エレクトロポレーションを用いた上記RNAの送達は、上記裸のRNAコントロールと比較して増大した発現を生じたが、これらレベルは、リポソームでのものより低かった。

20

【0137】

上記リポソーム群において認められる効果が、上記リポソームの成分にのみ起因したのか、または上記封入に関連していたのかを評価するために、上記レプリコンを、封入形態（2種の異なる精製プロトコルで、0.1μg RNA）において、または上記リポソームの形成後にそのリポソームと混合して（非封入「lipoplex」、0.1μg RNA）、または裸のRNA（1μg）として、投与した。図10は、上記lipoplexが、最低レベルの発現を与えたことを示し、これは、封入が強力な発現に必須であることを示す。

30

【0138】

リポソーム送達を使用するインビボ研究から、これら知見が確認された。マウスには、（i）全長RSV Fタンパク質をコードする自己複製RNAレプリコン、（ii）自己複製GFPコードRNAレプリコン、（iii）自己複製を排除するnsP4においてノックアウトを有するGFPコードRNAレプリコン、（iv）全長RSV Fタンパク質の種々の組み合わせを与えた。合計13群に与えた：

40

【0139】

【表 1】

A	-	-
B	0.1 μ g の(i), 裸の	-
C	0.1 μ g の(i), リボソームに封入	-
D	0.1 μ g の(i), 別個のリボソームとともに	-
E	0.1 μ g の(i), 裸の	10 μ g の(ii), 裸の
F	0.1 μ g の(i), 裸の	10 μ g の(iii), 裸の
G	0.1 μ g の(i), リボソームに封入	10 μ g の(ii), 裸の
H	0.1 μ g の(i), リボソームに封入	10 μ g の(iii), 裸の
I	0.1 μ g の(i), リボソームに封入	1 μ g の(ii), リボソームに封入
J	0.1 μ g の(i), リボソームに封入	1 μ g の(iii), リボソームに封入
K	5 μ g F タンパク質	-
L	5 μ g F タンパク質	1 μ g の(ii), リボソームに封入
M	5 μ g F タンパク質	1 μ g の(iii), リボソームに封入

10

図 18 における結果は、F 特異的 I g G 応答は、単なる共送達よりむしろ上記リボソーム中の封入を必要としたことを示す（群 C および群 D を比較のこと）。群 K、群 L および群 M の比較は、上記 RNA は、共送達されたタンパク質に対してアジュバント効果を提供し、この効果は、複製 RNA および非複製 RNA の両方で認められたことを示す。

20

【0140】

さらなる S E A P 実験から、インビボで明らかな用量応答が示された。発現は、1 ng ほどの RNA の送達後にも認められた（図 6）。封入レプリコンからの発現と裸のレプリコンからの発現とを比較するさらなる実験から、0.01 μ g 封入 RNA は、1 μ g の裸の RNA に等しいことが示された。RNA の 0.5 μ g 用量において、上記封入物質は、6 日目において 1.2 倍高い発現を与えた；0.1 μ g 用量レベルでは、6 日目において 2.4 倍高かった。

30

【0141】

上記群において平均レベルで調べるだけでなく、個々の動物もまた研究した。いくらかの動物は、裸のレプリコンに対して非応答者であったのに対して、封入は、非応答者を排除した。

【0142】

さらなる実験では、D L i n D M A を D O T A P で置換した。D O T A P リボソームは、裸のレプリコンより良好な発現を与えたが、それらは、D L i n D M A リボソームより劣っていた（1 日目において 2 ~ 3 倍の差異）。D O T A P は、四級アミンを有し、それゆえ送達の点において正電荷を有するのに対し、D L i n D M A は、三級アミンを有する。

40

【0143】

インビボでの免疫原性を評価するために、レプリコンを構築して、RS ウイルス (RSV) に由来する全長 F タンパク質を発現させた。これを、裸 (1 μ g)、リボソーム中に封入 (0.1 もしくは 1 μ g)、またはビリオン中でパッケージング (10⁶ IU; 「VRP」) で、0 日目および 21 日目に送達した。図 7 は、2 回目の用量の 2 週間後の抗 F の I g G 力価を示す。上記リボソームは、明らかに免疫原性を増強する。図 8 は、2 週間後の力価を示す。この時点までに、0.1 μ g の上記封入 RNA と、1 μ g の上記封入 RNA と、上記 VRP 群との間に統計学的差異は何らなかった。中和力価 (60% のプラーク減少として測定, 「PRNT60」) は、2 回目の用量の 2 週間後に、これら 3 群において有意差はなかった（図 9）。図 12 は、2 回目の用量の 4 週間後の I g G 力価およ

50

び P R N T 力価の両方を示す。

【 0 1 4 4 】

図 1 3 は、上記 R N A が堅調な C D 8 T 細胞応答を誘発することを確認する。

【 0 1 4 5 】

さらなる実験において、V R P、0.1 μ g リボソーム封入 R N A、もしくは 1 μ g リボソーム封入 R N A を与えられたマウスにおける F 特異的 I g G 力価を比較した。2 回目の用量の後の種々の時点での力価比 (V R P : リボソーム) は、以下のとおりであった：

【 0 1 4 6 】

【表 2】

	2 週間	4 週間	8 週間
0.1 μ g	2.9	1.0	1.1
1 μ g	2.3	0.9	0.9

従って、上記リボソーム封入 R N A は、ビリオン送達で認められるのと本質的に同程度の免疫応答を誘導する。

【 0 1 4 7 】

さらなる実験から、優れた F 特異的 I g G 応答が 10 μ g 用量で示され、これは、1 μ g および 0.1 μ g 用量についての応答と等しく、0.01 μ g 用量ではより低い応答が示された。図 1 1 は、3 種の異なる用量における裸の形態において、4 種の異なる用量におけるリボソームにおいて、もしくは V R P (10⁶ I U) として、上記レプリコンを与えられた動物における I g G 力価を示す。1 μ g リボソーム封入 R N A で認められた応答は、V R P と比較した場合に統計的に有意ではなかった (A N O V A) が、10 μ g リボソーム封入 R N A で認められたより高い応答は、これらの群の両方と比較した場合、統計的に有意であった (p < 0.05) 。

【 0 1 4 8 】

さらなる研究から、上記 0.1 μ g のリボソーム封入 R N A は、0.1 μ g の送達された D N A より遙かに高い抗 F I g G 応答を与え (2 回目の用量の 15 日後)、さらに、エレクトロポレーション (E l g e n^{T M} D N A D e l i v e r y S y s t e m , I n o v i o) によって送達された、上記 F 抗原をコードする 20 μ g プラスミド D N A より免疫原性であることが確認された。

【 0 1 4 9 】

さらなる研究を、マウスの代わりにコットンラット (S i g m o d o n h i s p i d i s) において行った。1 μ g 用量において、リボソーム封入は、裸の R N A と比較して、F 特異的 I g G 力価を 8.3 倍増大させ、P R N T 力価を 9.5 倍増大させた。上記抗体応答の大きさは、5 \times 10⁶ I U V R P により誘導されたものに等しかった。裸の R N A およびリボソーム封入 R N A はともに、R S V チャレンジ (1 \times 10⁵ プラーク形成単位) から上記コットンラットを防御することができ、肺ウイルス負荷を少なくとも 3.5 l o g 減少させた。封入は、約 2 倍の減少を増大させた。

【 0 1 5 0 】

大動物研究を、ウシにおいて行った。ウシを、0 日目および 21 日目に、リボソーム内部に処方した、66 μ g の、全長 R S V F タンパク質をコードするレプリコンで免疫した。P B S 単独を、陰性コントロールとして使用し、承認されたワクチンを陽性コントロールとして (F o r t D o d g e の 「 T r i a n g l e 4 」 , 死滅ウイルスを含む) 使用した。図 1 4 は、1 回目の免疫から始まって 63 日間の期間にわたる F 特異的 I g G 力価を示す。上記 R N A レプリコンは、ウシにおいて免疫原性であったが、承認されたワクチンより低い力価を与えた。すべてのワクチン接種したウシは、2 回目の投与の後に F

10

20

30

40

50

特異的抗体を示し、力価は、上記2回目の投与の2～6週間後の期間に非常に安定であった（そして上記RNAワクチンに関しては特に安定であった）。

【0151】

（作用機構）

骨髄由来樹状細胞（pDC）を、野生型マウスもしくは「Resq」（rsq1）変異系統から得た。上記変異系統は、そのTLR7レセプターのアミノ末端において点変異を有し、これは、リガンド結合に影響を及ぼさずにTLR7シグナル伝達を破壊する[44]。上記細胞を、DOTAP、リポフェクタミン2000で処方したレプリコンRNAもしくはリポソーム内のレプリコンRNAで刺激した。図19に示されるように、IL-6およびINFは、WT細胞において誘導されたが、この応答は、変異マウスにおいてほぼ完全に排除された。これらの結果は、TLR7が、免疫細胞におけるRNA認識のために必要とされ、そしてリポソーム封入レプリコンが、免疫細胞に高レベルのインターフェロンおよび炎症促進性（pro-inflammatory）サイトカインの両方を分泌させ得ることを示す。

10

【0152】

（pKa測定）

脂質のpKaを、標準の温度および圧力の水において、以下の技術を使用して測定する：

- ・エタノール中の脂質の2mM溶液を、上記脂質を秤量し、エタノール中に溶解することによって調製する。エタノール：メタノール 9：1中の蛍光プロトトルエンイソチアゾールホン酸（TNS）の0.3mM溶液を、最初にメタノール中のTNSの3mM溶液を調製し、次いで、エタノールで0.3mMに希釈することによって調製する。

20

- ・それぞれ、濃度20mM、25mM、20mMおよび150mMのリン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、および塩化ナトリウムを含む水性緩衝液を、調製する。上記緩衝液を、8つの部分に分け、そのpHを、12N HClもしくは6N NaOHのいずれかで、4.44～4.52、5.27、6.15～6.21、6.57、7.10～7.20、7.72～7.80、8.27～8.33および10.47～11.12へと調整する。400μLの2mM脂質溶液および800μLの0.3mM TNS溶液を混合する。

- ・7.5μLのプロブ/脂質混合物を、1mL 96ウェルプレートの中の242.5μLの緩衝液に添加する。これを、8つすべての緩衝液で行う。混合した後、100μLの各プロブ/脂質/緩衝液混合物を、クリアボトム（clear bottom）250μL黒色96ウェルプレート（例えば、モデルCOSTAR 3904, Corning）に移す。この混合を行う便利な方法は、Tecan Genesis RSP150ハイスループット液体ハンドラーおよびGemini Softwareを使用することである。

30

- ・各プロブ/脂質/緩衝液混合物の蛍光を、322nm励起、431nm発光（オートカットオフ420nm）で測定する（例えば、SpectraMax M5分光光度計およびSoftMax pro 5.2ソフトウェアで）。

- ・測定後、上記96ウェルプレートにおける空のウェルのバックグラウンド蛍光値を、各プロブ/脂質/緩衝液混合物から差し引く。次いで、その蛍光強度値を、最低pHにおける値に対して正規化する。次いで、正規化した蛍光強度を、pHに対してプロットし、最適の線を、提供する。

40

- ・上記正規化した蛍光強度が0.5に等しい最適の線上の点を、見いだす。0.5に等しい正規化した蛍光強度に対応するpHを見いだし、上記脂質のpKaとみなす。

【0153】

この方法は、DLiNDMAについてpKa 5.8を与える。参考文献5のカチオン性脂質についてのこの方法によって測定されたpKa値は、以下に含まれる。

【0154】

（代替のカチオン性脂質を使用するリポソーム中の封入）

50

D l i n D M A を使用する代わりとして、参考文献 5 のカチオン性脂質を使用する。これら脂質を、参考文献 5 に開示されるように合成しうる。

【 0 1 5 5 】

D l i n D M A を使用して上記で形成されたリポソームを、これ以降、「 R V 0 1 」シリーズと言及する。上記 D l i n D M A を、シリーズ「 R V 0 2 」～「 R V 1 2 」において以下で記載されるように、種々のカチオン性脂質で置き換えた。2 % P E G 2 0 0 0 - D M G と、(0 1) 4 0 % の上記カチオン性脂質、1 0 % D S P C、および 4 8 % コレステロール、または (0 2) 6 0 % の上記カチオン性脂質および 3 8 % コレステロールのいずれかを使用して、各リポソームの 2 つの異なるタイプを形成した。従って、(0 1) リポソームと (0 2) リポソームとの比較は、中性の両性イオン性脂質の効果を


10

【 0 1 5 6 】

R V 0 2 リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a > 9 , 三級アミンなし) を使用して作製した :

【 0 1 5 7 】

【 化 6 】




20

R V 0 3 リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 6 . 4) を使用して作製した :

【 0 1 5 8 】

【 化 7 】



30


40

R V 0 4 リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 6 . 6 2) を使用して作製した :

50

【0159】

【化8】




10

RV05リボソームを、以下のカチオン性脂質 (pK_a 5.85) を使用して作製した :

20

【0160】

【化9】



30


RV06リボソームを、以下のカチオン性脂質 (pK_a 7.27) を使用して作製した :

40

【0161】

50

【化10】




10

RV07リボソームを、以下のカチオン性脂質（ pK_a 6.8）を使用して作製した：

【0162】

【化11】




20

30

RV08リボソームを、以下のカチオン性脂質（ pK_a 5.72）を使用して作製した：

【0163】

【化12】




40

50

R V 0 9 リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 6 . 0 7) を使用して作製した :

【 0 1 6 4 】

【 化 1 3 】




10

R V 1 0 リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 7 . 8 6) を使用して比較のために作製した :

【 0 1 6 5 】

【 化 1 4 】




20

30

R V 1 1 リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 6 . 4 1) を使用して作製した :

【 0 1 6 6 】

【 化 1 5 】




40

R V 1 2 リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 7) を使用して作製した :

50

【 0 1 6 7 】

【 化 1 6 】




10

RV16リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 6 . 1) を使用して作製した
[4 5] :

【 0 1 6 8 】

【 化 1 7 】

20




30

RV17リポソームを、以下のカチオン性脂質 (p K a 6 . 1) を使用して作製した
[4 5] :

【 0 1 6 9 】

【 化 1 8 】

40



40

RV18リポソームを、DODMAを使用して作製した。RV19リポソームを、D O

50

TMAを使用して作製し、RV13リポソームを、DOTAPで作製した。これらはともに、四級アミン頭部基を有する。

【0170】

これらリポソームを特徴付けし、上に記載されるSEAPレポーターで試験した。以下の表は、上記リポソームのサイズ（Z平均および多分散性指数）、各リポソームにおけるRNA封入の%と、注射後1日目および6日目に検出されたSEAP活性とを示す。SEAP活性は、DLiNDMA、コレステロールおよびPEG-DMGから作製された「RV01(02)」リポソームに関連する：

【0171】

【表3】

RV	脂質 pKa	Zav (pdI)	%封入	SEAP 1日目	SEAP 6日目
RV01 (01)	5.8	154.6 (0.131)	95.5	80.9	71.1
RV01 (02)	5.8	162.0 (0.134)	85.3	100	100
RV02 (01)	>9	133.9 (0.185)	96.5	57	45.7
RV02 (02)	>9	134.6 (0.082)	97.6	54.2	4.3
RV03 (01)	6.4	158.3 (0.212)	62.0	65.7	44.9
RV03 (02)	6.4	164.2 (0.145)	86	62.2	39.7
RV04 (01)	6.62	131.0 (0.145)	74.0	91	154.8
RV04 (02)	6.62	134.6 (0.117)	81.5	90.4	142.6
RV05 (01)	5.85	164.0 (0.162)	76.0	76.9	329.8
RV05 (02)	5.85	177.8 (0.117)	72.8	67.1	227.9
RV06 (01)	7.27	116.0 (0.180)	79.8	25.5	12.4
RV06 (02)	7.27	136.3 (0.164)	74.9	24.8	23.1
RV07 (01)	6.8	140.6 (0.184)	77	26.5	163.3
RV07 (02)	6.8	138.6 (0.122)	87	29.7	74.8
RV08 (01)	5.72	176.7 (0.185)	50	76.5	187
RV08 (02)	5.72	199.5 (0.191)	46.3	82.4	329.8
RV09 (01)	6.07	165.3 (0.169)	72.2	65.1	453.9
RV09 (02)	6.07	179.5 (0.157)	65	68.5	658.2
RV10 (01)	7.86	129.7 (0.184)	78.4	113.4	47.8
RV10 (02)	7.86	147.6 (0.131)	80.9	78.2	10.4
RV11 (01)	6.41	129.2 (0.186)	71	113.6	242.2
RV11 (02)	6.41	139 (0.198)	75.2	71.8	187.2
RV12 (01)	7	135.7 (0.161)	78.8	65	10
RV12 (02)	7	158.3 (0.287)	69.4	78.8	8.2

図15は、上記カチオン性脂質のpKaに対する、6日目のSEAPレベルをプロットする。最良の結果は、上記脂質が5.6~6.8の間、および理想的には、5.6~6.3の間のpKaを有する場合に認められる。

【0172】

これらリポソームはまた、全長RSV Fタンパク質をコードするレプリコンを送達するために使用した。第1の用量(2wp1)の2週間後の、Fタンパク質に対する総IgG力価を、図16においてpKaに対してプロットする。最良の結果は、上記pKaが、上記カチオン性脂質が5.7~5.9の間のpKaを有するが、pKa単独が、高い力価を保証するには十分でない(例えば、上記脂質は、なおリポソーム形成を支援しなければならない)場合に認められる

(RSV免疫原性)

さらなる研究は、RSV Fタンパク質をコードする自己複製レプリコン(vA317

）で行った。BALB/cマウス（1群あたり4匹もしくは8匹の動物）に、0日目および21日目に、上記レプリコン（1 μ g）単独を、あるいは上記RV01脂質もしくはRV05脂質（上記を参照のこと；pKa 5.8もしくは5.85）で、またはRV13でリポソームとして処方されたレプリコンを、両側の筋肉内にワクチン接種（50 μ L/脚）した。上記RV01リポソームは、40% DLinDMA、10% DSPC、48% コレステロールおよび2% PEG-DMGを有したが、RNAの量は異なった。上記RV05（01）リポソームは、40% カチオン性脂質、48% コレステロール、10% DSPC、および2% PEG-DMGを有した；上記RV05（02）リポソームは、60% カチオン性脂質、38% コレステロール、および2% PEG-DMGを有した。上記RV13リポソームは、40% DOTAP、10% DPE、48% コレステロールおよび2% PEG-DMGを有した。比較のために、同じRSV-F抗原を発現する裸のプラスミドDNA（20 μ g）を、エレクトロポレーションを使用するか、またはRV01（10）リポソーム（0.1 μ g DNA）によるかのいずれかで送達した。4匹のマウスを、ナープコントロール群として使用した。

10

20

30

40

50

【0173】

リポソームを、方法（A）もしくは方法（B）によって調製した。方法（A）において、エタノール中の新たな脂質ストック溶液を調製した。37mgのカチオン性脂質、11.8mgのDSPC、27.8mgのコレステロールおよび8.07mgのPEG-DMGを秤量し、7.55mLのエタノールに溶解した。新たに調製した脂質ストック溶液を、37において約15分間にわたって穏やかに振盪して、均質な混合物を形成した。次いで、226.7 μ Lの上記ストックを、1.773mL エタノールに添加して、作業脂質ストック溶液2mLを作製した。この量の脂質を使用して、75 μ g RNAを有するリポソームを形成し、8:1 窒素 対 ホスフェート比（RV01（08）およびRV01（09）においては、この比が、4:1もしくは16:1に改変されたことを除く）を与えた。RNAの2mLの作業溶液（もしくはRV01（10）については、DNA）をまた、100mM クエン酸緩衝液（pH6）中の約1 μ g/ μ Lのストック溶液から調製した。3本の20mL ガラスバイアル（撹拌子つき）を、RNase Away 溶液（Molecular BioProducts）ですすぎ、使用前に多量のMilliQ水で洗浄して、上記バイアルのRNaseの汚染を除去した。上記バイアルのうちの1本を、上記RNA作業溶液に対して使用し、他のものを、上記脂質およびRNA混合物を集めるために使用した（後に記載されるとおり）。上記作業脂質およびRNA溶液を、37において10分間にわたって加熱し、その後、3cc シリンジに詰めた。2mLのクエン酸緩衝液（pH6）を、別の3cc シリンジに詰めた。RNAおよび上記脂質を含むシリンジを、FEPチューブを使用して、Tミキサー（PEEKTM 500 μ m ID 接合部）に接続した。上記Tミキサーからの出口もまた、FEPチューブであった。上記クエン酸緩衝液を含む第3のシリンジを、FEPチューブの別個の部分に接続した。次に、すべてのシリンジを、シリンジポンプを使用して流速7mL/分で運転した。そのチューブの出口を、20mL ガラスバイアル中に上記混合物を集める（撹拌しながら）ように配置した。撹拌子を取り出し、エタノール/水性溶液を、室温へと1時間にわたって平衡化させた。次いで、上記混合物を、FEPチューブの部分に取り付けた5cc シリンジに詰め、そして、等しい長さのFEPチューブを有する別の5cc シリンジには、等容積の100mM クエン酸緩衝液（pH6）を詰めた。上記2本のシリンジを、シリンジポンプを使用して7mL/分の流速で運転し、最終の混合物を、20mL ガラスバイアルに集めた（撹拌しながら）。次に、リポソームを2mLに濃縮し、TFFを使用して10~15容積の1xPBSに対して透析し、その後、最終生成物を回収した。上記TFFシステムおよび中空ファイバー濾過膜を、Spectrum Labsから購入し、上記製造業者のガイドラインに従って使用した。100kD孔サイズカットオフおよび20cm²表面積を有するポリエーテルスルホン（PES）中空ファイバー濾過膜（部品番号 P-C1-100E-100-01N）を、使用した。インビトロ実験およびインビボ実験に関しては、処方物を、1xPBSで必要とされるRNA濃度へと希釈した

【 0 1 7 4 】

調製法 (B) は、 2 つの手段において方法 (A) とは異なる。まず、上記 2 0 m L ガラスバイアル中での収集後 (しかし、 T F F 濃縮前) に、上記混合物を、 Mustang Q 膜 (Pall Corporation, Ann Arbor, MI, USA から得られる、アニオン性分子を結合して除去するアニオン交換支持体) を通過させた。この膜を、最初に 4 m L の 1 M NaOH で、次に、 4 m L の 1 M NaCl および 1 0 m L の 1 0 0 m M クエン酸緩衝液 (pH 6) で洗浄し、リボソームを、 1 0 分間にわたって 3 7 °C において加温し、その後、濾過した。第 2 に、上記中空ファイバー濾過膜は、ポリスルホン (部品番号 P / N : X 1 A B - 1 0 0 - 2 0 P) であった。

10

【 0 1 7 5 】

上記リボソームの Z 平均粒子直径、多分散指数、および封入効率は、以下のとおりであった：

【 0 1 7 6 】

【表 5】

RV	Zav (nm)	pDI	% 被包	調製
RV01 (10)	158.6	0.088	90.7	(A)
RV01 (08)	156.8	0.144	88.6	(A)
RV01 (05)	136.5	0.136	99	(B)
RV01 (09)	153.2	0.067	76.7	(A)
RV05 (01)	148	0.127	80.6	(A)
RV05 (02)	177.2	0.136	72.4	(A)
RV01 (10)	134.7	0.147	87.8 *	(A)
RV13 (02)	128.3	0.179	97	(A)

20

*このRV01(10)処方物については、核酸は、RNAではなくDNAであった。

30

血清を、 1 4 日目、 3 6 日目および 4 9 日目に抗体分析のために集めた。脾臓を、 4 9 日目に、 T 細胞分析のためにマウスから採取した。

【 0 1 7 7 】

F 特異的血清 I g G 力価 (GMT) は、以下のとおりであった：

【 0 1 7 8 】

40

50

【表 6】

RV	14 日目	36 日目
裸の DNA プラスミド	439	6712
裸の A317 RNA	78	2291
RV01 (10)	3020	26170
RV01 (08)	2326	9720
RV01 (05)	5352	54907
RV01 (09)	4428	51316
RV05 (01)	1356	5346
RV05 (02)	961	6915
RV01 (10) DNA	5	13
RV13 (02)	644	3616

10

サイトカイン陽性であり、かつ R S V F 5 1 - 6 6 ペプチドに対して特異的な T 細胞の割合は、以下のとおりであり、統計的に有意にゼロを上回る数字のみを示す：

20

【 0 1 7 9 】

【表 7】

RV	CD4+CD8-				CD4-CD8+			
	IFN γ	IL2	IL5	TNF α	IFN γ	IL2	IL5	TNF α
裸の DNA プラスミド	0.04	0.07		0.10	0.57	0.29		0.66
裸の A317 RNA	0.04	0.05		0.08	0.57	0.23		0.67
RV01 (10)	0.07	0.10		0.13	1.30	0.59		1.32
RV01 (08)	0.02	0.04		0.06	0.46	0.30		0.51
RV01 (05)	0.08	0.12		0.15	1.90	0.68		1.94
RV01 (09)	0.06	0.08		0.09	1.62	0.67		1.71
RV05 (01)					0.06	0.04		0.19
RV05 (02)	0.05	0.07		0.11	0.64	0.35		0.69
RV01 (10) DNA				0.03				0.08
RV13 (02)	0.03	0.04		0.06	1.15	0.41		1.18

30

40

従って、上記リボソーム処方物は、増大した F 特異的 I g G 力価および T 細胞頻度によって決定される場合、上記裸の RNA コントロールと比較して免疫原性を顕著に増大した。リボソームとともに処方したか、またはエレクトロポレーションを使用して裸で送達されたプラスミド DNA は、リボソーム処方された自己複製 RNA より顕著に免疫原性が低かった。

【 0 1 8 0 】

上記 RV 0 1 RNA ワクチンおよび RV 0 5 RNA ワクチンは、上記 RV 1 3 (D O T A P) ワクチンより免疫原性が強かった。これら処方物は、匹敵する物理的特徴を有し、同じ自己複製 RNA で処方したが、それらは、異なるカチオン性脂質を含む。RV 0 1 および RV 0 5 はともに、頭部基に p K a 約 5 . 8 の三級アミンを有し、かつまた、

50

不飽和アルキル尾部を含む。RV13は、不飽和アルキル尾部を有するが、その頭部基は、四級アミンを有し、カチオン性が非常に強い。これら結果から、5.0~7.6の範囲のpKaを有する、三級アミンを有する脂質が、DOTAPのような脂質（これらは、RNAのためのリポソーム送達系において使用される場合に、カチオン性が強い）より優れていることが示唆される。

【0181】

(DLiNDMAのさらなる代替)

RV01リポソームにおけるカチオン性脂質(DLiNDMA)は、RV16、RV17、RV18もしくはRV19で置き換えられた。総IgG力価を、図17に示す。最低の結果は、RV19(すなわち、DOTMA四級アミン)で認められる。

10

【0182】

(BHK発現)

異なる脂質を有するリポソームを、BHK細胞とともに一晚インキュベートし、タンパク質発現効力について評価した。RV05脂質発現でのベースラインから、10% 1,2-ジフィタノイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン(DPYPE)を上記リポソームに添加することによって18x、10% 18:2(cis)ホスファチジルコリンを添加することによって10x、および代わりにRV01を使用することによって900x増大し得た。

【0183】

(様々なマウス系統におけるRSV免疫原性)

レプリコン「vA142」は、RSVの全長野生型表面融合(F)糖タンパク質をコードするが、その融合ペプチドは欠失しており、その3'末端は、リボザイム媒介性切断によって形成される。これを、3種の異なるマウス系統において試験した。

20

【0184】

BALB/cマウスに、0日目および22日目に、両側の筋肉内ワクチン接種(50µL/脚)を与えた。動物を、8つの試験群(1群あたり5匹の動物)およびナイーブコントロール(2匹の動物)へと分けた:

群1には、裸のレプリコン(1µg)を与えた。

群2には、40% DLiNDMA、10% DSPC、48% Chol、2% PEG結合体化DMGを有するリポソーム「RV01(37)」中で送達した1µg レプリコンを与えた。

30

群3には、群2と同じものを与えたが、0.1µg RNAであった。

群4には、「RV17(10)」リポソーム(40% RV17(上記を参照のこと)、10% DSPC、49.5% コレステロール、0.5% PEG-DMG)中において1µg レプリコンを与えた。

群5には、「RV05(11)」リポソーム(40% RV07脂質、30% 18:2 PE(DLOPE)、28% コレステロール、2% PEG-DMG)中において1µg レプリコンを与えた。

群6には、「RV17(10)」リポソーム中において0.1µg レプリコンを与えた。

群7には、水酸化アルミニウムをアジュバント添加した5µg RSV-Fサブユニットタンパク質を与えた。

40

群8は、ナイーブコントロール(2匹の動物)であった。

【0185】

血清を、14日目、35日目および49日目に、抗体分析のために集めた。F特異的血清IgG GMTは、以下であった:

【0186】

【表 8】

日数	1	2	3	4	5	6	7	8
14	82	2463	1789	2496	1171	1295	1293	5
35	1538	34181	25605	23579	13718	8887	73809	5

35日目において、F特異的IgG1力価およびIgG2a力価(GMT)は、以下のとおりであった：

【0187】

【表 9】

IgG	1	2	3	4	5	6	7
IgG1	94	6238	4836	7425	8288	1817	78604
IgG2a	5386	77064	59084	33749	14437	17624	24

35日目および49日目のRSV血清中和抗体力価は、以下のとおりであった(データは、2~5匹のマウスプール(1群あたり1プール)の60%ブランク減少中和力価である)：

【0188】

【表 10】

日数	1	2	3	4	5	6	7	8
35	<20	143	20	101	32	30	111	<20
49	<20	139	<20	83	41	32	1009	<20

49日目に、T細胞分析のために脾臓を採取した。平均の正味F特異的サイトカイン陽性T細胞頻度(CD4+もしくはCD8+)は、以下のとおりであった(これは、統計的に有意にゼロを上回った(CD4+についてはRSVペプチドであるF51-66、F164-178、F309-323、またはCD8+についてはペプチドF85-93およびF249-258に対して特異的)数字のみを示す)：

【0189】

10

20

30

40

50

【表 1 1】

群	CD4+CD8-				CD4-CD8+			
	IFN γ	IL2	IL5	TNF α	IFN γ	IL2	IL5	TNF α
1	0.03	0.06		0.08	0.47	0.29		0.48
2	0.05	0.10		0.08	1.35	0.52		1.11
3	0.03	0.07		0.06	0.64	0.31		0.61
4	0.05	0.09		0.07	1.17	0.65		1.09
5	0.03	0.08		0.07	0.65	0.28		0.58
6	0.05	0.07		0.07	0.74	0.36		0.66
7		0.02			0.04	0.04		
8								

C57BL/6マウスを、同じように免疫したが、第9の群には、RSVの全長野生型表面融合糖タンパク質（融合ペプチド欠失）を発現するVRP（ 1×10^6 IU）を与えた。

【0190】

血清を、14日目、35日目および49日目に、抗体分析のために集めた。F特異的IgG力価（GMT）は、以下であった：

【0191】

【表 1 2】

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	1140	2133	1026	2792	3045	1330	2975	5	1101
35	1721	5532	3184	3882	9525	2409	39251	5	12139

35日目において、F特異的IgG1力価およびIgG2a力価（GMT）は、以下のとおりであった：

【0192】

【表 1 3】

IgG	1	2	3	4	5	6	7	8
IgG1	66	247	14	328	468	92	56258	79
IgG2a	2170	7685	5055	6161	1573	2944	35	14229

35日目および49日目のRSV血清中和抗体力価は、以下のとおりであった（データは、2～5匹のマウスプール（1群あたり1プール）の60% プラーク減少中和力価である）：

【0193】

10

20

30

40

50

【表 1 4】

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	<20	27	29	22	36	<20	28	<20	<20
49	<20	44	30	23	36	<20	33	<20	37

49日目に、T細胞分析のために脾臓を採取した。平均の正味F特異的サイトカイン陽性T細胞頻度(CD8+)は、以下のとおりであった(これは、統計的に有意にゼロを上回った(RSVペプチドF85-93およびF249-258に対して特異的)数字のみを示す)：

【0194】

【表 1 5】

群	CD4-CD8+			
	IFN γ	IL2	IL5	TNF α
1	0.42	0.13		0.37
2	1.21	0.37		1.02
3	1.01	0.26		0.77
4	1.26	0.23		0.93
5	2.13	0.70		1.77
6	0.59	0.19		0.49
7	0.10	0.05		
8				
9	2.83	0.72		2.26

C3H/HeNマウスの9群を、同じようにして免疫した。F特異的IgG力価(GMT)は、以下であった：

【0195】

【表 1 6】

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	5	2049	1666	1102	298	984	3519	5	806
35	152	27754	19008	17693	3424	6100	62297	5	17249

35日目において、F特異的IgG1力価およびIgG2a力価(GMT)は、以下のとおりであった：

【0196】

10

20

30

40

50

【表 17】

lgG	1	2	3	4	5	6	7	8
lgG1	5	1323	170	211	136	34	83114	189
lgG2a	302	136941	78424	67385	15667	27085	3800	72727

35日目および49日目のRSV血清中和抗体力価は、以下のとおりであった：

【0197】

10

【表 18】

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	<20	539	260	65	101	95	443	<20	595
49	<20	456	296	35	82	125	1148	<20	387

従って、3種の異なる脂質（RV01、RV05、RV17；pKaは、5.8、5.85、6.1）を、3種の異なる近交系のマウス系統において試験した。3種の系統すべてに関して、RV01がRV17より有効であった；BALB/cおよびC3H系統に関しては、RV05は、RV01およびRV17よりも有効性が低かったが、B6系統においては、より有効であった。しかし、すべての場合において、上記リポソームは、並行して試験した2種のカチオン性ナノエマルジョンより有効であった。

20

【0198】

（CMV免疫原性）

DLiNDMAをカチオン性脂質として有するRV01リポソームを使用して、サイトメガロウイルス（CMV）糖タンパク質をコードするRNAレプリコンを送達した。「vA160」レプリコンは、全長糖タンパク質HおよびL（gH/gL）をコードするのに対して、「vA322」レプリコンは、可溶性形態（gHsol/gL）をコードする。上記2種のタンパク質は、単一のレプリコン中の別個のサブゲノムプロモーターの制御下にある；2種の別個のベクター（1つは、gHをコードし、1つは、gLをコードする）の共投与は、良好な結果を与えなかった。

30

【0199】

BALB/cマウス（10匹/群）に、0日目、21日目および42日目に、gH/gLを発現するVRP（ 1×10^6 IU）、gHsol/gLを発現するVRP（ 1×10^6 IU）およびコントロールとしてPBSを、両側の筋肉内ワクチン接種（ $50 \mu\text{L}$ /脚）で与えた。2つの試験群に、リポソーム（40% DLiNDMA、10% DSPC、48% Chol、2% PEG-DMG；上記で議論した方法（A）を使用するが、 $150 \mu\text{g}$ RNAバッチサイズを用いて作製した）中に処方した、 $1 \mu\text{g}$ の上記vA160レプリコンもしくはvA322レプリコンを与えた。

40

【0200】

上記vA160リポソームは、Zav直径 168 nm、pdI 0.144、および87.4% 封入を有した。上記vA322リポソームは、Zav直径 162 nm、pdI 0.131、および90% 封入を有した。

【0201】

上記レプリコンは、単一のベクターから2種のタンパク質を発現できた。

【0202】

63日目（3wp3）に、血清を、免疫学的分析のために集めた。CMV中和力価（コントロールと比較して、陽性ウイルスフォーカス/ウェルの数において50%減少を生じる血清希釈の逆数）は、以下のとおりであった：

50

【 0 2 0 3 】

【 表 1 9 】

gH/gL VRP	gHsol/gL VRP	gH/gL リポソーム	gHsol/gL リポソーム
4576	2393	4240	10062

全長もしくは可溶性形態の上記 C M V g H / g L 複合体のいずれかを発現する R N A は、従って、上皮細胞でアッセイされる場合、高い力価の中和抗体を誘発した。上記リポソーム封入 R N A によって誘発された平均力価は、その対応する V R P についてのものと少なくとも同程度に高かった。

10

【 0 2 0 4 】

本発明は、例示によって記載されてきたに過ぎず、本発明の範囲および趣旨内に留まりながら、改変が行われ得ることは、理解される。

本発明は以下の態様にも関する。

[1] 水性コアを封入する脂質二重層を有するリポソームであって、ここで：(i) 該脂質二重層は、5 . 0 ~ 7 . 6 の範囲の p K a を有する脂質を含み；そして(i i) 該水性コアは、免疫原をコードする R N A を含む、リポソーム。

20

[2] 5 . 0 ~ 7 . 6 の範囲の p K a を有する前記脂質は、三級アミンを有する、上記 [1] に記載のリポソーム。

[3] 5 . 0 ~ 7 . 6 の範囲の p K a は、5 . 7 ~ 5 . 9 の間である、上記 [1] ~ [2] のいずれかに記載のリポソーム。

[4] 5 . 0 ~ 7 . 6 の範囲の p K a を有する前記脂質は、R V 0 1、R V 0 2、R V 0 3、R V 0 4、R V 0 5、R V 0 6、R V 0 7、R V 0 8、R V 0 9、R V 1 1、R V 1 2、R V 1 6 もしくは R V 1 7 について本明細書で示される式を有する、上記 [1] に記載のリポソーム。

[5] 2 0 ~ 2 2 0 n m の範囲の直径を有する、上記 [1] ~ [4] のいずれかに記載のリポソーム。

[6] 前記 R N A 分子は、(i) 該 R N A 分子から R N A を転写し得る R N A 依存性 R N A ポリメラーゼ、および(i i) 免疫原をコードする、上記 [1] ~ [5] のいずれかに記載のリポソーム。

30

[7] 前記 R N A 分子は、2 個のオープンリーディングフレームを有し、そのうちの第 1 のものは、アルファウイルスレプリカーゼをコードし、そのうちの第 2 のものは、前記免疫原をコードする、上記 [5] に記載のリポソーム。

[8] 前記 R N A 分子は、9 0 0 0 ~ 1 2 0 0 0 ヌクレオチド長である、上記 [1] ~ [7] のいずれかに記載のリポソーム。

[9] 前記免疫原は、細菌、ウイルス、真菌もしくは寄生生物に対してインビボで免疫応答を誘発し得る、上記 [1] ~ [8] のいずれかに記載のリポソーム。

[1 0] 前記免疫原は、呼吸器系合胞体ウイルス糖タンパク質 F に対してインビボで免疫応答を誘発し得る、上記 [1] ~ [9] のいずれかに記載のリポソーム。

40

[1 1] 上記 [1] ~ [1 0] のいずれかに記載のリポソームを含む、薬学的組成物。

[1 2] 脊椎動物において防御的免疫応答を惹起するための方法であって、該方法は、該脊椎動物に、有効量の、上記 [1] ~ [1 0] に記載のリポソーム、または上記 [1 1] に記載の薬学的組成物を投与する工程を包含する、方法。

[1 3] R N A 含有リポソームを調製するためのプロセスであって、該プロセスは、リポソーム形成の際に、(a) R N A と、脂質とを、該脂質の p K a 未満であるが 4 . 5 を上回る p H において混合する工程；次いで、(b) 該 p H を、該脂質の p K a を上回るように上昇させる工程、を包含する、プロセス。

[1 4] 上記 [1 3] に記載のプロセスであって、ここで、工程 (a) において使用され

50

るRNAは、前記脂質の有機溶液と混合して、混合物を与えるために、水性溶液中に存在し、該混合物は、次いで、希釈されて、リポソームを形成し；そして前記pHは、リポソーム形成後に、工程（b）において上昇させられる、プロセス。

【 0 2 0 5 】

【 数 1 】

参考文献

- [1] Johanning *et al.* (1995) *Nucleic Acids Res* 23:1495-1501.
- [2] WO2005/121348.
- [3] WO2008/137758. 10
- [4] WO2009/086558.
- [5] WO2011/076807.
- [6] Heyes *et al.* (2005) *J Controlled Release* 107:276-87.
- [7] WO2005/121348.
- [8] *Liposomes: Methods and Protocols, Volume 1: Pharmaceutical Nanocarriers: Methods and Protocols.* (ed. Weissig). Humana Press, 2009. ISBN 160327359X.
- [9] *Liposome Technology*, volumes I, II & III. (ed. Gregoriadis). Informa Healthcare, 2006.
- [10] *Functional Polymer Colloids and Microparticles volume 4 (Microspheres, microcapsules & liposomes).* (eds. Arshady & Guyot). Citus Books, 2002.
- [11] Jeffs *et al.* (2005) *Pharmaceutical Research* 22 (3):362-372. 20
- [12] WO2005/113782.
- [13] WO2011/005799.
- [14] El Ouahabi *et al.* (1996) *FEBS Letts* 380:108-12.
- [15] Giuliani *et al.* (2006) *Proc Natl Acad Sci U S A* 103(29):10834-9.
- [16] WO2009/016515.
- [17] WO02/34771.
- [18] WO2005/032582.
- [19] WO2010/119343.
- [20] WO2006/110413. 30
- [21] WO2005/111066.
- [22] WO2005/002619.
- [23] WO2006/138004.
- [24] WO2009/109860.
- [25] WO02/02606.
- [26] WO03/018054.
- [27] WO2006/091517.
- [28] WO2008/020330.
- [29] WO2006/089264. 40
- [30] WO2009/104092.

【 0 2 0 6 】

【 数 2 】

[31] WO2009/031043.
 [32] WO2007/049155.
 [33] Gennaro (2000) *Remington: The Science and Practice of Pharmacy*. 20th edition, ISBN: 0683306472.
 [34] *Methods In Enzymology* (S. Colowick and N. Kaplan, eds., Academic Press, Inc.)
 [35] *Handbook of Experimental Immunology*, Vols. I-IV (D.M. Weir and C.C. Blackwell, eds, 1986, Blackwell Scientific Publications)
 [36] Sambrook *et al.* (2001) *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 3rd edition (Cold Spring Harbor Laboratory Press).
 [37] *Handbook of Surface and Colloidal Chemistry* (Birdi, K.S. ed., CRC Press, 1997)
 [38] Ausubel *et al.* (eds) (2002) *Short protocols in molecular biology*, 5th edition (Current Protocols).
 [39] *Molecular Biology Techniques: An Intensive Laboratory Course*, (Ream *et al.*, eds., 1998, Academic Press)
 [40] *PCR (Introduction to Biotechniques Series)*, 2nd ed. (Newton & Graham eds., 1997, Springer Verlag)
 [41] Yoneyama & Fujita (2007) *Cytokine & Growth Factor Reviews* 18:545-51.
 [42] Maurer *et al.* (2001) *Biophysical Journal*, 80: 2310-2326.
 [43] Perri *et al.* (2003) *J Virol* 77:10394-10403.
 [44] Iavarone *et al.* (2011) *J Immunol* 186:4213-22.
 [45] WO2011/057020.


10

20

【 図 面 】


【 図 1 】

FIGURE 1



【 図 2 】

FIGURE 2




30


40

50

【 3 】




【 4 】




10

20

【 5 】



【 6 】




30


40

50

【 図 7 】




【 図 8 】




10

20

【 図 9 】



【 図 1 0 】




30


40

50

【 図 1 1 】




【 図 1 2 】




10

【 図 1 3 】



【 図 1 4 A 】



20


30

40

50


【 図 1 4 B 】

FIGURE 14B



【 図 1 5 】

FIGURE 15




10

20


【 図 1 6 】

FIGURE 16



【 図 1 7 】

FIGURE 17




30

40

50


【 18 】

FIGURE 18



【 19 A 】

FIGURE 19A




10

20

【 19 B 】

FIGURE 19B



30

40

50

【手続補正書】

【提出日】令和4年10月25日(2022.10.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

リボソームおよび免疫原をコードするRNA分子を含む組成物であって、
 前記リボソームが脂質二重層を有し、脂質二重層が前記免疫原をコードするRNA分子のうちの少なくとも半分を水性コア内に封入しており、
 前記脂質二重層が三級アミンを含む脂質を含み、
 前記三級アミンを含む脂質が5.0～7.6の範囲のpKaを有し、
 前記三級アミンを含む脂質の5.0～7.6の範囲のpKaが、
 1) 100体積%のエタノール中の2mMの該脂質400 μ Lと、90体積%のエタノールおよび10体積%のメタノール中の0.3mMの蛍光プローブトルエンニトロスルホン酸(TNS)800 μ Lとを混合し、それによって脂質/TNS混合物を取得し；
 2) 1)で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、2.5mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナトリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、4.44～4.52のpHを有するよう調整されている第1の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第1の脂質/緩衝液混合物を取得し、クリアボトムを有する96ウェルプレートの第1のウェル中に100 μ Lの前記第1の脂質/緩衝液混合物を分注し；
 3) 1)で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、2.5mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナトリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、5.27のpHを有するよう調整されている第2の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第2の脂質/緩衝液混合物を取得し、前記96ウェルプレートの第2のウェル中に100 μ Lの前記第2の脂質/緩衝液混合物を分注し；
 4) 1)で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、2.5mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナトリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、6.15～6.21のpHを有するよう調整されている第3の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第3の脂質/緩衝液混合物を取得し、前記96ウェルプレートの第3のウェル中に100 μ Lの前記第3の脂質/緩衝液混合物を分注し；
 5) 1)で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、2.5mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナトリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、6.57のpHを有するよう調整されている第4の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第4の脂質/緩衝液混合物を取得し、前記96ウェルプレートの第4のウェル中に100 μ Lの前記第4の脂質/緩衝液混合物を分注し；
 6) 1)で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、2.5mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナトリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、7.10～7.20のpHを有するよう調整されている第5の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第5の脂質/緩衝液混合物を取得し、前記96ウェルプレートの第5のウェル中に100 μ Lの前記第5の脂質/緩衝液混合物を分注し；
 7) 1)で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、2.5mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナ

10

20

30

40

50

トリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、7.72～7.80のpHを有するよう調整されている第6の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第6の脂質/緩衝液混合物を取得し、前記96ウェルプレートの第6のウェル中に100 μ Lの前記第6の脂質/緩衝液混合物を分注し；

8) 1) で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、25mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナトリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、8.27～8.33のpHを有するよう調整されている第7の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第7の脂質/緩衝液混合物を取得し、前記96ウェルプレートの第7のウェル中に100 μ Lの前記第7の脂質/緩衝液混合物を分注し；

9) 1) で得られた前記脂質/TNS混合物7.5 μ Lと、20mMのリン酸ナトリウム、25mMのクエン酸ナトリウム、20mMの酢酸ナトリウムおよび150mMの塩化ナトリウムを含むナトリウム塩緩衝液であり、10.47～11.12のpHを有するよう調整されている第8の緩衝液242.5 μ Lとを混合し、それによって第8の脂質/緩衝液混合物を取得し、前記96ウェルプレートの第8のウェル中に100 μ Lの前記第8の脂質/緩衝液混合物を分注し；

10) 322nmの励起波長を用い、420nm未満をカットオフして、前記96ウェルプレートの第1～第8のウェルおよび空ウェルの各々の431nmの波長での絶対蛍光を測定し、

11) 第1～第8のウェルの絶対蛍光各々から空ウェルの絶対蛍光を差し引き、それによって、第1～第8の脂質/緩衝液混合物各々についてブランク除去蛍光を取得し；

12) 第1～第8の脂質/緩衝液混合物のブランク除去蛍光各々を、第1の脂質/緩衝液混合物のブランク除去蛍光に対して正規化し、それによって、第1～第8の脂質/緩衝液混合物各々について、第1の脂質/緩衝液混合物の相対蛍光を1とする相対蛍光を取得し；

13) 第1～第8の脂質/緩衝液混合物の相対蛍光を、第1～第8の脂質/緩衝液混合物のpHに対してプロットし；

14) 13) で得られたグラフから0.5の相対蛍光に対応するpHを見出し、前記0.5の相対蛍光に対応するpHを前記脂質のpKaと決定すること

によって決定される、

組成物。

【請求項2】

前記三級アミンを含む脂質が、5.8～7.0の範囲のpKaを有する、請求項1に記載の組成物。

【請求項3】

前記三級アミンを含む脂質が、6.07～7.0の範囲のpKaを有する、請求項1に記載の組成物。

【請求項4】

前記リボソームが、20～220nmの範囲の直径を有する、請求項1に記載の組成物。

【請求項5】

前記免疫原をコードするRNA分子は、2個のオープンリーディングフレームを有し、そのうちの第1のものは、アルファウイルスレプリカーゼをコードし、そのうちの第2のものは、前記免疫原をコードする、請求項1に記載の組成物。

【請求項6】

前記免疫原をコードするRNA分子が、前記免疫原をコードするRNA分子からRNAを転写できるRNA依存性RNAポリメラーゼをさらにコードする、請求項1に記載の組成物。

【請求項7】

前記免疫原が、細菌、ウイルス、真菌もしくは寄生生物に対してインビボで免疫応答を誘発し得る、請求項1に記載の組成物。

10

20

30

40

50

【請求項 8】

前記脂質二重層が、ポリエチレングリコール結合体化（PEG結合体化）脂質、および／またはコレステロールをさらに含む、請求項 1～7 にいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 9】

前記免疫原が、ウイルス免疫原、細菌免疫原、真菌免疫原、または寄生生物免疫原を含む、請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 10】

PEG結合体化脂質が、1,2-ジミリスチル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[メトキシ(ポリエチレングリコール)]である、請求項 1～9 のいずれか 1 項に記載の組成物。

10

【請求項 11】

前記脂質二重層が、前記脂質二重層を形成する総脂質の 35 モル%～50 モル%の割合でコレステロールを含む、請求項 1～10 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 12】

前記免疫原が、2 種以上の免疫原を含む、請求項 1～11 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 13】

前記脂質二重層が、前記脂質二重層を形成する総脂質の 40 モル%～60 モル%の割合で前記三級アミンを含む脂質を含む、請求項 1～12 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 14】

前記脂質二重層が、1,2-ジアステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリンをさらに含む、請求項 1～13 のいずれか 1 項に記載の組成物。

20

【請求項 15】

前記免疫原が、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）免疫原、エプスタイン・バー・ウイルス（EBV）免疫原、サイトメガロウイルス（CMV）免疫原、コロナウイルススパイクポリペプチド免疫原、インフルエンザ A ウイルス免疫原、水痘帯状疱疹ウイルス（VZV）免疫原、またはフラビウイルス免疫原を含む、請求項 1～14 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 16】

前記脂質二重層が、前記免疫原をコードする RNA 分子の 71%～97.6%を水性コア内に封入している、請求項 1～15 のいずれか 1 項に記載の組成物。

30

【請求項 17】

前記脂質二重層が、前記免疫原をコードする RNA 分子の 85.3%～97.6%を水性コア内に封入している、請求項 1～15 のいずれか 1 項に記載の組成物。

【請求項 18】

請求項 1～17 のいずれか 1 項に記載の組成物を含む、薬学的組成物。

【請求項 19】

脊椎動物において防御的免疫応答を惹起するための、請求項 18 に記載の薬学的組成物。

【請求項 20】

前記免疫原に対する細胞媒介性免疫応答、および／または前記免疫原に対する抗体応答をインビボで誘発するための、請求項 18 または 19 に記載の薬学的組成物。

40

【請求項 21】

請求項 1 に記載の組成物を調製するためのプロセスであって、該プロセスは、リポソーム形成の際に、(i) 前記免疫原をコードする RNA 分子と、脂質とを、該脂質の pKa 未満であるが 4.5 を上回る pH において混合する工程；次いで、(ii) 該 pH を、該脂質の pKa を上回るように上昇させる工程、を含む、プロセス。

【請求項 22】

請求項 21 に記載のプロセスであって、ここで、工程 (i) において使用される前記免疫原をコードする RNA 分子は、前記脂質の有機溶液と混合して、混合物をもたらすために、水性溶液中に存在し、該混合物は、次いで、希釈されて、リポソームを形成し；そして

50

前記 pH は、リボソーム形成後に、工程 (i i) において上昇させられる、プロセス。

【請求項 2 3】

脊椎動物において防御的免疫応答を惹起するための医薬を製造するための、請求項 1 ~ 17 のいずれか 1 項に記載の組成物の使用。

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類

<i>A 6 1 K</i>	<i>47/28</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 K</i>	<i>47/18</i>	
<i>A 6 1 K</i>	<i>47/24</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 K</i>	<i>47/28</i>	
<i>A 6 1 P</i>	<i>31/04</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 K</i>	<i>47/24</i>	
<i>A 6 1 P</i>	<i>31/10</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 P</i>	<i>31/04</i>	
<i>A 6 1 P</i>	<i>31/12</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 P</i>	<i>31/10</i>	
<i>A 6 1 P</i>	<i>33/00</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 P</i>	<i>31/12</i>	
<i>A 6 1 K</i>	<i>39/02</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 P</i>	<i>33/00</i>	
<i>C 1 2 N</i>	<i>15/88</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>A 6 1 K</i>	<i>39/02</i>	
<i>C 1 2 N</i>	<i>15/54</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>C 1 2 N</i>	<i>15/88</i>	<i>Z</i>
<i>C 1 2 N</i>	<i>15/40</i>	<i>(2006.01)</i>	<i>C 1 2 N</i>	<i>15/54</i>	
			<i>C 1 2 N</i>	<i>15/40</i>	

1. TRITON

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 4 6 6 2 - 8 0 9 7 , エミリービル , ピーオー ボックス
8 0 9 7 , ノバルティス ヴァクシンス アンド ダイアグノスティクス , インコーポレイテッド
気付