

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  
(O.A.P.I.)



19

11 N°

12347

51 Inter. Cl.7

C07D 487/08, 498/08  
A61K 31/529, 31/535, 31/4188

BREVET D'INVENTION

21 Numéro de dépôt : 1200300019

22 Date de dépôt : 24.07.2001

30 Priorité(s) : FR  
01.08.2000 N° 00/10121

24 Délivré le : 07.10.2003

45 Publié le : 15 MAI 2006

73 Titulaire(s) :

Société dite : AVENTIS PHARMA S.A.  
20, Avenue Raymond Aron  
92160 ANTONY (FR)


72 Inventeur(s) :

1- LAMPILAS Maxime  
60, rue Veuve Aublet  
93230 ROMAINVILLE (FR)  
2- ASZODI Jozsef (FR)  
3- ROWLANDS David Alan (FR)  
4- FROMENTIN Claude (FR)

74 Mandataire : CABINET CAZENAVE  
B.P. 500  
YAOUNDE - Cameroun

54 Titre : Composés azabicycliques, leur préparation et leur utilisation comme médicaments, notamment comme anti-bactériens.

57 Abrégé : L'invention concerne de nouveaux composés hétérocycliques de formule générale (I), et leurs sels avec une base ou un acide. L'invention concerne également un procédé pour la préparation de ces composés ainsi que leur utilisation comme médicaments, notamment comme anti-bactériens.



5 L'invention concerne de nouveaux composés  
hétérocycliques, leur préparation et leur utilisation  
comme médicaments, notamment comme anti-bactériens.

Dans le journal J. Org. Chem., Vol. 37, No. 5, 1972,  
10 pages 697 à 699 est décrite notamment la préparation d'un  
dérivé bicyclique de formule brute  $C_{10}H_{18}N_2O$ .


Dans le journal J. Org. Chem., Vol. 45, No. 26,  
1980, pages 5325-5326 est décrite notamment la  
préparation de dérivés bicycliques de formules brutes  
15  $C_6H_9NO_2$  et  $C_7H_{11}NO_2$ .

Dans la revue Chemical Reviews, 1983, vol. 83, No.  
5, pages 549 à 555 est décrite notamment la préparation  
de dérivés bicycliques de fomules brutes  $C_{10}H_{18}N_2O$  et  
 $C_7H_{12}N_2O$ .

20 Dans le journal Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, n°  
3, pages 625 à 628 est décrit notamment la préparation  
d'un composé de formule brute  $C_{12}H_{12}N_2O$ .

Aucune utilisation particulière dans le domaine  
thérapeutique de ces composés n'a été décrite dans ces  
25 documents.

L'invention a pour objet les composés répondant à la  
formule (I) suivante:



(I)



3

A représente une liaison entre les deux carbones porteurs de  $R_1$  et  $R_2$  ou un groupement  $\begin{array}{c} \text{---} \text{C}(\text{H})\text{---} \text{R}_4 \\ \vdots \\ \text{---} \end{array}$ ,  $R_4$  représentant un atome d'hydrogène ou un groupement  $(\text{CH}_2)_{n'}\text{R}_5$ ,  $n'$  et  $R_5$  étant définis comme ci-dessus, le pointillé représentant une éventuelle liaison avec l'un ou l'autre des carbones porteurs des substituants  $R_1$  et  $R_2$ ;

$n$  est égal à 1 ou 2;

X représente un groupement divalent  $-\text{C}(\text{O})-\text{B}-$  relié à l'atome d'azote par l'atome de carbone,

B représente un groupement divalent  $-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-$  lié au carbonyle par l'atome d'oxygène, un groupement  $-\text{NR}_8-$   $(\text{CH}_2)_n-$  ou  $-\text{NR}_8-\text{O}-$  relié au carbonyle par l'atome d'azote,  $n$  est égal à 0 ou 1 et  $R_8$  est choisi dans le groupe constitué par un atome d'hydrogène, un radical OH, R, OR, Y, OY,  $Y_1$ ,  $OY_1$ ,  $Y_2$ ,  $OY_2$ ,  $Y_3$ ,  $\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{SO}_m\text{R}$ ,  $\text{OSiR}_a\text{R}_b\text{R}_c$  et  $\text{SiR}_a\text{R}_b\text{R}_c$ ,  $R_a$ ,  $R_b$  et  $R_c$  représentant individuellement un radical alkyle linéaire ou ramifié renfermant de 1 à 6 atomes de carbone ou un radical aryle renfermant de 6 à 10 atomes de carbone, R étant défini comme précédemment et  $m$  étant égal à 0, 1 ou 2,

Y est choisi dans le groupe constitué par les radicaux COH, COR, COOR, CONH<sub>2</sub>, CONHR, CONHOH, CONHSO<sub>2</sub>R, CH<sub>2</sub>COOH, CH<sub>2</sub>COOR, CH<sub>2</sub>CONHOH, CH<sub>2</sub>CONHCN, CH<sub>2</sub>tétrazole, CH<sub>2</sub>tétrazole protégé, CH<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>H, CH<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>R, CH<sub>2</sub>PO(OR)<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>PO(OR)(OH), CH<sub>2</sub>PO(R)(OH) et CH<sub>2</sub>PO(OH)<sub>2</sub>,

$Y_1$  est choisi dans le groupe constitué par les radicaux SO<sub>2</sub>R, SO<sub>2</sub>NHCOH, SO<sub>2</sub>NHCOR, SO<sub>2</sub>NHCOOR, SO<sub>2</sub>NHCONHR, SO<sub>2</sub>NHCONH<sub>2</sub> et SO<sub>3</sub>H,

$Y_2$  est choisi dans le groupe constitué par les radicaux PO(OH)<sub>2</sub>, PO(OR)<sub>2</sub>, PO(OH)(OR) et PO(OH)(R),

$Y_3$  est choisi dans le groupe constitué par les radicaux tétrazole, tétrazole substitué par le radical R,

squarate, NH ou NR tétrazole, NH ou NR tétrazole substitué par le radical R, NHSO<sub>2</sub>R et NRSO<sub>2</sub>R, R étant défini comme ci-dessus;

étant entendu que lorsque n est égal à 1 et A représente un groupement  $\begin{array}{c} \text{---} \text{C}(\text{H}) \text{---} \text{R}_4 \\ | \\ | \\ | \end{array}$  dans lequel R<sub>4</sub> est un atome d'hydrogène et

- soit X représente le groupement -C(O)-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>" dans lequel n" est 0 ou 1,
- soit X représente le groupement -CO-NR<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>" dans lequel n" est 1 et R<sub>8</sub> est le groupement isopropyle,
- soit X représente le groupement -CO-NR<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>" dans lequel n" est 0 et R<sub>8</sub> est hydrogène ou phényle,

alors R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> ne peuvent représenter tous les trois en même temps un atome d'hydrogène.

L'invention a également pour objet les sels de ces composés qui peuvent être obtenus avec des bases ou des acides minéraux ou organiques, ainsi que les sels internes sous la forme desquels certains composés peuvent, le cas échéant, se présenter.

Les atomes de carbone asymétriques contenus dans les composés de formule (I) peuvent indépendamment les uns des autres présenter la configuration R, S ou RS et l'invention a donc également pour objet les composés de formule (I) se présentant sous la forme d'énantiomères purs ou de diastéréoisomères purs ou sous la forme d'un mélange d'énantiomères notamment de racémates, ou de mélanges de diastéréoisomères.

Il résulte de ce qui précède que les substituants R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub> pris individuellement d'une part et X d'autre part peuvent être en position cis et/ou trans par rapport au cycle sur lequel ils sont fixés et que l'invention a

donc pour objet les composés de formule (I) se présentant sous la forme d'isomères cis ou d'isomères trans ou de mélanges.

Par radical alkyle renfermant de 1 à 6 atomes de carbone, on entend le radical méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, ainsi que butyle, pentyle ou hexyle linéaire ou ramifié.

Par radical  $-CH_2-$ alkényle renfermant de 3 à 9 atomes de carbone, on entend par exemple le radical allyle, ou un radical butényle, pentényle ou hexényle.

Par radical aryle renfermant de 6 à 10 atomes de carbone, on entend un radical phényle ou naphthyle.


Par radical aralkyle renfermant de 7 à 11 atomes de carbone, on entend un radical benzyle, phénéthyle ou méthylnaphtyle.

Par radical alkyloxy renfermant de 1 à 6 atomes de carbone, on entend notamment le radical méthoxy, éthoxy, propoxy, isopropoxy, ainsi que butoxy, isobutoxy, sec-butoxy ou tert-butoxy.

Par atome d'halogène, on entend un atome de fluor, de chlore, de brome ou d'iode.

Par radical squarate, on entend le radical de formule:

25




Parmi les sels d'acides des produits de formule (I), on peut citer entre autres, ceux formés avec les acides minéraux, tels que les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfurique ou phosphorique ou avec les acides organiques comme l'acide formique, acétique, trifluoroacétique, propionique, benzoïque,

30

maléique, fumarique, succinique, tartrique, citrique, oxalique, glyoxylique, aspartique, alcanesulfoniques, tels que les acides méthane et éthane sulfoniques, arylsulfoniques tels que les acides benzène et paratoluènesulfoniques.

Parmi les sels de bases des produits de formule (I), on peut citer, entre autres, ceux formés avec les bases minérales telles que, par exemple, l'hydroxyde de sodium, de potassium, de lithium, de calcium, de magnésium ou d'ammonium ou avec les bases organiques telles que, par exemple, la méthylamine, la propylamine, la triméthylamine, la diéthylamine, la triéthylamine, la N,N-diméthyléthanolamine, le tris (hydroxyméthyl) amino méthane, l'éthanolamine, la pyridine, la picoline, la dicyclohexylamine, la morpholine, la benzylamine, la procaine, la lysine, l'arginine, l'histidine, la N-méthylglucamine, ou encore les sels de phosphonium, tels que les alkyl-phosphonium, les aryl-phosphoniums, les alkyl-aryl-phosphonium, les alkényl-aryl-phosphonium ou les sels d'ammoniums quaternaires tels que le sel de tétra-n-butyl-ammonium.

Parmi les composés de formule (I), l'invention a notamment pour objet ceux dans lesquels n est égal à 1 ainsi que ceux dans lequel A représente un groupe



tel que défini plus haut, et notamment parmi ceux-ci, ceux dans lesquels R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène.

Parmi les composés de formule (I), l'invention a encore notamment pour objet ceux dans lesquels X représente un groupement divalent -CO-B dans lequel B représente un groupement -NR<sub>3</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> - tel que défini plus haut et plus particulièrement, parmi ceux-ci, ceux

dans lesquels  $R_8$  est un groupement  $Y_1$  ou  $OY_1$ , dans lequel  $Y_1$  est tel que défini plus haut.


Parmi les composés de formule (I), l'invention a tout particulièrement pour objet les composés dont les noms suivent:

- le trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,
- le trans -7-oxo-N-(phénylméthyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,
- le trans -7-oxo-N-(4-pyridinyl méthyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,
- le trans -7-oxo-N-(3-pyridinyl méthyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,
- le trans -7-oxo-N-(2-amino 2-oxo éthyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,
- le trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle.

Un autre objet de l'invention est aussi un procédé permettant la préparation des composés de formule (I).

Ce procédé est caractérisé en ce qu'il comporte:

- a) une étape au cours de laquelle on fait réagir avec un agent de carbonylation, le cas échéant en présence d'une base, un composé de formule (II):






dans laquelle:

- R'<sub>1</sub> représente un atome d'hydrogène ou un radical CN, COOH protégé, COOR', (CH<sub>2</sub>)<sup>n'</sup>R'<sub>5</sub>, CONR<sub>6</sub>, R<sub>7</sub> ou  $\begin{array}{c} \text{NR}_6 \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagdown \\ \text{NHR}_7 \end{array}$  protégé ;
- 5 R'<sub>1</sub>, R<sub>6</sub> et R<sub>7</sub> ayant les définitions ci-dessus et R' et R'<sub>5</sub> ayant respectivement les définitions de R et R<sub>5</sub> ci-dessus, dans lesquelles les fonctions réactives éventuellement présentes sont protégées;
- 10 R'<sub>2</sub> représente un atome d'hydrogène ou un groupement (CH<sub>2</sub>)<sup>n'</sup><sub>1</sub>R'<sub>5</sub>, n'<sub>1</sub> et R'<sub>5</sub> étant défini comme ci-dessus; R<sub>3</sub> est défini comme précédemment;
- A' représente une liaison entre les deux carbones porteurs de R'<sub>1</sub> et R'<sub>2</sub> ou un groupement  $\begin{array}{c} \text{---} \text{C(H)} \text{---} \text{R}'_4 \\ \parallel \\ \text{---} \end{array}$ , R'<sub>4</sub> représentant un atome d'hydrogène ou un groupement
- 15 (CH<sub>2</sub>)<sup>n'</sup><sub>1</sub>R'<sub>5</sub>, n'<sub>1</sub> et R'<sub>5</sub> étant définis comme ci-dessus, le pointillé représentant une liaison éventuelle avec l'un ou l'autre des carbones porteurs des substituants R'<sub>1</sub> et R'<sub>2</sub>;
- 20 n est défini comme précédemment;
- HZ représente un groupement HO-(CH<sub>2</sub>)<sup>n''</sup>-, HNR'<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n''</sup>- ou HNR'<sub>8</sub>-O-, n'' étant défini comme précédemment et R'<sub>8</sub> représentant un atome d'hydrogène, un radical OH protégé, R', OR', un radical Y' ou OY', Y' étant choisi parmi les
- 25 groupements COH, COR', COOR', CONH<sub>2</sub>, CONHR', CONHOH protégé, CONHSO<sub>2</sub>R', CH<sub>2</sub>COOH protégé, CH<sub>2</sub>COOR', CH<sub>2</sub>CONHOH protégé, CH<sub>2</sub>CONHCN, CH<sub>2</sub>tétrazole substitué par R', CH<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>R', CH<sub>2</sub>PO(OR')<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> protégé, CH<sub>2</sub>PO(OR')OH protégé, CH<sub>2</sub>PO(R')OH protégé, CH<sub>2</sub>PO(OH)<sub>2</sub> protégé, un
- 30 radical Y'<sub>1</sub> ou OY'<sub>1</sub>, Y'<sub>1</sub> étant choisi parmi les groupements SO<sub>2</sub>R', SO<sub>2</sub>NHCOH, SO<sub>2</sub>NHCOR', SO<sub>2</sub>NHCOOR', SO<sub>2</sub>NHCONH<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>NHCONHR' et SO<sub>3</sub>H protégé, un radical Y'<sub>2</sub> ou OY'<sub>2</sub>, Y'<sub>2</sub> représentant un groupement PO(OH)<sub>2</sub> protégé,

PO(OH)(OR') protégé, PO(OH)R' protégé ou PO(OR')<sub>2</sub>, ou un radical Y'<sub>3</sub>, Y'<sub>3</sub> étant choisi parmi les groupements tétrazole protégé, tétrazole substitué par le radical R', NH ou NR' tétrazole protégé, NH ou NR' tétrazole substitué par le radical R', NHSO<sub>2</sub>R' et NR'SO<sub>2</sub>R', R' étant défini comme ci-dessus;

en vue d'obtenir un composé intermédiaire de formule:



(III)

15 dans laquelle:

R'<sub>1</sub>, R'<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, A' et n ont les mêmes significations que ci-dessus et soit X<sub>1</sub> est un atome d'hydrogène et X<sub>2</sub> représente un groupement -Z-CO-X<sub>3</sub>, X<sub>3</sub> représentant le reste de l'agent de carbonylation, soit X<sub>2</sub> est un groupement -ZH et X<sub>1</sub> représente un groupement CO-X<sub>3</sub>, X<sub>3</sub> étant défini comme précédemment;

20 b) une étape au cours de laquelle on cyclise l'intermédiaire obtenu précédemment, en présence d'une base;

25 et en ce que:

c) le cas échéant, l'étape a) est précédée et/ou l'étape b) est suivie de l'une ou de plusieurs des réactions suivantes, dans un ordre approprié:

- 30
- protection des fonctions réactives,
  - déprotection des fonctions réactives,
  - estérification,
  - saponification,
  - sulfatation,

- phosphatation
- amidification,
- acylation,
- sulfonylation;
- 5 - alkylation;
- introduction d'une double liaison;
- formation d'un groupe urée;
- introduction d'un groupement tétrazole;
- réduction d'acides carboxyliques;
- 10 - déshydratation d'amide en nitrile;
- salification;
- échange d'ions;
- dédoublement ou séparation de diastéréoisomères;
- 15 - oxydation de sulfure en sulfoxyde et/ou sulfone.

Comme agent de carbonylation, on peut mettre en œuvre un réactif tel que le phosgène, le diphosgène, le triphosgène, un chloroformiate d'aryle tel que le  
20 chloroformiate de phényle ou de p-nitrophényle, un chloroformiate d'aralkyle tel que chloroformiate de benzyle, un chloroformiate d'alkyle ou d'alkényle tel que le chloroformiate de méthyle ou d'allyle, un dicarbonate d'alkyle tel que le dicarbonate de tert-butyle, le  
25 carbonyl-diimidazole et leurs mélanges.

La réaction a lieu de préférence en présence d'une base ou d'un mélange de bases qui neutralise l'acide formé. Elle peut notamment être une amine telle que la triéthylamine, la diisopropyléthylamine, la pyridine, la  
30 diméthylaminopyridine. Toutefois, on peut également opérer en utilisant le produit de départ de formule II comme base. On en utilise alors un excès. Une illustration en est donnée dans la partie expérimentale.

Le cas échéant, le produit de formule II est mis en œuvre sous la forme d'un sel d'acide, par exemple un chlorhydrate ou un trifluoroacétate.

Comme base dans l'étape b), on peut également  
5 utiliser les amines, ou encore les hydrures, les alcoolates, les amidures ou carbonates de métaux alcalins ou alcalino-terreux.

Les amines peuvent être choisies par exemple dans la liste ci-dessus.

10 Comme hydrure on peut notamment utiliser l'hydrure de sodium ou de potassium.

Comme alcoolate de métal alcalin, on utilise de préférence le t-butylate de potassium.

Comme amidure de métal alcalin on peut notamment  
15 utiliser le bis(triméthylsilyl) amidure de lithium.

Comme carbonate, on peut notamment utiliser le carbonate ou bicarbonate de sodium ou de potassium.

Le cas échéant, l'intermédiaire de formule III peut être obtenu sous forme d'un sel d'acide généré lors de la  
20 réaction de carbonylation et notamment un chlorhydrate. Il est ensuite mis en œuvre dans la réaction de cyclisation sous cette forme.

Le cas échéant, la cyclisation peut être effectuée sans isolement de l'intermédiaire de formule III.

25 Les réactions mentionnées à l'étape c) sont d'une manière générale des réactions classiques, bien connues de l'homme du métier.

Les fonctions réactives qu'il convient, le cas échéant, de protéger sont les fonctions acides  
30 carboxyliques, amines, amides, hydroxy et hydroxylamines.

La protection de la fonction acide est notamment effectuée sous forme d'esters d'alkyle, d'esters allyliques, de benzyle, benzhydryle ou p-nitrobenzyle.

La déprotection est effectuée par saponification, hydrolyse acide, hydrogénolyse, ou encore clivage à l'aide de complexes solubles du Palladium O.

Des exemples de ces protections et déprotections  
5 sont fournis ci-après dans la partie expérimentale.

La protection des amines et amides est notamment effectuée sous forme de dérivés benzylés, sous forme de carbamates, notamment d'allyle, benzyle, phényle ou tertbutyle, ou encore sous forme de dérivés silylés tels  
10 que les dérivés tertbutyle diméthyl, triméthyl, triphényl ou encore diphényl tertbutyl-silyle.

La déprotection est effectuée, selon la nature du groupement protecteur, par le sodium ou le lithium dans l'ammoniac liquide, par hydrogénolyse ou à l'aide de  
15 complexes solubles du Palladium O, par action d'un acide, ou par action du fluorure de tétrabutylammonium.

Des exemples sont fournis ci-après dans la partie expérimentale.

La protection des hydroxylamines est effectuée  
20 notamment sous forme d'éthers de benzyle ou d'allyle.

Le clivage des éthers est effectué par hydrogénolyse ou à l'aide de complexes solubles du Palladium O.

Une illustration est fournie plus loin dans la partie expérimentale.

25 La protection des alcools est effectuée de manière classique, sous forme d'éthers, d'esters ou de carbonates. Les éthers peuvent être des éthers d'alkyle ou d'alkoxyalkyle, de préférence des éthers de méthyle ou de méthoxyéthoxyméthyle, des éthers d'aryle ou de  
30 préférence d'aralkyle, par exemple de benzyle, ou des éthers silylés, par exemple les dérivés silylés cités plus haut. Les esters peuvent être n'importe quel ester clivable connu de l'homme du métier et de préférence

l'acétate, le propionate ou le benzoate ou p-nitrobenzoate. Les carbonates peuvent être par exemple des carbonates de méthyle, tertbutyle, allyle, benzyle ou p-nitrobenzyle.

5 La déprotection est effectuée par les moyens connus de l'homme du métier, notamment la saponification, l'hydrogénolyse, le clivage par des complexes solubles du Palladium 0, l'hydrolyse en milieu acide ou encore, pour les dérivés silylés, le traitement par le fluorure de  
10 tétrabutylammonium.

Des exemples sont fournis dans la partie expérimentale.

La réaction de sulfatation est effectuée par action des complexes  $\text{SO}_3$ -amines tels que  $\text{SO}_3$ -pyridine ou  $\text{SO}_3$ -  
15 diméthylformamide, en opérant dans la pyridine, le sel formé, par exemple le sel de pyridine, pouvant ensuite être échangé par exemple par un sel d'une autre amine, d'un ammonium quaternaire ou d'un métal alcalin. Des exemples sont fournis dans la partie expérimentale.

20 La réaction de phosphatation est effectuée par exemple par action d'un chlorophosphate tel que le diméthyl, dibenzyl ou diphényl chlorophosphate.

La réaction d'amidification est effectuée au départ de l'acide carboxylique à l'aide d'un agent d'activation  
25 tel qu'un chloroformiate d'alkyle ou l'EDCI, par action de l'ammoniaque ou d'une amine appropriée ou de leurs sels d'acides. Des exemples sont fournis ci-après dans la partie expérimentale.

Les réactions d'acylation et de sulfonation sont  
30 effectuées sur les hydroxyurées par action respectivement d'un halogénure ou anhydride d'acide carboxylique approprié ou d'un halogénure d'acide sulfonique

approprié. Plusieurs exemples sont fournis ci-après dans la partie expérimentale.

La réaction d'alkylation est effectuée par action sur les dérivés hydroxylés d'un halogénure d'alkyle ou  
5 d'alkyle substitué, notamment par un radical carboxy libre ou estérifié. Des illustrations sont fournies ci-après dans la partie expérimentale.

L'introduction finale éventuelle d'une double liaison, laquelle est alors située de préférence entre  
10 les atomes de carbone porteurs de  $R_4$  et  $R_1$ , est effectuée par action d'un dérivé halogéné du sélénium puis oxydation, selon des méthodes connues de l'homme du métier. Un exemple figure ci-après dans la partie expérimentale.

15 La formation d'un groupement urée, laquelle concerne le substituant  $R_8$  est effectuée de préférence par action d'un isocyanate approprié sur le NH libre. Un exemple figure ci-après dans la partie expérimentale.

L'introduction d'un groupement tétrazole est  
20 effectuée par action d'un dérivé halogéné, de préférence fluoré, du tétrazole protégé ou substitué. La déprotection peut être effectuée par hydrogénolyse.

La réduction d'acides en alcools peut être effectuée par action d'un borane ou via un anhydride mixte  
25 intermédiaire, par action d'un borohydrure alcalin. L'anhydride mixte est préparé par exemple à l'aide d'un chloroformiate d'alkyle. Une illustration en est fournie dans la partie expérimentale.

La déshydratation d'amide en nitrile peut intervenir  
30 dans les conditions des réactions de carbonylation et cyclisation.

L'oxydation des sulfures en sulfoxyde et/ou sulfone peut être effectuée par action d'un peracide tel que

l'acide métachloroperbenzoïque ou perphthalique ou de tout autre réactif connu de l'homme du métier.

La salification par les acides est le cas échéant réalisée par addition d'un acide en phase soluble au composé. La salification par les bases peut concerner soit les composés comportant une fonction acide, notamment carboxy, soit ceux comportant une fonction sulfooxy ou dérivée de l'acide phosphorique ou ceux comportant un hétérocycle à caractère acide. Dans le premier cas, on opère par addition d'une base appropriée telle que celles citées précédemment. Dans le second cas, on obtient directement le sel de pyridinium lors de l'action du complexe  $\text{SO}_3$ -pyridine et on obtient les autres sels à partir de ce sel de pyridinium. Dans l'un ou l'autre cas, on peut encore opérer par échange d'ions sur résine. Des exemples de salifications figurent ci-après dans la partie expérimentale.

La séparation des énantiomères et diastéréoisomères peut être réalisée selon les techniques connues de l'homme du métier, notamment la chromatographie.

Outre via les procédés décrits précédemment, des composés de formule (I) peuvent bien entendu être obtenus par des méthodes qui utilisent au départ un composé de formule (II) dans laquelle  $\text{R}'_1$ ,  $\text{A}'$ ,  $\text{R}'_2$ ,  $\text{R}_3$  et  $\text{HZ}$  ont les valeurs qui conduisent directement (sans transformation) à celles des composés que l'on souhaite préparer. Le cas échéant, celles de ces valeurs qui renfermeraient des fonctions réactives telles que mentionnées plus haut sont alors protégées, la déprotection intervenant à l'issue de l'étape de cyclisation b ou à tout autre moment opportun dans la synthèse. Les protections et déprotections sont alors réalisées comme décrit ci-dessus.



De telles méthodes sont fournies ci-après dans la partie expérimentale.


Les produits de formule générale (I) possèdent une très bonne activité antibiotique sur les bactéries gram(+) telles que les staphylocoques. Leur efficacité sur les bactéries gram (-) notamment sur les bactéries coliformes est particulièrement notable.

Ces propriétés rendent aptes lesdits produits ainsi que leurs sels d'acides et de bases pharmaceutiquement acceptables à être utilisés comme médicaments dans le traitement des affections à germes sensibles et notamment dans celui des staphylococcies, telles que septicémies à staphylocoques, staphylococcies malignes de la face ou cutanée, pyodermites, plaies septiques ou suppurantes, anthrax, phlegmons, érysipèles, staphylococcies aiguës primitives ou post grippales, broncho-pneumonies, suppurations pulmonaires.

Ces produits peuvent également être utilisés comme médicaments dans le traitement des colibacilloses et infections associées, dans les infections à proteus, à klebsiella et à salmonella et dans d'autres affections provoquées par des bactéries à gram (-).

La présente invention a donc également pour objet, à titre de médicaments et notamment de médicaments antibiotiques, les produits de formule (I) tels que définis ci-dessus ainsi que leurs sels avec les acides et les bases pharmaceutiquement acceptables.

L'invention a plus particulièrement pour objet, à titre de médicaments, les produits de formule (I) telle que décrite ci-dessus dans lesquels n est égal à 1 ainsi que ceux dans lesquels A représente un groupe



tel que défini plus haut, et notamment ceux dans lesquels R<sub>4</sub> est un atome d'hydrogène.

5 L'invention a tout particulièrement pour objet, à titre de médicaments, les produits de formule (I) dans lesquels X représente un groupement divalent -CO-B dans lequel B représente un groupement -NR<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> - tel que défini plus haut et plus particulièrement, parmi ceux-ci,  
10 ceux dans lesquels R<sub>8</sub> représente un groupement Y<sub>1</sub> ou OY<sub>1</sub>, dans lequel Y<sub>1</sub> est tel que défini plus haut.

Parmi les composés de formule (I), l'invention a tout particulièrement pour objet, à titre de médicaments, les composés dont les noms suivent:

15 le trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(phénylméthyl)-6-(sulfooxy)  
-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels  
20 de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(4-pyridinyl méthyl)-6-(sulfooxy)  
-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels  
de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(3-pyridinyl méthyl)-6-(sulfooxy)  
25 -1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels  
de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(2-amino 2-oxo éthyl)-6-(sulfooxy)  
-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels  
de bases, notamment de sodium,

30 le trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle.

L'invention a aussi pour objet les compositions pharmaceutiques renfermant comme principe actif, au moins

un des composés selon l'invention tels que définis ci-dessus.

Ces compositions peuvent être administrées par voie buccale, rectale, parentérale, notamment intramusculaire, ou par voie locale en application topique sur la peau et les muqueuses.

Les compositions selon l'invention peuvent être solides ou liquides et se présenter sous les formes pharmaceutiques couramment utilisées en médecine humaine comme par exemple, les comprimés simples ou dragéifiés, les gélules, les granulés, les suppositoires, les préparations injectables, les pommades, les crèmes, les gels; elles sont préparées selon les méthodes usuelles. Le ou les principes actifs peuvent y être incorporés à des excipients habituellement employés dans ces compositions pharmaceutiques, tels que le talc, la gomme arabique, le lactose, l'amidon, le stéarate de magnésium, le beurre de cacao, les véhicules aqueux ou non, les corps gras d'origine animale ou végétale, les dérivés paraffiniques, les glycols, les divers agents mouillants, dispersants ou émulsifiants, les conservateurs.

Ces compositions peuvent notamment se présenter sous forme d'une poudre destinée à être dissoute extemporanément dans un véhicule approprié, par exemple, de l'eau stérile apyrogène.

La dose administrée est variable selon l'affection traitée, le sujet en cause, la voie d'administration et le produit considéré. Elle peut être, par exemple, comprise entre 0,250 g et 10 g par jour, par voie orale chez l'homme, avec le produit décrit à l'exemple 1 ou encore comprise entre 0,25 g et 10 g par jour par voie intramusculaire ou intraveineuse.

Les produits de formule (I) peuvent également être utilisés comme désinfectants des instruments chirurgicaux.

L'invention a enfin pour objet, à titre de produits industriels nouveaux et notamment à titre de produits intermédiaires nécessaires à la préparation des produits de formule (I), les produits de formules (III) telle que définie précédemment ainsi que leurs sels avec les acides et notamment leurs chlorhydrates.

Les produits de formule (II) sont connus ou préparables selon des méthodes connues de l'homme du métier. Des références de littérature ainsi que des préparations sont fournies ci-après dans la partie expérimentale.

Les exemples suivants illustrent l'invention, sans toutefois en limiter la portée.

#### Exemples

Dans les exemples qui suivent les abréviations suivantes ont été utilisées:

DEAD: azo-dicarboxylate de diéthyle

TEA: triéthylamine

DMAP: 4-diméthylamino-pyridine

EDCI: 1-(3-diméthylamino-propyl)-3-éthylcarbo-  
diimide chlorhydrate

THF: tétrahydrofuranne

AIBN: 2,2'-azo-bis-isobutyronitrile

M: masse molaire moléculaire

SM: spectrometrie de masse

EI: impact électronique

SIMS: secondary ion mass spectrometry

FAB: fast atom bombardement

Exemple 1

cis-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-4-propanoate  
de diphénylméthyle

On mélange 3,16 g (10,6 mmoles) de chlorhydrate de  
5 l'acide 3-oxo-1-(phénylméthyl)-4-pipéridinepropanoïque (M  
= 297,7 g) (décrit dans la demande de brevet japonais  
J54098-772) avec 100 ml d'éthanol et on refroidit à 10°C.  
Sous un courant d'azote, on additionne en 15 mn 1,84 g de  
NaBH<sub>4</sub>, en maintenant la température entre 8 et 13°C. On  
10 laisse la température remonter jusqu'à la température  
ambiante et on laisse en contact pendant 1 heure 30. On  
rajoute encore 380 mg de NaBH<sub>4</sub> et on laisse réagir toute  
une nuit à température ambiante.

On évapore le solvant sous pression réduite, on  
15 reprend dans 50 ml d'eau et on ramène le pH de 10 à 2 au  
moyen d'acide chlorhydrique concentré. On évapore à  
nouveau sous pression réduite. Le résidu solide (environ  
10.8 g) est lavé deux fois avec 100 ml d'éthanol puis le  
solvant est évaporé sous pression réduite.

20 On obtient ainsi 3,10 g de chlorhydrate de l'acide  
3-hydroxy-1-(phénylméthyl)-4-pipéridinepropanoïque (M =  
299,7 g), ce qui correspond à un rendement de 97%.

On dilue les 3,10 g (10,3 mmoles) du composé obtenu  
précédemment, dans 100 ml d'éthanol puis on l'additionne  
25 sur 900 mg de Pd/C à 10% en poids préhydrogéné et dans 30  
ml d'éthanol.

On laisse sous atmosphère d'hydrogène à pression  
normale toute une nuit, puis on élimine le catalyseur par  
filtration et l'éthanol par évaporation sous pression  
30 réduite.

On obtient 1,90 g de chlorhydrate de l'acide trans-  
3-hydroxy-4-pipéridinepropanoïque (M = 209,6 g), soit un  
rendement de 88%.

On mélange 1,79 g (8,54 mmoles) du composé obtenu précédemment avec 20 ml d'éthanol et 20 ml d'eau.

On ajoute ensuite de la soude concentrée jusqu'à ce que le pH soit d'environ 8,5.

5        Puis, on ajoute 1 ml de chloroformiate d'allyle et de la soude concentrée de façon à maintenir le pH entre 8 et 9.

Le mélange réactionnel est extrait à l'acétate d'éthyle puis la phase aqueuse est acidifiée jusqu'à pH 2  
10 par ajout d'acide chlorhydrique concentré et reextraite par l'acétate d'éthyle. Après séchage et évaporation du solvant sous pression réduite, on obtient 1,69 g de produit brut que l'on reprend dans un mélange de dichlorométhane et d'éthanol, puis on filtre et on  
15 évapore à nouveau le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,40 g d'acide trans-3-hydroxy-1-[(2-propényloxy)carbonyl]-4-pipéridinepropanoïque (M = 257 g) , soit un rendement de 60%.

On dissout 3,24 g (12.6 mmoles) de l'hydroxy-acide  
20 ci-dessus et 6,4 g de triphénylphosphine dans 60 ml de THF à 0°C sous atmosphère d'azote. On additionne ensuite 2,5 ml de DEAD et après 15 mn on évapore sous pression réduite le mélange réactionnel pour obtenir 12 g de produit brut. On purifie par chromatographie sur silice  
25 en éluant progressivement par un mélange de dichloromethane et d'acétate d'éthyle 9/1, 8/2, 7/3 pour séparer les lactones cis et trans.

On obtient ainsi 2,72 g de lactone cis en mélange avec du DEAD réduit et de l'oxyde de phosphine.

30        Ce produit est remis en solution dans 10 ml de DME et on ajoute 8 ml d'une solution de NaOH 1N. Après 1h de contact, le mélange réactionnel est extrait deux fois par l'acétate d'éthyle, puis acidifié jusqu'à pH 2 par HCl

2N, et réextrait par l'acétate d'éthyle. Après séchage et évaporation du solvant sous pression réduite, on obtient 1,07 g d'hydroxy-acide.

1,0 g d'hydroxy-acide brut est dissout dans un mélange de 5 ml de dichlorométhane et 2 ml de méthanol, puis traité par un excès de diphényldiazométhane dans du dichlorométhane, jusqu'à disparition du produit de départ. Le solvant est évaporé sous pression réduite et le produit est purifié par chromatographie pour donner 1,39 g de cis-3-hydroxy-1-[(2-propényloxy)carbonyl]-4-pipéridinepropanoate de diphénylméthyle (M = 423 g), soit un rendement global de 26 %.

On dissout ensuite sous atmosphère d'azote 1,2 g (2,83 mmol) du produit obtenu précédemment dans 23 ml de dichlorométhane. On ajoute ensuite 390  $\mu$ l d'acide acétique puis 860  $\mu$ l de  $\text{Bu}_3\text{SnH}$  et 70 mg de  $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ .

On évapore le solvant sous pression réduite pour obtenir 3,82 g de produit brut que l'on lave à l'éther de pétrole. On obtient 1,27 g de produit que l'on filtre sur silice avec du dichlorométhane, puis avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol 95/5 puis 90/10. On obtient ainsi 0,87 g de cis-3-hydroxy-4-pipéridinepropanoate de diphénylméthyle (M = 339 g), soit un rendement de 77%.

On dissout 400 mg (1,00 mmol) du composé obtenu précédemment dans 25 ml de dichlorométhane, on ajoute 80  $\mu$ l de diphosgène ( $\text{Cl}_3\text{COCOCl}$ ), 336  $\mu$ l de TEA, 144 mg de DMAP.

On laisse réagir à la température ambiante pendant 5h30, puis on dilue dans du dichlorométhane. On lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec une solution de tampon de phosphate de sodium de pH 7, on sèche la phase organique sur sulfate de sodium, puis on

évapore le solvant sous pression réduite. On obtient ainsi 380 mg de produit brut.

On purifie par chromatographie sur silice, en éluant au mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5 à 0,1% d'eau.

On obtient 184 mg du composé du titre ( $M = 365,43$  g), soit un rendement de 50%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,60 à 1,88 (m):  $N\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}$ ; 2,48 (m):  $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CO}$ ; 2,78 (d) - 2,90 (m) - 3,33 à 3,47 (m):  $\text{CH}_2\text{-N-CH}_2$ ; 4,50 (d):  $\text{CHO-CH}_2$ ; 6,89 (s):  $\text{CO}_2\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$ ; 7,33 (m):  $(\text{C}_6\text{H}_5)_2$ .

IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1784, 1734, 1600, 1585, 1496  $\text{cm}^{-1}$

SM(électrospray positif) m/z:  $[M]^+ = 365$

#### Exemple 1bis

Acide cis-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-4-propanoïque

176 mg (0,482 mmoles) du produit obtenu précédemment sont dissous dans 10 ml d'acétone. On ajoute 90 mg de Pd/C à 10% en poids.

On laisse réagir sous atmosphère d'hydrogène à pression normale pendant 3 heures. On rajoute encore 25 mg de catalyseur et on laisse la réaction se poursuivre pendant 1h15.

On filtre le catalyseur puis on évapore le solvant sous pression réduite pour obtenir 146 mg de produit.

On remet en réaction dans 10 ml d'acétone avec 35 mg de Pd/C à 10% en poids sous atmosphère d'hydrogène et on laisse la réaction se compléter pendant 1 heure.

Le catalyseur est ensuite séparé par filtration et le filtrat est évaporé sous pression réduite. On obtient 137 mg de produit brut que l'on cristallise dans un



mélange d'éther éthylique et d'éther de pétrole. On obtient ainsi 75 mg du produit recherché (M = 199 g), soit un rendement de 78%.

Spectre RMN du proton

- 5 Dans le CDCl<sub>3</sub>, à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:  
1,30 à 1,63 (m) et 1,88 (m): NCH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CH; 2,25 (t): CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CO; 3,06 (m) et 3,38 (m): CH<sub>2</sub>-N-CH<sub>2</sub>; 4,65 (d): C-CHO-CH<sub>2</sub>; 12,08 (s): H mobile.
- 10 IR (Nujol): 1785, 1717 cm<sup>-1</sup>  
SM (FAB) m/z: [M+H]<sup>+</sup> = 200; 159

Exemple 2

trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1] octan-4-acétate de diphénylméthyle

- 15 On mélange sous atmosphère inerte 94 mg (0,259 mmoles) du composé chlorhydrate de trans-3-hydroxy-4-pipéridine-acétate de diphénylméthyle (M = 361,87 g) (décrit dans Eur. J. Med. Chem - Chim. Ther - 1982 - 17(6)531-5) et 7 ml de dichlorométhane.
- 20 On refroidit au moyen d'un bain de glace et on injecte 19 µl de diphosgène. On agite pendant 25 minutes, puis on injecte 72 µl de TEA. On agite à température ambiante pendant 30 minutes et on évapore le solvant sous pression réduite.
- 25 On reprend ensuite par 7 ml de toluène.  
On additionne 36 µl de TEA puis 31 mg de DMAP.  
On chauffe pendant 15 minutes à 100°C, puis on laisse revenir à la température ambiante. On lave ensuite avec 2 fois 4 ml d'acide tartrique à 10% dans l'eau, puis
- 30 avec 4 ml d'eau saturée en chlorure de sodium.  
On sèche sur sulfate de magnésium, on filtre et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient 78 mg d'huile que l'on chromatographie sur silice, avec comme éluant un mélange 95/5 de dichlorométhane et d'acétate d'éthyle.

On obtient ainsi 35,7 mg du composé attendu (M = 351,405 g), sous forme de cristaux blancs, soit un rendement de 39 %.

Exemple 2bis

Acide trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octan-4-acétique

On mélange sous atmosphère inerte 38,7 mg (0,110 mmoles) du produit obtenu à l'exemple 2 ainsi que 2 ml d'acétone et 38 mg de catalyseur Pd/C à 10% en poids.

On place sous atmosphère d'hydrogène à pression normale.

On laisse réagir pendant 45 minutes, puis on élimine par filtration le catalyseur et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 32,6 mg de produit brut.

On recristallise dans de l'éther éthylique pour obtenir 14,2 mg de cristaux blancs du composé attendu ( $C_8H_{10}NO_4$  - M=185,181 g), soit un rendement de 69 %.

Exemple 3

cis-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo [3.2.1] octan-4-acétate de diphénylméthyle

On mélange 1,5 g (5,78 mmoles) d'acide trans-1-[(1,1-diméthyléthoxy)carbonyl]-3-hydroxy-4-pipéridineacétique (décrit dans Eur. J. Med. Chem - Chim. Ther - 1982 - 17(6)531-5), 7 ml de dichlorométhane, 3,03 g de triphénylphosphine et 22 ml de tétrahydrofuranne.

On additionne une solution de 0,91 ml de DEAD dans 2,5 ml de tétrahydrofuranne. On laisse réagir pendant 3

heures 20, puis on additionne 8,7 ml de soude 1N et on agite pendant 1 heure 15.

On extrait le mélange réactionnel deux fois par de l'acétate d'éthyle, puis on ramène à pH 2 avec de l'acide chlorhydrique 2N. On extrait ensuite trois fois à l'acétate d'éthyle.

On réunit les phases organiques et on lave à l'eau saturée en chlorure de sodium, puis on sèche sur du sulfate de magnésium, on filtre et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,37 g de cristaux blancs de (3a.alpha.,7a.alpha.)-hexahydro-2-oxo-furo[2,3-c]pyridine-6(2H)-carboxylate de 1,1-diméthyléthyle ( $C_{12}H_{21}NO_5$ -M=259,304 g), soit un rendement de 91 %.

On mélange sous atmosphère inerte 1,37 g (5,28 mmoles) du composé obtenu précédemment et 32 ml de dichlorométhane.

On introduit un excès d'une solution de diphényldiazométhane dans le dichlorométhane, jusqu'à disparition du produit de départ.

On évapore ensuite le solvant sous pression réduite et on obtient ainsi 2,81 g de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en utilisant comme éluant du dichlorométhane, puis un mélange 95/5 de dichlorométhane/acétate d'éthyle.

On obtient 2,00 g de cristaux blancs de cis-1-[(1,1-diméthyléthoxy)carbonyl]-3-hydroxy-4-pipéridineacétate de diphénylméthyle, (M = 425,528 g), soit un rendement de 89%.

On introduit 0,6 g (1,41 mmoles) du composé obtenu précédemment et 1,93 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène dans le méthanol à 7,3 mol/l,

On agite à température ambiante et après 15 minutes, on ajoute 1 ml de dichlorométhane.

Après encore 15 minutes, on évapore le milieu réactionnel sous pression réduite.

5 On rajoute encore du dichlorométhane puis, on évapore à nouveau. On renouvelle cette opération plusieurs fois.

On cristallise ensuite le produit dans l'éther éthylique.

10 On obtient ainsi 0,44 g de chlorhydrate de cis-3-hydroxy-4-pipéridineacétate de diphenylméthyle de formule brute,  $C_{20}H_{23}NO_3, HCl$  ( $M = 361,871$  g), soit un rendement de 86%.

Cette réaction conduit également à la formation de 15 quantités variables de lactone chlorhydrate de (3a.alpha., 7a.alpha.)-hexahydro-furo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one, ( $M=177,6$ g).

On mélange sous atmosphère inerte 0,28 g (0,77 20 mmoles) du composé  $C_{20}H_{23}NO_3, HCl$  obtenu précédemment et 19 ml de dichlorométhane.

On additionne à 0°C 60µl de diphosgène et on agite. Après 25 minutes on introduit 0,32 ml de TEA. On ajoute ensuite 94 mg de DMAP et laisse revenir à la température ambiante.

25 On agite pendant 4 heures 15 minutes, puis on lave successivement avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10% puis à l'eau saturée de chlorure de sodium.

On sèche ensuite sur sulfate de magnésium, on filtre 30 et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 0,265 g du composé attendu, de formule brute  $C_{21}H_{21}NO_4$  ( $M = 351,405$  g) soit un rendement de 98%.

Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics

en ppm et multiplicité:

- 5 1,82 (m):  $\text{NCH}_2\text{-CH}_2$ ; 2,30 à 2,70 (m):  $\text{CO-CH}_2\text{-CH}$ ; 2,93 (d) - 2,99 (dt) et 3,45 (m):  $\text{CH}_2\text{-N-CH}_2$ ; 4,60 (d):  $\text{CH-CHO-CH}_2$ ; 6,87 (s):  $\text{CO}_2\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$ ; 7,10 à 7,35 (m):  $(\text{C}_6\text{H}_5)_2$ .

IR ( $\text{CHCl}_3$ ) = 1786, 1734; 1600, 1587, 1496  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (SIMS)m/z:  $[\text{M}+\text{Na}]^+ = 374^+$ .

10 Exemple 3bis

Acide cis-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octan-4-acétique

On mélange 55 mg (0,156 mmoles) du produit obtenu à l'exemple 3, 3 ml d'acétate d'éthyle et 55 mg de catalyseur Pd/C à 10% en poids.

- 15 On place sous atmosphère d'hydrogène à pression normale.

On laisse réagir pendant 1 heure 30, puis on filtre ensuite le catalyseur et on évapore le solvant sous pression réduite.

- 20 On obtient ainsi 38 mg de produit brut que l'on cristallise dans un mélange de pentane et d'éther éthylique.

- On recueille de cette manière 16 mg de cristaux blancs du composé attendu ( $M = 185,181$  g), soit un rendement de 55%.

25 Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics

en ppm et multiplicité:

- 30 1,63 à 1,86 (m) et 1,91 (m):  $\text{NCH}_2\text{-CH}_2$ ; 2,27 à 2,49 (m) et 2,54 (dd):  $\text{CO-CH}_2\text{-CH}$ ; 2,98 (d) et 3,54 (d):  $\text{CH}_2\text{-N-CH}_2\text{-CH}_2$ ; 3,04 (dt) et 3,41 (dd):  $\text{CH}_2\text{-N-CH}_2\text{-CH}_2$ ; 4,71 (d):  $\text{CH-CHO-CH}_2$ .

IR (Nujol): 1784, 1734, 1686  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (SIMS) m/z:  $[\text{M}+\text{H}]^+ = 186^+, 167^+$ .

Exemple 3ter

5 cis-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octan-4-acétate de méthyle

On dissout ensuite 78 mg (0,421 mmoles) du composé obtenu à l'exemple 3bis dans 1 ml de dichlorométhane.

10 On additionne goutte à goutte un excès de diazométhane jusqu'à ce qu'une coloration jaune subsiste, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 80 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant au mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5.

15 On obtient ainsi 8,2 mg du composé attendu ( $M = 199,208 \text{ g}$ ) soit un rendement de 10%.

Exemple 4

cis-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octan-4-acétonitrile

20 On dissout 67 mg (0,38 mmoles) du chlorhydrate de (3a.alpha.,7a.alpha.)-hexahydro-furo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one, ( $M=177,6\text{g}$ ) préparé à l'exemple 3 dans 1 ml d'une solution d'ammoniac à 4,17 mol/l dans le méthanol.

25 On agite pendant 5 heures, on évapore le solvant sous pression réduite, puis on ajoute à nouveau 1 ml de la solution d'ammoniac dans le méthanol et on laisse la réaction se poursuivre pendant 18 heures.

On évapore le solvant sous pression réduite et obtient ainsi 79 mg de cis-3-hydroxy-4-pipéridineacétamide de formule brute  $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$  ( $M = 158 \text{ g}$ ).

30 On mélange sous atmosphère inerte 75 mg du composé obtenu ci-dessus en solution dans 9 ml de dichlorométhane.

On refroidit par un bain de glace et on introduit 30  $\mu$ l de diphosgène.

On maintient à 0-5°C pendant 40 minutes, puis on introduit 0,16 ml de TEA et 5 minutes après, 46 mg de  
5 DMAP.

On agite pendant 4 heures à la température ambiante.

On lave deux fois avec 2 ml d'acide tartrique à 10 % dans l'eau, puis par 2 ml d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

10 On sèche sur MgSO<sub>4</sub>, on filtre, on évapore le solvant sous pression réduite. On obtient ainsi 35 mg de produit brut que l'on reprend dans un mélange 30/70 d'acétate d'éthyle et de dichlorométhane. On filtre les impuretés et on évapore le filtrat sous pression réduite.

15 On obtient ainsi 23 mg du composé attendu (M = 166,18 g) sous forme d'huile, soit un rendement d'environ 26%.

IR (Nujol): 2241, 1777  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z: [M]<sup>+</sup> = 166, 137, 82, 55, 42.

20 Exemple 5

3-benzoyl-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-one

On mélange sous atmosphère inerte, 1,01 g (5,43 mmoles) de 3-amino-1-pyrrolidinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle

25 (M = 186,25 g) (décrit dans la demande de brevet WO 9801426) et 10 ml de dichlorométhane, on refroidit la solution à 0°C, puis on ajoute goutte à goutte 0,76 ml de TEA.

30 On agite pendant 15 minutes en maintenant la température à 0°C, puis on ajoute 0,63 ml de chlorure de benzoyle.

On laisse revenir à la température ambiante, puis on dilue en ajoutant 10 ml de dichlorométhane.

On lave ensuite avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec 10 ml d'eau. On sèche sur sulfate de magnésium, on filtre et on élimine le dichlorométhane par évaporation sous pression réduite.

5 On obtient ainsi 1,30 g de 3-(benzoylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle (M = 292,36 g) sous la forme d'une huile jaune. Le rendement correspondant est de 82%.

On mélange 1,30 g (4,46 mmoles) de ce composé avec  
10 10 ml de méthanol.

On refroidit la solution à 0°C, puis on introduit progressivement 6,12 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène à 7,3 moles/l dans le méthanol.

On évapore ensuite le solvant sous pression réduite.

15 On obtient ainsi 1,01 g de chlorhydrate de N-(3-pyrrolidinyl)-benzamide (M = 226,707 g) se présentant sous forme d'huile marron, soit un rendement proche de 100%.

On mélange sous atmosphère inerte 1,01 g (4,46  
20 mmoles) du composé obtenu précédemment, ainsi que 10 ml de dichlorométhane.

On refroidit à 0°C, puis on ajoute goutte à goutte, 1,36 ml de TEA.

On agite pendant 15 minutes, puis on ajoute goutte à  
25 goutte 1,44 ml de diphosgène.

On maintient à 0°C pendant 30 minutes, puis on laisse revenir à température ambiante.

On dilue ensuite avec du dichlorométhane, on lave avec un solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis à  
30 l'eau.

On sèche sur sulfate de magnésium, on filtre et on concentre par évaporation du solvant sous pression réduite pour obtenir 0,615 g de produit brut.



On purifie par chromatographie sur silice en éluant au mélange 90/10 de dichlorométhane/acétone.

On récupère ainsi 0,320 g de chlorure de l'acide 3-(benzoylamino)-1-pyrrolidinecarboxylique qui cristallise.

5 Le rendement correspondant est de 28%.

On dissout ensuite sous atmosphère inerte 0,585 g (2,31 mmoles) du composé précédent dans 18 ml de tétrahydrofuranne.

10 On refroidit la solution à  $-78^{\circ}\text{C}$ , puis on ajoute goutte à goutte, 2,55 ml d'une solution de bis(triméthylsilyl) amidure de lithium 1 M dans le tétrahydrofuranne.

On obtient une solution jaune que l'on maintient à  $-78^{\circ}\text{C}$  pendant 20 minutes, puis on continue à agiter pendant 1 heure en laissant remonter la température. On  
15 ajoute à  $0^{\circ}\text{C}$  350  $\mu\text{l}$  d'acide acétique, puis 5 ml d'acide tartrique en solution à 10% dans l'eau. On dilue dans de l'acétate d'éthyle puis on lave avec une solution d'acide tartrique à 10% puis avec une solution de tampon phosphate à  $\text{pH} = 7$ , puis à l'eau.

20 On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, on filtre et on concentre par évaporation du solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 0,315 g de produit brut, sous la forme d'un solide jaune.

25 On purifie ce produit brut, par chromatographie sur silice en éluant au mélange 90/10 de dichlorométhane et d'acétate d'éthyle.

On recueille ainsi 0,140 g du composé attendu  $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2$ , ( $M = 216,24$  g), sous la forme d'un solide  
30 blanc, soit un rendement de 28%.

IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1801, 1775, 1675; 1620, 1603, 1582  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (électrospray positif)  $m/z$ :  $[\text{M}]^+ = 216, 105, 77$ .

Exemple 6

Sel de potassium de l'acide trans-6-[(phénylméthoxy) carbonyl]-2-oxo-1,3-diazabicyclo[2.2.1] heptan-3-acétique

On mélange 1 g (3,12 mmoles -  $M = 186,25$  g) de trans-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) (décrit dans J. Org. Chem. 1991, 56, 3009-3016), 10 ml de tétrahydrofuranne, 560  $\mu$ l de bromoacétate d'allyle et 660  $\mu$ l de TEA.

On laisse réagir sous agitation à température ambiante pendant 14 heures, puis pendant 3 heures à 50°C.

On dilue ensuite à l'acétate d'éthyle et on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

On sèche la phase organique sur sulfate de magnésium, on filtre puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,21 g de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant au mélange 80/20 de dichlorométhane et d'acétate d'éthyle.

On recueille ainsi que 0,99 mg de trans-4-[[[(2-propényloxy) carbonyl]méthyl]amino]-1,2-pyrrolidine dicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) de formule brute  $C_{12}H_{30}N_2O_6$  ( $M = 418$  g).

A 0,99 g (2,36 mmoles) du composé obtenu précédemment, on ajoute sous atmosphère d'azote et à 0 °C, 6 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène 4 M dans l'acétate d'éthyle. On laisse ensuite réagir à température ambiante pendant 15 minutes.

On évapore le solvant sous pression réduite. On obtient un produit brut que l'on cristallise dans l'éther éthylique pour obtenir 0,95 g de dichlorhydrate de trans-4-[[[(2-propényloxy) carbonyl]méthyl]amino]-2-

pyrrolidinecarboxylate de phénylméthyle, de formule brute  $C_{17}H_{23}N_2O_4$ ,  $2HCl$  ( $M = 394$  g).

On dissout 0,5 g de ce produit dans 20 ml de dichlorométhane et on ajoute 1,3 ml de soude 2N et 3ml  
5 d'eau. On laisse décanter, on extrait au dichlorométhane, on sèche sur sulfate de magnésium, puis on filtre et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 339 mg de diamine libre. Le rendement correspondant est de 83%.

10 On dissout 100 mg (0,314 mmoles) de la diamine obtenue précédemment dans 5 ml d'acétonitrile à 0°C et sous atmosphère d'azote.

21  $\mu$ l de diphosgène sont ajoutés. Après 15 minutes de contact, cette solution est additionnée, sous  
15 atmosphère d'azote et en 4 heures, sur un mélange contenant 38 mg de DMAP, 88  $\mu$ l de TEA dans 10 ml d'acétonitrile chauffé à 70°C.

Après la fin de l'addition, le mélange réactionnel est encore chauffé pendant une heure, puis refroidi,  
20 dilué par de l'acétate d'éthyle et lavé successivement par une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, ensuite par une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de sodium, filtration et évaporation des solvants sous pression réduite, on  
25 obtient 58 mg de produit brut. Ce produit est purifié par chromatographie sur silice en éluant par un mélange dichlorométhane / acétate d'éthyle 8/2 pour donner 19 mg de  
trans-6-[(phénylméthoxy)carbonyl]-2-oxo-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptan-3-acétate de 2-propényle de  
30 formule brute  $C_{18}H_{20}N_2O_5$  ( $M = 344,57$  g), soit un rendement de 17 %.

On dissout ensuite 24 mg (0,069 mmoles) du composé précédent dans 250  $\mu$ l de dichlorométhane. On introduit 3

mg de Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub> sous atmosphère d'azote, puis on ajoute  
150 µl d'une solution d'éthyle-2-hexanoate de potassium  
0,5 M dans l'acétate d'éthyle. Après quelques minutes, il  
se forme un précipité que l'on centrifuge et lave deux  
5 fois avec 500 µl d'acétate d'éthyle.

On obtient 24 mg du composé attendu C<sub>15</sub>H<sub>15</sub>KN<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (M =  
342 g), soit un rendement quantitatif.

#### Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 300 MHz, déplacements chimiques des  
10 pics

en ppm et multiplicité:

1,83 (ddd) et 2,56: N-CH<sub>2</sub>-CHN-CH<sub>2</sub>; 2,50 et 2,79 (d):  
N-CH<sub>2</sub>-CHN-CH<sub>2</sub>; 3,23 (d) et 3,41 (d): =C-N-CH<sub>2</sub>-C=O; 3,62  
(ddd): O=C-CHN-CH<sub>2</sub>; 4,13 (s): N-CH<sub>2</sub>-CHN-CH<sub>2</sub>; 5,16 (s):  
15 =C-O-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>; 7,38 (m): C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH<sub>2</sub>.

SM (électrospray positif) m/z: [2MK + H]<sup>+</sup> = 723, [2MK +  
Na]<sup>+</sup> = 707, [MK + K]<sup>+</sup> = 381, [MK + Na]<sup>+</sup> = 365; [MK + H]<sup>+</sup> =  
343.

#### Exemple 7

20 trans-3-benzoyl-2-oxo-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane-6-  
carboxylate de méthyle

On mélange sous atmosphère d'azote 0,471 g (1,93  
mmole) de trans-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de  
1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-méthyle (décrit dans J.  
25 Org. Chem. 1991, 56, 3009-3016) et 3,5 ml de  
dichlorométhane sec pour le dissoudre.

On refroidit la solution à 0°C, puis on ajoute  
goutte à goutte 269 µl de TEA.

On agite pendant 15 minutes en maintenant à 0°C,  
30 puis on ajoute goutte à goutte, 224 µl de chlorure de  
benzoyle.

On laisse ensuite la température revenir à 20°C en  
une heure.

On dilue avec 30 ml de dichlorométhane, puis on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis une solution saturée de bicarbonate de sodium, puis avec de l'eau.

5 On sèche sur du sulfate de magnésium, on filtre, on concentre par évaporation du dichlorométhane sous pression réduite.

On obtient ainsi 0,6 g d'une huile jaune que l'on purifie par chromatographie sur silice en utilisant comme 10 éluant un mélange dichlorométhane/méthanol 99/1.

On récupère ainsi 0,499 g de trans-4-(benzoylamino)-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-méthyle, de formule brute  $C_{18}H_{24}N_2O_5$  ( $M = 348$  g) soit un rendement de 74%.

15 On mélange sous atmosphère d'azote 0,400 g (1,15 mmole) du composé obtenu précédemment avec 3 ml d'acétate d'éthyle pour dissoudre le composé, puis on refroidit la solution à 0°C, on ajoute 2,89 ml d'une solution de 4 mole/l de HCl dans l'acétate d'éthyle.

20 Au bout de 15 minutes, on continue à agiter à température ambiante pendant 1 heure.

On élimine ensuite le solvant par évaporation sous pression réduite.

25 On obtient ainsi 0,350 g de chlorhydrate de trans-4-(benzoylamino)-2-pyrrolidinecarboxylate de méthyle de formule brute  $C_{13}H_{15}N_2O_3 \cdot HCl$  ( $M = 284,744$  g) sous la forme d'un solide beige.

30 On mélange 0,327 g (1,15 mmole) du composé obtenu précédemment, placé sous atmosphère d'azote, avec 4 ml de dichlorométhane.

On refroidit alors la suspension à 0°C, puis on ajoute 352  $\mu$ l de TEA. On agite pendant 15 minutes à 0°C, puis on ajoute 138  $\mu$ l de diphosgène. On continue à agiter

012347

37

pendant 5 minutes à 0°C, puis on laisse le mélange réactionnel revenir à la température ambiante. On laisse encore réagir pendant 30 minutes.

5 On dilue ensuite par du dichlorométhane et on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec de l'eau et on sèche sur du sulfate de magnésium.

10 On filtre et on élimine le solvant par évaporation sous pression réduite. On obtient ainsi 0,360 g de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant au mélange dichlorométhane/acétone 95/5.

On recueille ainsi 93,7 mg de chlorhydrate de trans-4-(benzoylamino)-1-(chlorocarbonyl)-2-pyrrolidinecarboxylate de méthyle ( $C_{14}H_{14}N_2O_4$ , HCl (M = 310,74 g), soit un rendement de 26 %.

15 On mélange 93,7 mg (0,301 mmole) du composé obtenu précédemment, sous atmosphère d'azote, avec 3 ml de tétrahydrofuranne. On abaisse la température de la solution à -78°C, puis on ajoute goutte à goutte 332  $\mu$ l de bis(triméthylsilyl)amidure de lithium en solution 1M dans le tétrahydrofuranne et on maintient le milieu réactionnel à -78°C pendant encore 5 minutes.

20 On agite pendant 30 minutes à la température ambiante.

0  
25 Ensuite on refroidit la solution à 0°C, et on ajoute 55  $\mu$ l d'acide acétique. On ajoute 20 ml d'acétate d'éthyle et 3 ml d'un tampon phosphate à pH = 7,0. On laisse décanter, lave à l'eau, on sèche sur sulfate de magnésium, on filtre, on concentre par évaporation. On obtient ainsi 76 mg d'une mousse que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant au mélange  
30 dichlorométhane/acétone 97/3.

On récupère 5 mg du composé attendu pur, de formule brute ( $C_{14}H_{14}N_2O_4$ , HCl ( $M = 274,279$  g), soit un rendement de 6%.

IR ( $CHCl_3$ ): 1805, 1779, 1743, 1669; 1603, 1589, 1486  $cm^{-1}$ .

5 SM (EI) m/z:  $[M]^+ = 274, 215, 169, 105, 77$ .

Exemple 7bis

trans-3-benzoyl-2-oxo-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane-6-carboxylate de phénylméthyle

10 On procède de façon similaire à ce qui est indiqué dans l'exemple 7, en partant de 0,92 g de trans-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-phénylméthyle (décrit dans J. Org. Chem. 1991, 56, 3009-3016) pour obtenir le composé attendu avec un  
15 rendement global de 5,4 % sur 4 étapes.

Exemple 8

trans-2-oxo-3-(phénylsulfonyl)-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane-6-carboxylate de phénylméthyle

On mélange sous atmosphère d'azote 2,97 g (9,26  
20 mmoles) de trans-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) (décrit dans J. Org. Chem. 1991, 56, 3009-3016) de formule brute  $C_{17}H_{24}N_2O_4$  ( $M = 320,392$  g) et ajoute 25 ml de dichlorométhane. On refroidit à 5°C et on ajoute 1,3 ml  
25 de TEA. On agite pendant 10 minutes et puis on ajoute 1,63 g de chlorure de benzènesulfonyle.

On laisse sous agitation à 5°C pendant 15 minutes, puis on laisse la température du milieu réactionnel remonter à 20°C sur une durée de 45 minutes.

30 On dilue au moyen de dichlorométhane, on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec du tampon phosphate à pH = 7,0, ensuite avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. On sèche sur

sulfate de magnésium et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 4,5 g de produit brut que l'on chromatographie sur silice en éluant au mélange 90/10 de dichlorométhane et d'acétate d'éthyle.

On récupère ainsi 4,06 g de trans-4-[(phénylesulfonyl)amino]-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) de formule brute  $C_{23}H_{28}N_2O_6S$  ( $M = 460,552$  g), ce qui correspond à un rendement de 95%.

On mélange 3,83 g (8,31 mmoles) du sulfonamide obtenu précédemment avec 10 ml de méthanol anhydre.

On refroidit la solution à 0°C et on ajoute à cette température 8,2 ml d'une solution de 10 mol/l d'acide chlorhydrique dans le méthanol.

On laisse agiter à 0°C pendant 5 mn, puis on laisse la température remonter jusqu'à la température ambiante.

Après 30 minutes, on évapore le méthanol sous pression réduite, on reprend plusieurs fois au méthanol puis au dichlorométhane. On cristallise ensuite le chlorhydrate dans l'éther éthylique.

On obtient ainsi 3,2 g de chlorhydrate de trans-4-[(phénylesulfonyl)amino]-2-pyrrolidinecarboxylate de phénylméthyle, de formule brute  $C_{18}H_{20}N_2O_4S$ , HCl ( $M = 396,896$  g), ce qui correspond à un rendement de 96 %.

On mélange 2,78 g (7 mmoles) du chlorhydrate obtenu précédemment sous atmosphère inerte avec 28 ml de dichlorométhane.

On refroidit ensuite vers 0-5°C, puis on ajoute 2,15 ml de TEA.

On continue à agiter pendant 15 minutes à une température comprise entre 0 et 5°C, puis on ajoute 0,46 ml de diphosgène.



On maintient à cette température pendant 4 minutes, puis on additionne une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, on dilue à l'aide de dichlorométhane, on décante, on lave avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium, on sèche sur du sulfate de magnésium, et on concentre sous pression réduite.

On obtient ainsi 3,1 g d'une huile jaune que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 9/1.

On recueille 1,82 g de trans-1-(chlorocarbonyl)-4-[(phénylsulfonyl)amino] - 2 - pyrrolidinecarboxylate de phénylméthyle, de formule brute  $C_{19}H_{19}ClN_2O_5S$  (M = 422,89 g), ce qui correspond à un rendement de 61%.

On mélange 1,81 g (4,28 mmoles) du chlorure de carbamoyle obtenu précédemment sous atmosphère inerte avec 31 ml de tétrahydrofuranne.

La solution obtenue est refroidie à  $-70^{\circ}C$ , puis on ajoute à cette température en 10 minutes, 4,7 ml d'une solution 1M de bis(triméthylsilyl)amidure de lithium dans du tétrahydrofuranne.

On agite pendant 45 minutes à  $-70^{\circ}C$ , puis on laisse remonter la température vers  $0^{\circ}C$ . On maintient le milieu réactionnel à cette température pendant 2 heures 30.

On ajoute ensuite 295  $\mu$ l d'acide acétique.

On dilue avec du dichlorométhane, puis on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, avec un solution de tampon phosphate à pH = 7 et avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

On sèche sur sulfate de magnésium, et concentre à sec sous pression réduite.

On purifie le produit brut par chromatographie sur silice, en prenant comme éluant un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5.

On obtient ainsi 244 mg du composé attendu de formule brute  $C_{19}H_{18}N_2O_5S$  ( $M = 386,429$  g), ce qui correspond à un rendement de 14%.

Spectre RMN du proton

5 Dans le  $CDCl_3$ , à 400 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

2,15 (m):  $O=C-CH-CH_2$ ; 2,85 (d) et 3,08 (d):  $O=C-N-CH_2$ ;  
3,62 (m):  $O=C-CH-N-CH_2$ ; 4,94 (s):  $O_2S-N-CH-CH_2$ ; 5,16:  
 $CO_2CH_2C_6H_5$ ; 7,34 (m):  $C_6H_5$ ; 7,57 (m) - 7,68 (m) et 8,03 (m):

10  $SO_2C_6H_5$ .

IR ( $CHCl_3$ ): 1780, 1743; 1586, 1499  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif) m/z:  $[2M+Na]^+ = 795$ ;  
 $[M+Na+CH_3CN]^+ = 450$ ;  $[M+Na]^+ = 409$ ;  $[M+H]^+ = 387$ .

15 Exemple 9

trans-3-benzoyl-4-méthyl-2-oxo-1,3-diazabicyclo[2.2.1]  
heptane - 6 - carboxylate de phénylméthyle

On mélange sous atmosphère inerte 18,69 g (58,52 mmoles)

20 de 4-oxo-1,2 pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyl-éthyle) et de 2 - (phénylméthyle) (décrit dans Chem. Pharm. Bull. 43(8)1302-1306 (1995)) de formule brute  $C_{17}H_{21}NO_5$  ( $M = 319,361$  g) et 500 ml d'éther éthylique anhydre.

25 On ajoute à la solution obtenue à une suspension de 10g de  $CeCl_3$  dans 50 ml d'éther éthylique anhydre.

On agite la suspension pendant 30 minutes à  $20^\circ C$ , puis on refroidit à  $-60^\circ C$ .

30 On ajoute ensuite 20 ml de solution 3 M de  $MeMgBr$  dans l'éther éthylique.

On laisse réagir pendant 1 heure à  $-60^\circ C$ , puis on laisse la température remonter à  $0^\circ C$  en 30 minutes. On neutralise avec une solution aqueuse de  $NH_4Cl$  à 10%. On

extrait avec du dichlorométhane, filtre, lave à l'eau la phase organique, sèche sur sulfate de magnésium, et concentre à sec sous pression réduite.

On obtient ainsi 19,33 g d'une huile que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant au mélange dichlorométhane/tbutylméthyl-éther 90/10.

On obtient 7,21 g de cis-4-hydroxy-4-méthyl-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle), de formule brute  $C_{18}H_{25}NO_5$  ( $M = 335,404$  g) soit un rendement de 36%, ainsi que 2,5 g de l'alcool épimère.

On mélange sous atmosphère inerte 3,17 g (9,45 mmoles) du composé obtenu précédemment et 70 ml de dichlorométhane. On refroidit à 5°C et on ajoute goutte à goutte 2,3 ml de TEA, puis 1,28 ml de chlorure de méthane sulfonyle.

On agite pendant 45 mn à 5°C.

On lave à l'aide d'une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec une solution de tampon phosphate à pH 7, puis à l'eau.

On sèche la phase organique sur sulfate de magnésium et concentre à sec sous pression réduite.

On obtient ainsi 3,9g d'une huile que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On recueille 2,75 g de cis-4-méthyl-4-[(méthylsulfonyl) oxy]-1,2-pyrrolidine dicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) de formule brute  $C_{19}H_{27}NO_7S$  ( $M = 413,494$  g) ce qui correspond à un rendement de 70%.

On prépare une solution de 2,54 g (6,14 mmoles) du mésylate obtenu précédemment dans 40 ml de diméthylformamide.

On ajoute ensuite à 20°C, 519 mg (7,98 mmoles) de NaN<sub>3</sub>, on chauffe à 50°C pendant 2 heures. Après refroidissement, on verse dans 250 ml d'eau et on extrait par 250 ml de dichlorométhane. La phase organique est lavée à l'eau. On sèche sur du sulfate de magnésium et évapore à sec sous pression réduite.

On obtient 2,4 g de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, avec comme éluant un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5.

On recueille ainsi 1,66 g de trans-4-azido-4-méthyl-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) de formule brute C<sub>18</sub>H<sub>24</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub> (M = 360,42 g), (titrant environ 30% en poids) ce qui correspond à un rendement d'environ 25%.

On dissout 1,85 g de l'azide obtenu précédemment (soit environ 1,7 mmole) dans 18 ml de toluène.

On ajoute ensuite, à 20°C, 1,38 ml de Bu<sub>3</sub>SnH et 84 mg d'AIBN.

On porte à 75°C et on maintient à cette température pendant 2 heures.

On évapore le toluène et redissout dans l'acétate d'éthyle. On ajoute une solution aqueuse saturée de fluorure de potassium et on agite pendant 30 minutes à température ambiante.

On filtre sur clarcel, on laisse décanter et on sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium.

Après évaporation du solvant sous pression réduite, on obtient 3 g d'une huile que l'on chromatographie sur silice, en éluant au mélange dichlorométhane/méthanol 9/1.

On recueille 560 mg de trans-4-amino-4-méthyl-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de

2-(phénylméthyle) de formule brute  $C_{18}H_{26}N_2O_4$  ( $M = 334,419$  g). Le rendement est donc quantitatif.

On mélange sous atmosphère inerte 578 mg (1,72 mmoles) de l'amine obtenue précédemment dans 30 ml de  
5 dichlorométhane.

On refroidit à  $5^{\circ}C$  et on ajoute goutte à goutte 290  $\mu$ l de TEA, puis 240  $\mu$ l de chlorure de benzoyle.

On continue l'agitation à  $5^{\circ}C$  pendant 30 minutes.

On dilue avec du dichlorométhane, lave avec une  
10 solution aqueuse à 10% d'acide tartrique, avec une solution aqueuse saturée de carbonate de sodium, puis à l'eau, on sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, et évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 950 mg d'une huile que l'on purifie  
15 par chromatographie en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On recueille ainsi 732 mg de trans-4-(benzoylamino)-  
4-méthyl-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-  
diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) de formule brute  
20  $C_{25}H_{30}N_2O_5$   
( $M = 438,528$  g), ce qui correspond à un rendement de 97%.

On dissout 636 mg (1,45 mmoles) de l'amide obtenu  
précédemment dans 1,9 ml d'acétate d'éthyle, refroidit  
vers  $0-5^{\circ}C$  au bain de glace, puis ajoute 3,2 ml d'une  
25 solution de chlorure d'hydrogène à 4,6 mol/l dans l'acétate d'éthyle.

On laisse la température remonter à  $20^{\circ}C$ , puis après  
1 heure, on évapore le solvant sous pression réduite.

On cristallise ensuite le chlorhydrate dans l'éther  
30 éthylique.

On récupère ainsi 570 mg de chlorhydrate de trans-  
4-(benzoylamino)-4-méthyl-2-pyrrolidinecarboxylate  
de phénylméthyle de formule brute  $C_{20}H_{22}N_2O_3, HCl$

(M = 374,87 g), sous la forme d'une poudre blanche. Le rendement est donc quantitatif.

On dissout sous atmosphère inerte 100 mg (0,267 mmole) de chlorhydrate obtenu précédemment dans 1,5 ml de dichlorométhane.

On refroidit vers 0-5°C, puis on ajoute 90 µl de TEA.

On agite pendant 15 mn à 5°C, puis on ajoute 20 µl de diphosgène.

On continue à agiter pendant 30 minutes à 5°C.

Ensuite, on traite avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, on extrait avec du dichlorométhane, on lave la phase organique avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium, sèche sur du sulfate de magnésium, et évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 130 mg d'une huile que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/ acétate d'éthyle 9/1.

On recueille alors 72 mg de trans-4-(benzoylamino)-1-(chlorocarbonyl)-4-méthyl-2-pyrrolidinecarboxylate de phénylméthyle de formule brute  $C_{21}H_{21}N_2O_4Cl$  (M = 400,865 g), ce qui correspond à un rendement de 67%.

On dissout 373 mg (0,930 mmole) du composé obtenu précédemment dans 9 ml de tétrahydrofuranne.

On refroidit ensuite la solution jusqu'à -70°C et on ajoute en 5 minutes 1 ml d'une solution 1 M dans le tétrahydrofuranne de bis(triméthylsilyl)amidure de lithium.

On laisse le milieu réactionnel se réchauffer jusqu'à 0°C pendant 45 minutes, puis on additionne 69 µl d'acide acétique.

On dilue ensuite avec du dichlorométhane, on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec une solution de tampon phosphate à pH=7,0, et avec un solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

5 On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, concentre à sec sous pression réduite, pour obtenir 330 mg d'un produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant au mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 98/2 contenant 0,1% en  
10 volume de TEA.

On recueille ainsi 123 mg du composé attendu de formule brute  $C_{21}H_{20}N_2O_4$  ( $M = 364,404$  g), ce qui correspond à un rendement de 36%.

#### Spectre RMN du proton

15 Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,76 (s):  $\underline{CH}_3$ ; 2,11 (dd) et 2,73 (ddd):  $N-CH-\underline{CH}_2$ ;  
2,93 (dt) et 3,00 (d):  $N-\underline{CH}_2$ ; 3,96 (ddd):  $N-\underline{CH}-CH_2$ ; 5,21:  
CO<sub>2</sub> $\underline{CH}_2C_6H_5$ ; 7,36 (m):  $CH_2C_6H_5$ ; 7,43 (t) et 7,57 (tt) et  
20 7,72 (d):  $COC_6H_5$ .

IR(CHCl<sub>3</sub>): 1776, 1745, 1682; 1601, 1580, 1498  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif) m/z:  $[2M + Na]^+ = 751$ ;  $[2M + H]^+ = 729$ ;  $[M + Na]^+ = 387$ ;  $[M + H]^+ = 365$

#### 25 Exemple 10

Sel de 1-propényltriphénylphosphonium de trans-2-oxo-3-(sulfooxy)-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane-6-carboxylate de phénylméthyle

30 On dissout sous atmosphère inerte 15 g (46,71 mmoles) de cis-4-hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) (produit commercial) de formule brute  $C_{17}H_{23}NO_5$  ( $M = 321,377$  g) dans 225 ml de dichlorométhane anhydre.

On ajoute à la solution 5,42 ml de 2,6-lutidine. On refroidit à  $-70^{\circ}\text{C}$ , puis on introduit en 5 minutes, 8,25 ml d'anhydride trifluorométhanesulfonique.

On agite pendant 10 minutes à  $-70^{\circ}\text{C}$  puis on introduit à  $-70^{\circ}\text{C}$  4,43 g de O-allyl-hydroxyl-amine.

On laisse ensuite le mélange réactionnel à température ambiante pendant 27 heures.

On dilue au dichlorométhane, puis on lave avec une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique, avec une solution aqueuse saturée de  $\text{NaHCO}_3$ , et à l'eau.

On sèche la phase organique sur du sulfate de sodium, et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 23 g d'une huile brute que l'on purifie par chromatographie sur silice, l'éluant étant successivement un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5, 90/10, puis 80/20.

On récupère 7,18 g de trans-4-[(2-propényloxy)amino]-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) de formule brute  $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{O}_5$  ( $M = 376,456$  g), ce qui correspond à un rendement de 40%.

On dissout 3,25 g (8,63 mmoles) du composé obtenu précédemment dans 3,5 ml d'acétate d'éthyle.

On refroidit vers  $0-5^{\circ}\text{C}$ , puis on ajoute 19 ml d'une solution de 4,6 mol/l de chlorure d'hydrogène dans l'acétate d'éthyle.

On laisse réagir tout en agitant vers  $0-5^{\circ}\text{C}$  pendant 40 minutes.

On évapore le solvant sous pression réduite, puis on reprend plusieurs fois au diéthyl éther, en soutirant le liquide surnageant.

On obtient ainsi 2,54 g d'un chlorhydrate sous la forme d'un précipité blanc, que l'on dissout dans 55 ml



de dichlorométhane sous agitation. On ajoute 7,3 ml de soude 2N. Après décantation, on sèche la phase organique sur du sulfate de sodium.

On évapore le dichlorométhane sous pression réduite.

5 On obtient ainsi 2,12 g de trans-4-[(2-propényloxy)amino]-2-pyrrolidinecarboxylate de phénylméthyle de formule brute  $C_{15}H_{20}N_2O_3$  ( $M = 276,337$  g) sous la forme d'une huile soit un rendement de 89%.

10 On dissout sous atmosphère inerte 4,14 g (15 mmoles) du composé obtenu précédemment dans 1,5 l d'acétonitrile.

On refroidit vers 0-5°C et on ajoute 1,14 ml de diphosgène. On agite pendant 15 minutes en maintenant à 0-5°C, puis on ajoute successivement 4,6 ml de TEA, et 1,83g de DMAP dans 80 ml d'acétonitrile.

15 On laisse la température remonter à la température ambiante et on laisse réagir pendant 26 heures, puis on évapore la moitié du solvant sous pression réduite.

20 Ensuite, on traite par une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique, puis on extrait au dichlorométhane. On lave la phase organique à l'aide d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium, la sèche sur du sulfate de magnésium et évapore le solvant sous pression réduite.

25 On obtient ainsi 43 g de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10 contenant 0,1% de TEA.

30 On recueille 312 mg de trans-2-oxo-3-(2-propényloxy)-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane-6-carboxylate de phénylméthyle de formule brute  $C_{16}H_{18}N_2O_4$  ( $M = 302,33$  g) ce qui correspond à un rendement de 7 %.

On dissout sous atmosphère inerte 70,2 mg (0,232 mmole) du composé obtenu précédemment dans 2,3 ml de

dichlorométhane. On introduit ensuite 26,5  $\mu$ l d'acide acétique et 134 mg de  $\text{Pd}(\text{P}(\text{Ph})_3)_4$ .

On laisse réagir pendant 40 mn à température ambiante, puis on abaisse la température à  $-20^\circ\text{C}$  et on additionne 2,96 ml d'une solution du complexe  $\text{SO}_3$ -pyridine à 0,314 mol/l. On laisse réagir 2 heures et demie puis on additionne du dichlorométhane et on évapore le milieu réactionnel sous pression réduite. On reprend alors par 40 ml de dichlorométhane et on lave avec 5 ml d'eau. La phase organique est séparée et séchée sur du sulfate de sodium, puis le solvant est évaporé sous pression réduite.

On obtient ainsi 280 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant successivement par un mélange dichlorométhane/acétone 80/20 contenant 0,1 % de TEA, puis un mélange dichlorométhane/acétone 50/50 contenant 0,1 % de TEA.

On récupère 34,0 mg du composé attendu, de formule brute  $\text{C}_{34}\text{H}_{33}\text{N}_2\text{O}_7\text{SP}$  ( $M = 644,689$  g) sous la forme d'une huile jaune, soit un rendement de 23%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 400 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

2,00(m) et 2,48(m):  $\underline{\text{CH}_2}$ -CH-C=O; 2,72(d) et 3,12(s): CH- $\underline{\text{CH}_2}$ -N; 3,75(m):  $\text{CH}_2$ - $\underline{\text{CH}}$ -C=O<sub>2</sub>; 4,71(s)  $\underline{\text{CH}}$ -CH<sub>2</sub>-N; 5,18 [AB]  $\underline{\text{CH}_2}$ -C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>; 7,35(m):  $\text{CH}_2$ -C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> et 2,29(m):  $\underline{\text{CH}_3}$ -CH=CH; 6,62 et 7,21 CH<sub>3</sub>-CH=CH; 7,60-7,85 P(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>

#### SM (électrospray négatif et positif) m/z:

[Manion]<sup>-</sup> = 341

[Mcation]<sup>+</sup> = 303

Exemple 11

Sel de 1-propényltriphénylphosphonium de trans-2-oxo-3-(sulfooxy)-1,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane-6-carboxylate de méthyle

5 On procède comme dans l'exemple 10, mais en partant de 207 mg du cis-4-hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-méthyle.

On obtient ainsi 12 mg de produit désiré de formule  $C_7H_{10}N_2O_7S$  ( $M = 266,231$  g).

10 SM (électrospray négatif et positif) m/z:

[Manion]<sup>-</sup> = 265

[Mcation]<sup>+</sup> = 303

Exemple 12a

15 trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate de diphenylméthyle

On mélange sous atmosphère inerte 8 ml de dichlorométhane et 347 mg (1mmole) de chlorhydrate de cis-5-hydroxy-3-pipéridinecarboxylate de diphenylméthyle  
20 (décrit dans Acta Chem. Scand. Ser. B 35(4) 289-294).

On refroidit à 0°C, puis on ajoute 346 µl de TEA et 72 µl de diphosgène.

On laisse réagir pendant 15 minutes en maintenant la température à 0°C, puis on évapore le solvant sous  
25 pression réduite. On reprend dans 25 ml de toluène sec. On filtre pour éliminer le chlorhydrate de TEA.

On ajoute au filtrat 553 µl de TEA et on chauffe à reflux pendant 4 heures.

On dilue ensuite avec de l'acétate d'éthyle et on  
30 lave avec une solution aqueuse contenant 10% d'acide tartrique, puis avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium, et sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium.

On évapore ensuite sous pression réduite et on récupère 339 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant au mélange de toluène/acétate d'éthyle 70/30.

5 On recueille ainsi 146 mg du composé attendu ( $M = 337,378$  g), ce qui correspond à un rendement de 43%.

Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

10 2,15 (ddd) et 2,73 (dq):  $N-CH_2-CHO-CH_2$ ; 2,92 (tt):  $O_2C-CH-$ ; 3,00 (d) et 3,45 (d):  $N-CH_2-CHO$ ; 3,48 (dd) et 4,07 (dd):  $N-CH_2-CH-CO_2$ ; 4,79 (dt):  $N-CH_2-CHO$ ; 6,90 (s):  $CO_2-CH-(C_6H_5)_2$ ; 7,33 (m):  $(C_6H_5)_2$ .

IR(CHCl<sub>3</sub>): 1792, 1734; 1600, 1585, 1497  $cm^{-1}$ .

15 SM (EI) m/z:  $[M]^+ = 337, 292, 183, 167$ .

Exemple 12b

Acide trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylique

20 On mélange 320 mg du composé obtenu à l'exemple 12a, 17 ml d'acétone et 70 mg de catalyseur Pd/C à 20% en masse.

On agite sous atmosphère d'hydrogène à pression normale.

25 Au bout de 2 heures 30, on rajoute 70 mg de catalyseur et laisse réagir pendant encore 1 heure 30, puis on filtre le milieu réactionnel.

30 On évapore le solvant sous pression réduite et obtient ainsi 350 mg du produit brut que l'on cristallise dans du pentane.

On filtre et on récupère ainsi 158 mg du produit recherché de formule brute  $C_7H_9NO_4$  ( $M = 171,154$  g) sous la

forme d'un solide gris. Le rendement correspondant est de 89%.

Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 300 MHz, déplacements chimiques des  
5 pics en ppm et multiplicité:

2,10 (ddd) et 2,43 (dm):  $\text{N-CH}_2\text{-CHO-CH}_2$ ; 2,83 (tt):  
 $\text{O}_2\text{C-CH-}$ ; 3,13 (d) et 3,27 (dm):  $\text{N-CH}_2\text{-CHO}$ ; 3,40 (dd) et  
3,72 (d):  $\text{N-CH}_2\text{-CH-CO}_2\text{H}$ ; 4,81 (m):  $\text{N-CH}_2\text{-CHO}$ ; 12,54 (s  
large):  $\text{CO}_2\text{H}$ .

10 IR (nujol): 1782, 1692  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[\text{M}]^+$  = 177, 155, 127, 82, 70.

Exemple 12c

trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate  
15 de (4-nitrophényl)méthyle

On mélange sous atmosphère inerte 30 mg (0,175  
mmole) de l'acide obtenu à l'exemple 12b et 0,5 ml de  
dichlorométhane. On ajoute alors 26,8 mg d'alcool 4-  
nitrobenzylique, 2,2 mg de DMAP et 37 mg de EDCI.

20 On laisse réagir en agitant pendant 2 heures à  
température ambiante.

La phase organique est ensuite diluée par du  
dichlorométhane, lavée par une solution aqueuse d'acide  
tartrique à 10% et une solution de tampon phosphate à pH  
25 7.

Après séchage de la phase organique sur sulfate de  
sodium, et évaporation du solvant sous pression réduite,  
on obtient 57 mg de produit brut que l'on purifie par  
chromatographie sur silice en éluant au mélange  
30 toluène/acétate d'éthyle 85/15.

Le produit est ensuite cristallisé dans un mélange  
d'éther éthylique et de pentane pour donner 34 mg de

cristaux blancs du composé recherché ( $M = 306,277$  g). Le rendement correspondant est de 63,5%.

Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des  
5 pics en ppm et multiplicité:

2,14 (ddd) et 2,84 (dm):  $N-CH_2-CHO-CH_2$ ; 2,90 (tt):  
 $O_2C-CH-$ ; 3,10 et 3,49 (dm);  $N-CH_2-CHO$ ; 3,43 (dd) et 4,14  
(dl):  $N-CH_2-CH-CO_2$ ; 5,27 [AB]:  $CO_2-CH_2-C_6H_5$ ; 7,56 et 8,24  
[AA'BB']:  $C-C_6H_5-NO_2$ .

10 IR ( $CHCl_3$ ): 1799, 1789, 1741; 1609, 1526, 1495  $cm^{-1}$ .

SM (EI)  $m/z$ :  $[M]^+$ : 306, 170, 136, 126, 106, 82.

Exemple 13

6-(phénylméthyl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

15 Stade A:

A une solution de 20,71 g de 3-amino-pyridine dans  
200 ml de chlorure de méthylène on ajoute vers 0-5°C,  
30,7 ml de TEA. On ajoute ensuite goutte à goutte en 15  
mn, 25,5 ml de chlorure de benzoyle et laisse revenir à  
20 température ambiante. Après 1 heure sous agitation, on  
lave à l'eau, puis avec une solution saturée au  
bicarbonate de sodium puis sèche la phase organique sur  
sulfate de sodium et on évapore le solvant sous pression  
réduite. On obtient 42,29 g de produit attendu  
25 cristallisé ( $M = 198,226$  g).

Stade B:

A une solution de 10 g du produit obtenu au stade A  
dans 200 ml de méthanol, on ajoute 4,3 ml d'acide  
chlorhydrique concentré et 500 mg de rhodium sur alumine  
30 à 5 % en poids. On place sous atmosphère d'hydrogène à  
une pression de 60-110 bars pendant 15 heures.

On filtre le mélange réactionnel, on rince au  
méthanol puis on concentre le filtrat sous pression

réduite. Le chlorhydrate du produit attendu est obtenu en mélange avec 10 % de chlorhydrate du produit de départ.

On reprend le produit par 250 ml de chlorure de méthylène et ajoute 1,1 équivalent de soude 1 N. Après 15  
5 mn sous agitation, on décante le chlorure de méthylène, on lave la phase organique à l'eau, la sèche et l'évapore sous pression réduite. On chromatographie le résidu sur silice en éluant au mélange chlorure de méthylène - méthanol - triéthylamine 92/8/3.

10 On obtient 7,4 g de produit attendu cristallisé, soit un rendement de 72 %.

Stade C : N-(phénylméthyl)-3-pipéridinamine

On dissout 20 g du produit obtenu comme décrit au stade B dans 600 ml de 1,2-diméthoxyéthane. On ajoute à  
15 la solution en 30 mn 14,86 g d'hydrure d'aluminium lithium. On chauffe sous agitation et sous gaz inerte à 75 - 80°C pendant 16 heures puis on refroidit à 0°C et on ajoute en 45 mn, sans dépasser 12°C, 11 ml d'eau. On agite pendant 10 mn, filtre et lave le précipité au  
20 chlorure de méthylène. On concentre le filtrat sous pression réduite. On obtient 17,8 g de produit attendu, sous forme d'une huile que l'on distille sous pression réduite (température d'ébullition: 114 - 121°C / 0,8 mbar). On recueille 16 g de produit attendu, soit un  
25 rendement de 86 %.

Stade D: 6-(phénylméthyl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

On dissout 1,06 g de produit obtenu au stade C dans 28 cm<sup>3</sup> de toluène, puis on refroidit à 0°C et on ajoute  
30 sous gaz inerte 337 µl de diphosgène. On laisse remonter la température et on maintient 2 heures à 20°C. On concentre sous pression réduite puis on chromatographie le résidu sur silice en éluant successivement au chlorure

de méthylène-acétone 95/5 puis 80/20 et enfin chlorure de méthylène-méthanol, triéthylamine 92/8/3 et obtient 362 mg de produit attendu  $C_{13}H_{16}N_2O$  ( $M = 216,85$  g) soit un rendement de 30%.

- 5 CPV/Spectre de masse (EI) m/z:  $[M]^+ = 216, 125, 91$ .  
IR ( $CHCl_3$ ): 1718; 1498  $cm^{-1}$ .

Exemple 14

6-benzoyl-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

- 10 Stade A: 3-(benzylamino)-1-pipéridinecarboxylique

On dissout 5 g de produit obtenu au stade B de l'exemple 13, dans 1,25 l de toluène anhydre sous atmosphère d'azote puis on ajoute 3,4 ml de TEA et on introduit à 0- 5°C en 3 mn, 1,47 ml de diphosgène. Après  
15 20 mn à 0-5°C, on laisse réchauffer jusqu'à 20°C, on maintient sous agitation pendant 75 mn, puis évapore le solvant sous pression réduite. On chromatographie le résidu sur silice en éluant avec un mélange chlorure de méthylène-acétone 8/2. On obtient 3,44 g de produit  
20 attendu (rendement de 52,6 %).

Stade B

6-benzoyl-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

On introduit sous atmosphère d'azote, 48 mg d'hydrure de sodium à 50% en dispersion dans l'huile et  
25 20 ml de THF. On refroidit vers 0-5°C, puis on ajoute en une fois 266mg du produit obtenu au stade A.

On laisse la température remonter jusqu'à la température ambiante, puis on ajoute 60  $\mu$ l d'acide acétique et 10 ml de tampon de phosphate à pH 7.

- 30 On ajoute ensuite un peu d'acétate d'éthyle puis on décante et on réextrait à l'acétate d'éthyle. On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, puis on évapore les solvants sous pression réduite.



012347

56

Le produit brut est chromatographié sur silice en éluant avec du dichlorométhane contenant 2% d'acétone.

On obtient ainsi 143 mg du produit recherché  $C_{13}H_{12}N_2O_2$

5 (M: 228,25 g). Le rendement correspondant est de 62%.

Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,20 - 2,15 (m) et 2,42 (m):  $NCH-CH_2-CH_2-$ ; 2,80 (d)  
10 - 2,93 (d) ; 3,11 (m); 3,28 à 3,58 (m):  $CH_2-N$ ; 4,54 (m):  
 $CH-N$ ; 7,43 (m) ; 7,55 (m); 7,69 (m):  $C_6H_5$   
IR ( $CHCl_3$ ): 1758, 1672; 1605, 1586, 1492;  
SM (EI) m/z:  $[M]^+ = 230, 125, 105, 77$

15 Exemple 15

Acide 7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-6-acétique

Stade A:

5-[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]-1,6-diazabicyclo[3-  
2-1]octan-7-one]

20 On place sous atmosphère d'azote 843 mg de lithium et condense à  $-70^\circ C$  320 ml d'ammoniac. On ajoute à  $-70^\circ C$  en 10 mn, 7,56 g (34,8 mmoles) de produit obtenu à l'exemple 13 dans 160 ml de tétrahydrofuranne. On agite 5  
25 réchauffant lentement jusqu'à  $20^\circ C$ . On ajoute lentement à la suspension obtenue, à  $20^\circ C$ , 7,9 g de chlorure de (1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyle dans  $10\text{ cm}^3$  de tétrahydrofuranne puis maintient sous agitation pendant  
30 10 mn. On ajoute ensuite  $160\text{ cm}^3$  d'acétate d'éthyle puis  $60\text{ cm}^3$  d'une solution aqueuse à 10 % d'acide tartrique. On décante, reextrait à l'acétate d'éthyle lave la phase organique à l'eau, la sèche sur sulfate de sodium et évapore le solvant sous pression réduite. On

chromatographie l'huile obtenue sur silice à 10 % d'eau, en éluant avec du chlorure de méthylène puis avec un mélange chlorure de méthylène-acétone 8/2 et obtient 3,04 g de produit attendu (rendement: 36,2 %).

5 Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

0,21(S) et 0,40(S):  $\text{SiCH}_3$ ; 0,97(S):  $\text{Si}t\text{Bu}$ ; 1,5 à 1,8(m) et 2,07(m):  $\text{N-CH-CH}_2\text{-CH}_2$ ; 2,85 (d) et 3,32 (m);  $\text{-CH-CH}_2\text{-N}$ : 2,93 (dt) et 3,32 (m):  $\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-N}$ ; 3,65 (m):  $\text{CH - N}$ .

IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1710; 842  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[\text{M}]^+$ : 240, 225, 183, 100, 83, 57.

Stade B:

7-oxo-1,6-diazabicyclo[3-2-1]octan-6-acétate de  
15 phénylméthyle

On dissout sous atmosphère d'azote 1,44 g (5,99 mmoles) du produit obtenu au stade A dans 14,4 ml de tétrahydrofurane puis ajoute 941  $\mu\text{l}$  de bromoacétate de phénylméthyle et ensuite, goutte à goutte, 6 ml d'une  
20 solution 1 M de fluorure de tétra-n-butyl ammonium dans le tétrahydrofurane. On agite 10 mn à 20°C puis dilue par 15 ml d'acétate d'éthyle et on ajoute 5 ml de solution aqueuse de tampon de phosphate à pH = 7. On  
25 décante, réextrait à l'acétate d'éthyle, lave la phase organique à l'eau, on la sèche sur du sulfate de sodium et on évapore le solvant sous pression réduite. On  
30 chromatographie le résidu huileux sur silice à 10 % d'eau en éluant avec un mélange chlorure de méthylène-acétone 8/2. On obtient 140 mg du produit attendu. Le rendement correspondant est de 9%.

IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1746, 1720  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[\text{M}]^+$  = 274, 183, 155, 139, 91, 83.

Stade C: Acide 7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-acétique

On dissout 137 mg de produit obtenu au stade B dans 1,5 ml d'acétate d'éthyle, puis on ajoute à la solution  
5 14 mg de palladium sur charbon à 10 % et on place sous atmosphère d'hydrogène. Après 15 mn on ajoute à nouveau 15 mg de palladium sur charbon et maintient sous agitation pendant 15 mn. On filtre le catalyseur, le rince à l'acétate d'éthyle, puis à l'acétone et au  
10 méthanol et on évapore le solvant sous pression réduite. On obtient au total 68 mg de produit brut que l'on cristallise dans l'éther. On obtient 58 mg du produit attendu de formule brute  $C_{15}H_{18}N_2O_3$  ( $M = 274,321$  g). Le rendement correspondant est de 63 %.

15. Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 400 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,48 (m), 1,63 (m), 1,73 (m) et 1,86 (m):  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 2,85 à 3,00 (m), 3,14 (dm) et 3,64 (m):  $CH_2-N-CH_2$   
20 et  $CH-N$ ; 3,78 et 4,14 [AB]:  $CON-CH_2-CO$ .

SM (EI) m/z:  $[M]^+ = 184, 139, 125, 111, 97, 83$ .

Exemple 16

7-oxo-N-phényl-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-  
25 carboxamide

On mélange sous gaz inerte 1 ml de tétrahydrofuranne et 99 mg (0,41 mmole) du composé obtenu au stade A de l'exemple 15.

On ajoute successivement 50  $\mu$ l d'isocyanate de  
30 phényle puis 450  $\mu$ l d'une solution 1M de fluorure de tétrabutylammonium dans le THF.

On laisse réagir pendant 10 minutes, puis on dilue à l'acétate d'éthyle, on lave à l'eau. On décante et sèche

la phase organique sur du sulfate de magnésium. On évapore le solvant sous pression réduite. On obtient ainsi 140 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice en prenant comme éluant un  
5 mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On recueille 21 mg du composé du titre, de formule brute  $C_{13}H_{15}N_3O$  ( $M = 245,283$  g), ce qui correspond à un rendement de 20%.

Spectre RMN du proton

10 Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,78 (m), 2,02 (m) et 2,17 (m):  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 2,88 (d), 3,13 (dt) et 3,42 (m):  $CH_2-N-CH_2$ ; 4,49 (m):  $CH-N$ ; 7,11(t); 7,34(t) et 7,54(d):  $C_6H_5$ ; 10,05: NH.

15 IR ( $CHCl_3$ ): 3302, 3266; 1734; 1700; 1602, 1553, 1501  $cm^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[M]^+$ : 245, 153, 126, 119, 98, 92.

Exemple 17a

20 6-[1-(phénylméthyl)-1H-tétrazol-5-yl]-1,6-diazabicyclo [3.2.1]octan-7-one

On place sous gaz inerte 480 mg (2 mmoles) du composé obtenu au stade A de l'exemple 15.

25 On ajoute ensuite une solution de 712 mg de 5-fluoro-1-(phénylméthyl)-1H-tétrazole dans 1,5 ml de tétrahydrofurane puis 2 ml d'une solution 1 M de fluorure de tétrabutylammonium dans le THF. On laisse réagir pendant 1 minute.

30 On dilue ensuite à l'acétate d'éthyle, on lave à l'eau, on décante, on sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient 1,06 g d'un produit huileux que l'on chromatographie sur silice dans le mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On obtient ainsi 143 mg du composé attendu de formule brute  $C_{14}H_{16}N_6O$  ( $M = 284,324$  g) sous la forme d'un produit amorphe blanc. Le rendement correspondant est de 25%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,80 (m), 2,04 (m) et 2,67 (m):  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 2,83 (d), 2,85 (dm), 3,10 (dd) et 3,44 (dd):  $CH_2-N-CH_2$ ; 3,99 (m):  $CH-N$ ; 5,63 et 5,88 [AB]:  $C_6H_5-CH_2$ ; 7,18 (m) et 7,32 (m):  $C_6H_5$ .

15

#### Exemple 17b

6-(1H-tétrazol-5-yl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

On mélange 120 mg du produit obtenu à l'exemple 17a et 2,4 ml d'un mélange méthanol/acétate d'éthyle 90/10 puis ajoute 2,4 ml de THF jusqu'à l'obtention d'une dissolution totale.

On ajoute ensuite 24 mg de catalyseur palladium sur charbon à 10%, puis on agite sous atmosphère d'hydrogène. Après 3 heures de réaction, on filtre le catalyseur, on rince avec un mélange tétrahydrofurane/méthanol, puis on évapore le solvant sous pression réduite. On cristallise ensuite le produit dans l'éther éthylique.

On obtient ainsi 72 mg du composé du titre de formule brute  $C_7H_{10}N_6O$  ( $M = 194,198$  g), sous la forme d'un produit blanc cristallisé. Le rendement correspondant est de 88%.

30

#### Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,63 (m), 1,89 (m) et 2,07 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 3,14 à 3,20 (m) et 3,43 (m): CH<sub>2</sub>-N-CH<sub>2</sub>; 4,51 (m): CH-N.

5 IR (Nujol): 1744; 1594  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[M]^+$  = 194, 165, 124, 111, 98, 83, 68, 56, 41.

### Exemple 18

10 6-acétyl-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

On dissout dans 1,4 ml de THF, 140 mg (0,582 mmoles) du composé obtenu au stade A de l'exemple 15.

On ajoute successivement à la solution obtenue 55  $\mu\text{l}$  d'anhydride acétique puis 0,58 ml d'une solution 1 M de fluorure de tétrabutylammonium dans le THF.

On dilue ensuite à l'acétate d'éthyle, on lave à l'eau, on décante, on sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

20 On obtient ainsi 116 mg d'une huile brute que l'on chromatographie sur silice avec un mélange dichlorométhane/acétone 80/20.

On obtient ainsi 18 mg du composé attendu, de formule brute  $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2$  ( $M = 168,196 \text{ g}$ ), ce qui correspond à un rendement de 18 %.

### Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,65 à 2,20 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 2,54 (s):  $\text{CH}_3\text{CO-N}$ ; 2,83 (d), 3,33 (dm), 3,10 (m) et 3,45 (dd) CH<sub>2</sub>-N-CH<sub>2</sub>; 4,55 (m): O=C-N-CH.

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1758, 1696  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[M]^+$  = 168, 140, 126, 98, 43.

Exemple 19a

6- (phénylméthoxy) -1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

On dissout 44,02 g (0,22 mole) de 3-oxo-1-  
5 pipéridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle ( $C_{10}H_{17}NO_3$ ,  
M = 199,251 g) (décrit dans J. Med. Chem. 1986, 29, 224-  
229) dans 440 ml d'éthanol.

On ajoute ensuite 38,79 g de chlorhydrate de O-  
benzyl-hydroxylamine. On introduit ensuite goutte à  
10 goutte, dans la suspension, 54 ml de pyridine.

On laisse réagir en agitant pendant 4 heures à  
environ 25°C, puis on évapore le solvant sous pression  
réduite. On reprend par un mélange de dichlorométhane et  
d'acétate d'éthyle, puis filtre et rince au  
15 dichlorométhane, puis avec un mélange de dichlorométhane  
et d'acétate d'éthyle. Le filtrat est ensuite concentré à  
sec sous pression réduite.

On obtient ainsi 69,8 g d'une huile jaune clair que  
l'on purifie par chromatographie sur silice. L'éluant  
20 utilisé est un mélange cyclohexane/acétate d'éthyle  
80/20.

On recueille 57,21 g de 3-[(phénylméthoxy)imino]-1-  
pipéridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle, de formule  
brute  $C_{17}H_{24}N_2O_3$  (M = 304,39 g), sous la forme d'une huile  
25 jaune très pâle. Le rendement correspondant est de 85%.

On dissout 24,82 g (0,0815 mmole) de l'oxime obtenu  
précédemment dans 163 ml d'éthanol refroidi à -10°C sous  
azote. On ajoute alors 25 ml d'un complexe borane-  
pyridine puis, goutte à goutte en une heure et quart,  
30 204 ml d'acide chlorhydrique 2N. La solution est agitée  
pendant 1 heure et quart à -5°C, puis traitée par 100 ml  
de solution saturée d'hydrogène-carbonate de sodium, puis

par 35 g de carbonate de sodium, qui sont ajoutés par petites fractions. Le pH est alors de 7-8.

Le milieu réactionnel est extrait à l'acétate d'éthyle.

5 Les phases organiques sont réunies, séchées sur sulfate de sodium, le solvant est évaporé sous pression réduite. On obtient ainsi 39,0 g d'un liquide huileux incolore que l'on reprend dans 400 ml d'acétate d'éthyle.

La solution est lavée par une solution aqueuse  
10 d'acide chlorhydrique 0,05 N, puis les phases organiques sont réunies et le solvant est évaporé sous pression réduite.

On récupère 35,5 g d'un liquide incolore huileux que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant un  
15 mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5, puis au mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 80/20.

On recueille ainsi 17,89 g de 3-  
[(phénylméthoxy) amino]-1-pipéridinecarboxylate de 1,1-  
diméthyléthyle de formule brute  $C_{17}H_{26}N_2O_3$  (M = 306,41 g),  
20 sous la forme d'une huile incolore. Le rendement correspondant est de 72%.

On dissout 6,72 g (21,9 mmoles) de la pipéridine obtenue précédemment dans 22 ml d'acétate d'éthyle refroidi à  $-10^{\circ}C$ . On ajoute goutte à goutte, en 30  
25 minutes, 28 ml d'une solution 4,0 mol/l d'acide chlorhydrique anhydre dans l'acétate d'éthyle.

Après 1 heure à  $0^{\circ}C$ , on ajoute 40 ml d'éther éthylique, on filtre le précipité de dichlorhydrate et on le lave à l'éther éthylique.

30 On obtient ainsi 3,87 g d'un solide blanc.

Par cristallisation du filtrat, on obtient encore 1,80 g du produit désiré.



Le produit obtenu est repris dans 60 ml de soude 1 N et 120 ml d'acétate d'éthyle. Après décantation, la phase aqueuse est saturée par du chlorure de sodium, puis on extrait deux fois à l'acétate d'éthyle. Les phases  
5 organiques sont réunies et séchées sur du sulfate de magnésium puis concentrées à sec sous pression réduite.

On obtient ainsi 3,67 g de N-(phénylméthoxy)-3-pipéridinamine, de formule brute  $C_{12}H_{18}N_2O$  ( $M = 206,29$  g), ce qui correspond à un rendement de 81%.

10 On dissout 518 mg (2,5 mmoles) du composé obtenu précédemment dans 5 ml de dichlorométhane anhydre, puis on ajoute 0,5 ml de TEA.

La suspension blanchâtre obtenue est refroidie à -65°C, puis 12,5 ml d'une solution de diphosgène 0,10  
15 mol/l dans du dichlorométhane sont ajoutés en 15 minutes.

Après 45 minutes de réaction, la solution incolore est diluée par 15 ml de dichlorométhane et traitée par 15 ml d'eau.

On laisse le milieu décanter, puis on extrait la  
20 phase aqueuse par 20 ml de dichlorométhane.

Les phases organiques réunies sont séchées sur du sulfate de magnésium, puis concentrées à sec sous pression réduite. On obtient ainsi une huile jaune pâle que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant au  
25 mélange d'acétate d'éthyle 90/10, puis un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 80/20.

On recueille ainsi 196 mg du composé attendu de formule brute  $C_{13}H_{16}N_2O_2$ , ( $M = 232,28$  g) sous la forme d'une huile incolore. Le rendement correspondant est de  
30 34%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

012347

65

1,59 (m) et 1,93 à 2,18 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub> ; 2,73 (dt),  
2,94 (dt), 3,17(dt) et 3,40 (dd): CH<sub>2</sub>-N-CH<sub>2</sub>; 3,29 (t): N-  
CH; 4,89 (d): N-O-CH<sub>2</sub>-(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>); 7,38: C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1747; 1498 cm<sup>-1</sup>.

5 SM (EI) m/z: [M]<sup>+</sup> = 232, 91.

#### Exemple 19b

6-(acétyloxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

10 On dissout 95 mg (0,41 mmole) du composé obtenu à  
l'exemple 19a dans 5 ml de méthanol, on agite 8 mg de  
palladium sur charbon à 10% en poids, puis on place la  
suspension sous atmosphère d'hydrogène sous pression  
normale pendant 1 heure à 25°C, puis le catalyseur est  
filtré.

15 Après évaporation du solvant sous pression réduite,  
on obtient 70 mg de cristaux blancs.

20 Les cristaux sont repris dans 2 ml de  
dichlorométhane anhydre. La solution est refroidie à -  
10°C sous azote. On ajoute ensuite 70 µl de pyridine puis  
40 µl d'anhydride acétique et agite pendant 20 minutes. On  
concentrée sous pression réduite et obtient 75 mg de  
cristaux blancs que l'on purifie sur silice, en éluant au  
mélange dichlorométhane d'acétate d'éthyle 80/20.

25 On recueille 49 mg du composé attendu (M = 184,20g)  
sous la forme d'un solide blanc. Le rendement  
correspondant est de 65%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le CDCl<sub>3</sub>, à 300 MHz, déplacements chimiques des  
pics en ppm et multiplicité:

30 1,60 à 2,2: N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub> ; 2,24 (s): CH<sub>3</sub>; 2,95 (d) et 3,54  
(dm): N-CH<sub>2</sub>-CH; 3,07 (dt) et 3,54 (ddl): N-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 3,94  
(tl): O=C-N-CH.

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1798; 1764 cm<sup>-1</sup>.

SM (EI) m/z:  $[M]^+$  = 184, 142, 125, 43.

Exemple 19c

6-(benzoyloxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

5 On procède de manière similaire à ce qui a été décrit à l'exemple 19b en partant de 205 mg du composé préparé à l'exemple 19a et 200 mg d'anhydride benzoïque.

On obtient ainsi 64 mg du composé attendu de formule brute  $C_{13}H_{14}N_2O_3$  ( $M = 246,27$  g) soit un rendement 30%.

10 Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,64 à 1,95 (m) et 2,10 à 2,35 (m):  $CH-CH_2-CH_2$ ; 3,02 (d) et 3,65 (dm):  $N-CH_2-CH$ ; 3,13 (dt) et 3,55 (ddl):  $N-CH_2-CH_2$ ; 4,09 (tl):  $O=C-N-CH$ ; 7,49 (m): 7,65 (tt); 8,12 (m):  $C_6H_5$ .

IR ( $CHCl_3$ ): 1774, 1756;1602, 1585, 1495  $cm^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[M]^+$  = 246, 105, 77.

20 Exemple 19d

6-(1-oxopropoxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-7-one

On procède de manière similaire à ce qui a été décrit à l'exemple 19c, en partant de 163 mg du composé préparé à l'exemple 19a et 70  $\mu$ l de chlorure de propionyle.

On obtient ainsi 17 mg du composé attendu de formule brute  $C_9H_{14}N_2O_3$  ( $M = 198,23$  g), soit un rendement de 12 %.

Spectre RMN du proton

30 Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,25 (t):  $O=C-CH_2-CH_3$ ; 1,65 (m), 1,78 (m) et 2,10 (m):

N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 2,52 (m) O=C-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub>; 2,94 (d) et 3,55 (dl):  
 N-CH<sub>2</sub>-CH; 3,07 (dt) et 3,48 (dd): N-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 3,93 (m): N-  
 CH<sub>2</sub>-CH.

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1792; 1763 cm<sup>-1</sup>.

5 SM (EI) m/z: [M]<sup>+</sup> = 198, 170, 142, 125, 97, 57.

Exemple 19e

6-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]-1,6-diazabicyclo[3.2.1]  
 octan-7-one

10 On procède de manière similaire à ce qui a été  
 décrit à l'exemple 19d, en partant de 139 mg du composé  
 préparé à l'exemple 19a et 126 mg de chlorure de tosyle.

On obtient ainsi 77mg du composé attendu de formule  
 brute C<sub>13</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>S (M = 296,35 g) soit un rendement de 44%.

15 Spectre RMN du proton

Dans le CDCl<sub>3</sub>, à 250 MHz, déplacements chimiques des pics  
 en ppm et multiplicité:

1,55 et 2,99 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 2,45 (s): CH<sub>3</sub>; 2,89  
 (d), 3,00 (dt), 3,29 (dt) et 3,39 (dd): CH<sub>2</sub>-N-CH<sub>2</sub>; 4,04  
 20 (m): N-CH; 7,35 et 7,91 [AA'BB'] CH<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-SO<sub>2</sub>.

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1775; 1599, 1495, 1383; 1193, 1180 cm<sup>-1</sup>.

SM (EI) m/z: [M]<sup>+</sup> = 296, 155, 141, 125, 91.

Exemple 19f

25 6-[(méthylsulfonyl)oxy]-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-  
 one

On procède de manière similaire à ce qui a été  
 décrit à l'exemple 19e en partant de 211 mg du composé  
 préparé à l'étape 19a et 80μl de chlorure de mésyle.

30 On obtient ainsi 50 mg du composé attendu de formule  
 brute C<sub>17</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>S (M = 220,25 g) soit un rendement de 25%.

Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,56 et 2,38 (m):  $\text{N-CH-CH}_2\text{-CH}_2$ ; 3,00 (d), 3,12 (dt) et 3,49 (m):  $\text{N-(CH}_2\text{)}_2$ ; 3,26 (s):  $\text{CH}_3$ ; 4,12 (m):  $\text{N-CH}$ .

5 IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1775; 1381, 1187  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[\text{M}]^+ = 220, 141, 125, 97, 79$ .

10 Exemple 19g

6-[(4-nitrophényl)sulfonyl]oxy]-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one-

On procède de manière similaire à ce qui a été décrit à l'exemple 19f en partant de 270 mg du composé préparé à l'exemple 19a et 283 mg de chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle.

On obtient ainsi 205,5 mg de composé attendu de formule brute  $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O}_6\text{S}$  ( $\text{M} = 327,32$  g) soit un rendement de 54%.

20 Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,64 (dt), 1,84 (m), 1,99 (m), 2,31 (dm):  $\text{NCH-CH}_2\text{-CH}_2$ ;

2,94 (d), 3,30 (dt), 3,04 (dt), 3,40 (ddl):  $\text{N(CH}_2\text{)}_2$ ;

25 4,14:  $\text{O=C-N-CH}$ ; 8,25 et 8,41 [AA'BB']:  $\text{NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{SO}_2$ .

IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1776; 1610, 1590, 1538; 1393, 1191  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[\text{M}]^+ = 327, 186, 141, 125, 111$ .

Exemple 20

30 6-[[[(4-méthylphényl)sulfonyl] amino]-1,6-diazabicyclo[3.2.1] octan-7-one

On dissout 5 g (25,1 mmole) de 3-oxo-1-pipéridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle (décrit dans

J. Med. Chem. 1986, 29, 224-229) ( $C_{10}H_{17}NO_3$ ,  $M = 199,251$  g) dans 50 ml de dichlorométhane.

On ajoute ensuite à la solution 4,67 de tosylhydrazine. et laisse réagir pendant 2 heures sous agitation, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi, avec un rendement quantitatif, 9,56 g de 3-[2-[(4-méthylphényl)sulfonyl]hydrazono]-1-pipéridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle, de formule brute  $C_{17}H_{25}N_3O_4S$  ( $M = 367,47$  g).

On mélange sous gaz inerte 4,5 g du composé obtenu précédemment (12,2 mmoles), 90 ml d'un mélange méthanol/tétrahydrofurane 50/50, et quelques grains de vert de bromocrésol.

On ajoute ensuite 1,62 g de  $NaBH_3CN$ , puis refroidit vers  $0-5^{\circ}C$ , et introduit, de façon à maintenir le pH du milieu entre 3,8 et 5,4, une solution à 0,7 mol/l de chlorure d'hydrogène gazeux dans le méthanol.

On laisse réagir en agitant pendant 2 heures et demie.

On évapore sous pression réduite les  $2/3$  des solvants, puis on ajoute 200 ml de dichlorométhane et on lave par une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium.

On sèche la phase organique sur du sulfate de sodium et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 4,48 g de 3-[2-[(4-méthylphényl)sulfonyl]hydrazino] - 1-pipéridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle de formule brute  $C_{17}H_{27}N_3O_4S$  ( $M = 369,486$  g).

Le rendement correspondant est de 99%.

On mélange sous gaz inerte à  $0^{\circ}C$ , 4,48 g du composé obtenu précédemment 9 ml d'acétate d'éthyle.

On ajoute 30 ml d'une solution à 4 mol/l de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'acétate d'éthyle, on agite pendant 15 minutes puis on filtre et on lave le chlorhydrate à l'acétate d'éthyle. On sèche sous pression  
5 réduite et on obtient 3,48 g de dichlorhydrate de 2-(3-pipéridinyl)hydrazide de l'acide 4-méthylbenzènesulfonique, de formule brute  $C_{12}H_{19}N_3O_2S$ , 2HCl (M = 342,289 g). Le rendement correspondant est de 84%.

On dissout ensuite les 3,48 g du composé obtenu  
10 précédemment et 5 ml d'eau déminéralisée. Sous bonne agitation, on ajoute 10,2 ml de solution aqueuse de soude 2N.

Il se forme un précipité après 1 à 2 mn de contact. On agite ensuite pendant 10 minutes, puis on filtre le  
15 précipité et on le lave à l'eau, puis à l'acétate d'éthyle.

On sèche le solide obtenu sous pression réduite.

On obtient ainsi 2,21 g de 2-(3-pipéridinyl)hydrazide de l'acide 4-méthyl-  
20 benzènesulfonique, de formule brute  $C_{12}H_{19}N_3O_2S$  (M = 269,328 g). Le rendement correspondant est de 81%.

On mélange sous gaz inerte 500 mg (1,85 mmole) de l'amine obtenue précédemment et 20 ml de tétrahydrofuranne.

25 On ajoute à la suspension obtenue, à une température comprise entre 0 et 5°C, 112  $\mu$ l de diphosgène puis 517  $\mu$ l de TEA et 23 mg de DMAP.

On laisse réagir en agitant et en laissant la température remonter à 20°C.

30 On dilue ensuite à l'acétate d'éthyle, puis on lave avec une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique, ensuite avec de l'eau déminéralisée.

On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, puis évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient 769 mg d'un produit brut que l'on dissout dans 7 ml de dichlorométhane et 517  $\mu$ l de TEA.

On laisse réagir pendant une nuit sous agitation.

On dilue au dichlorométhane, lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium et on évapore le solvant sous pression réduite.

La mousse obtenue (395 mg) est purifiée par chromatographie sur silice avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 80/20.

On recueille 44 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{13}H_{17}N_3O_2S$  ( $M = 295,362$  g). Le rendement correspondant est de 8%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,55 à 1,80 (m) et 2,18 (m):  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 2,42 (s):  $CH_3$ ; 2,88 (d) et 2,93 (m);  $N-CH_2-CH$ ; 3,18 à 3,32 (m):  $N-CH_2-CH_2$ ; 4,08 (m):  $N-CH-CH_2$ ; 6,98 (sl): NH.

IR ( $CHCl_3$ ): 3264, 1737, 1599, 1490  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif) m/z:  $[M + Na]^+ = 318$ ,  $[M + H]^+ = 296$

25

#### Exemple 21

6-[(4-méthylphényl)sulfonyl]-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

On dissout, dans 3 ml de dichlorométhane anhydre, 305 mg (1,52 mmole) de 3-amino-1-pipéridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle (décrit dans J. Med. Chem. 1992, 35, 4334-4343), de formule brute  $C_{10}H_{20}N_2O_2$  ( $M = 200,282$  g).



On ajoute ensuite, 212  $\mu$ l de TEA, puis on refroidit à 5°C et on ajoute 278 mg de chlorure de tosyle. On agite en laissant la température revenir à 20°C et on laisse réagir pendant 2 heures.

5 On dilue ensuite au dichlorométhane et on lave d'abord avec une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique puis avec une solution de tampon phosphate à pH = 7.

On sépare et sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, puis on évapore le solvant sous pression  
10 réduite. On obtient ainsi une huile que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 9/1.

On recueille 440 mg de 3-[[[(4-méthylphényl) sulfonyl]amino]-1-pipéridinecarboxylate de 1,1-  
15 diméthyléthyle (décrit dans J. Med. Chem. 1992, 35, 4334-4343) de formule brute  $C_{17}H_{26}N_2O_4S$  (M = 354,472 g). Le rendement correspondant est de 82%.

On refroidit à 0-5° un mélange de 425 mg du composé obtenu précédemment et 2,1 ml d'un mélange acide  
20 trifluoroacétique/dichlorométhane 50/50.

On garde sous agitation à 5°C pendant 30 minutes.

On évapore ensuite le solvant sous pression réduite pour obtenir 403 mg de trifluoroacétate de 4-méthyl-N-(3-  
pipéridinyl)-benzènesulfonamide de formule brute  
25  $C_{14}H_{19}F_3N_2O_4S$  (M = 368,377 g).

On met en suspension 228 mg du composé obtenu précédemment dans 2 ml de méthanol. On traite par un excès de résine DOWEX 21K 20-50 Mesh activée à la soude.

On filtre, on rince la résine au méthanol, puis on  
30 évapore le filtrat sous pression réduite.

On recueille ainsi 123 mg de 4-méthyl-N-(3-pipéridinyl)-benzènesulfonamide de formule brute  
 $C_{12}H_{18}N_2O_2S$  (M = 254,353 g).

On dissout sous gaz inerte 118 mg de l'amine obtenue précédemment dans 1,2 ml de dichlorométhane.

On introduit alors successivement 98  $\mu$ l de TEA puis 28  $\mu$ l de diphosgène. On laisse réagir en agitant pendant 5 30 minutes à 0-5°C. On dilue par du dichlorométhane, on lave la phase organique par une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis à l'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, filtration et évaporation du solvant sous pression réduite, le produit brut est purifié par 10 chromatographie sur silice en prenant comme éluant un mélange dichlorométhane/acétone 95/5.

On obtient ainsi 112 mg de chlorure de l'acide 3-  
[[ (4-méthylphényl) sulfonyl] amino] -1-  
pipéridinecarboxylique, de formule brute  $C_{13}H_{17}ClN_2O_3S$  (M =  
15 316,308 g). Le rendement correspondant est de 76%.

Sous atmosphère inerte, on mélange 10 mg d'hydrure de sodium (en suspension à 55-65% dans l'huile) et 2 ml de tétrahydrofurane anhydre.

On ajoute ensuite 71 mg du produit obtenu 20 précédemment.

On agite à température ambiante pendant 15 minutes, puis on ajoute 12  $\mu$ l d'acide acétique et 2 ml de solution de tampon phosphate à pH=7.

On agite encore pendant 5 minutes, puis on ajoute 5 25 ml d'acétate d'éthyle, on laisse décanter, puis on réextrait à l'acétate d'éthyle. On sépare et sèche ensuite la phase organique sur du sulfate de magnésium, on filtre, on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 65 mg de produit brut que l'on 30 purifie par chromatographie sur silice, en éluant au mélange dichlorométhane/acétone 95/5.

On recueille ainsi 40 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{13}H_{16}N_2O_3S$  ( $M = 280,348$  g). Le rendement correspondant est de 64%.

Spectre RMN du proton

5 Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité (présence de deux conformères 90/10):

1,46 (m), 1,76 (m) et 2,08 (dm):  $NCH-CH_2-CH_2$ ; 2,44 (s) et 2,45 (s):  $CH_3$ ; 2,82 (d) et 2,98 (m) et 3,28 à 3,50 (m):  $-N-(CH_2)_2$ ; 4,55 (m) et 4,65 (m):  $CO-N-CH$ ; 7,33 et 7,78, 7,35 et 8,02 [AA'BB']  $CH_3-C_6H_4-SO_2$ .

IR ( $CHCl_3$ ): 1758, 1598, 1995, 1367, 1169  $cm^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[M]^+$ : 280, 216, 155, 125, 97, 91.

15 Exemple 22

6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]oct-3-èn-7-one

On mélange sous gaz inerte 5 ml de dichlorométhane et 68 mg de chlorhydrate de 1,2,3,6-tétrahydro-pyridin-3-ol ( $M = 135,5$  g) (décrit dans Chem. Pharm. Bull. 20 30(10)3617-3623(1982)).

On ajoute 33  $\mu l$  de diphosgène et on agite pendant 5 minutes à 0°C. Ensuite on ajoute 140  $\mu l$  de TEA et 61 mg de DMAP.

On laisse réagir à température ambiante pendant 25 heures, puis on dilue avec du dichlorométhane et on lave avec une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique puis à l'eau. On décante et sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium. On évapore le solvant sous pression réduite. On obtient ainsi 5 mg de produit brut que l'on 30 purifie par chromatographie sur silice, en éluant au dichlorométhane puis un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5.

On recueille ainsi 3 mg du composé attendu, de formule brute  $C_6H_7NO_2$  ( $M = 125$  g). Le rendement correspondant est de 5%.

5 Exemple 23

trans-3-benzoyl-2-oxo-4-oxa-1,3-diazabicyclo[3.2.1]octane-7-carboxylate de phénylméthyle

On mélange sous gaz inerte 5,50 g (13,7 mmoles) de cis-4-[(méthylsulfonyl)oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylate  
10 de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle) (décrit dans

J. Org. Chem. 1991, 56, 3009-3016), de formule brute  $C_{18}H_{25}NO_7S$  ( $M = 399,466$  g) et 110 ml de diméthylformamide puis ajoute 2,58 g de N-hydroxyphthalimide, puis 1,52 g  
15 d'hydrogénocarbonate de potassium.

On chauffe sous agitation à  $100^\circ C$  et on maintient le milieu réactionnel à cette température pendant 4 heures.

On refroidit à  $20^\circ C$ , on ajoute 220 ml d'eau et de glace, puis on extrait à l'éther isopropylique.

20 On sèche sur sulfate de magnésium, puis on évapore à sec sous pression réduite.

On chromatographie le résidu sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On recueille ainsi 3,06 g de trans-4-[(1,3-dihydro-  
25 1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle), de formule brute  $C_{25}H_{26}N_2O_7$  ( $M = 466,494$  g). Le rendement correspondant est de 47%.

On dissout 3,24 g (6,94 mmoles) du phthalimide obtenu  
30 comme précédemment dans 33 ml de dichlorométhane.

On ajoute 372  $\mu l$  d'hydrate d'hydrazine.

On agite encore pendant 2 heures 30 à  $20^\circ C$ .

On filtre le précipité formé, le rince au dichlorométhane, puis évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient 2,91 g de produit brut que l'on purifie  
5 par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10, puis 80/20 et 50/50.

On récupère ainsi au total 942 mg de trans-4-  
(aminooxy)-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-  
10 diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle), de formule brute  $C_{17}H_{24}N_2O_5$  ( $M = 336,39$  g). Le rendement correspondant est de 40%.

On mélange sous gaz inerte 853 mg du composé obtenu  
précédemment (2,53 mmoles) et 8,5 ml de dichlorométhane  
15 anhydre.

On refroidit vers 0-5°C, puis on ajoute 706  $\mu$ l de TEA et 588  $\mu$ l de chlorure de benzoyle.

On agite pendant 10 minutes à 0-5°C, puis on laisse  
réchauffer à 20°C et on laisse encore réagir pendant 30  
20 minutes.

On lave la phase organique avec une solution aqueuse  
d'acide tartrique à 10%, puis à l'eau. On décante et  
sèche la phase organique sur du sulfate de sodium, on  
évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,38 g de produit, que l'on mélange  
25 avec 25 ml de dichlorométhane. On refroidit vers 10-15 °C et on ajoute 123  $\mu$ l de d'hydrate d'hydrazine.

On laisse réagir en agitant à 20°C pendant deux  
heures et demie.

30 On évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,13 g de produit brut que l'on  
purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un  
mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 80/20.

On recueille 948 mg de trans-4-[(benzoylamino)oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(phénylméthyle), de formule brute  $C_{24}H_{28}N_2O_6$  (M = 440,50 g).

5 Le rendement global est donc de 85%.

On dissout sous agitation les 948 mg du composé obtenu précédemment dans 2 ml d'acétate d'éthyle.

On refroidit à 0-5°C, puis on ajoute en une fois 4,7 ml d'une solution d'environ 4,6 M de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'acétate d'éthyle.

Après 1 heure, le solvant est évaporé sous pression réduite et le produit est repris 3 fois à l'éther éthylique.

On évapore le solvant sous pression réduite. On obtient ainsi 842 mg de chlorhydrate de trans-4-[(benzoylamino)oxy]-2-pyrrolidinecarboxylate de phénylméthyle, sous la forme d'une mousse friable blanche de formule  $C_{19}H_{20}N_2O_4 \cdot HCl$  (M = 376,84 g).

Le rendement est quantitatif.

20 On dissout 47 mg (0,125 mmole) du chlorhydrate obtenu précédemment sous gaz inerte dans 0,5 ml de dichlorométhane. On ajoute 25,2  $\mu$ l de pyridine, puis on refroidit à 0-5°C et ajoute 9,5  $\mu$ l de diphosgène.

On laisse la température remonter à 20°C, dilue au dichlorométhane, puis lave le milieu réactionnel avec une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique puis avec de l'eau.

On décante la phase organique et on la sèche sur du sulfate de sodium. On évapore ensuite le solvant sous pression réduite.

30 On obtient ainsi 43,8 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On recueille 34,9 mg de trans-4-[(benzoylamino)oxy]-1-(chlorocarbonyl)-2-pyrrolidinecarboxylate de phénylméthyle, de formule brute  $C_{20}H_{19}ClN_2O_5$  ( $M = 402,83$  g).

5 Le rendement correspondant est de 69%.

On dissout 13 mg (0,032 mmole) du composé obtenu précédemment dans 4 ml de toluène.

On ajoute 9  $\mu$ l de TEA et 7,8 mg de DMAP.

On chauffe à 100°C pendant une nuit.

10 On évapore le solvant sous pression réduite puis on purifie le résidu par chromatographie en éluant par du dichlorométhane.

On récupère ainsi 4,3 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{20}H_{18}N_2O_5$  ( $M = 336,37$  g). Le rendement correspondant est de 40%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,97 (ddd) et 2,85 (ddd): N-O-CH- $\underline{CH_2}$ -CH; 3,80 (dd) et 4,14 (dd): N-O-CH- $\underline{CH_2}$ -N; 4,75 (dd): N- $\underline{CH}$ -CH<sub>2</sub>; 4,93 (t): N-O- $\underline{CH}$ -CH<sub>2</sub>; 5,04 et 5,31 [AB]: O- $\underline{CH_2}$ -C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>; 7,77: et 7,25 à 7,50 (m) CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> et OC-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.

IR ( $CHCl_3$ ): 1735; 1612, 1575, 1496  $cm^{-1}$

#### 25 Exemple 24

3-benzoyl-1,3-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-one

Sous atmosphère d'azote, on dissout 2,4 g (10 mmoles) de chlorhydrate de N-(4-pipéridinyl)-benzamide (décrit dans J. Med. Chem. EN. 17(1974), 736-739), de 30 formule brute  $C_{12}H_{16}N_2O$  dans 30 ml de dichlorométhane.

On refroidit à 0°C, on ajoute sous agitation 2,8 ml de TEA et 0,66 ml de diphosgène.

Après quelques minutes, on dilue avec du dichlorométhane, puis on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec de l'eau. On décante la phase organique, on la sèche sur du sulfate de magnésium et on évapore le solvant sous pression réduite. On purifie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On obtient 1,62 g de chlorure de l'acide 4-(benzoylamino)-1-pipéridinecarboxylique, de formule brute  $C_{13}H_{15}ClN_2O_5$  (M = 266,5 g). Le rendement correspondant est de 61%.

Sous atmosphère d'azote on dissout 1,21 g (48 mmoles) du composé obtenu précédemment dans 37 ml de tétrahydrofuranne.

On refroidit la solution à  $-78^{\circ}C$ , puis on ajoute goutte à goutte, 5 ml d'une solution de bis(triméthylsilyl)amidure de lithium 1M dans le tétrahydrofuranne.

On maintient à  $-78^{\circ}C$  pendant 15 minutes puis on laisse la température remonter jusqu'à la température ambiante et on laisse réagir encore pendant une heure.

On refroidit la solution à  $0^{\circ}C$ , on ajoute 720  $\mu l$  d'acide acétique. Il se forme un précipité. On dilue par de l'acétate d'éthyle puis on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10% et avec une solution de tampon phosphate à pH = 7,0.

On décante la phase organique et on la sèche sur du sulfate de magnésium. On filtre, puis on évapore le solvant sous pression réduite. Le produit brut est purifié par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange de dichlorométhane et d'acétate d'éthyle 90/10.



On obtient ainsi 0,214 g du composé attendu, de formule  $C_{18}H_{14}N_2O_2$  ( $M = 230$  g) cristallisé dans l'éther éthylique.

Le rendement correspondant est de 20%.

5 Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,71 à 2,02 (m):  $(CH_2)_2-CHN$ ; 3,14 (t):  $N-(CH_2)_2$ ; 4,84 (m):  $(CH_2)_2-CHN$ ; 7,39 à 7,65 (m):  $C_6H_5$ .

10 IR (CHCl<sub>3</sub>): 1735, 1682; 1618, 1602, 1582; 1488  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif) m/z:  $[2M + Na]^+ = 483$ ;  $[M+Na + CH_3CN]^+ = 294$ ;  $[M+Na]^+ = 253$

Exemple 25

15 trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de diphenylméthyle

On mélange sous atmosphère inerte 15 ml de dichlorométhane et 197 mg (0,633 mmole) de trans-5-hydroxy-2-pipéridinecarboxylate de diphenylméthyle  
20 (décrit dans Rec. Trav. Chim. (1959), 78, 648-658), de formule brute  $C_{19}H_{21}NO_3$ .

On refroidit à 0°C, puis on additionne successivement

42  $\mu$ l de diphosgène, 177  $\mu$ l de TEA puis 77 mg de DMAP. On  
25 laisse réagir 4 heures à température ambiante.

On lave ensuite le mélange réactionnel avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10 %, puis avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

On rénit les phases organiques et on les sèche sur  
30 du sulfate de magnésium, on évapore le solvant sous pression réduite et obtient ainsi 195 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec du dichlorométhane contenant 0,1% d'eau.

On recueille une huile qui cristallise dans un mélange pentane/éther éthylique.

On récupère ainsi 108 mg du composé attendu sous forme de cristaux blancs correspondant à la formule brute  
5  $C_{20}H_{19}NO_4$  ( $M = 337,338$  g).

Le rendement correspondant est de 51%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 400 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

10 1,86 (m) et 2,03 (m):  $N-CH-CH_2-\underline{CH_2}-CO$ ; 2,27 (m):  $N-CH-\underline{CH_2}-CH_2-CO$ ; 3,07 (d) et 3,29 (m):  $N-\underline{CH_2}-CHO$ ; 4,31 (dd):  $N-\underline{CH}-CH_2$ ; 4,73 (m):  $N-\underline{CH_2}-CHO$ ; 6,93 (s):  $CO_2-\underline{CH}-(C_6H_5)_2$ ; 7,27 à 7,41 (m):  $CH(C_6H_5)_2$ ;

IR ( $CHCl_3$ ): 1788, 1736; 1496  $cm^{-1}$ ;

15 SM (SIMS)  $m/z$ :  $[M+Na]^+ = 360$ ,  $[M+li]^+ = 344$ ;  $[M]^+ = 337$ , 167

#### Exemple 26a

trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate  
20 de (4-nitrophényl)méthyle

On mélange sous atmosphère inerte 66 ml de dichlorométhane et 1 g (3,56 mmole) de trans-5-hydroxy-2-pipéridinecarboxylate de (4-nitrophényl)méthyle de formule brute  $C_{13}H_{16}N_2O_5$  ( $M = 280,282$  g).

25 On refroidit à  $0^\circ C$ , et on ajoute 0,24 ml de diphosgène. On laisse réagir en agitant pendant 10 minutes à  $0^\circ C$ , puis on laisse réchauffer jusqu'à la température ambiante. On évapore le solvant sous pression réduite.

30 On dissout le résidu dans 66 ml de toluène et on ajoute 0,99 ml de TEA.

On plonge le ballon dans un bain d'huile à 110°C et on l'y maintient pendant 15 minutes. On laisse ensuite revenir à la température ambiante.

On lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium puis évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 0,885 g de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange toluène/acétate d'éthyle 85/15.

On recueille ainsi 0,184 g du composé attendu, de formule brute  $C_{14}H_{14}N_2O_6$  ( $M = 306,276$  g) sous la forme d'une huile jaune.

Le rendement correspondant est de 17%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 400 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,92 (m) et 2,07 (m):  $N-CH-CH_2-\underline{CH_2}-CO$ ; 2,22 (m) et 2,30 (m):  $N-CH-\underline{CH_2}-CH_2-CO$ ; 3,17 (d) et 3,35 (dm):  $N-\underline{CH_2}-CHO$ ; 4,28 (dd):  $N-\underline{CH}-CH_2$ ; 4,79 (m):  $N-CH_2-\underline{CHO}$ ; 5,33 [AB]:  $CO_2-\underline{CH_2}-C_6H_4NO_2$ ; 7,56 et 8,25 [AA'BB']:  $CH_2-C_6H_4-NO_2$

IR ( $CHCl_3$ ): 1791, 1745; 1609, 1526, 1495  $cm^{-1}$ ;

SM (EI) m/z:  $[M]^+ = 306, 262, 136, 126, 82, 55$

#### Exemple 26b

Acide trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1.]octane-2 carboxylique

On mélange 140 mg (0,457 mmole) de l'ester obtenu à l'exemple 26a, 7 ml d'acétone et 28 mg de catalyseur Pd/C à 20% en poids.

On laisse ensuite réagir en agitant pendant 25 minutes sous atmosphère d'hydrogène à pression normale.

On filtre le catalyseur et on évapore ensuite le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 137 mg du composé attendu, de formule brute  $C_7H_9NO_4$  ( $M = 171,152$  g), sous la forme d'une huile, en mélange avec une mole de p-toluidine.

Le rendement correspondant est de 97%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 400 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

10 1,84 (m) et 1,95 à 2,05 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CO; 3,13 (d) et 3,24 (dd): N-CH<sub>2</sub>-CHO; 4,02 (dd): N-CH-CH<sub>2</sub>; 4,81 (dm): N-CH<sub>2</sub>-CHO.

#### Exemple 26c

15 trans-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de méthyle

On dissout 17,25 mg (0,1 mmole) de l'acide obtenu à l'exemple 26b dans 3 ml de dichlorométhane.

20 On traite par un excès de diazométhane en solution dans le dichlorométhane, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 30 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange toluène/acétate d'éthyle 90/10.

25 On recueille 6,7 mg du composé attendu ( $M = 485,187$  g).

Le rendement correspondant est de 36%.

#### Exemple 27

30 cis-7-oxo-6-oxa-1-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de (4-nitrophényl)méthyle

Sous atmosphère d'azote, on introduit 0,802 g (2,034 mmoles) de trifluoroacétate de cis-5-hydroxy-2-

pipéridine-carboxylate de (4-nitrophényl)méthyle (décrit dans Rec. Trav. Chim. (1959), 78, 648-658), de formule brute  $C_{13}H_{16}N_2O_5, CF_3CO_2H$  ( $M = 394,303$  g) dans 40 ml de dichlorométhane et on refroidit à  $0^\circ C$ . On ajoute 0,135 ml de diphosgène. On agite pendant 15 minutes à  $0^\circ C$ , on laisse remonter la température jusqu'à la température ambiante et on continue l'agitation pendant 35 minutes.

On évapore le solvant sous pression réduite.

On dissout ce produit dans 40 ml de toluène et 1,1 ml de triéthylamine. On porte le mélange réactionnel à  $100^\circ C$  pendant 35 minutes, puis on laisse refroidir jusqu'à la température ambiante.

On lave à l'eau puis avec une solution de tampon phosphate à  $pH = 7$ .

On sèche la phase organique sur du sulfate de sodium et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 0,56 g d'un produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétone 95/5.

On recueille ainsi 110 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{14}H_{14}N_2O_6$ , ( $M = 306,275$  g), sous la forme d'une huile.

Le rendement correspondant est de 17%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,80 à 1,94 et 2,10 à 2,45:  $N-CH-CH_2-CH_2-CO$ ; 3,07 (d), 3,04 (dm) et 3,86 (dd):  $CH-N-CH_2$ ; 4,80 (t):  $O=C-O-CH$ ; 5,28 et 5,43 [AB]:  $O=C-O-CH_2-C_6H_5$ ; 7,61 et 8,24 [AA'BB']  $C_6H_4NO_2$ .

IR ( $CHCl_3$ ): 1801, 1794, 1745, 1704; 1609, 1525, 1498  $cm^{-1}$ .

SM (EI) m/z:  $[M]^+$  = 306, 262, 136, 126, 83, 55

Exemple 28a

Sel de 1-propényltriphénylphosphonium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle

5 Stade A

cis-5-hydroxy-1-(trifluoroacétyl-2-pipéridinecarboxylate de phénylméthyle

On dissout sous atmosphère inerte 6,19 g (22,77 mmoles) de chlorhydrate de 5-hydroxy-2-  
10 pipéridinecarboxylate de phénylméthyle, de formule brute  $C_{13}H_{18}ClNO_3$  (M = 271,746 g) (décrit dans Rec. Trav. Chim. (1959), 78, 648-658) dans 80 ml de dichlorométhane anhydre.

On refroidit à 5°C et on ajoute 9,5 ml de TEA puis,  
15 goutte à goutte 6,46 ml d'anhydride trifluoroacétique.

On laisse réagir sous agitation à 5°C pendant une heure, puis dilue avec du dichlorométhane, on lave successivement avec une solution d'acide tartrique à 10%, une solution aqueuse de tampon phosphate à pH=7 et une  
20 solution aqueuse de chlorure de sodium.

On décante la phase organique et on la sèche sur du sulfate de magnésium. Puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 10 g d'une huile rouge que l'on  
25 dissout dans 100 ml de méthanol. On refroidit vers 10°C, et on ajoute lentement, 20°C maximum, 6,8 g (78 mmoles) d'hydrogénocarbonate de sodium en solution dans 100 ml d'eau.

On laisse réagir sous agitation à 20°C pendant 30  
30 minutes, on extrait au dichlorométhane.

On décante la phase organique, la lave avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium et on la sèche sur du sulfate de magnésium.

On évapore le solvant sous pression réduite et recueille ainsi 7,6 g d'une huile orange que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5.

5 On récupère ainsi 6 g de composé attendu de formule brute  $C_{15}H_{16}F_3NO_4$  ( $M = 331,294$  g). Le rendement correspondant est de 68%.

Stade B trans-5-[(2-propényloxy)amino]-1-(trifluoroacétyl)-2-pipéridinecarboxylate de  
10 phénylméthyle,

On introduit 1,74 g (5,26 mmoles) de l'alcool obtenu précédemment dans 29 ml d'acétonitrile. On refroidit à -40°C et on ajoute à cette température 0,61 ml de 2,6-lutidine ( $C_5H_3N(CH_3)_2$ ) puis 0,91 ml d'anhydride trifluoro  
15 méthanesulfonique.

On laisse réagir sous agitation pendant 30 minutes à -40°C. On ajoute ensuite, toujours à -40°C, en une minute, 0,7 ml (10,52 mmoles) de O-allyl-hydroxylamine.

On laisse revenir à 0°C puis on rajoute ensuite 0,61  
20 ml de 2,6 lutidine et on laisse réagir toute la nuit (15 heures), à environ 5°C, puis encore 2 heures à 20°C.

On dilue ensuite au dichlorométhane, on lave avec un solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium, puis avec un solution aqueuse d'acide tartrique à 10% et avec  
25 une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

On décante la phase organique, on la sèche sur du sulfate de magnésium et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 2,1 g d'une huile jaune que l'on  
30 purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange toluène/acétate d'éthyle 90/10.

On recueille 1,23 g de composé attendu de formule brute  $C_{18}H_{21}F_3N_2O_4$  ( $M = 386,374$  g).

Le rendement correspondant est de 61%.

Stade C

trans-5- [(2-propényloxy)amino] -2-pipéridinecarboxylate  
de phénylméthyle

5 On dissout sous atmosphère inerte, 1,41 g (3,65  
mmoles) du composé obtenu précédemment dans 25 de  
méthanol anhydre.

On refroidit à 0-5°C, puis on fait 3 additions,  
espacées de 45 minutes, de 145 mg de NaBH<sub>4</sub>.

10 Le milieu réactionnel est ensuite acidifié à pH = 2  
par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 N  
préalablement refroidie à 5°C.

On extrait à l'acétate d'éthyle.

15 On refroidit à 5°C la phase aqueuse, on ajoute 100  
ml d'acétate d'éthyle, et on traite avec une solution  
saturée de carbonate de sodium jusqu'à obtenir un pH de  
8,5 à 9.

20 On extrait ensuite l'amine à l'acétate d'éthyle. La  
phase organique est lavée par une solution aqueuse  
saturée de chlorure de sodium, puis séchée sur du sulfate  
de magnésium et concentrée par évaporation du solvant  
sous pression réduite.

On obtient ainsi 0,628 g de produit attendu de  
formule brute C<sub>16</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (M = 290,364 g).

25 Le rendement correspondant est de 59%.

Stade D

trans-7-oxo-6-(2-propényloxy)-1,6-  
diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle

30 On dissout sous atmosphère inerte 103 mg (0,35  
mmoles) de l'amine obtenue précédemment dans 35 ml de  
dichlorométhane anhydre.



On refroidit la solution vers 0-5°C, et on ajoute goutte à goutte, à cette température, 0,1 ml de TEA, puis 21 µl de diphosgène.

5 On laisse réagir sous agitation pendant 15 minutes à 0-5°C, puis laisse la température remonter jusqu'à 20°C, et ajoute 42 mg de DMAP. On continue d'agiter à 20°C pendant environ 5 heures.

On dilue au dichlorométhane, on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis à l'eau.

10 On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium et on concentre par évaporation du solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 70 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur 5 g de silice, en éluant 15 avec un mélange dichlorométhane/méthanol 98/2.

On recueille 48 mg de produit attendu de formule  $C_{17}H_{20}N_2O_4$  (M = 316,36 g).

Le rendement correspondant est de 43%.

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1750; 1642 ; 1600, 1496 cm<sup>-1</sup>.

20 SM (électrospray positif) m/z: [M + Na + CH<sub>3</sub>CN]<sup>+</sup> = 380; [M + Na]<sup>+</sup> = 339; [M + H]<sup>+</sup> = 317.

Stade E Sel de 1-propényltriphénylphosphonium de trans-7-oxo-6-(sulfoxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle

25 On dissout sous atmosphère inerte 202 mg (0,638 mmoles) du composé obtenu au stade D dans 5,5 ml de dichlorométhane anhydre.

A la solution obtenue, on ajoute à 20°C, 73 µl d'acide acétique, puis 369 mg de Pd(P(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.

30 Après 30 minutes d'agitation à la température ambiante, on traite la N-hydroxy-urée, formée par 5,5 ml de pyridine et 358 mg du complexe SO<sub>3</sub>-pyridine.

On laisse réagir sous agitation pendant 18 heures à

20°C, puis concentre le milieu réactionnel par évaporation du solvant sous pression réduite.

On reprend avec 50 ml de dichlorométhane et on lave à l'eau. On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium et on évapore le dichlorométhane sous pression réduite.

On obtient ainsi 650 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétone 60/40 contenant 0,1% en volume de TEA.

On recueille ainsi 280 mg du sel de phosphonium de composé attendu, de formule brute  $C_{35}H_{35}N_2O_7PS$  ( $M = 646,705$  g).

Le rendement correspondant est de 68%.

15 Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

2,05 (m), 2,22 (dm) et 2,33 (m):  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 2,95 (d) et 3,30 (dt);  $O=C-N-CH_2$ ; 4,10 (m) et 4,32 (m):  $O=C-N-CH$  et  $O=C-N-CH_2-CH$ ; 5,12 (s):  $COO-CH_2-C_6H_5$ ; 7,36:  $C_6H_5$  et 2,30 (m):  $CH_3-CH=CH$ ; 6,65 et 7,20  $CH_3-CH=CH$ ; 7,65-7,85  $P(C_6H_5)_3$ .

IR ( $CHCl_3$ ): 1746; 1638, 1605, 1587, 1495  $cm^{-1}$ .

25 SM (électrospray négatif et positif)  $m/z$ :  $[Manion]^- = 355$ ;  $[Mcation]^+ = 303$ .

Exemple 28b

Sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylate de phénylméthyle

30 On dissout 236 mg (0,364 mmoles) du sel de phosphonium obtenu au stade E de l'exemple 28a dans 0,8 ml de tétrahydrofurane et 4 gouttes d'eau.

On fait passer la solution obtenue sur une colonne de résine DOWEX 50WX8 sous forme Na<sup>+</sup>, en éluant avec de l'eau.

Après lyophilisation, on obtient 127 mg du sel de sodium attendu, de formule brute C<sub>14</sub>H<sub>15</sub>N<sub>2</sub>O<sub>7</sub>SNa (M = 378,339 g).

Le rendement correspondant est de 92%.

Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,65 à 2,02: N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 2,91 (d) et 3,04 (dt): O=C-N-CH<sub>2</sub>; 4,00 à 4,05: O=C-N-CH et O=C-N-CH<sub>2</sub>-CH; 5,20 [AB]: COO-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>; 7,39 (m): C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.

IR (Nujol): 1744 ; 1495 cm<sup>-1</sup>.

SM (électrospray négatif) m/z; [M]<sup>-</sup> = 355.

Exemple 28c

trans-7-oxo-6-[(phenylsulfonyl)oxy]-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylate de phénylméthyle

On dissout 48 mg (0,152 mmoles) du dérivé obtenu au stade D de l'exemple 28a dans 1,2 ml de dichlorométhane.

On y ajoute à 20°C, 26 µl d'acide acétique puis 88 mg de Pd (PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub> et laisse réagir pendant 2h à 20° sous agitation.

On dilue par addition de toluène et on évapore les solvants sous pression réduite.

Au produit brut obtenu, on ajoute 1,5 ml de dichlorométhane, 25 µl de pyridine et 24 µl de chlorure de benzènesulfonyle.

On laisse réagir à 20°C sous agitation pendant 1 heure puis on rajoute 12,5 µl de pyridine et 10 µl de chlorure de benzènesulfonyle.

On agite pendant 15 minutes à 20°C et on dilue avec du dichlorométhane.

On lave ensuite successivement avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, une solution de tampon phosphate à pH= 7 et avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

On sèche la phase aqueuse sur sulfate de magnésium, et évapore le solvant sous pression réduite. On obtient 180 mg d'une huile jaune que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant un mélange dichlorométhane/éther de méthyle et de t-butyle 95/5.

On recueille ainsi 20 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{20}H_{20}N_2O_6S$  ( $M = 416,456$  g). Le rendement correspondant est de 31%.

#### 15 Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,83 (m) et 2,00 à 2,25 (m):  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 3,02 (d) et 3,16 (dm):  $O=C-N-CH_2$ ; 4,04 (m) et 4,11 (dd):  $O=C-N-CH$  et  $O=C-N-CH_2-CH$ ; 5,21 (s):  $COO-CH_2-C_6H_5$ ; 7,34 (m):  $C_6H_5$ ; 7,56 (m), 7,70 (m) et 8,03 (m):  $O_2S-C_6H_5$ .

IR ( $CHCl_3$ ): 1780, 1738; 1600, 1585, 1498; 1386, 1193  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif)  $m/z$ :  $[2M + Na]^+ = 855$ ;  $[M + Na + CH_3CH]^+ = 480$ ;  $[M+Na]^+ = 439$ ;  $[MH]^+ = 417$ .

25

#### Exemple 28d

trans-7-oxo-6-[(2-thiénylsulfonyl)oxy]-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylate de phéylméthyle

En partant de 100 mg (0,316 mmoles) du composé obtenu au stade D de l'exemple 28a, on procède de manière similaire à ce qui vient d'être décrit, sauf qu'au lieu d'utiliser du chlorure de benzènesulfonyle, on utilise du chlorure de 2 thiényl sulfonyle.

On recueille ainsi 8 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{18}H_{18}N_2O_6S_2$  ( $M = 422,481$  g). Le rendement correspondant est de 30%.

Spectre RMN du proton

5 Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,84 (m) et 2,10 à 2,25:  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 3,02 (d) et 3,24 (dt):  $O=C-N-CH_2$ ; 4,06 (m):  $O=C-N-CH_2-CH$ ; 4,14 (dd):  $O=C-N-CH$ ; 5,22 (s):  $COO-CH_2-C_6H_5$ ; 7,17 (dd):  $SO_3-C-S-CH=CH$ ; 10 7,35 (sl):  $C_6H_5$ ; 7,80 (dd):  $SO_3-C=CH$ ; 7,87 (m):  $SO_3-C-S-CH$ .

IR ( $CHCl_3$ ): 1780, 1739; 1600, 1503, 1495  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif)  $m/z$ :  $[M + Na + CH_3CN]^+ = 867$ ;  $[2M + Na]^+ = 445$ ; 339, 298, 91.

15

Exemple 28e

trans-6-(2-hydroxy-2-oxoéthoxy)-7-oxo-1,6-diazabicyclo [3.2.1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle

20 Stade A trans-7-oxo-6-[2-oxo-2-(2-propényloxy)éthoxy]-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle

On dissout sous atmosphère inerte 48 mg (0,15 mmoles) du composé obtenu au stade D de l'exemple 28a dans 1,5 ml de dichlorométhane anhydre.

25 On ajoute à 20°C 18  $\mu$ l d'acide acétique puis 88 mg de  $Pd(P(C_6H_5)_3)_4$  et laisse sous agitation pendant 1 heure à 20°C.

On filtre sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/éther de t-butyle et de méthyle 7/3.

30 On évapore le solvant sous pression réduite et obtient 70 mg d'hydroxy urée que l'on reprend avec 2 ml de dichlorométhane, puis on ajoute 85  $\mu$ l de TEA et 64  $\mu$ l de bromo-acétate d'allyle.

On agite à 20°C pendant 3 heures et demie.

On lave successivement avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, une solution aqueuse de tampon phosphate à pH= 7, et de l'eau.

5 On sèche la phase organique et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 60 mg de produit brut que l'on chromatographie sur silice en éluant au mélange dichlorométhane/éther de t-butyle et de méthyle 90/10 contenant 0,1% de TEA.

10 On recueille 22 mg de formule brute  $C_{19}H_{22}N_2O_6$ , (M = 374,396 g). Le rendement correspondant est de 39%.

#### Stade B

15 trans-6-(2-hydroxy-2-oxoethoxy)-7-oxo-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylate de phénylméthyle

On dissout sous atmosphère inerte 22 mg (0,0587 mmoles) du composé obtenu précédemment dans 1 ml de dichlorométhane anhydre.

20 On ajoute à 20°C 10  $\mu$ l d'acide acétique et 34 mg de  $Pd(P(C_6H_5)_3)_4$  et laisse réagir sous agitation à 20°C pendant 30 minutes.

On concentre le milieu réactionnel et on reprend au toluène pour éliminer l'acide acétique.

25 On obtient ainsi 49 mg de produit brut auquel on ajoute 2 ml de tampon phosphate de pH 7, puis on lave 2 fois avec 1 ml de dichlorométhane.

On évapore le solvant et obtient 46 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant d'abord avec un mélange dichlorométhane/éther de t-butyle et de méthyle 90/10 puis avec un mélange dichlorométhane/éthanol 60/40.

On obtient ainsi 4,5 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{37}H_{37}N_2O_6P$  ( $M = 636,691$  g). Le rendement correspondant est de 12%.

5 Exemple 29a

trans-6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de (4-nitrophényl) méthyle

Stade A

10 cis-5-(methylsulfonyl)oxy-1,2-pipéridinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-[(4-nitrophényl)méthyle]

On dissout sous atmosphère inerte dans 112 ml de dichlorométhane, 11,25 g (29,5 mmoles) de cis-5-hydroxy-1,2-pipéridinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-[(4-nitrophényl)méthyle] (décrit dans Rec.Trav.Chim. 15 (1959), 78, 648-658), de formule brute  $C_{18}H_{24}N_2O_7$  ( $M = 380,398$  g).

On refroidit à  $0-5^{\circ}C$ , puis on introduit successivement, 5 ml de TEA puis 2,44 ml de chlorure de méthanesulfonyle.

20 On laisse la température revenir à  $20^{\circ}C$  sous agitation et on laisse réagir ainsi pendant 1 heure. On dilue ensuite au dichlorométhane, lave à deux reprises à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, et évapore le solvant sous pression réduite.

25 On obtient ainsi 16 g d'une huile brute que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec du dichlorométhane contenant 2% d'acétate d'éthyle.

30 On recueille 9,14 g de produit attendu de formule brute  $C_{19}H_{26}N_2O_9S$  ( $M = 458,491$  g). Le rendement correspondant est de 67%.

Stade B trans-5-azido-1,2-pipéridinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-[(4-nitrophényl)méthyle]

On dissout sous atmosphère inerte 11,1 g (24,2 mmoles) du mésylate obtenu précédemment dans 111 ml de diméthylformamide.

On ajoute ensuite 1,73 g d'azoture de sodium  $\text{NaN}_3$ .

5 On chauffe sous agitation à  $80^\circ\text{C}$  et on maintient à cette température pendant 18 heures. On laisse revenir à  $20^\circ\text{C}$ , puis on évapore le diméthylformamide sous pression réduite jusqu'à obtenir un faible volume, puis on dilue à l'acétate d'éthyle et on lave avec une solution de soude  
10 2 N, puis avec de l'eau. On sèche sur du sulfate de magnésium, puis on évapore les solvants sous pression réduite.

L'huile brute obtenue est purifiée par chromatographie sur silice en éluant avec du  
15 dichlorométhane contenant 2% d'acétate d'éthyle.

On obtient ainsi 7,34 g de composé attendu, de formule brute  $\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{N}_5\text{O}_6$  ( $M = 405,413$  g) sous forme d'une huile jaune qui cristallise.

Le rendement correspondant est de 75%.

20 Stade C

trans-5-amino-1,2-pipéridinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyl-éthyle) et de 2-[(4-nitrophényl)méthyle]

On introduit les 7,34 g (18,1 mmoles) d'azide obtenu précédemment dans 150 ml de tétrahydrofuranne et 30 ml  
25 d'eau.

On ajoute 7,2 g de triphénylphosphine, puis on laisse réagir sous agitation à  $20^\circ\text{C}$  pendant une nuit.

On évapore ensuite le solvant sous pression réduite et on effectue deux entraînements à l'acétate d'éthyle.

30 On obtient ainsi un extrait sec que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec du dichlorométhane contenant 5% de méthanol.



On recueille 5,62 g de composé attendu, de formule brute  $C_{18}H_{25}N_3O_6$  ( $M = 379,416$  g). Le rendement correspondant est de 82%.

Stade D

5 trans-5-(benzoylamino)-1,2-pipéridinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-[(4-nitrophényl)méthyle]

On dissout 700 mg (1,84 mmole) de l'amine obtenue précédemment dans 8 ml de dichlorométhane.

On refroidit à  $0^{\circ}C$ , puis on introduit 257  $\mu$ l de TEA  
10 puis 214  $\mu$ l de chlorure de benzoyle.

On laisse la température revenir à  $20^{\circ}C$ .

Après 40 minutes de réaction, on dilue au dichlorométhane, on lave avec une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium, puis à l'eau.

15 On sèche sur du sulfate de sodium, on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 867 mg de composé attendu, de formule brute  $C_{25}H_{29}N_3O_7$  ( $M = 483,525$  g). Le rendement correspondant est de 97 %.

20

Stade E

chlorhydrate de trans - 5 - (benzoylamino) - 2 - pipéridine carboxylate de (4-nitrophényl) méthyle

On mélange 861 mg (8 mmole) de l'amide obtenu  
25 précédemment, 9 ml de méthanol, et 2,3 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène gazeux à 8 mol/l dans le méthanol.

On laisse la température revenir à  $20^{\circ}C$  et on laisse réagir pendant 3 heures. On rajoute ensuite 1,15 ml de  
30 solution de chlorure d'hydrogène dans le méthanol.

On agite pendant 20 minutes à  $20^{\circ}C$ , puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On effectue ensuite deux entraînements au dichlorométhane, puis deux entraînements à l'éther éthylique.

Le produit cristallise dans l'éther éthylique.

5 On obtient ainsi 715 mg de composé attendu de formule brute  $C_{20}H_{22}ClN_3O_5$  ( $M = 419,967$  g).

Le rendement correspondant est de 96%.

#### Stade F

trans-5-(benzoylamino)-1-(chlorocarbonyl)-2-pipéridine  
10 carboxylate de (4-nitrophényl)méthyle

On mélange 1,08 g (2,58 mmole) du chlorhydrate obtenu comme précédemment et 11 ml de dichlorométhane.

On refroidit la suspension obtenue vers 0-5°C et on ajoute 791  $\mu$ l de TEA, puis à la solution obtenue, on  
15 ajoute ensuite 161  $\mu$ l de diphosgène.

On agite pendant 5 minutes à 0-5°C, puis on laisse revenir à 20°C, et on laisse sous agitation pendant encore 30 minutes.

On dilue ensuite au dichlorométhane, on lave avec  
20 une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis à l'eau.

On sèche sur sulfate de sodium et on évapore le solvant sous pression réduite.

Le produit brut est purifié par chromatographie sur  
25 silice en éluant au dichlorométhane contenant 5% d'acétone.

On recueille 969 mg de composé attendu de formule brute  $C_{21}H_{20}ClN_3O_6$  ( $M = 445,862$  g).

Le rendement correspondant est de 84%.

#### 30 Stade G

trans-6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-  
carboxylate de (4-nitro-phényl) méthyle

On mélange sous gaz inerte 928 mg (2,08 mmoles) du composé obtenu précédemment et 27 ml de tétrahydrofuranne.

La solution obtenue est refroidie à  $-78^{\circ}\text{C}$  sous agitation, puis on introduit 2,1 ml de d'une solution de bis(triméthylsilyl)amidure de lithium 1M dans le tétrahydrofuranne.

On laisse sous agitation pendant 10 minutes à  $-78^{\circ}\text{C}$  puis ajoute 130  $\mu\text{l}$  d'acide acétique et agite en laissant la température remonter à  $15^{\circ}\text{C}$ .

On dilue à l'acétate d'éthyle puis on lave successivement avec une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique, avec une solution de tampon phosphate à  $\text{pH}=7$  et à l'eau.

On sèche sur sulfate de magnésium et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,6 g d'un extrait sec que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant au mélange dichlorométhane/acétone 98/2.

Le produit est ensuite cristallisé dans l'éther éthylique pour donner 204 mg du composé attendu, de formule brute  $\text{C}_{21}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{O}_6$  ( $M = 409,441$  g).

Le rendement correspondant est de 24 %.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,98 (m), 2,22 (m) et 2,40 (m):  $\text{N-CH-CH}_2\text{-CH}_2$ ; 3,08 (d) et 3,42 (dt):  $\text{O=C-N-CH}_2$ ; 4,23 (dd):  $\text{O=C-N-CH}$ ; 4,53 (m):  $\text{O=C-N-CH}_2\text{-CH}$ ; 5,34 [AB]:  $\text{COO-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_5$ ; 7,69 (m): 8,25 (m): 7,44 (m) et 7,56 (m):  $\text{C}_6\text{H}_5$  et  $\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$ .

IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1763, 1744, 1676; 1609, 1603, 1583, 1526, 1492  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (EI)  $m/z$ :  $[\text{M}]^+ = 409, 304, 273, 201, 105, 77$ .

Exemple 29b

Acide trans-6-benzoyl-7-oxo-1,6-  
diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylique

5 On mélange 89 mg de l'ester obtenu à l'exemple 29a, 4 ml d'acétone et 6 mg de catalyseur Pd/C à 10%.

On laisse réagir sous agitation, à 20°C et sous atmosphère d'hydrogène pendant 2 heures 45 minutes, puis on filtre le catalyseur et évapore le filtrat sous  
10 pression réduite.

On obtient ainsi 88 mg d'une résine que l'on cristallise dans 0,5 ml d'éther éthylique.

On obtient ainsi 54 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{14}H_{14}N_2O_4$  ( $M = 274,278$  g). Le rendement  
15 correspondant est de 91%.

Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 250 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,96 (m), 2,10 (m) et 2,37 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 3,13  
20 (d) et 3,41 (dm): O=C-N-CH<sub>2</sub>; 4,10 (dl): O=C-N-CH; 4,52  
(m): O=C-N-CH<sub>2</sub>-CH; 7,44 (m): 7,56 (tt) et 7,69 (dd)  $C_6H_5$ .

SM (EI) m/z:  $M^+$  = 274, 229, 169, 105, 77.

Exemple 29c

25 trans-6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de méthyle

On ajoute à 28 mg (0,102 mmole) l'acide obtenu à l'exemple 29b, sous agitation, 2 ml d'une solution de diazométhane à 12,7 g/l dans le dichlorométhane.

30 On évapore le solvant sous pression réduite et on purifie le résidu par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle 98/2.

100

On recueille 18,4 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{15}H_{16}N_2O_4$  ( $M = 288,305$  g). Le rendement correspondant est de 63%.

Spectre RMN du proton

5 Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,90 à 2,42: N-CH- $\underline{CH_2}$ - $\underline{CH_2}$ ; 3,12 (d) et 3,44 (dt): O=C-N- $\underline{CH_2}$ ; 3,83 (s):  $CH_3$ ; 4,17 (dl): O=C-N-CH; 4,54 (m): O=C-N- $\underline{CH_2}$ - $\underline{CH}$ ; 7,44 (t), 7,56 (t) et 7,69 (d):  $C_6H_5$ .

10 SM (EI) m/z:  $[M]^+$  = 288, 229, 183, 155, 105, 77.

Exemple 29d

trans-6-benzoyl-7-oxo-N-(phénylméthyl)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxamide

15 On mélange 30 mg (0,109 mmole) de l'acide trans-6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylique obtenu à l'exemple 29b, 0,5 ml de dichlorométhane, 23 mg de EDCI et 13  $\mu$ l de benzylamine.

On laisse réagir pendant 30 minutes sous agitation.

20 On dilue ensuite par du dichlorométhane, on lave avec une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique, on décante, et on sèche la phase organique sur sulfate de sodium.

On évapore le solvant sous pression réduite pour obtenir un produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétone 98/2.

On obtient ainsi 19,5 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{21}H_{21}N_3O_3$  ( $M = 363,419$  g). Le rendement correspondant est de 49%.

30 Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

101

1,97 (m), 2,34 (m) et 2,59 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 2,90 (d), 3,33 (m), 3,99 (dl) et 4,50 (m): O=C-N-CH, O=C-N-CH<sub>2</sub>-CH, O=C-N-CH<sub>2</sub>, CO-NH-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>; 6,94 (tl): NH; 7,24 à 7,58 (m) et 7,68 (m): C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CO et C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH<sub>2</sub>.

5 IR (CHCl<sub>3</sub>): 3411, 1763, 1680; 1603, 1583, 1519, 1498 cm<sup>-1</sup>.

Exemple 29e

6-benzoyl-N-[methyl (phénylméthyl)]-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide

10 On procède de manière analogue à l'exemple 29d en partant de 50 mg (0,182 mmole) de l'acide obtenu à l'exemple 29b et 45 µl de N-méthyl-benzylamine.

On recueille ainsi 12 mg du composé attendu, de formule brute C<sub>22</sub>H<sub>23</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub> (M = 377,45 g). Le rendement correspondant est de 17%.

15 SM (EI) m/z: [M]<sup>+</sup> = 377, 272, 105.

Exemple 29f

20 6-benzoyl-2-(hydroxyméthyl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

On dissout sous atmosphère inerte, dans 3 ml de tétrahydrofuranne, 100 mg (364 mmole) d'acide trans-6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylique obtenu à l'exemple 29b.

25 On refroidit à -10°C et on ajoute 40 µl de méthylmorpholine, puis 38 µl de chloroformiate d'éthyle.

On laisse réagir pendant 15 minutes à -10°C, puis on laisse la température remonter à 0°C et on ajoute 27 mg de NaBH<sub>4</sub>, puis, goutte à goutte, 1,5 ml de méthanol.

30 On laisse sous agitation à 0°C pendant 2 heures puis on laisse revenir à la température ambiante.

On ajoute 3 ml d'eau, on laisse sous agitation pendant 15 minutes, puis ajoute quelques gouttes de

chlorure d'ammonium. On extrait à l'acétate d'éthyle, on sèche sur du sulfate de magnésium, filtre et évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 85 mg d'un produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol 98/2.

On recueille ainsi 25 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{14}H_{16}N_2O_3$  ( $M = 260,3$  g). Le rendement correspondant est de 26%.

10

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,61 (m, 1H), 2,00 (m, 2H) 2,30 (m, 1H):  $CH-CH_2-CH_2-CH$ ;  
 15 2,19: 3,23 (d) et 3,26 (dt):  $N-CH_2$ ; 3,60 (m):  $N-CH-CH_2-OH$ ; 3,70 (m) et 3,77 (dd):  $CH-CH_2-O$ ; 4,56 (m):  
 $N-CH-CH_2-N$ .

SM (SIMS) m/z:  $[M + Na]^+ = 283$ ,  $[M + H]^+ = 261$ ,  $[M]^+ = 260, 229, 105$ .

20

#### Exemple 30

trans-6-acétyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de (4-nitrophényl)méthyle

On dissout 1 g (2,63 mmoles) de produit préparé au stade C de l'exemple 29 dans 12 ml de dichlorométhane.

On ajoute 250  $\mu$ l d'anhydride acétique, laisse réagir pendant 10 minutes sous agitation, puis dilue au dichlorométhane et lave avec une solution aqueuse saturée d'hydrogénocarbonate de sodium.

30

On sèche la phase organique sur sulfate de sodium, évapore à sec sous pression réduite pour obtenir 1,2 g de trans-5-(acétylamino)-1,2-pipéridinedicarboxylate de 1-

(1,1-diméthyléthyle) et de 2-[(4-nitrophényl)méthyle], de formule brute  $C_{20}H_{27}N_3O_7$  ( $M = 421,453$  g).

On utilise ce produit sans purification dans des étapes similaires aux stades E à G de l'exemple 29 et  
5 recueille ainsi 14 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{16}H_{17}N_3O_6$  ( $M = 347,330$  g). Le rendement correspondant est de 17%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des  
10 pics en ppm et multiplicité:

1,87 (m), 2,00 à 2,30 (m):  $N-CH-CH_2-CH_2$ ; 2,54 (s):  $N-CO-CH_3$ ; 2,95 (d) et 3,21 (m):  $O=C-N-CH_2$ ; 4,26 (dl):  $O=C-N-CH$ ; 4,55 (m):  $O=C-N-CH_2-CH$ ; 5,34 [AB]:  $CO_2-CH_2-C_6H_4$ ; 7,57 et 8,25 [AA'BB']:  $C_6H_4-NO_2$ .

15 SM (EI) m/z:  $[M]^+ = 347, 304, 211, 169, 125, 43$ .

#### Exemple 31

trans-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2,6-dicarboxylate de (4-nitrophényl)méthyle et 2-propényle

20 On dissout dans 8 ml de dichlorométhane, sous atmosphère d'azote, 1,24 g (3,278 mmoles) de produit préparé au stade C de l'exemple 29a.

On refroidit la solution à  $0^\circ C$ , puis on ajoute goutte à goutte 0,45 ml de TEA puis 0,35 ml de  
25 chloroformiate d'allyle.

On maintient à  $0^\circ C$  pendant 15 mn, puis on laisse réagir sous agitation pendant 1 heure à la température ambiante.

On dilue ensuite avec 20 ml de dichlorométhane, lave  
30 avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium, et deux fois à l'eau.

On sèche sur du sulfate de magnésium, et évapore le solvant sous pression réduite.



On obtient ainsi 1,5 g de trans-5-[[2-propényloxy) carbonyl] amino] -1,2-pipéridinedicarboxylate de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-[(4-nitrophényl)méthyle], de formule brute  $C_{22}H_{28}N_3O_8$ , ( $M = 462,486$  g)

5 Le rendement correspondant est de 99%.

On utilise ce produit dans des étapes similaires aux stades E à G de l'exemple 29a et obtient ainsi 30,6 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{18}H_{19}N_3O_7$ , ( $M = 389,368$  g) sous la forme d'un solide blanc. Le rendement  
10 correspondant est de 40%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,91 (m), 2,00 à 2,29 (m): N-CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>; 2,98 (d) et  
15 3,25 (dl): O=C-N-CH<sub>2</sub>; 4,27 (t) O=C-N-CH; 4,37 (sl): O=C-N-CH<sub>2</sub>-CH; 4,77 (dl): COO-CH<sub>2</sub>-CH=; 5,33 (s): COO-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>; 5,29 à 5,46: CH<sub>2</sub>=CH; 5,98 (m): CH<sub>2</sub>=CH; 7,96 et 8,29 [AA'BB']: C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-NO<sub>2</sub>.

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1801, 1775, 1738, 1724; 1649; 1608, 1595,  
20 1526  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif) m/z:  $[2M + Na]^+ = 801$ ,  $[M + Na + CH_3CN]^+ = 453$ ,  $[M + Na]^+ = 412$

#### Exemple 31bis

25 trans-6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle

On mélange sous atmosphère inerte 200 mg de trans-5-(benzoylamino)-1-(chlorocarbonyl)-2-pipéridinecarboxylate de phénylméthyle, de formule brute  $C_{21}H_{21}ClN_2O_4$  ( $M = 400,87$   
30 g), préparé de manière similaire aux stades A à F de l'exemple 29a et 6 ml de tétrahydrofurane anhydre et on refroidit à  $-78^\circ C$ .

105

On ajoute goutte à goutte 0,55 ml d'une solution de bis (triméthylsilyl) amidure de lithium 1M dans le tétrahydrofuranne.

On laisse réagir sous agitation à  $-78^{\circ}\text{C}$  pendant 10 minutes puis on ajoute 25  $\mu\text{l}$  d'acide acétique.

On laisse remonter la température à la température ambiante, puis on verse dans 10 ml d'une solution aqueuse à 10% d'acide tartrique. On extrait à l'acétate d'éthyle, lave avec une solution aqueuse de tampon phosphate à pH =7, puis à l'eau et sèche sur du sulfate de magnésium.

On amène à sec par évaporation du solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 158 mg d'un produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétone 98/2.

On recueille ainsi 70 mg du composé attendu, de formule brute  $\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_4$  ( $M = 364,40$  g). Le rendement correspondant est de 39%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 400 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

2,15 (m) et 2,25 (m):  $\text{NCH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CO}_2$ ; 1,94 (m) et 2,36 (m):  $\text{NCH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CO}_2$ ; 4,20 (d)  $\text{N}-\text{CH}-\text{CO}_2$ ; 4,50 (q):  $\text{NCH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CO}_2$ ; 3,08 (d) et 3,40 (dt):  $\text{N}-\text{CH}_2$ ; 5,25 [AB]:  $\text{CO}_2-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$ ; 7,38 (sl):  $\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$ ; 7,43 (tl) et 7,55 (tl) et 7,69 (dl)  $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CO}$ .

IR ( $\text{CHCl}_3$ ): 1764, 1744, 1675; 1602, 1584, 1498  $\text{cm}^{-1}$ .

SM (SIMS) m/z:  $[\text{M} + \text{Na}]^+ = 387$ ,  $[\text{M} + \text{H}]^+ = 365$ , 259, 257, 229, 105, 91.

30

#### Exemple 31ter

6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-2-ène-2-carboxylate de phénylméthyle

On mélange, sous atmosphère d'azote, 46 mg (0,126 mmoles) de produit obtenu à l'exemple 31bis et 0,5 ml de tétrahydrofurane anhydre.

On refroidit à  $-70^{\circ}\text{C}$  et on ajoute 0,31 ml de bis  
5 (triméthylsilyl) amidure de lithium 1M dans le tétrahydrofurane.

On laisse réagir pendant 2 heures à  $-70^{\circ}\text{C}$ , puis on laisse remonter la température à  $-15^{\circ}\text{C}$  et on ajoute à cette température 0,41 ml d'une solution de  $\text{C}_6\text{H}_5\text{-SeCl}$  à  
10 0,7 mol/l dans le THF.

On laisse sous agitation à  $-15^{\circ}\text{C}$  pendant 15 minutes, puis on laisse revenir à la température ambiante pendant 15 minutes et verse dans un mélange d'eau et de glace contenant quelques gouttes d'une solution aqueuse saturée  
15 de bicarbonate de sodium.

On extrait à l'acétate d'éthyle, lave à l'eau, sèche et évapore le solvant sous pression réduite.

On purifie le résidu par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétone 98/2 et recueille ainsi 15 mg de 6-benzoyl-7-oxo-2-  
20 (phényl-sélényl)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle, de formule brute  $\text{C}_{27}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_4\text{Se}$  ( $M = 519$ , 46 g). Le rendement correspondant est de 23%.

On mélange les 15 mg (0,029 mmole) du composé obtenu  
25 précédemment et 0,3 ml de dichlorométhane.

On refroidit à  $0^{\circ}\text{C}$  et on ajoute 15 mg d'acide méta-chloroperbenzoïque en solution dans 0,15 ml de dichlorométhane.

On laisse sous agitation à  $0^{\circ}\text{C}$  pendant 15 minutes,  
30 puis on laisse revenir à température ambiante.

On verse dans environ 20 ml d'eau, on extrait avec du dichlorométhane et on lave la phase organique avec une solution aqueuse de tampon phosphate à  $\text{pH}=7$ . On sèche

107

sur sulfate de magnésium, filtre et évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 15 mg de produit brut que l'on purifie sur silice en éluant avec un mélange  
5 dichlorométhane/acétone 98/2.

On recueille ainsi 5 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{21}H_{18}N_2O_4$  ( $M = 362,39$  g). Le rendement correspondant est de 48%.

Spectre RMN du proton

10 Dans le  $CDCl_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité: 2,66 (td) et 2,99 (tdd): N-CH- $\underline{CH_2}$ ; 3,03 (d) et 3,77 (ddd): N- $\underline{CH_2}$ ; 4,76 (tt): N- $\underline{CH}$ ; 5,23 [AB]:  $CO_2$ - $\underline{CH_2}$ - $C_6H_5$ ; 7,02 (dt): N-C=CH; 7,30 à 7,38 (m):  $CH_2$ - $C_6H_5$ ; 7,42 (tm), 7,54 (tm) et 7,62 (dm);  $C_6H_5$ -CO;

15

Exemple 31quater

Acide 6-benzoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-2-ène-2-carboxylique

On mélange 20 mg (0,055 mmole) du produit obtenu à  
20 l'exemple 31ter, on ajoute 0,4 ml d'acétone et 4 mg de catalyseur Pd/C à 10%.

On place sous atmosphère d'hydrogène et laisse réagir pendant 3 heures sous forte agitation.

On filtre et on lave le catalyseur à l'acétone puis  
25 au méthanol. On évapore le filtrat sous pression réduite.

On obtient ainsi 14 mg du composé attendu, de formule brute  $C_{14}H_{12}N_2O_4$  ( $M = 272,4$  g). Le rendement correspondant est de 93%.

SM (EI) m/z: [M]<sup>+</sup>: 272, 105.

30

Exemple 32 a

trans-7-oxo-6-(2-phénylméthoxy)-1,6-diaza-bicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de 2-propényle

Stade A

cis-5-hydroxy-1-[(trifluoroacétyl)-2-pipéridinecarboxylate  
de 2-propényle

On dissout dans 17 ml d'acétate d'éthyle, 17 g  
5 (0,059 mole) de cis-5-hydroxy-1,2-pipéridinedicarboxylate  
de 1-(1,1-diméthyléthyle) et de 2-(2-propényle) (décrit  
dans Rec. Trav. Chim. (1959), 78, 648-658), de formule  
brute  $C_{14}H_{23}NO_5$  (M = 285,3431 g).

On ajoute à 0°C une solution de 51 ml de chlorure  
10 d'hydrogène dans de l'acétate d'éthyle à 150 g/l.

On laisse revenir à la température ambiante et on  
laisse réagir sous agitation pendant 1 heure 30 minutes.

On évapore l'acétate d'éthyle sous pression réduite,  
puis on reprend dans l'éther éthylique, que l'on élimine  
15 à son tour sous pression réduite.

On obtient ainsi 12 g d'un solide jaune pâle que  
l'on mélange avec 200 ml de tétrahydrofuranne. On  
refroidit à 0°C, puis on ajoute 37,6 ml de TEA.

On maintient la température à 0°C, puis on ajoute  
20 lentement 16,8 ml d'anhydride trifluoroacétique.

On laisse la température remonter à 20°C et on  
laisse réagir encore pendant 20 minutes sous agitation.

On ajoute ensuite 20 ml d'eau.

La solution obtenue est agitée pendant 1 heure à la  
25 température ambiante et versée sur 300 ml d'eau. On  
extrait à l'acétate d'éthyle, on lave à l'eau, sèche sur  
du sulfate de sodium, et évapore le solvant sous pression  
réduite.

On obtient 15,7 g de produit brut que l'on purifie  
30 par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange  
dichlorométhane/acétate d'éthyle 90/10.

On obtient ainsi 12,3 g de composé attendu, de formule brute  $C_{11}H_{14}F_3NO_4$  ( $M = 281,23$  g), sous la forme d'une huile jaune. Le rendement correspondant est de 73%.

Stade B

5 trans-5-[(phénylméthoxy)amino]-1-(trifluoroacétyl)-2-pipéridinecarboxylate de 2-propényle

On mélange 10,9 g (38,7 mmoles) de composé obtenu au stade A et 150 ml d'acétonitrile.

La solution jaune pâle obtenue est refroidie à -  
10 30°C, puis on ajoute, 4,94 ml de 2,6-lutidine et 6,7 ml d'anhydride trifluorométhanesulfonique. On agite pendant 15 minutes, puis on additionne, toujours à -30°C, 9,57 g de O-benzylhydroxylamine.

En fin d'addition, on laisse la température remonter  
15 à 0°C et on laisse réagir pendant 1 heure à cette température. On rajoute ensuite 4,9 ml de 2,6-lutidine et on laisse en contact pendant 3 jours à 0°C.

On verse ensuite le mélange réactionnel dans 500 ml d'eau et on extrait avec de l'acétate d'éthyle. On lave  
20 successivement à l'eau, avec une solution aqueuse de tampon phosphate à pH=7,0, avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium, puis de nouveau avec à l'eau.

On sèche sur sulfate sodium et évapore le solvant  
25 sous pression réduite.

On obtient ainsi 23 g de produit brut que l'on dissout dans 150 ml de dichlorométhane. On lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10% , puis on sèche sur du sulfate de sodium, on évapore le solvant sous  
30 pression réduite.

On récupère ainsi 16,1 g d'une huile jaune que l'on purifie par chromatographie sur silice.

On recueille 12,1 g de composé attendu, de formule brute  $C_{18}H_{21}F_3N_2O_4$  ( $M = 386,37$  g) sous forme cristallisée. Le rendement correspondant est de 72%.

Stade C

5 trans-5-[(phénylméthoxy)amino]-2-pipéridinecarboxylate de 2-propényle

On refroidit à  $-10^{\circ}C$  80 ml de méthanol, puis on ajoute 4,15 g (37,8 mmoles) de  $NaBH_4$ .

10 A ce mélange, sous agitation, on ajoute lentement, sur une durée 30 minutes, en maintenant la température à  $-10^{\circ}C$ , une solution de 10,6 g (27,4 mmoles) du composé obtenu précédemment dans 80 ml de méthanol.

On laisse ensuite la température remonter à  $0^{\circ}C$ , puis on maintient cette température pendant 3 heures.

15 On verse le mélange réactionnel dans 450 ml de glace et d'eau et 150 ml d'acétate d'éthyle. On décante, lave à l'eau puis sèche la phase organique sur du sulfate de sodium et puis évapore le solvant sous pression réduite.

20 On obtient ainsi 8,2 g d'une huile jaune que l'on dissout dans 80 ml de tétrahydrofuranne, on ajoute une solution de 2,43 g d'acide oxalique dans 25 ml de THF. L'oxalate qui cristallise est filtré et lavé par un peu de THF puis séché sous pression réduite et dissous dans une solution saturée de bicarbonate de sodium. On extrait  
25 avec de l'acétate d'éthyle, on lave à l'eau la phase organique, sèche sur du sulfate de sodium et évapore le solvant sous pression réduite.

30 On obtient ainsi 4,39 g de composé attendu, de formule brute  $C_{16}H_{22}N_2O_3$  ( $M = 290,36$  g), sous la forme d'une huile qui cristallise lorsque la température est inférieure à  $20^{\circ}C$ . Le rendement correspondant est de 55%.

Stade D

trans-7-oxo-6-(2-phénylméthoxy)-1,6-diaza-bicyclo[3.2.1]-  
octane-2-carboxylate de 2-propényle

On dissout sous atmosphère d'azote 3,2 g (11  
5 mmoles) de l'huile obtenue précédemment dans 500 ml  
d'acétonitrile.

La solution obtenue est refroidie à 0°C au moyen  
d'un bain de glace et on ajoute 3,37 ml de TEA, puis  
0,796 ml de diphosgène, et 1,48 g de DMAP.

10 On laisse la température remonter à 20°C et on  
laisse réagir pendant 2 heures sous agitation.

On verse ensuite le mélange réactionnel sur 200 ml  
d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 0,1 N, on  
ajoute 400 ml d'eau, on extrait au dichlorométhane, on  
15 lave à l'eau et sèche sur du sulfate de sodium.

On évapore ensuite le solvant sous pression réduite  
de façon à obtenir 3,1 g du composé attendu, de formule  
brute  $C_{17}H_{20}N_2O_4$  ( $M = 316,36$  g), sous forme de cristaux.  
Le rendement correspondant est de 89%.

20 Spectre RMN du proton

1,66 (m) et 2,00 à 2,16 (m)  $O=C-CH-\underline{CH_2}-\underline{CH_2}$ ; 2,94 (d) et  
3,07 (dt)  $N-\underline{CH_2}$ ; 3,31 (m)  $N-CH_2-\underline{CH}$ ; 4,14 (dd)  $O=C-\underline{CH}$ , 4,68  
(dt)  $\underline{CH_2}-CH=CH_2$ ; 4,90 et 5,06 [AB]  $\underline{CH_2}-C_6H_5$ ; 5,26 (dq) et  
5,34 (dq)  $CH_2-CH = \underline{CH_2}$ ; 5,92 (m)  $CH_2-\underline{CH}=CH_2$ ; 7,37 à 7,42  
25 (m)  $C_6H_5$ .

IR (CHCl<sub>3</sub>): 1748; 1646; 1496  $cm^{-1}$ .

SM (électrospray positif) m/z:  $[2M + Na]^+ = 655$ ,  $[M + Na$   
 $+ CH_3CN]^+ = 380$ ,  $[M + Na]^+ = 339$ ,  $[M + H]^+ = 317$ , 289, 91.



Exemple 32b

Acide trans-7-oxo-6-(phénylméthoxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylique et son sel de cyclohexylamine.

5 On dissout sous atmosphère d'azote, 2,21 g (6,98 mmoles) du composé obtenu à l'exemple 32a dans 44 ml de dichlorométhane.

On ajoute une solution 0,5 M d'éthyl-hexanoate de sodium dans de l'acétate d'éthyle.

10 On ajoute ensuite en une fois 242 mg de tétrakistriphénylphosphine palladium, puis on maintient sous agitation pendant 1 heure. On dilue avec 22 ml d'acétate d'éthyle et on verse dans 75 ml d'une solution saturée de  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ .

15 On extrait ensuite à l'acétate d'éthyle et on sèche la phase organique sur du sulfate de sodium. On évapore le solvant sous pression réduite pour obtenir 3,5 g d'un résidu jaune que l'on dissout dans un mélange de 11 ml d'acétate d'éthyle et de 0,8 ml de cyclohexylamine.

20 Le sel de cyclohexylamine cristallisé est séparé par filtration et lavé à l'éther éthylique, puis le solvant est évaporé sous pression réduite. On obtient ainsi au total 2,51 g de sel cristallisé que l'on dissout dans 25 ml d'une solution aqueuse saturée de  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ . On extrait  
25 à l'acétate d'éthyle, on réunit les phases organiques et on les sèche sur du sulfate de sodium, puis évapore le solvant sous pression réduite.

On recueille ainsi 1,82 g de composé attendu de formule brute  $\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_4$  ( $M = 276,29$  g), sous forme  
30 cristallisée. Le rendement correspondant est de 94 %.

Spectre RMN du proton

Dans le  $\text{CDCl}_3$ , à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,68 (m) et de 2,20 à 2,22 (m):  $\text{CH}-\underline{\text{CH}_2}-\underline{\text{CH}_2}-\text{CH}$ ; 2,89  
 5 (d) et 3,11 (ddd):  $\text{N}-\underline{\text{CH}_2}$ ; 3,34 (dd)  $\text{N}-\text{CH}_2-\underline{\text{CH}}$ , 4,13 (dl):  
 $\text{N}-\underline{\text{CH}}-\text{C}=\text{O}$ ; 4,90 et 5,05 [AB]:  $\underline{\text{CH}_2}-\text{O}$ ; 7,32 à 7,43:  $\text{C}_6\text{H}_5$ .  
SM (SIMS) m/z:  $[\text{M} + \text{Na}]^+ = 299$ ,  $[\text{M} + \text{H}]^+ = 277,91$ .

Exemple 33 a

10 Sel de pyridinium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxamide

Stade A

trans-7-oxo-6-(phénylméthoxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide

15 On dissout dans 30 ml de dichlorométhane, 1,1 g (4 mmole) du composé obtenu de l'exemple 32b.

On ajoute à cette solution, 0,67 ml de TEA.

On refroidit la solution à  $5^\circ\text{C}$  et on ajoute assez rapidement 0,57 ml de chloroformiate d'isobutyle.

20 On maintient l'agitation pendant 20 minutes à  $5^\circ\text{C}$ , puis on ajoute, lentement, sous agitation vigoureuse, 3 ml d'ammoniac concentrée.

25 L'agitation est maintenue pendant une heure à température ambiante, le milieu réactionnel est dilué avec 30 ml d'eau, extrait avec du dichlorométhane, lavé à l'eau, séché sur du sulfate de sodium et concentré sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,1 g de produit attendu de formule brute  $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_3$  ( $M = 275,31$  g).

30 Le rendement est quantitatif.

Stade B

trans-6-hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide

On mélange 1,1 g du composé obtenu au stade A, 30 ml  
5 de méthanol et 300 mg de Pd/C à 10%.

On place sous atmosphère d'hydrogène puis on agite le mélange vigoureusement pendant 45 minutes.

Le catalyseur est ensuite filtré, lavé au méthanol puis par un mélange dichlorométhane/méthanol.

10 Le filtrat est évaporé sous pression réduite.

On obtient ainsi 800 mg de produit attendu de formule brute  $C_7H_{11}N_3O_3$  ( $M = 185,18$  g), sous la forme d'une mousse incolore.

Stade C

15 Sel de pyridinium trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxamide

On mélange sous atmosphère d'azote 800 mg du composé obtenu précédemment et 20 ml de pyridine anhydre.

On ajoute ensuite 1,91 g de complexe  $SO_3$ -pyridine.

20 Le mélange est agité pendant 20 heures à température ambiante.

Le milieu réactionnel est ensuite filtré et le solvant évaporé sous pression réduite.

On obtient ainsi le produit attendu de formule brute  
25  $C_{12}H_{16}N_4O_6S$ ,  $C_5H_5N$  ( $M = 344,35$  g) sous la forme d'un produit jaune.

Exemple 33b

30 Sel de tétrabutylammonium trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxamide

Le produit obtenu précédemment est introduit dans 40 ml d'une solution aqueuse concentrée de  $NaH_2PO_4$  de façon à obtenir un pH de 4.

On extrait à l'acétate d'éthyle puis on ajoute à la phase aqueuse 1,01 g d'hydrogénosulfate de tétrabutyl ammonium.

On agite pendant 10 minutes à température ambiante, extrait avec 4 fois 300 ml d'acétate d'éthyle, sèche la phase organique sur du sulfate de sodium et concentre sous pression réduite.

On obtient ainsi 1,530 g d'une mousse incolore que l'on purifie par chromatographie sur silice, en éluant avec un solvant acétone/dichlorométhane/TEA 50/48/2.

On recueille ainsi 1,02 g de produit attendu de formule brute  $C_{23}H_{46}N_4O_6S$  ( $M = 506,71$  g), sous la forme d'une mousse incolore. Le rendement global correspondant est de 50%.

15

#### Exemple 33 c

Sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxamide

Le produit obtenu à l'exemple 33b est dissout dans 7 ml d'un mélange acétone/eau 1/1 puis déposé sur une colonne de 180 g de résine DOWEX 50WX8 sous forme  $Na^+$  et élué à l'eau. Après évaporation de l'eau sous pression réduite, le produit cristallise.

On obtient ainsi 542 mg du composé attendu, de formule  $C_7H_{10}N_3NaO_6S$  ( $M = 287,23$  g). Le rendement correspondant est de 94%.

#### Spectre RMN du proton

Dans le DMSO, à 300 MHz, déplacements chimiques des pics en ppm et multiplicité:

1,55 à 2,10 (3H):  $CH-CH_2-CH_2-CH$ ; 2,91 (d) et 3,02 (dl):  $N-CH_2$ ; 3,38 (sl):  $N-CH_2-CH$ ; 3,68 (d):  $N-CH-C=O$ ; 7,23 et 7,44:  $NH_2$ .

SM (électrospray négatif) m/z:  $[M]^- = 264$

Exemples 34 à 47

Les carboxamides suivants ont été préparés suivant un mode opératoire similaire à celui qui est utilisé dans l'exemple 33 en partant de 110 mg d'acide obtenu à l'exemple 32b.

La seule différence est que dans l'étape 1, le réactif utilisé, c'est-à-dire, la solution d'ammoniac, est remplacé par une solution de l'amine correspondante.

Ainsi, seul le groupement R1 tel que défini pour la formule I varie.

Exemple 34

A partir de 49  $\mu$ l de benzylamine on obtient 64 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-N-(phenylmethyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement global de 38 %.

SM (électrospray positif) m/z: [M + Na]<sup>+</sup> = 400, [M + H]<sup>+</sup> = 378

20

Exemple 35

A partir de 43  $\mu$ l du 2-pyridineméthanamine on obtient 37 mg sel de sodium de trans-7-oxo-N-(2-pyridinylmethyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement global de 14 %.

25

SM (électrospray positif) m/z: [M + H]<sup>+</sup> = 379

Exemple 36

A partir de 51,3 mg de 3-pyridineéthanamine on obtient 42 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-N-[2-(3-pyridinyl)ethyl]-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement global de 20 %.

30

SM (électrospray positif) m/z: [M + H]<sup>+</sup> = 393

Exemple 37

A partir de 51,3 mg de 4-pyridineéthanamine on obtient 40  
5 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-N-[2-(4-pyridinyl)ethyl]-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 20 %.

SM (électrospray positif) m/z: [M + Na]<sup>+</sup> = 415, [M + H]<sup>+</sup> =  
10 393

Exemple 38

A partir de 50,2 mg de 2-pyridineéthanamine on obtient 45  
15 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 23 %.

SM (électrospray positif) m/z: [M + H]<sup>+</sup> = 393

20 Exemple 39

A partir de 58,3 mg de 3-amino-benzamide on obtient 43 mg  
de sel de sodium de trans-N-[3-(aminocarbonyl)phenyl]-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 22 %.

25 SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 383

Exemple 40

A partir de 58,3 mg de 4-diméthylamino-benzènamine on  
obtient 65,3 mg de sel de sodium de trans-N-[4-(diméthylamino)phenyl]-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement  
30 de 40 %.

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 383

Exemple 41

A partir de 58,3 mg de 3-diméthylamino-benzèneamine on obtient 91 mg de sel de sodium de trans-N-[3-  
5 (diméthylamino)phenyl]-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 54 %.

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 383

10 Exemple 42

A partir de 43 µl de 4-pyridinéméthanamine on obtient 24,6 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-N-[(4-pyridinyl)méthyl]-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement  
15 de 15 %.

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 355

Exemple 43

A partir de 44 µl de 3-pyridinéméthanamine on obtient  
20 44,7 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-N-(3-pyridinylméthyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 26 %.

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 355

25

Exemple 44

A partir de 84 mg (.-.-)-.alpha.-amino-benzènepropanamide on obtient 55 mg de sel de sodium de trans-N-(1-amino-1-oxo-3-phenyl-2-propyl)-7-oxo-6-  
30 (sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 27 %.

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 411, 321

Exemple 45

A partir de 46 mg de chlorhydrate de 2-amino-acétamide et 61  $\mu$ l de TEA on obtient 25 mg de sel de sodium de trans-N-(2-amino-2-oxoethyl)-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 13 %.

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 321, 249

Exemple 46

10 A partir de 64 mg de (3-aminophényl)-urée on obtient 43 mg de sel de sodium de trans-N-[3-[(aminocarbonyl)amino]phényl]-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide soit un rendement de 24 %.

15 SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 398, 153, 111

Exemple 47

A partir de 63 mg de (.+-.).alpha.-amino-benzèneacétamide on obtient 64 mg de sel de sodium de trans-N-(2-amino-2-oxo-1-phénylethyl)-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo

[3.2.1] octane-2-carboxamide soit un rendement de 38 %

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 397

25 Exemples 48 à 51

Les composés suivants ont été préparés à partir de 110 mg du composé obtenu à l'étape E de l'exemple 32, que l'on estérifie à chaque fois avec l'alcool approprié pour aboutir au produit final.

30 Ensuite, on opère de manière similaire à ce qui est décrit dans les stades B à E de l'exemple 33.

Exemple 48



A partir de 31,5 mg de 2-hydroxy-acétamide on obtient 54 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylate de 2-amino-2-oxoethyle soit un rendement de 32 %.

5 SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 322

Exemple 49

A partir de 51,7 mg de 4-pyridineéthanol on obtient 20 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylate de 2-(4-pyridinyl)ethyle soit un rendement de 8,5 %.

10 SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 370

Exemple 50

15 A partir de 47,3 mg de 2-pyridineéthanol on obtient 47 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo [3.2.1] octane-2-carboxylate de 2-(2-pyridinyl)ethyle soit un rendement de 23,4 %.

20 SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 370

Exemple 51

A partir de 57,7 mg de 3-pyridineéthanol on obtient 50 mg de sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de 2-(3-pyridinyl)ethyle soit un rendement de 26 %.

25 SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 370

Exemple 52

Sel de sodium de 3-méthoxy-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one

Stade A

On dissout 10 g (50 mmoles) de 3,5-dioxy-1-pipéridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle dans 10 ml de

012347

121

méthanol, puis on ajoute 6 g (54 mmoles) de chlorhydrate d'O-allylhydroxylamineamine.

On laisse sous agitation pendant 3 heures, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

- 5 On reprend le résidu dans de l'eau, on extrait au dichlorométhane, on lave la phase organique à l'eau, puis on la sèche sur du sulfate de sodium.

Après filtration et évaporation du solvant sous pression réduite, obtient 10,6 g de 5-méthoxy-3-[(2-propényloxy)imino]-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate  
10 de 1,1-diméthyléthyle de formule brute  $C_{14}H_{22}N_2O_4$  (M = 282,342 g). Le rendement correspondant est de 75%.

#### Stade B

- 15 Dans un ballon, on place 10,6 g (37,6 mmoles) du produit obtenu au stade A et 212 ml de méthanol.

On refroidit la solution à  $-5^{\circ}C$ , on ajoute 37,8 g cyanoborohydrure de sodium, puis 58,2 ml d'éthérate de fluorure de bore.

- 20 On dilue ensuite au dichlorométhane, on verse sur un mélange d'eau et de soude 2N, on extrait au dichlorométhane, on lave la phase organique à l'eau, on la sèche sur du sulfate de sodium, on filtre et on évapore le solvant sous pression réduite.

- 25 On purifie le produit obtenu par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange AcOEt/dichlorométhane 10/90.

On obtient ainsi 5,5 g de 5-méthoxy-3-[(2-propényloxy)amino]-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate  
30 de 1,1-diméthyléthyle de formule brute  $C_{14}H_{24}N_2O_2$  (M = 284,36 g).

Le rendement correspondant est de 51%.

Stade C

On introduit dans un ballon 5,5 g (19,3 mmoles) du produit obtenu au stade B, 27,5 ml de dichlorométhane et  
5 4,2 ml d'anisole.

On ajoute ensuite 27,5 ml d'acide trifluoroacétique.

On élimine le TFA et le dichlorométhane sous pression réduite.

On reprend le résidu dans de l'eau et on l'extrait 3 fois  
10 à l'AcOEt. La phase aqueuse est rendue basique par addition d'ammoniaque, puis extraite à l'AcOEt.

On lave les phases organiques à l'eau, on les sèche sur du sulfate de sodium. On filtre, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

15 On obtient ainsi 2,45 g de 5-méthoxy-N-(2-propényloxy)-1,2,3,6-tétrahydro-3-pyridinamine de formule brute  $C_9H_{16}N_2O_2$  (M = 184,24 g).

Le rendement correspondant est de 69%.

20 Stade D

On dissout sous atmosphère inerte 2,45 g (0,0133 mmole) du produit obtenu au stade C dans 826 ml d'acétonitrile et on refroidit la solution à 0°C.

On ajoute 0,778 ml de diphosgène.

25 On laisse la température remonter jusqu'à la température ambiante, puis on ajoute 5,56 ml de TEA.

On agite pendant une nuit à température ambiante, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On reprend le résidu dans de l'eau, on extrait à l'AcOEt,  
30 on lave la phase organique à l'eau, on la sèche sur du sulfate de sodium, on filtre, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

123

On purifie le résidu par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange AcOEt/dichlorométhane 1/9.

On recueille ainsi 1,13 g de 3-méthoxy-6-(2-propényloxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one de formule brute  
5  $C_{10}H_{14}N_2O_3$  (M = 210,23 g).

Le rendement correspondant est de 40,3%.

#### Stade E

Dans un ballon placé sous atmosphère inerte, on dissout  
10 105 mg (0,5 mmole) du produit obtenu au stade D dans 1,1 ml de dichlorométhane, on ajoute 57  $\mu$ l d'acide acétique, puis 317 mg de de  $Pd[P(C_6H_5)_3]_4$ .

Après 1 heure de réaction, on ajoute 1,1 ml de pyridine, puis 238 mg de complexe  $SO_3$ -pyridine.

15 On laisse sous agitation pendant une nuit, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

On reprend le résidu dans de l'eau, on l'extrait au dichlorométhane, on le lave à l'eau, on sèche la phase organique sur du sulfate de sodium, on filtre et on  
20 évapore le solvant sous pression réduite.

On purifie le résidu par chromatographie sur silice, en éluant avec un mélange trichlorométhane/acétonitrile 50/50.

On recueille ainsi 148 mg de sel de 1-  
25 propényltriphénylphosphonium de 3-méthoxy-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one de formule brute  $C_{28}H_{29}N_2O_6PS$ .

Le rendement correspondant est de 53%.

#### 30 Stade F

On dissout 148 mg du produit obtenu au stade E dans de l'eau contenant 10% de THF.

On fait passer la solution obtenue sur une colonne de résine DOWEX 50WX8 sous forme  $\text{Na}^+$ , en éluant avec de l'eau contenant 10% de THF.

On lyophilise le produit recueilli pour obtenir 51 mg du sel de sodium attendu, de formule brute  $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}_2\text{O}_6\text{SNa}$  ( $M = 272,21$  g).

Le rendement correspondant est de 70%.

Spectre RMN du proton

3,04 (d) et 3,25 (dd) :  $\text{C}=\text{CH}-\text{CH}-\underline{\text{CH}_2}-\text{N}$  ; 3,41 (d) et 3,71 (dd) :  $\text{N}-\underline{\text{CH}_2}-\text{C}=\text{CH}$  ; 3,47 (s) :  $\text{CH}_3-\text{O}$  ; 4,20 (dd) :  $\text{C}=\text{CH}-\underline{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{N}$  ; 5,19 (dl) :  $\text{C}=\underline{\text{CH}}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{N}$

SM (électrospray négatif) m/z:  $[\text{M}]^- = 249$ ,  $[\text{M} - \text{CH}_3]^- = 235$

Exemple 53

15 Sel de sodium de 3-méthoxy-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one

Stade A

On dissout 1,03 g (5,2 mmoles) de 3,6-dihydro-3-oxo-1(2H)-pyridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle de formule brute  $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{NO}_3$  dans 15 ml d'éthanol. On ajoute 572 mg (5,2 mmoles) d'O-allylhydroxylamineamine, puis 1,3 ml de pyridine.

On laisse sous agitation pendant 15 minutes, puis on ajoute 100 ml de dichlorométhane, on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10%, puis on sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium.

On filtre et on évapore le solvant sous pression réduite. On obtient ainsi 1,36 g de 3,6-dihydro-3-[(2-propényloxy)imino]-1(2H)-pyridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle de formule brute  $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_3$  ( $M = 252,32$  g).

Le rendement correspondant est quantitatif.

Stade B

On procède comme indiqué au stade A de l'exemple 52 à partir de 1.38 g de produit obtenu au stade A, 15,1 g de cyanoborohydrure de sodium et 8,3 ml d'éthérate de trifluorure de bore.

- 5 On recueille ainsi après purification 0,99 g d'un mélange 2/3 de 3-[(2-propényloxy)amino]-1-piperidinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle et 1/3 de 3,6-dihydro-3-[(2-propényloxy)amino]-1(2H)-pyridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle de formule brute  $C_{13}H_{22}N_2O_3$  (M = 254,33 g).
- 10 Le rendement correspondant est de 71%.

#### Stade C

On dissout 1,07 g (4,26 mmoles) du mélange obtenu au stade B dans 2 ml d'AcOEt. On refroidit à 0°C, puis on

15 ajoute 5,8 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène 7,3 M dans l'AcOEt. On laisse réagir pendant 2 heures 30 à 0°C.

On évapore le solvant sous pression réduite, puis on reprend dans l'éther, filtre le précipité et sèche

20 ensuite sous pression réduite.

On obtient ainsi 560 mg de dichlorhydrate de N-(2-propényloxy)-1,2,3,6-tétrahydro-3-pyridinamine de formule brute  $C_8H_{16}Cl_2N_2O$  (M = 227,14 g).

Le rendement correspondant est de 57%.

25

#### Stade D

On dissout 560 mg (2,46 mmoles) du produit obtenu au stade C dans 6 ml de dichlorométhane, puis on ajoute 2,5 ml de soude 2N.

30 On décante et on extrait la phase aqueuse à l'AcOEt.

On réunit les phases organiques, on les sèche sur du sulfate de magnésium, on les filtre, puis on évapore le solvant sous pression réduite.

126

On obtient ainsi 278 mg de N-(2-propényloxy)-1,2,3,6-tétrahydro-3-pyridinamine de formule brute  $C_8H_{14}N_2O$  (M = 154,21 g).

Le rendement correspondant est de 73%.

5

#### Stade E

On dissout sous atmosphère d'argon 270 mg (1,75 mmoles) du produit obtenu au stade D dans 45 ml d'acétonitrile, on ajoute 760  $\mu$ l de TEA et 105  $\mu$ l de diphosgène.

10 On laisse réagir pendant 15 minutes à 0°C, puis on laisse revenir à la température ambiante et laisse encore réagir pendant 2 heures.

On ajoute ensuite 213 mg de DMAP on laisse réagir toute une nuit.

15 On ajoute de l'AcOEt, puis on lave avec une solution aqueuse d'acide tartrique à 10% et à l'eau.

On sèche la phase organique sur du sulfate de magnésium, on la filtre et on évapore le solvant sous pression réduite.

20 On purifie le produit brut obtenu sur silice, en éluant avec un mélange dichlorométhane/acétone 95/5 contenant 0,1 % de TEA.

On recueille ainsi 36 mg de 6-(2-propényloxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one de formule brute

25  $C_9H_{12}N_2O_2$  (M = 180,21 g).

Le rendement correspondant est de 11%.

#### Stade F

On procède de manière analogue à celle décrite dans le  
30 stade E de l'exemple 52 à partir de 51 mg (0,27 mmole) du produit obtenu au stade E, 33  $\mu$ l d'acide acétique, 165 mg de  $Pd[P(C_6H_5)_3]_4$  et 132 mg de complexe  $SO_3$ -pyridine.

On recueille ainsi 29,6 mg de sel de 1-propényltriphénylphosphonium de 6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one.

Ce sel est passé sur une colonne de résine DOWEX 50WX8 sous forme Na<sup>+</sup>, en éluant avec de l'eau contenant 10% de THF.

On lyophilise le produit recueilli pour obtenir 13 mg du sel de sodium attendu, de formule brute C<sub>6</sub>H<sub>7</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>SNa (M = 242,19 g).

10 Le rendement correspondant est de 20%.

SM (électrospray négatif) m/z: [M]<sup>-</sup> = 219

#### Exemple 54

Sel de sodium de 6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one

#### Stade A

On procède comme indiqué au stade A de l'exemple 53 à partir de 12 g (0,061 mole) de 3,6-dihydro-3-oxo-1(2H)-pyridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle de formule brute C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>3</sub>, 9,7 g de chlorhydrate de O-benzylhydroxylamine et 15 ml de pyridine.

On obtient ainsi 19,4 g de 3,6-dihydro-3-[(phénylméthoxy)imino]-1(2H)-pyridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle de formule brute C<sub>17</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (M = 302,38 g).

25 Le rendement correspondant est quantitatif.

#### Stade B

On procède comme indiqué au stade B de l'exemple 53 à partir de 14,9 g (0,0496 mole) du produit obtenu au stade A, 12 g de cyanoborohydrure de sodium et 30 ml d'éthérate de trifluorure de bore.

On obtient ainsi après purification 8,2 g d'un mélange de 2/3 de 3,6-dihydro-3-[(phénylméthoxy)amino]-1(2H)-



pyridinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle et 1/3 de 3-[(phénylméthoxy)amino]-1-piperidinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle de formule brute  $C_{17}H_{24}N_2O_3$  (M = 304,39 g). Le rendement correspondant est de 55%.

5

#### Stade C

On procède comme indiqué au stade C de l'exemple 53 à partir de 9,3 g (0,0306 mole) du mélange obtenu au stade B et 106 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène dans l'AcOEt à 7 mol/l.

10

On obtient ainsi 8,39 g d'un mélange de 2/3 de dichlorhydrate de N-(phénylméthoxy)-1,2,3,6-tétrahydro-3-pyridinamine et 1/3 de dichlorhydrate de N-(phénylméthoxy)-3-piperidinamine de formule brute  $C_{12}H_{18}Cl_2N_2O$  (M = 277,20 g).

15

Le rendement correspondant est de 98%.

#### Stade D

On procède comme indiqué au stade D de l'exemple 53 à partir de 8,30 g (0,0299 mole) du mélange obtenu au stade C et 30 ml de soude 2N.

20

On obtient ainsi 5,95 g de mélange de 2/3 de N-(phénylméthoxy)-1,2,3,6-tétrahydro-3-pyridinamine et 1/3 de N-(phénylméthoxy)-3-piperidinamine de formule brute  $C_{12}H_{16}N_2O$  (M = 204,27 g).

25

Le rendement correspondant est de 98%.

#### Stade E

On procède comme indiqué au stade E de l'exemple 53 à partir de 5,02 g (0,0246 mole) du mélange obtenu au stade D, 2,43 ml de diphosgène, 7,4 ml de TEA et 3g de DMAP.

30

Dans un ballon équipé d'une agitation magnétique, à 0°C et sous argon, on introduit 5,020 g (0,0246 mole) du

produit obtenu au stade D et 1,2 ml de 1,2-dichloroéthane.

On ajoute 2,43 g de diphosgène.

On recueille ainsi après purification 2,4 g de 6-(phénylméthoxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one de  
5 formule brute  $C_{13}H_{14}N_2O_2$  ( $M = 230,27$  g).

Le rendement correspondant est de 42%.

On recueille également 512 mg de 6-(phénylméthoxy)-1.6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one de formule brute  $C_{13}H_{16}N_2O_2$   
10 ( $M = 232,27$  g).

Le rendement correspondant est de 9%.

#### Stade F

On dissout 0,128 g (0,551 mmole) de 6-(phénylméthoxy)-  
15 1.6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one obtenu au stade E dans  
1 ml de méthanol.

On ajoute 0,035 g de catalyseur Pd/C et on place sous  
atmosphère d'hydrogène à pression normale.

A la fin de la réaction, on filtre le milieu réactionnel,  
20 on rince au méthanol et on évapore le solvant sous  
pression réduite.

On obtient ainsi 76 mg de 6-hydroxy-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one de formule brute  $C_6H_{10}N_2O_2$   
( $M = 142,16$  g).

25 Le rendement correspondant est quantitatif.

#### Stade G

Dans un ballon placé sous atmosphère inerte, on introduit  
75 mg (0,528 mmole) du produit obtenu au stade F dans 2  
30 ml de pyridine.

On ajoute 235 mg de complexe  $SO_3$ -pyridine et on laisse  
réagir pendant 2 heures.

On ajoute ensuite quelques gouttes d'eau et on évapore le solvant sous pression réduite.

On obtient ainsi 361 mg de produit brut que l'on purifie par chromatographie sur silice en éluant avec un mélange  
5 dichlorométhane/éthanol 6/4 contenant 0,1% en poids de TEA.

On recueille ainsi 32 mg de sel de triéthylammonium de 6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-7-one purifié, de formule brute  $C_{11}H_{15}N_3O_5S$  ( $M = 301,32$  g).

10 Le rendement correspondant est de 17%.

#### Stade H

On dissout 31 mg du produit obtenu au stade G dans 0,5 ml d'eau contenant 10% de THF.

15 On fait passer la solution obtenue sur une colonne de résine DOWEX 50WX8 sous forme  $Na^+$ , en éluant avec de l'eau contenant 10% de THF.

On lyophilise le produit recueilli pour obtenir 20 mg du sel de sodium attendu, de formule brute  $C_9H_9N_2O_5SNa$  ( $M =$   
20 221 g).

Le rendement correspondant est de 77%.

SM (électrospray négatif) m/z:  $[M-H]^- = 221$

#### ETUDE PHARMACOLOGIQUE DES PRODUITS DE L'INVENTION

25 Activité in vitro, méthode des dilutions en milieu liquide

On prépare une série de tubes dans lesquels on répartit la même quantité de milieu nutritif stérile. On  
30 distribue dans chaque tube des quantités croissantes du produit à étudier, puis chaque tube estensemencé avec une souche bactérienne. Après incubation de vingt-quatre heures à l'étuve à 37°C, l'inhibition de la croissance

est appréciée par transillumination, ce qui permet de déterminer les concentrations minimales inhibitrices (C.M.I.) exprimées en  $\mu\text{g/ml}$ .

5 Les tests ont été effectués avec les produits de l'invention suivants:

Test A: Sel de sodium de trans-N-(2-amino-2-oxoethyl)-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, dont la  
10 préparation est décrite à l'exemple 45

Test B: Sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, dont la  
15 préparation est décrite à l'exemple 33c

Test C: Sel de sodium de trans-7-oxo-N-(3-pyridinylmethyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, dont la  
20 préparation est décrite à l'exemple 43

Test D: Sel de sodium de trans-7-oxo-N-[(4-pyridinyl)methyl]-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, dont la  
25 préparation est décrite à l'exemple 42

Test E: Sel de sodium de trans-7-oxo-N-(phenylmethyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, dont la  
30 préparation est décrite à l'exemple 34

Test F: Sel de sodium de trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de

012347

132  
phenylmethyl, dont la préparation est décrite à l'exemple 28b.

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant:

5

Souches	Code	C.M.I. mesurées en $\mu\text{g/ml}$					
		TEST n°					
		A	B	C	D	E	F
S. aureus SG511	011 HT3	>160	>160	>80	>80	5	160
S. aureus Exp 54146	011UC4	>160	>160	>80	>80	5	160
S. Pyogenes A561	02A1UC1	160	>160	>80	>80	1,2	*
E. coli	250HT11	160	80	20	20	>80	*
E.coli DC2 (perméable)	250HT6	80	40	20	20	>80	*
E.coli (hyperperméable)	250IP5	20	10	5	2,5	20	*

\*: non déterminé

Les composés selon l'invention montrent donc une  
10 activité anti-bactérienne.

#### Exemple de composition pharmaceutique

On a préparé une composition pharmaceutique pour  
injection renfermant:


15

Composé de l'exemple 33c - 500 mg

Excipient aqueux stérile q.s.p.  $5\text{cm}^3$

1. Composé de formule générale (I), ou l'un de ses sels avec une base ou un acide:

5



10

(I)

dans laquelle:

15  $R_1$  représente un atome d'hydrogène, un radical COOH, CN, COOR, CONR<sub>6</sub>, R<sub>7</sub>, (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>·R<sub>5</sub> ou  $\begin{matrix} \text{NR}_6 \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagdown \\ \text{NHR}_7 \end{matrix}$

R est choisi dans le groupe constitué par un radical alkyle renfermant de 1 à 6 atomes de carbone, éventuellement substitué par un radical pyridyle ou  
20 carbamoyle, un radical -CH<sub>2</sub>-alkényle renfermant au total de 3 à 9 atomes de carbone, aryle renfermant de 6 à 10 atomes de carbone ou aralkyle renfermant de 7 à 11 atomes de carbone, le noyau du radical aryle ou aralkyle étant éventuellement substitué par un radical OH, NH<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>,  
25 alkyle renfermant de 1 à 6 atomes de carbone, alkoxy renfermant de 1 à 6 atomes de carbone ou par un ou plusieurs atomes d'halogène,

R<sub>6</sub> et R<sub>7</sub>, identiques ou différents, sont choisis dans le groupe constitué par un atome d'hydrogène, un radical  
30 alkyle renfermant de 1 à 6 atomes de carbone, aryle renfermant de 6 à 10 atomes de carbone et aralkyle renfermant de 7 à 11 atomes de carbone, éventuellement substitués par un radical carbamoyle, uréido ou

diméthylamino, et un radical alkyle renfermant de 1 à 6 atomes de carbone substitué par un radical pyridyle,

$n'$  est égal à 1 ou 2,

$R_5$  est choisi dans le groupe constitué par un radical COOH, CN, OH,  $NH_2$ , CO- $NR_6R_7$ , COOR, OR, OCOH, OCOR, OCOOR, OCONHR, OCONH<sub>2</sub>, NHR, NHCOH, NHCOR, NHSO<sub>2</sub>R, NH-COOR, NH-CO-NHR ou NHCONH<sub>2</sub>,  $R$ ,  $R_6$  et  $R_7$  étant définis comme ci-dessus;

$R_2$  représente un atome d'hydrogène ou un groupement  $(CH_2)_{n'}R_5$ ,  $n'_1$  étant égal à 0, 1 ou 2 et  $R_5$  étant défini comme ci-dessus;

$R_3$  représente un atome d'hydrogène ou un radical alkyle renfermant de 1 à 6 atomes de carbone;

A représente une liaison entre les deux carbones porteurs de  $R_1$  et  $R_2$  ou un groupement  $\begin{array}{c} \text{---} \text{C}(\text{H})\text{---}R_4 \\ \text{||} \\ \text{---} \end{array}$ ,  $R_4$  représentant un atome d'hydrogène ou un groupement  $(CH_2)_{n'}R_5$ ,  $n'_1$  et  $R_5$  étant définis comme ci-dessus, le pointillé représentant une éventuelle liaison avec l'un ou l'autre des carbones porteurs des substituants  $R_1$  et  $R_2$ ;

$n$  est égal à 1 ou 2;

X représente un groupement divalent -C(O)-B- relié à l'atome d'azote par l'atome de carbone,

B représente un groupement divalent -O-(CH<sub>2</sub>)<sub>n''</sub>- lié au carbonyle par l'atome d'oxygène, un groupement -NR<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n''</sub>- ou -NR<sub>8</sub>-O- relié au carbonyle par l'atome d'azote,  $n''$  est égal à 0 ou 1 et  $R_8$  est choisi dans le groupe constitué par un atome d'hydrogène, un radical OH,  $R$ , OR, Y, OY, Y<sub>1</sub>, OY<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, OY<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub>, OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>SO<sub>m</sub>R, OSiR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>R<sub>c</sub> et SiR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>R<sub>c</sub>, R<sub>a</sub>, R<sub>b</sub> et R<sub>c</sub> représentant individuellement un radical alkyle linéaire ou ramifié renfermant de 1 à 6 atomes de carbone ou un radical aryle renfermant de 6 à

10 atomes de carbone, R étant défini comme précédemment et m étant égal à 0, 1 ou 2,

Y est choisi dans le groupe constitué par les radicaux COH, COR, COOR, CONH<sub>2</sub>, CONHR, CONHOH, CONHSO<sub>2</sub>R, 5 CH<sub>2</sub>COOH, CH<sub>2</sub>COOR, CH<sub>2</sub>CONHOH, CH<sub>2</sub>CONHCN, CH<sub>2</sub>tétrazole, CH<sub>2</sub>tétrazole protégé, CH<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>H, CH<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>R, CH<sub>2</sub>PO(OR)<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>PO(OR)(OH), CH<sub>2</sub>PO(R)(OH) et CH<sub>2</sub>PO(OH)<sub>2</sub>,

Y<sub>1</sub> est choisi dans le groupe constitué par les radicaux SO<sub>2</sub>R, SO<sub>2</sub>NHCOH, SO<sub>2</sub>NHCOR, SO<sub>2</sub>NHCOOR, SO<sub>2</sub>NHCONHR, 10 SO<sub>2</sub>NHCONH<sub>2</sub> et SO<sub>3</sub>H,

Y<sub>2</sub> est choisi dans le groupe constitué par les radicaux PO(OH)<sub>2</sub>, PO(OR)<sub>2</sub>, PO(OH)(OR) et PO(OH)(R),

Y<sub>3</sub> est choisi dans le groupe constitué par les radicaux tétrazole, tétrazole substitué par le radical R, 15 squarate, NH ou NR tétrazole, NH ou NR tétrazole substitué par le radical R, NHSO<sub>2</sub>R et NRSO<sub>2</sub>R, R étant défini comme ci-dessus;

étant entendu que lorsque n est égal à 1 et A représente un groupement  $\begin{array}{c} \text{---} \text{C}(\text{H}) \text{---} \text{R}_4 \\ | \\ \text{H} \end{array}$  dans lequel R<sub>4</sub> est un atome 20 d'hydrogène et


- soit X représente le groupement -C(O)-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> dans lequel n est 0 ou 1,
- soit X représente le groupement -CO-NR<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> dans lequel n est 1 et R<sub>8</sub> est le groupement 25 isopropyle,
- soit X représente le groupement -CO-NR<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> dans lequel n est 0 et R<sub>8</sub> est hydrogène ou phényle,

alors R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> ne peuvent représenter tous les trois 30 en même temps un atome d'hydrogène.

2. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que n est égal à 1.



3. Composé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que A représente un groupement



5

tel que défini à la revendication 1.

4. Composé selon la revendication 3, caractérisé en ce que R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène.

10

5. Composé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que X représente un groupement divalent -CO-B- dans lequel B représente un groupement -NR<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub> - tel que défini à la revendication 1.

15

6. Composé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le groupement R<sub>8</sub> est un groupement Y<sub>1</sub> ou OY<sub>1</sub>, dans lequel Y<sub>1</sub> est choisi parmi les groupements SO<sub>2</sub>R, SO<sub>2</sub>NHCOR, SO<sub>2</sub>NHCOOR, SO<sub>2</sub>NHCONHR et SO<sub>3</sub>H et R est

20

7. Les composés de formule I, telle que définie à la revendication 1, dont les noms suivent:

le trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(phénylméthyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(4-pyridinyl méthyl)-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(3-pyridinyl méthyl)-6-(sulfooxy)

30

-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,

le trans -7-oxo-N-(2-amino 2-oxo éthyl)-6-(sulfooxy)


-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxamide et ses sels de bases, notamment de sodium,

le trans-7-oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3,2,1]octane-2-carboxylate de phénylméthyle.

8. Procédé de préparation d'un composé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte :

a) une étape au cours de laquelle on fait réagir, avec un agent de carbonylation, le cas échéant en présence d'une base, un composé de formule (II) :

15



20

dans laquelle:

$R'_1$  représente un atome d'hydrogène ou un radical CN, COOH protégé, COOR',  $(CH_2)n'R'_5$ , CONR<sub>6</sub>, R<sub>7</sub> ou  $\begin{matrix} \text{NR}_6 \\ \text{C} \\ \text{NHR}_7 \end{matrix}$  protégé ;

25  $n'$ , R<sub>6</sub> et R<sub>7</sub> ayant les définitions de la revendication 1 et

R' et R'<sub>5</sub> ayant respectivement les définitions de R et R<sub>5</sub> de la revendication 1, dans lesquelles les fonctions réactives éventuellement présentes sont protégées;

30 R'<sub>2</sub> représente un atome d'hydrogène ou un groupement  $(CH_2)n'_1R'_5$ ,  $n'_1$  étant défini comme dans la revendication 1 et R'<sub>5</sub> étant défini comme ci-dessus ;

R<sub>3</sub> est tel que défini dans la revendication 1;


A' représente une liaison entre les deux carbones porteurs de R'<sub>1</sub> et R'<sub>2</sub> ou un groupement  $\begin{array}{c} \text{---} \text{C(H)} \text{---} \text{R}'_4 \\ || \\ \text{---} \end{array}$ , R'<sub>4</sub> représentant un atome d'hydrogène ou un groupement (CH<sub>2</sub>)<sup>n'</sup><sub>1</sub>R'<sub>5</sub>, n'<sub>1</sub> et R'<sub>5</sub> étant définis comme ci-dessus, le pointillé représentant une liaison éventuelle avec l'un ou l'autre des carbones porteurs des substituants R'<sub>1</sub> et R'<sub>2</sub>;

n est tel que défini dans la revendication 1;

HZ représente un groupement HO-(CH<sub>2</sub>)<sup>n''</sup>-, HNR'<sub>8</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n''</sup>- ou HNR'<sub>8</sub>-O-, n'' étant défini comme précédemment et R'<sub>8</sub> représentant un atome d'hydrogène, un radical OH protégé, R', OR', un radical Y' ou OY', Y' étant choisi parmi les groupements COH, COR', COOR', CONH<sub>2</sub>, CONHR', CONHOH protégé, CONHSO<sub>2</sub>R', CH<sub>2</sub>COOH protégé, CH<sub>2</sub>COOR', CH<sub>2</sub>CONHOH protégé, CH<sub>2</sub>CONHCN, CH<sub>2</sub>tétrazole substitué par R', CH<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>R', CH<sub>2</sub>PO(OR')<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> protégé, CH<sub>2</sub>PO(OR')OH protégé, CH<sub>2</sub>PO(R')OH protégé, CH<sub>2</sub>PO(OH)<sub>2</sub> protégé, un radical Y'<sub>1</sub> ou OY'<sub>1</sub>, Y'<sub>1</sub> étant choisi parmi les groupements SO<sub>2</sub>R', SO<sub>2</sub>NHCOH, SO<sub>2</sub>NHCOR', SO<sub>2</sub>NHCOOR', SO<sub>2</sub>NHCONH<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>NHCONHR' et SO<sub>3</sub>H protégé, un radical Y'<sub>2</sub> ou OY'<sub>2</sub>, Y'<sub>2</sub> représentant un groupement PO(OH)<sub>2</sub> protégé, PO(OH)(OR') protégé, PO(OH)R' protégé ou PO(OR')<sub>2</sub>, ou un radical Y'<sub>3</sub>, Y'<sub>3</sub> étant choisi parmi les groupements tétrazole protégé, tétrazole substitué par le radical R', NH ou NR' tétrazole protégé, NH ou NR' tétrazole substitué par le radical R', NHSO<sub>2</sub>R' et NR'SO<sub>2</sub>R', R' étant défini comme ci-dessus;

en vue d'obtenir un composé intermédiaire de formule:

30



(III)

dans laquelle:

R'<sub>1</sub>, R'<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, A' et n ont les mêmes significations que ci-dessus et soit X<sub>1</sub> est un atome d'hydrogène et X<sub>2</sub> représente un groupement -Z-CO-X<sub>3</sub>, X<sub>3</sub> représentant le reste de l'agent de carbonylation, soit X<sub>2</sub> est un groupement -ZH et X<sub>1</sub> représente un groupement CO-X<sub>3</sub>, X<sub>3</sub> étant défini comme ci-dessus;

10 b) une étape au cours de laquelle on cyclise l'intermédiaire obtenu précédemment, en présence d'une base;

et en ce que:

c) le cas échéant, l'étape a) est précédée et/ou l'étape  
15 b) est suivie de l'une ou de plusieurs des réactions suivantes, dans un ordre approprié:

- protection des fonctions réactives,
- déprotection des fonctions réactives,
- estérification
- 20 - saponification,
- sulfatation,
- phosphatation
- amidification,
- acylation,
- 25 - sulfonylation;
- alkylation;
- introduction d'une double liaison;
- formation d'un groupe urée;
- introduction d'un groupement tétrazole;
- 30 - réduction d'acides carboxyliques;
- déshydratation d'amide en nitrile;
- salification;
- échange d'ions;

- 140
- dédoublement ou séparation de diastéréoisomères;
  - oxydation de sulfure en sulfoxyde et/ou sulfone.

5

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'agent de carbonylation est choisi dans le groupe constitué par le phosgène, le diphosgène, le triphosgène, les chloroformiates d'aryle, d'aralkyle, d'alkyle et d'alkényle, les dicarbonates d'alkyle, le carbonyl-diimidazole et leurs mélanges.

10. Procédé selon la revendication 8 ou la revendication 9, caractérisé en ce que la réaction de carbonylation a lieu en présence d'une base.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que la base est une amine.

20 12. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que dans l'étape b la base est choisie dans le groupe constitué par les amines, les hydrures, alcoolates, amidures ou carbonates de métaux alcalins ou alcalino-terreux.

25

13. A titre de médicaments, les produits répondant à la formule (I) telle que définie à la revendication 1, ainsi que leurs sels avec les acides et les bases pharmaceutiquement acceptables.

30


14. A titre de médicaments, les produits tels que définis à l'une quelconque des revendications 2 à 7 ainsi que

141  
leurs sels avec les acides et les bases  
pharmaceutiquement acceptables.

15. Compositions pharmaceutiques contenant, à titre de  
5 principe actif, au moins un médicament selon l'une des  
revendications 13 ou 14.

16. Composé de formule générale (III) ou l'un de ses sels  
avec un acide, notamment son chlorhydrate:

10



15

dans laquelle R'1, R'2, R3, A', n, X1 et X2 ont les mêmes  
significations que dans la revendication 8.

20

25

