

**Ausschlusspatent**

Erteilt gemäß § 5 Absatz 1 des Änderungsgesetzes zum Patentgesetz

ISSN 0433-6461

(11)

1587 78Int.Cl.³

3(51) C 07 J 7/00

C 12 P 33/08

MT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

1) AP C 07 J/ 2296 023
1) 3303/80-5(22) 29.04.81
(32) 29.04.80(44) 02.02.83
(33) CH

- 1) siehe (73)
 2) WIELAND, PETER, DR.; CH;
 3) CIBA-GEIGY AG, BASEL; CH;
 4) INTERNATIONALES PATENTBUERO BERLIN, 1020 BERLIN, WALLSTR. 23/24

4) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG HALOGENIERTER STEROIDE

7) Neue halogenierte Steroide der Formel A, worin X ein Halogen mit der Atomzahl von höchstens 17, Y ein Wasserstoffatom oder Hydroxyl und R ein Alkyl mit höchstens 6 Kohlenstoffatomen bedeutet, und ihre 1,2-Dehydroderivate werden durch ein neuartiges Verfahren hergestellt, indem man nacheinander a) in das 3 β -Hydroxy-16-methylpregna-5,16-dien-20-on oder ein 3-Carbonsäureester davon das Halogen X in die 21-Stellung einführt, b) das erhaltene 21-X-3 β -hydroxy-16-methylpregna-5,16-dien-20-on zu einem 3-Niederalkanoyl-ester verestert und mit einer Persäure behandelt, c) in einem erhaltenen 5,6; 16,17-diepoxid den 16 α , 17 α -Epoxidring mit einer starken Säure zur 16-Methylen-17 α -hydroxy-Gruppierung umlagert, den 5 α , 6 α -Epoxidring mit Fluorwasserstoff zur 6 β -Fluor-5 α -hydroxy-Gruppierung überführt und die gebildete freie 5- und 17-Hydroxylgruppe verestert, d) den erhaltenen 21-X-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-niederalkanoyl-5,17-diniederalkancarboxylester katalytisch hydriert, e) in der erhaltenen entsprechenden 16 β -Methyl-Verbindung die veresterte 3-Hydroxylgruppe durch selektive Hydrolyse freisetzt und durch die Behandlung mit einem Oxidationsmittel in die 3-Oxogruppe umwandelt, in einem erhaltenen 21-X-6 β -fluor-5 α ,17 α -diniederalkancarboxyloxy-16 β -methyl-pregnan-20-dion die 5-ständige Niederalkancarboxyloxygruppe sauer eliminiert und das 6 β -Fluor unter Analyse mit einer starken Säure in die 6 α -Konfiguration isomerisiert und, wenn erwünscht, das erhaltene 21-X-6 α -fluor-17 α -niederalkancarboxyloxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion oder ein 1,2-Dehydroderivat davon mittels des enzymatischen Systems eines 11 β -hydroxylierenden Mikroorganismus in der 11 β -Stellung hydroxyliert und/oder einen 1,2-gesättigten Endstoff in der 1,2-Stellung dehydriert. Verbindungen der Formel A weisen eine hohe entzündungshemmende Wirkung auf und sind als Antiinflammatorika verwendbar. Zudem dienen sie auch als wertvolle Zwischenprodukte zur Herstellung von antiinflammatorisch hochwirksamen polyhalogenierten Corticosteroiden. — Formel A —


229602 3

Berlin, den 27.8.1981
AP C 07 J/229 602/3
(59 164/18)

Verfahren zur Herstellung von halogenierten Steroiden

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft neue halogenierte Steroide der Formel



worin X ein Halogen mit der Atomzahl von höchstens 17, Y ein Wasserstoffatom oder Hydroxyl, und R ein Alkyl mit höchstens 6 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei die punktierte Linie in der 1,2-Stellung eine zusätzliche Doppelbindung eines 1,2-Dehydroderivats bezeichnet, technisch vorteilhafte Zwischenprodukte davon und pharmazeutische Präparate enthaltend diese Steroide, sowie ein neuartiges Verfahren zur Herstellung derselben.

Das durch das Symbol X charakterisierte Halogen ist Fluor oder vorzugsweise Chlor.

Das durch das Symbol R charakterisierte Alkyl kann verzweigt sein, wie 2-Propyl oder 1,1-Dimethyläthyl, vorzugsweise ist

229602 3 -1a- -2-

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

es aber ein geradkettiges Alkyl, wie Methyl, Propyl, Butyl, Pentyl oder Hexyl und vor allem Aethyl.

Die erfindungsgemäß hergestellten Verbindungen besitzen wertvolle pharmakologische, insbesondere antiinflammatorische Eigenschaften. Sie werden angewandt als Arzneimittel.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Zur Herstellung solcher komplizierten polysubstituierten Verbindungen aus einfachen Rohstoffen oder Zwischenprodukten der industriellen Produktion der Steroide benötigt man einen vielstufigen Syntheseweg, in welchem jede einzelne funktionelle Gruppe separat eingeführt wird, wobei oft eine bereits eingeführte Gruppe später gegen eine unerwünschte weitere Umwandlung vorübergehend geschützt werden muß. Die Reihenfolge der einzelnen Syntheseschritte, die meistens als Analogieverfahren an sich bekannt sind, ist oft für die Ökonomie der gesamten Synthese von entscheidender Bedeutung. Bei der Synthesestrategie, d. h. bei der Auswahl von Verfahrensvarianten und ihrer Reihenfolge, wird im allgemeinen besonders geachtet, daß man empfindliche funktionelle Gruppen erst in späteren Stadien der Synthese einführt, um ihre eventuelle Beeinträchtigung durch die nachfolgenden Operationen zu vermeiden. Zu solchen empfindlichen Gruppen wird das 21-Fluor und vor allem das 21-Chlor zweifellos gezählt, zumal wenn seine Reaktivität noch durch eine benachbarte 20-Oxo-gruppe zusätzlich gesteigert wird. Zur gewöhnlichen Synthesestrategie gehört deshalb allgemein, für die Einführung dieser Halogenatome in die 21-Stellung erst die spätesten Stufen, wenn nicht die allerletzte Stufe, der Synthese vorzusehen. Für die Einführung selbst stehen mehrere,

229602 3 ~~2~~ -3-

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

meistens indirekte Methoden zur Verfügung, denen ein gemeinsames Prinzip zugrunde liegt, nämlich der Austausch einer geeignet veresterten 21-Hydroxylgruppe gegen das gewünschte Halogen, vgl. US-PS 4 113 680 und US-PS 3 992 422, sowie den dort angegebenen Stand der Technik. Dafür muß aber die 21-Hydroxylgruppe ihrerseits auch vorher eingeführt werden, wozu im Normalfall wieder mehrere Reaktionsstufen notwendig sind; zudem ist sie selber dermaßen reaktiv, daß sie während der Synthese in einer geschützten Form, üblicherweise als Ester, vorliegen muß. Eine solche klassische Synthesestrategie kann man am Beispiel der Synthese von 6α , 21-Difluor, 11 β , 17 α -dihydroxy-16 α -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion gemäß US-PS 3 499 016 demonstrieren, worin zur Einführung von 3 funktionellen Gruppen (6α - und 21-Fluor, 17 α -Hydroxyl) nicht weniger als 10 Verfahrensstufen notwendig sind, wobei eine sauerstoffhaltige funktionelle Gruppe in der 21-Stellung bereits vom Anfang an vorhanden war.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Bereitstellung eines einfachen und wirtschaftlichen Verfahrens zur Herstellung von neuen antiinflammatorisch wirksamen Verbindungen sowie von technisch vorteilhaften Zwischenprodukten davon.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen einfachen Syntheseweg zur Herstellung von Verbindungen der Formel I aufzufinden.

229602 3 ~~2a~~ -4-

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

Dem erfindungsgemäßen Verfahren liegt die unerwartete Entdeckung zugrunde, daß 21-Chlor-20-oxosteroide, sowie auch ihre 21-Fluoranalogen, über eine wesentlich höhere chemische Stabilität verfügen, als man bisher allgemein vermutet hat. Wie sich nun überraschen-

229602 3 -8-5-

derweise gezeigt hat, bleibt das Halogenatom unter normalen Bedingungen verschiedener konventioneller Umwandlungen der technischen Steroidsynthese unversehrt und benötigt zu seiner Erhaltung keine aussergewöhnlichen Vorsichtsmassnahmen, welche den Rahmen üblicher Bedingungen der Produktion überschreiten würden.

Eine konsequente Anwendung dieser Befunde führte zur Erarbeitung des vorliegenden erfindungsgemässen Verfahrens, welches über neuartige Zwischenprodukte auf einem kurzen, übersichtlichen Weg die Verbindungen der Formel I liefert, wie es durch die Formelschemen I und II illustriert wird. In diesen Schemen haben X und R die oben angegebene Bedeutung und Ac stellt einen Niederalkanoylrest mit 1-7 Kohlenstoffatomen dar, z.B. einen solchen, der sich vom oben definierten Alkylrest R ableitet, besonders aber den Acetyl- und Formylrest. (Zur Unterscheidung davon wird in der ganzen Beschreibung der ähnliche Rest R.CO-, welcher jedoch gemäss der eingangs angegebenen Definition 2-7 Kohlenstoffatome enthält, als der Niederalkancarboxylrest bezeichnet).

Zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung gehören auch die neuen Zwischenprodukte zur Herstellung der Verbindungen der Formel A, namentlich das 21-Chlor-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on und Niederalkanoyl-ester davon, das 21-Chlor-3 β -hydroxy-16 β -methyl-5 α ,6;16 α ,17-diepoxy-pregnan-20-on und seine Niederalkanoyl-ester, das 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on und seine 3-Niederalkanoyl-ester und 3-Niederalkanoyl-5,17-diniederalkancarboxylester, das 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on und seine 5,17-Diniederalkancarboxylester und 3-Niederalkanoyl-5,17-diniederalkancarboxylester, das 21-Chlor-6 β -fluor-5 α ,17 α -diniederalkancarboxyloxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dion, das 21-Chlor-6 β -fluor-17 α -niederalkancarboxyloxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion, sowie Analoge aller genannten Verbindungen, worin sich anstelle von 21-Chlor das Fluor befindet. Ebenfalls gehört zum Gegenstand der Erfindung das Verfahren zu ihrer Herstellung gemäss Schema I. bzw. II.

229602 3 -4-6-

Besonders bevorzugte Verbindungen sind dabei: 21-Chlor-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on-formiat und -acetat, 21-Fluor-3-hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on und das 3-Formiat und 3-Acetat davon, 21-Chlor-3-hydroxy-16 β -methyl-5 α ,6;16 α ,17-diepoxy-pregnan-20-on-formiat und -acetat, 21-fluor-3 β -hydroxy-16 β -methyl-5 α ,6;16 α ,17-diepoxy-pregnan-20-on, dessen 3-Formiat und 3-Acetat, 21-Chlor-6 α -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-formiat und 3-acetat, sowie -3-formiat-5,17-dipropionat und -3-acetat-5,17-dipropionat, 6 β ,21-Difluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-formiat und -3-acetat, sowie -3-formiat-5,17-dipropionat und -3-acetat-5,17-dipropionat, 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on-5,16-dipropionat, -3-formiat-5,17-dipropionat und -3-acetat-5,17-dipropionat, 6 β ,21-Difluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on-5,17-dipropionat, -3-formiat-5,17-dipropionat und -3-acetat-5,17-dipropionat, 21-Chlor-5 α ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dion-5,17-dipropionat, 6 β ,21-Difluor-5 α ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dion-5,17-dipropionat, 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat, 6 α ,21-Difluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregna-4-en-3,20-dion-17-propionat, 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat, 6 α ,21-Difluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat, sowie 21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat, 6 α ,21-Difluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat, 21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat und 6 α ,21-Difluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat.

Die neuen Verbindungen der Formel A besitzen wertvolle pharmakologische Eigenschaften, vor allem eine hervorragende antiinflammatorische Wirksamkeit, wie man sie bei z.B. lokaler Anwendung als Hemmung der entzündlichen Vorgänge feststellen kann. So erwies im Rattenohr-Dermatitis-Hemmtest nach Tonelli das 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat ED₅₀ (effektive Dosis, die eine 50%-ige Hemmung der experimentellen Dermatitis

229602 3 ~~5~~ - 7 -

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

verursacht) von 53 µg/ml, und das 21-Chlor-6α-fluor-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat ED₅₀ von 12 µg/ml. Dank dieser Eigenschaft sind die Verbindungen der Formel A in allen Indikationen, für die sich Glucocorticoid-Steroide mit entzündungshemmenden Eigenschaften eignen, insbesondere jedoch als topisch anzuwendende antiinflammatorische Glucocorticoide, z. B. zur Behandlung von entzündlichen Dermatosen, wie Ekzemen und Dermatiden, oder partiell corticoidresistenten Dermatosen, z. B. Psoriasis, verwendbar.

Zudem sind die Verbindungen der Formel A besonders wertvolle Zwischenprodukte zur Herstellung anderer nützlicher Stoffe, insbesondere anderer pharmakologisch wirksamer Steroide. In dieser Beziehung haben sie z. B. eine Schlüsselstellung bei der Synthese von antiinflammatorisch hochwirksamen, topisch anwendbaren Corticosteroiden, wie vom 21-Chlor-6α-fluor-9α-halogen-11β-hydroxy-16β-methyl-17α-propionyloxy-pregna-1,4-dien-3,20-dion und Analogen davon gemäß der GB-PS 1 563 638. Zur Überführung in diese wertvollen Therapeutica benötigt man bei einer Verbindung der Formel A gegebenenfalls nur die problemlose konventionelle Einführung vom 9-Chlor oder 9-Fluor.

Die erwähnten neuen Verbindungen werden erfindungsgemäß hergestellt, indem man nacheinander a) in das 3β-Hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on oder einen Carbonsäureester, wie insbesondere einen 3-Niederalkanoyl-ester, davon das Halogen X in die 21-Stellung einführt, b) das erhaltene 21-X-3β-hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on zu einem 3-Niederalkanoyl-ester verestert und mit einer Persäure zugleich in der 5,6- und 16,17-Stellung epoxidiert, c) in einem

229602 3 ~~6~~ - 8 -

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

erhaltenen 5,6;16,17-Diepoxid den 16 α ,17 α -Epoxidring unter Katalyse mit einer starken Säure zur 16-Methylen-17 α -hydroxy-Gruppierung umlagert, den 5 α ,6 α -Epoxidring mit Fluorwasserstoff in die 6 β -Fluor-5 α -hydroxy-Gruppierung überführt und die 5- und 17-Hydroxylgruppe verestert, d) den erhaltenen 21-X-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-niederalkanoyl-5,17-diniederalkancarboxylester katalytisch hydriert; e) in der erhaltenen entsprechenden 16 β -Methyl-Verbindung die veresterte 3-Hydroxylgruppe durch selektive Hydrolyse freisetzt und durch Behandlung mit einem Oxidationsmittel in die 3-Oxogruppe umwandelt, f) in einem erhaltenen 21-X-6 β -fluor-5 α ,17 α -diniederalkancarboxyloxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dion die 5-ständige Niederalkancarboxyloxygruppe sauer eliminiert und das 6 β -Fluor unter Katalyse mit einer starken Säure in das 6 α -Fluor-Isomere umwandelt und, wenn ein Produkt der Formel A, worin Y für Hydroxyl steht, erwünscht ist, ein erhaltenes Endprodukt, worin Y für Wasserstoff steht, mittels des enzymatischen Systems eines 11 β -hydroxylierenden Mikroorganismus in der 11 β -Stellung hydroxyliert und/oder, wenn eine 1,2-Dehydroverbindung der Formel A erwünscht ist, ein erhaltenes 1,2-gesättigtes Endprodukt der Formel A dehydriert. Obwohl dabei alle einzelnen Verfahrensoperationen in an sich bekannter konventioneller Weise durchgeführt werden, treten bei einigen Stufen zusätzliche weitere, unerwartet günstige Resultate auf, die offensichtlich im Zusammenhang mit der besonderen Struktur der neuen Verbindungen stehen.

Für die erste Synthesestufe (bezeichnet als Stufe A im Schema I) des erfindungsgemäßen Verfahrens, s. h. für die Einführung des 21-ständigen Halogenatoms X, stehen einige allgemeine Verfahren zur Verfügung, wobei man zu diesem

229602 3

~~5a~~ -9-

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

Zwecke einen reaktionsfähigen Ester der entsprechenden 21-Hydroxyverbindung, insbesondere das 21-Jodid oder -Sulfonat, wie 21-Mesylat, mit Lithium- oder Silbersalz des gewünschten Halogens in einem polaren Lösungsmittel umgesetzt, Vornehmlich erfolgt jedoch die Einführung des Halogen X gemäß dem allgemeinen Verfahren des US-PS 3 758 524, indem man den bekannten Ausgangsstoff der Formel I unter der katalytischen Einwirkung eines Alkalimetallniederalkoholats, z. B. Natriumäthylat, Natriummethylat oder Kaliumtert-butylat, mit einem Niederalkyloxalat oder -formiat, z. B. Dimethyloxalat, Diäthyloxalat oder Äthylformiat, zum entsprechenden 21-Niederalkoxylderivat, z. B. Methoxyalyl- oder Äthoxyalyl-derivat, (Formel II, X = -CO.CO.O.Niederalkyl) bzw. 21-Formylderivat (Formel II, X = -CH=O) umwandelt, aus diesem durch die Behandlung mit einem organischen Sulfonylazid, z. B. p-Tosylazid, das neue 21-Diazo-3 β -hydroxy-16-methylpregna-5,16-dien-20-on bildet und dieses mit Fluorwasser-

stoff, oder in einer analogen Weise mit Chlorwasserstoff, unter Entstehung der entsprechenden 21-Halogenverbindung der Formel II behandelt.

Diese wird anschliessend zum entsprechenden 3 β -Niederalkanoyl-ester der Formel III in an sich bekannter Weise verestert. Falls das entsprechende 3-Formiat (Formel III, Ac = HC(=O)-) erwünscht wird, kann man vornehmlich zur Veresterung überschüssige Ameisensäure, vorzugsweise eine etwa 85-prozentige wässrige Ameisensäure, die zugleich auch als Lösungsmittel dient, verwenden und bei erhöhter Temperatur bis etwa 100° C arbeiten. Bei anderen Niederalkanoylestern, z.B. beim Acetat, behandelt man die 3-Hydroxyverbindung der Formel II in der üblichen Weise mit einem reaktionsfähigen Derivat der entsprechenden Niederalkansäure, wie einem Chlorid oder einem anderen gemischten Anhydrid, z.B. einem solchen mit Trifluoressigsäure, oder insbesondere dem symmetrischen Anhydrid, z.B. mit Acetanhydrid, in Gegenwart von mindestens einem Moläquivalent einer tertiären organischen Base und gegebenenfalls in einem aprotischen organischen Lösungsmittel im Temperaturbereich von etwa -10° bis etwa 30°, üblicherweise bei Zimmertemperatur. Vorzugsweise verwendet man dabei eine solche organische Base, die unfähig ist, z.B. infolge einer sterischen Hinderung, mit dem 21-Halogenid ein quaternäres Salz zu bilden; als eine solche Base wird bevorzugt z.B. ein 2,6-disubstituiertes, insbesondere dialkyliertes, Pyridinderivat, z.B. 2,4,6-Collidin oder vor allem 2,6-Lütidin, verwendet.

Die nächste Stufe (bezeichnet als B im Schema I.) des erfindungsgemässen Verfahrens besteht in der Epoxidierung des 5,16-Diens der Formel III mit einer organischen Persäure (Peroxysäure) oder einem analogen bekannten Epoxidierungsmittel. Die Reaktion wird in der konventionellen Weise bei Temperaturen von etwa -15° bis etwa +30°, insbesondere zwischen etwa 0° und Zimmertemperatur in einem inerten organischen Lösungsmittel, insbesondere einem Aether, wie Diäthyläther, 1,2-Dimethoxyäthan oder Tetrahydrofuran, oder einem halogenierten Kohlenwasserstoff, wie Chloroform oder Methylenchlorid, vorzugsweise in Abwesenheit von Wasser, durchgeführt. Als Epoxidierungsmittel

229602 3 -8-11-

verwendet man vornehmlich eine gegebenenfalls substituierte Peroxybenzoesäure, wie Perbenzoesäure, Phthalmonoperoxysäure ("Perphthalsäure") oder insbesondere die m-Chlorperbenzoesäure.

Das Reaktionsmittel greift gleichzeitig an 2 Stellen des Moleküls ein: während die Epoxidierung der 16,17-Doppelbindung mit einer hohen Stereospezifität verläuft und praktisch ausschliesslich zum 16 α ,17 α -Epoxidring führt, attackiert das Epoxidierungsmittel die 5,6-Doppelbindung von beiden Seiten; demzufolge resultiert neben dem als Hauptprodukt auftretenden 5 α ,6;16 α ,17-Diepoxid der Formel IVa als Nebenprodukt im Verhältnis von etwa 4:1 das epimere 5 β ,6;16 α ,17-Diepoxid der Formel IVb. Die Epimeren lassen sich durch die üblichen physikalischen Methoden, wie Kristallisation und/oder Chromatographie, leicht trennen und werden auch getrennt in der nächsten Stufe verarbeitet.

Die weitere Stufe (bezeichnet als C im Schema I.) des erfindungsgemässen Verfahrens umfasst die säurekatalysierte Umlagerung des 16 α ,17-Epoxidringes in die 16-Methylen-17 α -hydroxy-Gruppierung, sowie die Umwandlung des 5 α ,6-Epoxidringes in die 6 β -Fluor-5 α -hydroxy-Gruppierung. Besonders vorteilhaft werden beide Umwandlungen in einer einzigen Operation durchgeführt, indem man ein entsprechendes 5 α ,6;16 α ,17-Diepoxid der Formel IVa mit Fluorwasserstoff behandelt, welcher nicht nur das notwendige Fluoridanion für die 6 β -Fluorierung, sondern auch die für die Umlagerung des 16,17-Epoxids notwendige Acidität gleichzeitig besitzt. Die Reaktion kann mit etwa 40-prozentigem wässrigem, oder vorzugsweise mit wasserfreiem flüssigem Fluorwasserstoff z.B. unter solchen Bedingungen durchgeführt werden, die bei der konventionellen Ueberführung eines 9 β ,11-Epoxids in die entsprechende 9 α -Fluor-11 β -hydroxy-Verbindung gebräuchlich sind. Man arbeitet zweckmässig in überschüssigem HF als Lösungsmittel, gegebenenfalls auch in Gegenwart eines inerten Lösungsmittels, wie Chloroform, Tetrahydrofuran, Dioxan, oder insbesondere Dimethylformamid. Fluorwasserstoff kann man auch in Form eines fluorwasserstoffabgebenden Mittels einsetzen, z.B. als ein Salz mit einer tertiären organischen Base, oder insbesondere als eine ähnliche Additionsverbindung, z.B. ein Addukt mit einem Car-

229602 3 - 8 - 12 -

baminsäure- oder Thiocarbaminsäure-Derivat, insbesondere als Addukt mit Harnstoff gemäss U.S. Patent 3,211,758. Ueberraschenderweise ergibt diese Reaktion als das einzige Isomere die 16-Methylen-17 α -hydroxy-Verbindung der Formel V, die Bildung des Δ^{15} -16-Methyl-17 α -hydroxy-Isomeren, welches bei der Umlagerung eines 16 β -Methyl-16 α ,17 α -epoxids mit Fluorwasserstoff oft als das Hauptprodukt entsteht, konnte im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

Zur erfindungsgemässen Umwandlung eines epimeren 5 β ,6;16 α ,17--Diepoxids der Formel IVb ins Fluorhydrin der Formel V werden mehrere Zwischenstufen gebraucht, da man zunächst die ungünstige β -Konfiguration des 5,6-Epoxid-Ringes in die gewünschte α -Konfiguration umwandeln muss. Die mehrstufige Umwandlung wird gemäss Schema II durchgeführt, indem man das entsprechende 5 β ,6;16 α ,17-Diepoxid der Formel IVb mit einer starken sauerstoffhaltigen Säure umsetzt, die erhaltene 5 α ,6 β ,17 α -Trihydroxy-16-methylen-Verbindung der Formel XI mit Methansulfonylchlorid oder einem ähnlichen organischen Sulfonylhalogenid in Gegenwart einer organischen Base behandelt und die erhaltene 5 α ,6-Epoxy-17 α -hydroxy-16-methylen-Verbindung XII, die die richtige α -Konfiguration des Epoxid-Rings besitzt, mit Fluorwasserstoff umsetzt und so zum Fluorhydrin der Formel V überführt. Die Umsetzung mit einer starken Säure (Stufe C'_a im Schema II) erfolgt in der herkömmlichen Weise z.B. in Anwesenheit von kleinen Mengen Wasser in einem organischen Lösungsmittel, wie einem Niederalkanol, z.B. Methanol oder Aethanol, Aether, z.B. Diäthyläther oder insbesondere Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder einem halogenierten Kohlenwasserstoff, z.B. Chloroform, oder in einem Gemisch davon; als Säure verwendet man eine anorganische Säure, wie Perchlorsäure oder insbesondere Schwefelsäure, oder eine organische Sulfonsäure, wie insbesondere die p-Toluolsulfonsäure. - Die Umsetzung kann man mit katalytischen Mengen der Säure im breiten Temperaturbereich bis zur Siedetemperatur des Reaktionsgemisches durchführen, vorzugsweise wird aber schonend bei Zimmertemperatur gearbeitet. - Für die zweite Stufe (C'_b im Schema II), d.h. die Behandlung mit einem Sulfonylhalogenid, werden analoge Bedingungen angewendet, wie oben für die basenkatalysierte Veresterung der 3-Hydroxylgruppe geschildert wurde, mit einer be-

229602 3-10-13-

sonderen Vorsicht bei der Auswahl einer geeigneten Base. Die dritte Stufe (als C' im Schema II bezeichnet), d.h. die Aufspaltung des 5 α -, 6 α -Epoxid-Rings in der Verbindung der Formel XII unter Bildung des entsprechenden Fluorhydrins der Formel V, wird in derselben Weise durchgeführt, wie oben für die Behandlung des Diepoxids IVa mit Fluorwasserstoff eingehend angegeben wird. Der ganze dreistufige Prozess ist von Vorteil in erster Linie für die Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens im technischen Massstab als eine Eventualmassnahme zur Verwertung des Nebenproduktes der Formel IVb und zur zusätzlichen Erhöhung der Gesamtausbeute des Zwischenproduktes der Formel V.

Anschliessend an die Aufspaltung der Diepoxide IVa bzw. IVb werden im erhaltenen 21-X-6 β -fluor-5 α ,17 α -dihydroxy-3 β -niederalkanoyloxy-16-methylen-pregnan-20-on die beiden freien Hydroxylgruppen mit dem oben definierten Rest -COR einer Niederalkancarbonsäure unter Bildung des entsprechenden 3,5,17-Triesters der Formel VI verestert. Dazu verwendet man an sich bekannte, herkömmliche Methoden zur Veresterung von schwierig veresterbaren tertiären Hydroxylgruppen, z.B. die Behandlung der Verbindung der Formel V, die je eine solche Hydroxylgruppe in der 5 α - und 17 α -Stellung hat, mit einem symmetrischen Anhydrid einer geeigneten Niederalkancarbonsäure, z.B. mit Propionsäureanhydrid, unter Katalyse mittels einer starken Mineralsäure, wie insbesondere der Perchlorsäure, oder einer organischen Sulfonsäure, wie p-Toluolsulfonsäure. Vornehmlich verwendet man jedoch als Veresterungsmittel ein reaktionsfähiges gemischtes Anhydrid der entsprechenden Niederalkancarbonsäure, insbesondere ein solches mit Trifluoressigsäure, z.B. das gemischte Propionsäure-Trifluoressigsäure-Anhydrid. Die Umsetzung erfolgt üblicherweise bei Zimmertemperatur unter Ausschluss von Wasser in einem inerten organischen Lösungsmittel, wie einem gegebenenfalls halogenierten Kohlenwasserstoff, z.B. Benzol, Toluol, Cyclohexan, bzw. Chloroform oder Methylenchlorid, oder einem Aether, wie Diäthyläther, Dioxan oder Tetrahydrofuran, mit überschüssigem Veresterungsmittel. Dieses wird vorteilhaft unmittelbar vor der Umsetzung im Reaktionsgemisch vorbereitet, indem man die entsprechende Niederalkancarbonsäure mit einer etwa äquivalenten Menge Trifluoressigsäureanhydrid,

229602 3 - ~~X~~ - 14 -

gegebenenfalls unter Kühlung, vermischt und 30-60 Minuten bei Zimmertemperatur reagieren lässt.

Die nächste Stufe (bezeichnet als Stufe D im Schema I) des erfindungsgemässen Verfahrens besteht in der katalytischen Hydrierung eines 16-Methylenderivates der Formel VI zur entsprechenden 16 β -Methyl-Verbindung der Formel VII. Die Hydrierung wird in der herkömmlichen Weise, z.B. mit elementarem Wasserstoff bei atmosphärischem oder leicht erhöhtem (bis zu etwa 5 Atm) Druck bei Temperaturen in der Umgebung der Zimmertemperatur in den üblichen organischen Lösungsmitteln, wie Aethern, z.B. 1,2-Dimethoxyäthan, Dioxan oder Tetrahydrofuran, Niederalkanolen, z.B. Methanol oder Aethanol, oder niederaliphatischen Estern, z.B. Aethylacetat, durchgeführt. Als Katalysator kann man die üblichen fein verteilten Metallkatalysatoren verwenden, wie die Raney-Metalle, insbesondere Raney-Nickel, oder Edelmetalle, z.B. Rhodium oder ganz besonders bevorzugt Platin, die auch auf einem geeigneten Trägermaterial, wie Kieselgel oder Aluminiumoxid, feinverteilt sein können. Als einzige besondere Massnahme der Hydrierung ist darauf zu achten, dass das 21-ständige Halogenatom nicht wegreduziert wird, es sind insbesondere zu energische Bedingungen, wie erhöhte Temperatur und basisch reagierende Mittel, zu meiden. Es ist äusserst überraschend, dass diese Hydrierung praktisch ausschliesslich das 16 β -Methyl-Epimere liefert, obwohl bei den bekannten analogen Fällen jeweils beträchtliche Mengen des 16 α -Methyl-Epimeren gleichzeitig gebildet wurden.

Bei der weiteren Stufe (bezeichnet als Stufe E im Schema I) des erfindungsgemässen Verfahrens wird im 21-X-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on 3-Niederalkanoyl-5,17-diniederalkancarbonyl-ester der Formel VII zunächst die veresterte 3 β -Hydroxylgruppe hydrolytisch freigesetzt (womit der 5,17-Diniederalkancarbonyl-ester der Formel VIII entsteht) und anschliessend zur 3-Oxogruppe oxidiert. Die selektive hydrolytische Freisetzung der sekundären 3 β -Hydroxylgruppe in Gegenwart von analog veresterten tertiären Hydroxylgruppen in den Stellen 5 α - und 17 α - wird in an sich bekannter Weise unter Säurekatalyse durchgeführt, z.B. in einem Niederalkanol, wie Methanol, Aethanol oder

Isopropylalkohol in Gegenwart einer Mineralsäure, wie Chlorwasserstoffsäure oder Schwefelsäure. Falls die 3-Hydroxylgruppe im Ausgangsstoff der Formel VII als Formiat vorliegt, ist die selektive Freisetzung besonders glatt und kann auch mit schwach basischen Mitteln, z.B. mit einem Äquivalent Alkalimetallhydrocarbonat, wie Natrium- oder Kaliumhydrogencarbonat bei Raumtemperatur erfolgen. Auch die anschließende Oxydation (Dehydrierung) der freien 3 β -Hydroxylgruppe zur Oxogruppe unter Bildung des 21-X-6 β -fluor-5 α ,17 α -diniederalkancarbonyloxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dions der Formel IX geschieht in der konventionellen, allgemein bekannten Weise, z.B. mit einer Verbindung des 6-wertigen Chroms, wie Chromtrioxid oder Chromsäure und ihre Alkalimetallsalze, wobei man als Reaktionsmedium Niederalkancarbonsäuren, wie Essig- oder Propionsäure, oder ein Keton, wie Aceton, gegebenenfalls unter Verdünnung mit einem halogenierten Niederalkan, wie Dichlormethan oder Chloroform, verwendet und die Reaktionstemperatur vorzugsweise unterhalb der Raumtemperatur hält. Eine bevorzugte Variante ist die Oxydation mit einer Lösung von Chromtrioxid in wässriger Schwefelsäure (Jones-Reagens), die man üblicherweise in Aceton bei einer Temperatur zwischen etwa -10° bis etwa 25°, vorzugsweise in der Umgebung des Nullpunktes durchführt.

Die nächste Stufe (bezeichnet als Stufe F im Schema I) des erfindungsgemässen Verfahrens besteht in der sauren β -Eliminierung der veresterten 5 α -Hydroxylgruppe des 3-Ketons der Formel IX unter Bildung der mit der Oxogruppe konjugierten 4,5-Doppelbindung und in der säurekatalysierten Isomerisierung des 6 β -ständigen Fluoratoms in die thermodynamisch stabilere 6 α -Konfiguration, wodurch das 21-X-6 α -fluor-17 α -niederalkancarbonyloxy-16 β -methyl-pregnan-4-en-3,20-dion der Formel X resultiert. Zur β -Eliminierung der 5-ständigen Niederalkancarbonyloxygruppe genügt schon die geringe Acidität einer Carbonsäure; in an sich bekannter Weise sind zu diesem Zweck flüssige Carbonsäuren, die zugleich auch als Lösungsmittel dienen, besonders geeignet, darunter insbesondere niederaliphatische Monocarbonsäuren, wie vor allem Eisessig. Vorzugsweise wird bei einer erhöhten Temperatur von etwa 50° bis zur Siedetemperatur des Reaktionsgemisches gearbeitet. - Zu einer vollstän-

229602 3-13-16-

digen Isomerisierung des 6-ständigen Fluoratoms reicht jedoch die Acidität der erwähnten Säuren meistens nicht aus; dann ist es nötig, das Produkt einer derartigen Eliminierung noch einer nachträglichen Isomerisierung durch eine stärkere Säure zu unterziehen. Indem starke Säuren die β -Eliminierung bei vorsichtiger Anwendung nicht beeinträchtigen, kann man vorteilhaft beide Umwandlungen zu einer einzigen Operation zusammenschliessen, indem man in an sich bekannter Weise die Verbindung der Formel IX mit einer katalytischen Menge einer starken Säure in einem inerten organischen Lösungsmittel behandelt. Als Säure verwendet man entweder anorganische Säuren, z.B. Schwefelsäure, Perchlorsäure oder eine Halogenwasserstoffsäure, wie insbesondere Chlorwasserstoff oder Bromwasserstoff, oder starke organische Säuren, z.B. Sulfonsäuren, wie insbesondere p-Toluolsulfonsäure. Als Lösungsmittel kommen z.B. die oben erwähnten flüssigen Carbonsäuren, insbesondere Eisessig, und halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chloroform und Methylenchlorid, sowie ihre Gemische, besonders in Betracht. Die Reaktionstemperatur liegt üblicherweise etwa zwischen dem Nullpunkt und der Zimmertemperatur. Vornehmlich wird in einer Chloroformlösung mit gasförmigem trockenem Chlorwasserstoff bei etwa 0° umgesetzt.

Die erhaltenen 1,2-gesättigten 11-unsubstituierten Endstoffe des oben beschriebenen erfindungsgemässen Verfahrens, welche durch die Formel A charakterisiert sind, worin Y Wasserstoff bedeutet und worin sich eine einfache Bindung in 1,2-Stellung befindet, kann man anschliessend, wenn erwünscht, durch zusätzliche Strukturmerkmale modifizieren, indem man die 11 β -Hydroxylgruppe und/oder die 1,2-Doppelbindung in beliebiger Reihenfolge einführt.

Zwecks der gewünschtenfalls durchzuführenden Einführung der 11 β -Hydroxylgruppe wird gemäss Stufe G im Schema I des erfindungsgemässen Verfahrens das 21-X-6 α -fluor-17 α -niederalkancarbonyloxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion oder -1,4-dien-3,20-dion der Formel Aa einer biologischen 11 β -Hydroxylierung zum 21-X-6 α -fluor-11 β -hydroxy-17 α -niederalkancarbonyloxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion bzw. -1,4-dien-3,20-dion (21-X-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregn-

4-en-3,20-dion 17-Niederalkancarboxylester bzw. dessen 1,2-Dihydro-analogue) der Formel Ab unterworfen. Die Hydroxylierung wird nach den an sich bekannten Methoden der biologischen Transformation durchgeführt, die zur Einführung der 11 β -Hydroxylgruppe bei Steroiden der Pregnan-Reihe allgemein gebraucht werden, und erfolgt mittels des entsprechenden Enzymsystems eines bekannten 11 β -hydroxylierenden Mikroorganismus, wie *Aspergillus niger*, *Cunninghamella blakesleana* oder insbesondere *Curvularia lunata*. Diese 11 β -Hydroxylierung ist im vorliegenden Fall mit einem unerwarteten wesentlichen Vorteil verbunden: die veresterte 17 α -Hydroxylgruppe wird während der Transformation nicht freigesetzt, wie es bei solchen mikrobiologischen Prozessen allgemein üblich ist, sondern bleibt unversehrt erhalten. Das hydroxylierende Enzymsystem kann sich bei dieser Transformation direkt in der Zelle eines lebenden Mikroorganismus befinden und wirkt bei einer Variante des Hydroxylierungsverfahrens während der Kultivierung des Mikroorganismus in einem zweckmässigen, herkömmlichen Nährmedium oder bei einer anderen Variante in einer ruhenden Kultur, die man z.B. durch mechanisches Abtrennen des angewachsenen Mikroorganismus von der Nährlösung und Suspendieren in einem nährstofffreien wässrigen Medium zubereitet. Bekanntlich kann man aber auch mit einem hydroxylierenden Enzymsystem in einer zellfreien Form einwirken, z.B. mit einem Produkt, das durch eine schonende Tötung und/oder Zerstörung der Zellenwand des Mikroorganismus resultiert, oder mit einem mehr oder weniger angereicherten bzw. gereinigten Enzympräparat. Die Isolierung des hydroxylierten Steroids der Formel A aus dem Substrat erfolgt in der herkömmlichen Weise, gewöhnlich durch Extraktion mit geeigneten organischen Lösungsmitteln, z.B. halogenierten Kohlenwasserstoffen oder niederaliphatischen Estern, wie Chloroform oder Methylenchlorid, bzw. Äthylacetat.

Die gewünschtenfalls durchzuführende nachträgliche Einführung der 1,2-Doppelbindung in die 1,2-gesättigten Verbindungen unter Entstehung von entsprechenden 1,2-Dehydroderivaten erfolgt in an sich bekannter Weise, z.B. durch Dehydrieren. Man kann dazu biologische Dehydrierungsverfahren anwenden, z.B. mittels der Mikroorganismen

Corynebacterium simplex oder Septomyxa affinis oder ihrer Enzymsysteme dehydrieren, oder mit Selendioxid in einem organischen Lösungsmittel, z.B. tert-Butylalkohol, behandeln. Vorzugsweise lässt man jedoch mit 2,3-Dichlor-5,6-dicyan-1,4-benzochinon etwa bei Siedehitze während mehreren, z.B. 6-24 Stunden einwirken; als Lösungsmittel verwendet man übliche Lösungsmittel, z.B. aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Benzol oder Xylol, niederaliphatische Alkohole, wie Aethanol, Propanol oder tert.-Butylalkohol, niederaliphatische Ketone, wie Aceton oder 2-Butanon, aliphatische Ester, wie Aethylacetat, oder cyclische Aether, wie Dioxan oder Tetrahydrofuran.

Im oben geschilderten erfindungsgemässen Verfahren werden vorzugsweise Reaktionsmittel und Zwischenprodukte verwendet, die zu den besonders hervorgehobenen, insbesondere den spezifisch genannten, Endstoffen und Zwischenprodukten führen.

Sofern nicht spezifisch definiert wird, bezieht sich in der ganzen Beschreibung die Bezeichnung "nieder" im Zusammenhang mit einem Kohlenwasserstoffrest auf einen solchen mit höchstens 7 Kohlenstoffatomen.

Die Erfindung betrifft auch diejenigen Ausführungsformen der obigen Verfahren, bei denen man von einer auf irgendeiner Stufe als Zwischenprodukt erhältlichen Verbindung ausgeht und die fehlenden Schritte durchführt, oder bei denen ein Ausgangsstoff unter den Reaktionsbedingungen gebildet wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch pharmazeutische Präparate für Menschen und Säugetiere, welche die neuen oben beschriebenen Verbindungen der Formel A in einer therapeutisch wirksamen Menge als aktive Substanzen zusammen mit einem pharmazeutischen Trägermaterial enthalten, sowie ihre Herstellung. Als Träger verwendet man organische oder anorganische Stoffe, die für die enterale, insbesondere orale, und intrauterine, parenterale, oder topicale Gabe geeignet sind.

Für die Bildung derselben kommensolche Stoffe in Frage, die mit den neuen Verbindungen nicht reagieren, wie z.B. Wasser, Gelatine, Milchzucker, Stärke, Magnesiumstearat, Talk, pflanzliche Oele, Benzylalkohol, Gummi, Polyalkylenglykole, Vaseline, Cholesterin und andere bekannte Arzneimittelträger. Die pharmazeutischen Präparate können in fester Form, z.B. als Tabletten, Dragées oder Kapseln, oder in flüssiger oder halbflüssiger Form als Lösungen, Suspensionen, Emulsionen, Salben oder Cremes vorliegen. Gegebenenfalls sind diese pharmazeutischen Präparate sterilisiert und/oder enthalten Hilfsstoffe, wie Konservierungs-, Stabilisierungs-, Netz- oder Emulgiermittel, Salze zur Veränderung des osmotischen Druckes oder Puffer. Sie können auch noch andere therapeutisch wertvolle oder biologisch wirksame Stoffe enthalten.

Dabei kommen in erster Linie topisch anwendbare pharmazeutische Präparate, wie Cremes, Salben, Pasten, Schäume, Tinkturen und Lösungen, in Frage, die von etwa 0,01% bis etwa 0,5% des Wirkstoffs enthalten.

Cremes sind Oel-in-Wasser-Emulsionen, die mehr als 50% Wasser aufweisen. Als ölige Grundlage verwendet man in erster Linie Fettalkohole, z.B. Lauryl-, Cetyl- oder Stearylalkohole, Fettsäuren, z.B. Palmitin- oder Stearinsäure, flüssige bis feste Wachse, z.B. Isopropylmyristat, Wollwachs oder Bienenwachs, und/oder Kohlenwasserstoffe, z.B. Vaseline (Petrolatum) oder Paraffinöl. Als Emulgatoren kommen oberflächenaktive Substanzen mit vorwiegend hydrophilen Eigenschaften in Frage, wie entsprechende nichtionische Emulgatoren, z.B. Fettsäureester von Polyalkoholen oder Äthylenoxidaddukte davon, wie Polyglycerin-fettsäureester oder Polyoxyäthylensorbitan-fettsäureester (Tweens), ferner Polyoxyäthylen-fettalkoholäther oder -fettsäureester, oder entsprechende ionische Emulgatoren, wie Alkalimetallsalze von Fettalkoholsulfaten, z.B. Natriumlaurylsulfat, Natriumcetylsulfat oder Natriumstearylsulfat, die man üblicherweise in Gegenwart von Fettalkoholen, z.B. Cetylalkohol oder Stearylalkohol, verwendet. Zusätze zur Wasserphase sind u.a. Mittel, welche die Austrocknung der Crème vermindern,

229602 3 - 17-20-

z.B. Polyalkohole, wie Glycerin, Sorbit, Propylenglykol und/oder Polyäthylenglykole, ferner Konservierungsmittel und Riechstoffe.

Salben sind Wasser-in-Oel-Emulsionen, die bis zu 70%, vorzugsweise jedoch von etwa 20% bis etwa 50% Wasser oder wässrige Phase enthalten. Als Fettphase kommen in erster Linie Kohlenwasserstoffe, z.B. Vaseline, Paraffinöl und/oder Hartparaffine in Frage, die zur Verbesserung des Wasserbindungsvermögens vorzugsweise geeignete Hydroxyverbindungen, wie Fettalkohole oder Ester davon, z.B. Cetylalkohol oder Wollwachsalkohole, bzw. Wollwachs, enthalten. Emulgatoren sind entsprechende lipophile Substanzen, wie Sorbitan-fettsäureester (spans), z.B. Sorbitanoleat und/oder Sorbitanisostearat. Zusätze zur Wasserphase sind u.a. Feuchthaltungsmittel, wie Polyalkohole, z.B. Glycerin, Propylenglykol, Sorbit und/oder Polyäthylenglykol, sowie Konservierungsmittel und Riechstoffe.

Fettsalben sind wasserfrei und enthalten als Grundlage insbesondere Kohlenwasserstoffe, z.B. Paraffin, Vaseline und/oder flüssige Paraffine, ferner natürliche oder partial-synthetische Fette, z.B. Kokosfettsäuretriglycerid, oder vorzugsweise gehärtete Oele, z.B. hydriertes Erdnuss- oder Rizinusöl, ferner Fettsäurepartialester des Glycerins, z.B. Glycerinmono- und -distearat, sowie z.B. die im Zusammenhang mit den Salben erwähnten, die Wasseraufnahmefähigkeit steigenden Fettalkohole, Emulgatoren und/oder Zusätze.

Pasten sind Crèmen und Salben mit sekretabsorbierenden Puderbestandteilen, wie Metalloxiden, z.B. Titanoxid oder Zinkoxid, ferner Talk und/oder Aluminiumsilikate, welche die Aufgabe haben, vorhandene Feuchtigkeit oder Sekrete zu binden.

Schäume werden aus Druckbehältern verabreicht und sind in Aerosolform vorliegende flüssige Oel-in-Wasser-Emulsionen, wobei halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorfluorniederalkane, z.B. Dichlordifluormethan und Dichlortetrafluoräthan, als Treibmittel ver-

wendet werden. Als Oelphase verwendet man u.a. Kohlenwasserstoffe, z.B. Paraffinöl, Fettalkohole, z.B. Cetylalkohol, Fettsäureester, z.B. Isopropylmyristat, und/oder andere Wachse. Als Emulgatoren verwendet man u.a. Gemische von solchen mit vorwiegend hydrophilen Eigenschaften, wie Polyoxyäthylen-sorbitan-fettsäureester (Tweens), und solchen mit vorwiegend lipophilen Eigenschaften, wie Sorbitanfettsäureester (Spans). Dazu kommen die üblichen Zusätze, wie Konservierungsmittel.

Tinkturen und Lösungen weisen meistens eine wässrig-äthanolische Grundlage auf, der u.a. Polyalkohole, z.B. Glycerin, Glykole, und/oder Polyäthylenglykol, als Feuchthaltemittel zur Herabsetzung der Verdunstung, und rückfettende Substanzen, wie Fettsäureester mit niedrigen Polyäthylenglykolen, d.h. im wässrigen Gemisch lösliche, lipophile Substanzen als Ersatz für die der Haut mit dem Äthanol entzogenen Fettsubstanzen, und, falls notwendig, andere Hilfs- und Zusatzmittel beigegeben sind.

Die Herstellung der topisch verwendbaren pharmazeutischen Präparate erfolgt in an sich bekannter Weise, z.B. durch Lösen oder Suspendieren des Wirkstoffs in der Grundlage oder in einem Teil davon, falls notwendig. Bei Verarbeitung des Wirkstoffs als Lösung wird dieser in der Regel vor der Emulgierung in einer der beiden Phasen gelöst; bei Verarbeitung als Suspension wird er nach der Emulgierung mit einem Teil der Grundlage vermischt und dann dem Rest der Formulierung beigegeben.

Die Dosierung des Wirkstoffs, z.B. der oben besonders hervorgehobenen Verbindungen, erfolgt im Prinzip analog derjenigen von anerkannten topischen Antiinflammatorika vom Corticoid-Typ; sie hängt jedoch auch einerseits von Spezies, Körpergewicht, Alter und individuellem Zustand des Warmblüters, andererseits von der Applikationsweise ab, und kann im Routine-Test in bekannter Weise für jeden individuellen Fall festgestellt werden.

229602 3 -19- -22-

27.8.1981


AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)


Die Erfindung betrifft auch eine Methode zur Linderung oder Behebung von krankhaften entzündlichen Zuständen des Körpers, und insbesondere der Haut, eines Warmblüters, vor allem des Menschen, welche durch die Behandlung dieses Körpers oder Körperteils, vorzugsweise in topischer Applikation, mit einer antiinflammatorisch wirksamen Menge einer Verbindung der Formel A, allein oder in Form eines pharmazeutischen Präparats, charakterisiert ist. Unter der Bezeichnung "eine antiinflammatorisch wirksame Menge" ist eine solche Menge des Wirkstoffes zu verstehen, die zu einer signifikanten Inhibition der Entzündung ausreicht.

Ausführungsbeispiel

In den nachfolgenden Beispielen wird die praktische Durchführung der vorliegenden Erfindung noch näher illustriert, ohne sie dadurch in ihrem Umfang einzuschränken. Die Temperaturen werden vor- und nachstehend in Celsiusgraden angegeben.



Schema I.



Schema II.

229602 3 - 22 - 25 -

Beispiel 1: Zu 943 ml einer gerührten Lösung, zubereitet durch Verdünnen von 200 g Oxalsäuredimethylester mit Toluol bis zum Gesamtvolumen von 1 Liter, gibt man unter Stickstoffstrom und Eiskühlen 94,3 g pulverförmiges Natriummethylat, spült mit 900 ml Toluol nach, versetzt mit 117,6 g kristallinem 3 β -Hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-3-on-acetat, spült mit weiteren 900 ml Toluol nach und lässt sieben Stunden bei Zimmertemperatur rühren. Das Gemisch wird unter Eiskühlung nacheinander mit 64 ml Eisessig, 136,5 ml Triäthylamin und 194,2 g p-Toluolsulfonylazid unter Nachspülen mit 585 ml Toluol versetzt, die Kühlung entfernt und das Gemisch 18 Stunden bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Das Reaktionsgemisch wird auf halbgesättigte Kochsalzlösung geleert, die organische Schicht abgetrennt und die wässrige nochmals mit Chloroform extrahiert; kombinierte organische Lösungen werden dann mit halbgesättigter Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der gelbe kristalline Rückstand wird während drei Stunden mit 5,8 l tert-Butylalkohol und 1,17 l 2N-Kaliumhydroxid-Lösung verrührt, auf eine halbgesättigte Kochsalzlösung geleert und wie vorangehend aufgearbeitet. Der Rückstand wird in Methylenchlorid gelöst und durch 560 g Aluminiumoxid (Aktivität II) filtriert. Die mit 10 l Methylenchlorid und 30 l eines Gemisches (V/V) von Toluol-Aethylacetat (4:1) ausgewaschenen Eluate werden im Vakuum eingedampft. Durch Umlösen des Rückstandes aus Methylenchlorid-Aether erhält man 103 g 21-Diazo-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on vom Smp. 137-139° (Zers.).

Beispiel 2: Zu einer Mischung von 103 g 21-Diazo-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on, 1,73 l Methylenchlorid und 1,73 l Aether gibt man unter Rühren bei -10° im Stickstoffstrom 3,42 l einer 3N-Lösung von Chlorwasserstoff in Aether, wobei die Temperatur auf etwa 2° steigen kann. Nach 15 Minuten wird das Kühlbad entfernt, das Gemisch auf eine Lösung 1 kg Natriumacetat in 5 l Wasser geleert, in Methylenchlorid aufgenommen, mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Durch Kristallisation des Rückstandes aus Methanol erhält man 87,65 g 21-Chlor-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on vom Smp. 170-172°.

229602 3 - 25 - 26 -

Beispiel 3: Eine Mischung von 86 g 21-Chlor-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on, 800 ml Acetanhydrid und 172 ml 2,6-Lutidin wird während 137 Stunden im Dunkeln bei Zimmertemperatur gerührt, auf 4 kg Eis und 7,2 l Wasser gegossen und noch während zwei weiteren Stunden gerührt. Der Niederschlag wird abgenutscht, mit Wasser gewaschen, in Methylenchlorid gelöst, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Den Rückstand filtriert man in Toluollösung durch 430 g Kieselgel und wäscht mit 18 l Toluol aus. Der nach Eindampfen der Eluate im Vakuum erhaltene Rückstand (90 g) kann in der nächsten Stufe direkt verarbeitet werden. Nach Umlösen einer Probe aus Methylenchlorid-Aether-Pentan schmilzt das gereinigte 21-Chlor-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on-acetat bei 183-186°.

Beispiel 4: Zu 91,45 g rohem 21-Chlor-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on-acetat und 1,26 l Methylenchlorid gibt man unter Rühren und Kühlen mit Eiswasser 126 g m-Chlorperbenzoesäure. Nach 18-stündigem Rühren bei Zimmertemperatur wird das Gemisch auf 3 l gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung gegossen, durch mehrmaliges Extrahieren in Methylenchlorid aufgenommen, nacheinander mit 2,5 l 1N-Natriumthiosulfat-Lösung und gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der Rückstand wird an 920 g Kieselgel chromatographiert. Die ersten, mit insgesamt 7,5 l Toluol eluierten, Fraktionen werden verworfen, die nachfolgenden im Vakuum eingedampft. Die erhaltenen Rückstände werden vereinigt und aus Methylenchlorid-Aether umkristallisiert; das resultierende 70,36 g 21-Chlor-5 α ,6;16 α ,17-diepoxy-3 β -hydroxy-16 β -methylpregnan-20-on-acetat ist nur mit sehr wenig des entsprechenden 5 β ,6-Epoxids verunreinigt und wird in dieser Reinheit weiter verarbeitet. Eine Probe schmilzt nach chromatographischer Reinigung bei 212-214°.

Aus der Mutterlauge vom 5 α ,6-Epoxid erhält man nach Kristallisation aus Methylenchlorid-Aether 18,6 g 21-Chlor-5 β ,6;16 α ,17-diepoxy-3 β -hydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on-acetat, dem man nur geringe Mengen des entsprechenden 5 α ,6-Epoxids anhaften und das in dieser Reinheit

229602 3 - 24 - 27 -

weiter verarbeitet wird. Nach mehrmaligem Umlösen aus Methylenchlorid-Aether schmilzt eine Probe bei 158-160°.

Beispiel 5: Zu 13 g 21-Chlor-5 β ,6;16 α ,17-diepoxy-3 β -hydroxy-16 β -methylpregnan-20-on-acetat gibt man 1,3 l einer Mischung von 1,8 l Dioxan und 54 ml konzentrierter Schwefelsäure. Nach sechs Stunden wird das Gemisch auf gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung gegossen und mehrmals mit einer Mischung (V/V) von Chloroform-Alkohol(7:3) extrahiert. Die organischen Auszüge werden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Man erhält 13,15 g rohes 21-Chlor-3 β ,5 α ,6 β ,17 α -tetrahydroxy-16-methylenpregnan-20-on-3-acetat in Form eines Schaumes. Dieses wird in 167 ml 2,6-Lutidin gelöst und unter Rühren und Eiskühlung mit 6,13 ml Methansulfonylchlorid versetzt und 144 Stunden bei 0-5° gerührt. Das Gemisch wird mit Eis versetzt und eine weitere Stunde verrührt, mit 300 ml Eisessig angesäuert, in mehrere Portionen von Methylenchlorid aufgenommen, mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Den Rückstand chromatographiert man an 260 g Kieselgel, wobei man mit Gemischen (V/V) von Toluol-Aethylacetat (97:3) und (95:5) das 21-Chlor-5 α ,6-epoxy-3 β ,17 α -dihydroxy-16-methylenpregnan-20-on-3-acetat (5,2 g), Smp. 232-234° eluiert.

Beispiel 6: Ein Gemisch von 7,5 g 21-Chlor-5 α ,6-epoxy-3 β ,17 α -dihydroxy-16-methylenpregnan-20-on-3-acetat in 150 ml einer vorher zubereiteten Mischung von 56 Gewichtsteilen Fluorwasserstoff und 44 Gewichtsteilen Harnstoff wird während 90 Minuten bei Zimmertemperatur gerührt, auf 2,25 kg Eis und 1,13 l konzentrierte wässrige Ammoniaklösung gegossen und mehrmals mit Chloroform extrahiert. Die organischen Lösungen werden mit halbgesättigter Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der Rückstand wird in Chloroformlösung durch 150 g Kieselgel filtriert, mit 2 l eines Gemisches (V/V) von Chloroform-Aethylacetat (9:1) nachgewaschen und eingedampft. Nach Umlösen aus Methylenchlorid-Aether erhält man 6,28 g 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylenpregnan-20-on-3-acetat, Smp. 250-253° (Zers.).

229602 3 -28-28-

In analoger Weise erhält man aus 5 g 21-Chlor-5 α ,6;16 α ,17-di-epoxy-3 β -hydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on-acetat und 100 ml der oben definierten Fluorwasserstoff-Harnstoff-Mischung nach der oben beschriebenen Verarbeitung und Chromatographie an 213 g Kieselgel [Elution mit einem Gemisch von Toluol-Aethylacetat (9:1)], 1,93 g des oben beschriebenen Endstoffes.

Beispiel 7: Ein Gemisch von 6,2 g 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-acetat und 40 ml Chloroform wird unter Rühren mit einer 45 Minuten vorher zubereiteten Mischung von 96 ml Propionsäure und 80 ml Trifluoressigsäureanhydrid versetzt und die gebildete Lösung während 17 Stunden im Dunkeln bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Die dunkelrotbraune Reaktionslösung wird auf Eis geleert und unter Rühren innert 45 Minuten mit 200 g Natriumhydrogencarbonat versetzt. Nach weiteren 30 Minuten wird das Produkt in Methylenchlorid aufgenommen, mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der Rückstand in Toluollösung wird durch 160 g Kieselgel filtriert und mit 6 l eines Gemisches (V/V) von Toluol-Aethylacetat (4:1) eluiert. Der Rückstand der im Vakuum eingedampften Eluate wird aus Aether-Pentan umkristallisiert, wobei man 6,8 g 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-acetat-5,17-dipropionat, Smp. 171-172°, erhält.

Beispiel 8: 285 mg 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-acetat-5,17-dipropionat, 20 mg Platinoxid und 25 ml Feinsprit werden in einer Wasserstoffatmosphäre bei Zimmertemperatur und einem Ueberdruck von 100-200 Torr bis zum Aufhören der Wasserstoffaufnahme gerührt. Der Katalysator wird abgenutscht und mit Methylenchlorid nachgewaschen, und das Filtrat im Vakuum eingedampft. Nach Umkristallisieren des Rückstandes aus Alkohol erhält man 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on-3-acetat-5,17-dipropionat, Smp. 173-174°.

229602 3 - 28 - 29 -

Beispiel 9: Zu einer Mischung von 6,3 g 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on-3-acetat-5,17-dipropionat und 315 ml Methanol gibt man unter Rühren 42 ml einer 3,85N Lösung von Chlorwasserstoff in Isopropylalkohol. Nach 3 1/2 Stunden wird das Gemisch auf gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung geleert, der Niederschlag in Methylenchlorid aufgenommen, mit halbgesättigter Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Das erhaltene 21-Chlor-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16 β -methyl-pregnan-20-on-5,17-dipropionat wird in 42 ml Methylenchlorid und 168 ml Aceton gelöst und unter Rühren und Eiskühlung innert vier Minuten mit 6 ml einer 8N wässrigen Lösung von Chromsäure in Schwefelsäure versetzt. Nach 30 Minuten versetzt man das Gemisch tropfenweise mit einer Lösung von 8,9 g Natriumacetat in 170 ml Wasser und extrahiert anschliessend mehrmals mit Methylenchlorid. Die organischen Auszüge werden mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung und mit Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Das erhaltene 21-Chlor-6 β -fluor-5 α ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dion-5,17-dipropionat schmilzt nach Umlösen aus Aether bei 145-147°.

Beispiel 10: In eine Lösung von 100 ml 21-Chlor-6 β -fluor-5 α ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dion-5,17-dipropionat in 10 ml Chloroform wird unter Rühren und Eiskühlung während 5 Stunden Chlorwasserstoffgas eingeleitet. Das Gemisch wird auf Eiswasser geleert und mit Methylenchlorid extrahiert, der Auszug mit 3-%iger Lösung von Natriumhydrogencarbonat gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Nach Umkristallisieren des Rückstandes aus Methylenchlorid-Aether erhält man 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-propionat, Smp. 235,5-236°.

Zu derselben Verbindung gelangt man auch, wenn man das 21-Chlor-6 β -fluor-5 α ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregnan-3,20-dion-5,17-dipropionat zunächst durch 9-stündiges Erhitzen mit Eisessig auf 80° in das 21-Chlor-6 β -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-propionat vom Smp. 174-198° überführt und dieses anschliessend mit gasförmigem

229602 3-27-30-

Chlorwasserstoff in Chloroform in der oben geschilderten Weise zum obigen Endstoff isomerisiert.

Beispiel 11:

a) Zubereitung des hydroxylierenden Mikroorganismus-Präparates.

In einem 500 ml-Erlenmeyerkolben werden 100 ml einer sterilen Nährlösung (enthaltend 1 Gew.-% Hefeextrakt und 2 Gew.-% Saccharose, pH=5,6) mit einer Schrägagar-Kultur von *Curvularia lunata* ATCC 12017 geimpft und 36 Stunden bei 28° und 120 U.p.M. geschüttelt. Mit 5 ml der erhaltenen Kulturlösung werden 100 ml einer sterilen Nährlösung (enthaltend 0,75 % (Trockengewicht) "Corn-steep liquor" und 2 Gew.-% Saccharose, pH=5,5) geimpft und unter den obigen Bedingungen 24 Stunden bebrütet. Das angewachsene Myzelium wird durch Zentrifugieren abgetrennt, in einem gleichen Volumen einer Lösung von 0,7 Gew.-% Natriumsulfat und 0,02 Gew.-% Tween 80[®] (Handelsname für Polysorbat 80) suspendiert, nochmals durch Zentrifugieren abgetrennt und in einer halben Menge der letztgenannten Lösung resuspendiert.

b) Transformation und Isolierung.

Mikrokristallines 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methylpregn-4-en-3,20-dion-propionat wird in der oben beschriebenen Natriumsulfat-Tween 80-Lösung im Verhältnis 10 mg Steroid/1 ml Lösung suspendiert. Jeweils 40 Volumenteile der Myzelsuspension (siehe a) werden mit 1 Volumenteil der Steroidsuspension versetzt und in Erlenmeyerkolben während 48-96 Stunden bei 28° mit 250 U.p.M. geschüttelt. Die resultierende Kultursuspension wird mit Aethylacetat mehrmals extrahiert, der rohe Extrakt eingedampft und der Rückstand durch präparative Dünnschichtchromatographie [Silicagel; Gemisch von Toluol-Aceton(8:2)] getrennt. Neben einer Menge regeneriertem Ausgangsstoff wird als Umwandlungsprodukt nach Umlösen aus Aether das 21-Chlor-6 α -fluor-11 β , 17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat erhalten;

229602 3-~~28~~-31-

360 MHz - NMR -Spektrum (CDCl_3): 1 (s) - CH_3 (18); 1,18 (t, $J = 8,1$ Hz) - COCH_2CH_3 ; 1,39 (d, $J = 8$ Hz) - CH_3 (16); 1,44 (s) CH_3 (19); 3,95 + 4,05 (d, $J = 12$ Hz) - CH_2Cl ; 4,5 (m) - H(11); 5,1 - 5,4 (m) - H(6); 6,04 (s) - H(4) [ppm]; Smp. 214-214,5°C.

Beispiel 12:

Ein Gemisch von 200 mg 21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat und 250 mg 2,3-Dichlor-5,6-dicyan-1,4-benzochinon in 8 ml Dioxan wird während 22,5 Stunden unter Rückfluss gekocht. Die abgekühlte Reaktionslösung wird mit 50 ml einer 5-prozentigen (G/V) wässrigen Lösung von Natriumhydrogencarbonat versetzt, 30 Minuten gerührt und mit Methylenchlorid extrahiert. Die organische Phase wird mit verdünnter Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der Rückstand wird durch Dünnschichtchromatographie auf Kieselgelplatten im System Toluol-Aceton (4:1) aufgetrennt. Das erhaltene 21-Chlor-6 α -fluor-17 β -dihydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat wird aus Methylenchlorid-Methanol-Aether umgelöst, Smp. 221-222°C (Zersetzung).

Beispiel 13:

In analoger Weise wie im Beispiel 12 wird 200 mg 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-propionat (s. Beispiel 10) mit 250 mg 2,3-Dichlor-5,6-dicyan-1,4-benzochinon in 8 ml Dioxan behandelt und weiterverarbeitet, wodurch das 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-propionat resultiert; Smp. 216-219°C (aus Methylenchlorid-Aether).

Beispiel 14:

Eine Salbe, enthaltend 0,1% 21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat, kann wie folgt hergestellt werden:

229602 3-29-32-

Zusammensetzung (in Gewichts-%)

21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat	0,1 %
Vaseline	45,0 %
Paraffinöl	19,6 %
Cetylalkohol	5,0 %
Bienenwachs	5,0 %
Sorbitan-sesquioleat	5,0 %
p-Hydroxybenzoesäureisopropylester	0,2 %
Riechstoff	0,1 %
Wasser	20,0 %

Die Fettstoffe und Emulgatoren werden zusammengeschmolzen. Das Konservierungsmittel wird in Wasser gelöst, und die Lösung in die Fettschmelze bei erhöhter Temperatur einemulgiert. Nach dem Erkalten wird eine Suspension des Wirkstoffs in einem Teil der Fettschmelze in die Emulsion eingearbeitet und anschliessend Riechstoff zugegeben.

In analoger Weise wird auch eine Salbe, enthaltend 0,1 % 21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat bzw. 0,3 % 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-propionat oder dessen 1,2-Dehydroderivat - in letzteren 2 Fällen beträgt der Inhalt an Paraffinöl 19,4 % -, hergestellt.

229602 3-30-33-


27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

Erfindungsanspruch

1. Verfahren zur Herstellung von halogenierten Steroiden der Formel



worin X ein Halogen mit der Atomzahl von höchstens 17, Y ein Wasserstoffatom oder Hydroxyl und R ein Alkyl mit höchstens 6 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei die punktierte Linie in der 1,2-Stellung die zusätzliche Doppelbindung eines 1,2-Dehydroderivats bezeichnet, gekennzeichnet dadurch, daß man nacheinander a) in das 3 β -Hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on oder ein 3-Carbonsäureester davon das Halogen X in die 21-Stellung einführt, b) das erhaltene 21-X-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on zu einem 3-Niederalkanoyl ester verestert und mit einer Persäure behandelt, c) in einem erhaltenen 5,6;16,17-Diepoxid den 16 α ,17 α -Epoxidring unter Katalyse mit einer starken Säure zur 16-Methylen-17 α -hydroxy-Gruppierung umlagert, den 5 α ,6 α -Epoxidring mit Fluorwasserstoff in die 6 β -Fluor-5 α -hydroxy-Gruppierung über-

229602 3 ~~31~~ - 34-

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

führt und die gebildete 5- und 17-Hydroxylgruppe verestert, d) den erhaltenen 21-X-6 β -fluor-3 β ,5 α ,17 α -trihydroxy-16-methylen-pregnan-20-on-3-niederalkanoyl-5,17-diniederalkancarbonylester katalytisch hydriert, e) in der erhaltenen entsprechenden 16 β -Methyl-Verbindung die veresterte 3-Hydroxylgruppe durch selektive Hydrolyse freisetzt und durch Behandlung mit einem Oxidationsmittel in die 3-Oxogruppe umwandelt, f) in einem erhaltenen 21-X-6 β -fluor-5 α ,17 α -diniederalkancarbonyloxy-16 β -methylpregnan-3,20-dion die 5-ständige Niederalkancarbonyloxygruppe sauer eliminiert und das 6 β -Fluor unter Katalyse mit einer starken Säure in das 6 α -Fluor-Isomere umwandelt und wenn eine Verbindung der Formel A, worin Y für Hydroxyl steht, erwünscht ist, ein erhaltenes Endprodukt der Formel A, worin Y für Wasserstoff steht, mittels des enzymatischen Systems eines 11 β -hydroxylierenden Mikroorganismus in der 11 β -Stellung hydroxyliert und/oder, wenn eine 1,2-Dehydroverbindung der Formel A erwünscht ist, ein erhaltenes 1,2-gesättigtes Endprodukt der Formel A dehydriert.

2. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man zur Einführung des 21-Halogens gemäß Verfahrensstufe a) den Ausgangsstoff unter Katalyse mit einem Alkalimetallniederalkoholat mit einem Niederalkyloxalat oder -formiat zum entsprechenden 21-Niederalkoxylderivat bzw. 21-Formylderivat umwandelt, aus diesem durch die Behandlung mit einem organischen Sulfonylazid das 21-Diazo-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on bildet und dieses mit Fluorwasserstoff oder Chlorwasserstoff behandelt.

229602 3 -32- -35-

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

3. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man 21-X-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on zur Veresterung der 3-Hydroxylgruppe mit 85prozentiger wäßriger Ameisensäure behandelt.
4. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man 21-X-3 β -hydroxy-16-methyl-pregna-5,16-dien-20-on zur Veresterung der 3-Hydroxylgruppe mit einem symmetrischen Niederalkansäureanhydrid in 2,4,6-Collidin oder 2,6-Lutidin behandelt.
5. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man zur Durchführung der Verfahrensstufe c) ein entsprechendes 5 α ,6;16 α ,17-Diepoxid mit Fluorwasserstoff behandelt.
6. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man zur Durchführung der Verfahrensstufe c) ein entsprechendes 5 β ,6; 16 α ,17-Diepoxid mit einer starken sauerstoffhaltigen Säure umsetzt, die erhaltene 5 α ,5 β ,17 α -Trihydroxy-16-methylen-Verbindung mit einem organischen Sulfonylhalogenid in Gegenwart von 2,4,6-Collidin oder 2,6-Lutidin behandelt und die erhaltene 5 α ,6-Epoxy-17 α -hydroxy-16-methylen-Verbindung mit Fluorwasserstoff umsetzt.
7. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man im Anschluß an Verfahrensstufe c) im 21-X-6 β -fluor-5 α ,17 α -dihydroxy-3 β -niederalkanoxyloxy-16-methylen-pregnan-20-on die beiden freien Hydroxylgruppen durch Behandeln mit einem gemischten Anhydrid einer Niederalkancarbonsäure mit Trifluoressigsäure verestert.

229602 3 -33- -36-

27.8.1981

AP C 07 J/229 602/3

(59 164/18)

8. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man als Hydrierungskatalysator in der Stufe d) Platin verwendet.
9. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man zur Durchführung der Verfahrensstufe e) nacheinander mit einer starken Säure in einem oder mehreren Niederalkanolen und mit einer Verbindung des 6wertigen Chroms, insbesondere mit einer Lösung von Chromtrioxid in wäßriger Schwefelsäure in Aceton umsetzt.
10. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man zur Durchführung der Verfahrensstufe f) ein 21-X-6ß-fluor-5 α ,17 α -diniederalkancarboxyloxy-16ß-methylpregn-4-en-3,20-dion mit wasserfreiem Chlorwasserstoff oder Bromwasserstoff in einem halogenierten Kohlenwasserstoff behandelt.
11. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man die biologische 11ß-Hydroxylierung mit dem 11ß-hydroxylierenden Enzymsystem von *Curvularia lunata* in wachsender und ruhender Kultur durchführt.
12. Verfahren gemäß einem der Punkte 1 bis 11, gekennzeichnet dadurch, daß man eine Verbindung der Formel A herstellt, worin Y für Hydroxyl steht.
13. Verfahren gemäß einem der Punkte 1 bis 10, gekennzeichnet dadurch, daß man eine Verbindung der Formel A herstellt, worin Y für Wasserstoff steht.

229602 3~~-34~~ - 37-

27.8.1981

AP C 07 J/220 602/3

(59 164/18)

14. Verfahren gemäß einem der Punkte 1 bis 13, gekennzeichnet dadurch, daß man eine Verbindung der Formel A herstellt, worin X für Chlor steht.
15. Verfahren gemäß einem der Punkte 1 bis 13, gekennzeichnet dadurch, daß man eine Verbindung der Formel A herstellt, worin R für Äthyl steht.
16. Verfahren gemäß einem der Punkte 1 bis 15, gekennzeichnet dadurch, daß man eine Verbindung der Formel A herstellt, die in der 1,2-Stellung gesättigt ist.
17. Verfahren gemäß Punkt 16, gekennzeichnet dadurch, daß man 21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat herstellt.
18. Verfahren gemäß Punkt 16, gekennzeichnet dadurch, daß man 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregn-4-en-3,20-dion-17-propionat herstellt.
19. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man mit 2,3-Dichlor-5,6-dicyan-1,4-benzochinon dehydriert.
20. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man 21-Chlor-6 α -fluor-11 β ,17 α -dihydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat herstellt.
21. Verfahren gemäß Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß man 21-Chlor-6 α -fluor-17 α -hydroxy-16 β -methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion-17-propionat herstellt.