(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2014-532061

(P2014-532061A)

(43) 公表日 平成26年12月4日(2014.12.4)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C07K 19/00 (2006.01)	C07K 19/00 ZNA	4B024
C07K 14/705 (2006.01)	C07K 14/705	4C084
C07K 16/00 (2006.01)	C07K 16/00	4H045
A61K 38/00 (2006.01)	A61K 37/02	
A61P 35/00 (2006.01)	A61P 35/00	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 86 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2014-534677 (P2014-534677)
 (86) (22) 出願日 平成24年10月4日 (2012.10.4)
 (85) 翻訳文提出日 平成26年5月27日 (2014.5.27)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2012/058662
 (87) 国際公開番号 W02013/052607
 (87) 国際公開日 平成25年4月11日 (2013.4.11)
 (31) 優先権主張番号 61/543,186
 (32) 優先日 平成23年10月4日 (2011.10.4)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 592104782
 ザ・トラスティーズ・オブ・コロンビア・
 ユニバーシティー・イン・ザ・シティー・
 オブ・ニューヨーク
 THE TRUSTEES OF COL
 UMBIA UNIVERSITY IN
 THE CITY OF NEW YO
 RK
 アメリカ合衆国、ニューヨーク州 100
 27、ニューヨーク、ウエスト・ワンハン
 ドレッドシックスティーンズ・ストリート
 ・アンド・ブロードウェイ (番地無し)
 (74) 代理人 110001737
 特許業務法人スズエ国際特許事務所

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヒト・ノッチ1 デコイ

(57) 【要約】

ここに提供されるのは、ノッチ1融合タンパク質である。これらの融合タンパク質は連続的のアミノ酸を含んでなり、その配列は、ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインおよび抗体のFc部分におけるアミノ酸の配列と同一である。前記ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインは、EGF様反復10のN末端に存在するアミノ酸で開始し、少なくとも、EGF様反復23のC末端アミノ酸を通して伸びる。前記ヒト・ノッチ1受容体タンパク質のECDのN末端部分は、EGF様反復24のC末端アミノ酸まで延びてよく、またはEGF様反復36のC末端アミノ酸まで延びてよい。これら融合タンパク質の組成物もまた提供される。また、ここに記載される融合タンパク質を使用して、加齢関連の黄斑変性症 (AMD)、糖尿病性網膜症、および癌を治療する方法も提供される。

【選択図】 なし

Fig. 1a

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

融合タンパク質であって、連続的なアミノ酸を含んでなり、その配列は該融合タンパク質の N 末端で開始し、下記のアミノ酸の配列：

(a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および

(b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

ここで、前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

(i) E G F 様反復 1 0 の N 末端に存在するアミノ酸で始まり、

(i i) E G F 様反復 2 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

融合タンパク質。

10

【請求項 2】

請求項 1 に記載の融合タンパク質であって、前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列が、E G F 様反復 2 4 の C 末端アミノ酸配列にまで伸びる融合タンパク質。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の融合タンパク質であって、前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列が、E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸配列にまで伸びる融合タンパク質。

【請求項 4】

請求項 1 ~ 3 の何れか 1 項に記載の融合タンパク質であって、前記抗体の F c 部分がヒト抗体の F c 部分である融合タンパク質。

20

【請求項 5】

請求項 2 に記載の融合タンパク質であって、前記連続的なアミノ酸の配列は、2 4 位のシスチンで始まり 8 3 3 位のリジンで終わる配列番号 3 に記載の配列を含んでなる融合タンパク質。

【請求項 6】

請求項 3 に記載の融合タンパク質であって、前記連続的なアミノ酸の配列は、2 4 位のシスチンで始まり 1 3 1 8 位のリジンで終わる配列番号 5 に記載の配列を含んでなる融合タンパク質。

30

【請求項 7】

請求項 1 に記載の融合タンパク質であって、前記 (a) のヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインにはシグナルペプチドが先行している融合タンパク質。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の融合タンパク質であって、前記シグナルペプチドは、ヒト・ノッチタンパク質のシグナルペプチド、または I g G 重鎖のシグナルペプチドである融合タンパク質。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の融合タンパク質であって、前記連続的なアミノ酸の配列は、配列番号 3 に記載のものである融合タンパク質。

40

【請求項 1 0】

請求項 8 に記載の融合タンパク質であって、前記連続的なアミノ酸の配列は、配列番号 5 に記載のものである融合タンパク質。

【請求項 1 1】

請求項 1 ~ 1 0 の何れか 1 項に記載の融合タンパク質を含んでなる組成物。

【請求項 1 2】

請求項 1 1 に記載の組成物であって、前記融合タンパク質が、J A G G E D - 1 の活性を阻害するのに十分な量で、医薬的に許容可能な担体の中に存在している組成物。

【請求項 1 3】

加齢関連の黄斑変性症 (A M D) に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に

50

対して、請求項 1 ~ 10 の何れか 1 項に記載の融合タンパク質を、前記患者の A M D を治療するのに十分な量で投与することを含んでなる方法。

【請求項 14】

請求項 13 に記載の方法であって、前記 A M D が湿潤型 A M D である方法。

【請求項 15】

請求項 13 に記載の方法であって、前記 A M D が乾燥型 A M D である方法。

【請求項 16】

糖尿病性網膜症に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、請求項 1 ~ 10 の何れか 1 項に記載の融合タンパク質を、前記患者の糖尿病性網膜症を治療するのに有効な量で投与することを含んでなる方法。

10

【請求項 17】

請求項 13 ~ 16 の何れか 1 項に記載の方法であって、更に、血管内皮成長因子 (V E G F) の阻害剤を投与することを含んでなる方法。

【請求項 18】

請求項 17 に記載の方法であって、前記 V E G F の阻害剤が V E G F - A、P G I F、V E G F - B、V E G F - C、または V E G F - D の阻害剤である方法。

【請求項 19】

請求項 13 ~ 16 の何れか 1 項に記載の方法であって、更に、V E G F 受容体の阻害剤を投与することを含んでなる方法。

【請求項 20】

請求項 18 に記載の方法であって、前記 V E G F 受容体の阻害剤が、V E G F R - 1 または V E G F R - 2 の阻害剤である方法。

20

【請求項 21】

癌に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、請求項 1 ~ 10 の何れか 1 項に記載の融合タンパク質の何れかを、前記患者の癌を治療するのに有効な量で投与することを含んでなる方法。

【請求項 22】

請求項 21 に記載の方法であって、前記癌が膵臓癌である方法。

【請求項 23】

請求項 21 に記載の方法であって、前記癌が乳癌である方法。

30

【請求項 24】

加齢関連の黄斑変性 (A M D) に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者の A M D を治療するのに有効な量で融合タンパク質を投与することを含んでなり、前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含み、その配列は前記融合タンパク質の N 末端で開始し、且つ下記アミノ酸の配列：

(a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および

(b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

(i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、

(i i) 少なくとも E G F 様反復 13 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

40

方法：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は E G F 様反復 36 の C 末端アミノ酸ではない。

【請求項 25】

請求項 24 に記載の方法であって、前記 A M D が湿潤型 A M D である方法。

【請求項 26】

請求項 24 に記載の方法であって、前記 A M D が乾燥型 A M D である方法。

【請求項 27】

糖尿病性網膜症に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者

50

の糖尿病性網膜症を治療するのに有効な量で融合タンパク質を投与することを含んでなり、前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含み、その配列は前記融合タンパク質のN末端で開始し、且つ下記アミノ酸の配列：

- (a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および
- (b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

- (i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、
- (i i) 少なくとも E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

方法：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

【請求項 2 8】

請求項 2 4 ~ 2 7 の何れか 1 項に記載の方法であって、更に、血管内皮成長因子 (V E G F) の阻害剤を投与することを含んでなる方法。

【請求項 2 9】

請求項 2 8 に記載の方法であって、前記 V E G F の阻害剤が V E G F - A 、 P G I F 、 V E G F - B 、 V E G F - C 、または V E G F - D の阻害剤である方法。

【請求項 3 0】

請求項 2 4 ~ 2 7 の何れか 1 項に記載の方法であって、更に、V E G F 受容体の阻害剤を投与することを含んでなる方法。

【請求項 3 1】

請求項 3 0 に記載の方法であって、前記 V E G F 受容体の阻害剤が、V E G F R - 1 または V E G F R - 2 の阻害剤である方法。

【請求項 3 2】

癌に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者の癌を治療するのに有効な量で融合タンパク質を投与することを含んでなり、前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含み、その配列は前記融合タンパク質の開始し、且つ下記アミノ酸の配列：

- (a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および
- (b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

- (i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、
- (i i) 少なくとも E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

方法：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

【請求項 3 3】

請求項 3 2 に記載の方法であって、前記癌が膵臓癌である方法。

【請求項 3 4】

請求項 3 2 に記載の方法であって、前記癌が乳癌である方法。

【請求項 3 5】

請求項 2 4 ~ 3 4 の何れか 1 項に記載の方法であって、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ E G F 様反復 2 3 の C 末端アミノ酸まで伸びる方法。

【請求項 3 6】

請求項 2 4 ~ 3 4 の何れか 1 項に記載の方法であって、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸まで伸びる方法。

10

20

30

40

50

【請求項 37】

請求項 24 ~ 34 の何れか 1 項に記載の方法であって、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、EGF 様反復 1 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ EGF 様反復 13 の C 末端アミノ酸まで伸びる方法。

【請求項 38】

請求項 24 ~ 34 の何れか 1 項に記載の方法であって、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、EGF 様反復 1 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ EGF 様反復 24 の C 末端アミノ酸まで伸びる方法。

【発明の詳細な説明】

【関連出願】

10

【0001】

この出願は、2011年10月4日に提出された米国仮出願第 61 / 543 , 186 号の優先権を主張するものであり、その内容を本明細書の一部として援用する。

【0002】

この出願を通して、括弧内に記載した著者および発行日より種々の刊行物を引用する。これら刊行物の完全な書誌的引用は、本明細書の末尾または各実験セクションの末尾に記載する。これら刊行物の開示は、本発明が属する技術をより十分に記述するために、本明細書の一部として本願に援用する。

【発明の背景】

【0003】

20

ノッチタンパク質は、脈管構造、造血系および神経系を含む発生の決定において重要な役割を果たしている。かくして、発生の際および成人組織において、細胞の運命の決定および拘束が如何にして制御されるかを理解するために、それらの機能を理解することが重要である。今日まで、ノッチまたはノッチリガンドの遺伝子崩壊に関する幾つかの報告が脈管フェノタイプを記載しており、該報告は、この経路が脈管発生を案内する機構の基本的部分であることを強調している。異常型のノッチ活性は、癌および血管障害の両方を含むヒトの病理 (CADASIL) にリンクされてきた。腫瘍血管新生におけるノッチの解析は、最近になって始まったばかりである：しかし、我々によるノッチの潜在的な下流標的の発見は、血管新生に関連した病理的プロセスにおけるその役割を示唆している。例えば、VEGFR - 3 は、腫瘍血管新生および腫瘍リンパ管新生 (lymphangiogenesis) の両方に

30

【0004】

本発明における更なる背景は米国特許出願公開番号 US 2011 - 0008342 A 1 に見ることができ、本発明が属する技術をより十分に記述するために、その全内容を本明細書の一部として本願に援用する。

【発明の概要】

【0005】

40

本発明は、融合タンパク質であって、連続的なアミノ酸を含んでなり、その配列は該融合タンパク質の N 末端で開始し、下記のアミノ酸の配列：

(a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および

(b) これに続く抗体の Fc 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

(i) EGF 様反復 10 の N 末端に存在するアミノ酸で始まり、

(ii) EGF 様反復 23 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

融合タンパク質を提供する。

【0006】

50

一実施形態において、本発明の融合タンパク質は、E G F様反復24のC末端アミノ酸配列にまで伸びる、ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列と同じアミノ酸配列を含んでなるものである。もう一つの実施形態において、前記融合タンパク質は、F G F様反復36のC末端アミノ酸にまで伸びる、ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列と同じアミノ酸配列を含んでなるものである。

【0007】

現時点での好ましい一つの実施形態において、本発明の融合タンパク質は、ノッチ1 E G F様反復10~24(ここでは、ノッチ1デコイ10~24とも称する)を含んでなるものである。この融合タンパク質は、D L L 4に結合することなくJ A G G E D - 1に結合して、該タンパク質がD L L 4経路の阻害によって生じる不快な副作用、例えば肝毒性、心臓および肺における血管腫瘍または壊死が生じるのをなくすことを可能にする。

10

【0008】

そのJ A G G E D - 1についてのリガンド特異性のために、ノッチ1デコイ10~24融合タンパク質は、J A G G E D - 1関連の悪性腫瘍、例えば乳癌、頭および首の扁平上皮癌(H N S C C)、および成長因子によりJ A G G E D リガンドが高度に発現されまたは誘導されることが報告されている関連の癌に対して、優れた抗腫瘍活性を示すであろうこともまた想定および期待される。

【0009】

加えて、この融合タンパク質は、先に記載したノッチ1融合タンパク質をトランスフェクトされた細胞の分泌プロファイルと比較して優れた分泌プロファイルを有するであろうと思われる。このことは、タンパク質精製についての改善された効率を提供するであろう。

20

【0010】

本発明は更に、このような融合タンパク質および担体を含む組成物を提供する。

【0011】

本発明はまた、加齢関連の黄斑変性症(A M D)に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者のA M Dを治療するために有効な量で本発明の融合タンパク質を投与することを含んでなる方法を提供する。

【0012】

加えて、本発明は、糖尿病性網膜症に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者の糖尿病性網膜症を治療するために有効な量で本発明の融合タンパク質を投与することを含んでなる方法を提供する。

30

【0013】

本発明は更に、癌に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者のがんを治療するために有効な量で本発明の融合タンパク質を投与することを含んでなる方法を提供する。

【0014】

本発明はまた、加齢関連の黄斑変性症(A M D)に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者のA M Dを治療するために有効な量で前記融合タンパク質を投与することを含んでなり、ここでの前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含み、その配列は前記融合タンパク質のN末端で開始し、且つ下記アミノ酸の配列：

40

(a) ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および

(b) これに続く抗体のF c部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインは

(i) E G F様反復9のN末端に存在するアミノ酸を含み、

(i i) 少なくともE G F様反復13のC末端アミノ酸を通して伸びる

方法を提供する：

ただし、前記N末端アミノ酸が前記E G F様反復1のN末端アミノ酸であれば、前記C

50

末端アミノ酸は前記 E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

【0015】

本発明はまた、糖尿病性網膜症に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者の糖尿病性網膜症を治療するために有効な量で前記融合タンパク質を投与することを含んでなり、ここでの前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含んでなり、その配列は前記融合タンパク質の N 末端で開始し、下記アミノ酸の配列：

(a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および

(b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

(i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、

(ii) 少なくとも E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

融合タンパク質を提供する：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が前記 E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は前記 E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

【0016】

本発明はまた、癌に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者の癌を治療するために有効な量で前記融合タンパク質を投与することを含んでなり、ここでの前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含んでなり、その配列は前記融合タンパク質の N 末端で開始し、下記アミノ酸の配列：

(a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および

(b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

(i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、

(ii) 少なくとも E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

融合タンパク質を提供する：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が前記 E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は前記 E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図 1 a】短縮型ノッチ 1 デコイ変異体。図 1 a は、各々が D L L 4 および J A G G E D - 1 と相互作用して、汎ノッチ阻害剤 (pan-ノッチ inhibitor) として作用するノッチ 1 デコイ 1 ~ 3 6 およびノッチ 1 デコイ 1 ~ 2 4 の概略図である。図 1 b は、四つの短縮型ノッチ 1 デコイ変異体 1 0 ~ 3 6、1 4 ~ 3 6、1 0 ~ 2 4 および 1 4 ~ 2 4 の概略図である。

【図 1 b】短縮型ノッチ 1 デコイ変異体。図 1 a は、各々が D L L 4 および J A G G E D - 1 と相互作用して、汎ノッチ阻害剤 (pan-ノッチ inhibitor) として作用するノッチ 1 デコイ 1 ~ 3 6 およびノッチ 1 デコイ 1 ~ 2 4 の概略図である。図 1 b は、四つの短縮型ノッチ 1 デコイ変異体 1 0 ~ 3 6、1 4 ~ 3 6、1 0 ~ 2 4 および 1 4 ~ 2 4 の概略図である。

【図 2 a】2 9 3 T 細胞における短縮型ノッチ 1 デコイ変異体の発現および分泌。図 2 a は、全細胞溶解物および上清のウエスタンブロット、並びにノッチ 1 デコイ 1 ~ 1 3、1 ~ 2 4 および 1 ~ 3 6 の分子量を示している。図 2 b は、全細胞溶解物および上清のウエスタンブロット、並びにノッチ 1 デコイ 1 0 ~ 3 6、1 4 ~ 3 6、1 0 ~ 2 4 および 1 4 ~ 2 4 の分子量を示している。

【図 2 b】2 9 3 T 細胞における短縮型ノッチ 1 デコイ変異体の発現および分泌。図 2 a は、全細胞溶解物および上清のウエスタンブロット、並びにノッチ 1 デコイ 1 ~ 1 3、1 ~ 2 4 および 1 ~ 3 6 の分子量を示している。図 2 b は、全細胞溶解物および上清のウエスタンブロット、並びにノッチ 1 デコイ 1 0 ~ 3 6、1 4 ~ 3 6、1 0 ~ 2 4 および 1 4

10

20

30

40

50

~ 24 の分子量を示している。

【図3 a】デコイ1~13、1~24および1~36についてのノッチレポータ試験。図3 aは、ルシフェラーゼ遺伝子に結合された複数のCSL結合部位を含むノッチレポータ構築物の概略図である。図3 bは、DLL4を発現するHELA細胞についての結果を示している。図3 cは、JAGGED-1を発現するHELA細胞についての結果を示している。

【図3 b】デコイ1~13、1~24および1~36についてのノッチレポータ試験。図3 aは、ルシフェラーゼ遺伝子に結合された複数のCSL結合部位を含むノッチレポータ構築物の概略図である。図3 bは、DLL4を発現するHELA細胞についての結果を示している。図3 cは、JAGGED-1を発現するHELA細胞についての結果を示している。

10

【図3 c】デコイ1~13、1~24および1~36についてのノッチレポータ試験。図3 aは、ルシフェラーゼ遺伝子に結合された複数のCSL結合部位を含むノッチレポータ構築物の概略図である。図3 bは、DLL4を発現するHELA細胞についての結果を示している。図3 cは、JAGGED-1を発現するHELA細胞についての結果を示している。

【図4 a】デコイ10~26、14~36、10~24および14~24についてのノッチレポータ試験。図4 aは、DLL4を発現するHELA細胞についての結果を示している。図4 bは、JAGGED-1を発現するHELA細胞についての結果を示している。

【図4 b】デコイ10~26、14~36、10~24および14~24についてのノッチレポータ試験。図4 aは、DLL4を発現するHELA細胞についての結果を示している。図4 bは、JAGGED-1を発現するHELA細胞についての結果を示している。

20

【図5 a】ノッチ1デコイと、可溶性(図5 a)または全長(図5 b)ノッチ1リガンドとを同時形質移入された、293細胞溶解物の抗Fcまたは抗FLAG抗体を用いたイムノプロット。

【図5 b】ノッチ1デコイと、可溶性(図5 a)または全長(図5 b)ノッチ1リガンドとを同時形質移入された、293細胞溶解物の抗Fcまたは抗FLAG抗体を用いたイムノプロット。

【図6】ノッチデコイおよびノッチ1の共免疫沈降。

【図7 a】P2日での異なるノッチ1デコイを発現するアデノウイルスの注射後の、P5マウス網膜のイソレクチンB4染色。図7 aは、対照デコイ、ノッチ1デコイ1~13、ノッチ10~24デコイおよびDAPTである。図7 bは、Rc、ノッチ1デコイ1~13、ノッチ10~24デコイおよびノッチデコイ1~24である。網膜の血管領域は図7 cに定量化されている。平均血管収斂面積 $\pm$ S.D.*P値<0.05

30

【図7 b】P2日での異なるノッチ1デコイを発現するアデノウイルスの注射後の、P5マウス網膜のイソレクチンB4染色。図7 aは、対照デコイ、ノッチ1デコイ1~13、ノッチ10~24デコイおよびDAPTである。図7 bは、Rc、ノッチ1デコイ1~13、ノッチ10~24デコイおよびノッチデコイ1~24である。網膜の血管領域は図7 cに定量化されている。平均血管収斂面積 $\pm$ S.D.*P値<0.05

【図7 c】P2日での異なるノッチ1デコイを発現するアデノウイルスの注射後の、P5マウス網膜のイソレクチンB4染色。図7 aは、対照デコイ、ノッチ1デコイ1~13、ノッチ10~24デコイおよびDAPTである。図7 bは、Rc、ノッチ1デコイ1~13、ノッチ10~24デコイおよびノッチデコイ1~24である。網膜の血管領域は図7 cに定量化されている。平均血管収斂面積 $\pm$ S.D.*P値<0.05

40

【図8 a】ノッチ1デコイを発現するHUVECの遺伝子発現プロファイリング。ノッチ受容体(ノッチ1、ノッチ2、ノッチ3、およびノッチ4)のmRNA転写物についての定量的RT-PCRが、図8 a、図8 b、図8 cおよび図8 dにそれぞれ記載されている。

【図8 b】ノッチ1デコイを発現するHUVECの遺伝子発現プロファイリング。ノッチ受容体(ノッチ1、ノッチ2、ノッチ3、およびノッチ4)のmRNA転写物についての

50

定量的 R T - P C R が、図 8 a、図 8 b、図 8 c および図 8 d にそれぞれ記載されている。

【図 8 c】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。ノッチ受容体（ノッチ 1、ノッチ 2、ノッチ 3、およびノッチ 4）の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 8 a、図 8 b、図 8 c および図 8 d にそれぞれ記載されている。

【図 8 d】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。ノッチ受容体（ノッチ 1、ノッチ 2、ノッチ 3、およびノッチ 4）の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 8 a、図 8 b、図 8 c および図 8 d にそれぞれ記載されている。

【図 9 a】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。H E Y 1 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 9 a に示されている。H E Y 2 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 9 b に示されている。

【図 9 b】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。H E Y 1 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 9 a に示されている。H E Y 2 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 9 b に示されている。

【図 10 a】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。H E Y L の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 10 a に示されている。H E S 1 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 10 b に示されている。

【図 10 b】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。H E Y L の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 10 a に示されている。H E S 1 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が、図 10 b に示されている。

【図 11 a】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。D L L 4 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が図 11 a に；J A G G E D - 1 についての定量的 T R - P C R が図 11 b に；V E G F R - 1 についての定量的 R T - P C R が図 11 c に；V E G F R - 2 についての定量的 R T - P C R が図 11 d に；V E G F R - 3 についての定量的 R T - P C R が図 11 e に、それぞれ示されている。

【図 11 b】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。D L L 4 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が図 11 a に；J A G G E D - 1 についての定量的 T R - P C R が図 11 b に；V E G F R - 1 についての定量的 R T - P C R が図 11 c に；V E G F R - 2 についての定量的 R T - P C R が図 11 d に；V E G F R - 3 についての定量的 R T - P C R が図 11 e に、それぞれ示されている。

【図 11 c】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。D L L 4 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が図 11 a に；J A G G E D - 1 についての定量的 T R - P C R が図 11 b に；V E G F R - 1 についての定量的 R T - P C R が図 11 c に；V E G F R - 2 についての定量的 R T - P C R が図 11 d に；V E G F R - 3 についての定量的 R T - P C R が図 11 e に、それぞれ示されている。

【図 11 d】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。D L L 4 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が図 11 a に；J A G G E D - 1 についての定量的 T R - P C R が図 11 b に；V E G F R - 1 についての定量的 R T - P C R が図 11 c に；V E G F R - 2 についての定量的 R T - P C R が図 11 d に；V E G F R - 3 についての定量的 R T - P C R が図 11 e に、それぞれ示されている。

【図 11 e】ノッチ 1 デコイを発現する H U V E C の遺伝子発現プロファイリング。D L L 4 の m R N A 転写物についての定量的 R T - P C R が図 11 a に；J A G G E D - 1 についての定量的 T R - P C R が図 11 b に；V E G F R - 1 についての定量的 R T - P C R が図 11 c に；V E G F R - 2 についての定量的 R T - P C R が図 11 d に；V E G F R - 3 についての定量的 R T - P C R が図 11 e に、それぞれ示されている。

【図 12 a】V E G F 受容体についてのフローサイトメトリー。V E G F R - 1（図 12 a）、V E G F R - 2（図 12 b）、および V E G F R - 3（図 12 c）のためのノッチデコイを発現する H U V E C のヒストグラム。

10

20

30

40

50

【図12b】VEGF受容体についてのフローサイトメトリー。VEGFR-1(図12a)、VEGFR-2(図12b)、およびVEGFR-3(図12c)のためのノッチデコイを発現するHUVECのヒストグラム。

【図12c】VEGF受容体についてのフローサイトメトリー。VEGFR-1(図12a)、VEGFR-2(図12b)、およびVEGFR-3(図12c)のためのノッチデコイを発現するHUVECのヒストグラム。

【図13a】ノッチ1デコイを発現するHUVECの遺伝子発現プロファイル。全長VEGFR-1および可溶性VEGFR-1のmRNAについての定量的RT-PCR。

【図13b】ノッチ1デコイを発現するHUVECの遺伝子発現プロファイル。全長VEGFR-1および可溶性VEGFR-1のmRNAについての定量的RT-PCR。

【図14】マウス乳腺腫瘍細胞(Mm5MT)、ヒト膵臓癌細胞(KP1)、マウスのルイス肺癌細胞(LLC)、およびマウスのメラノーマ細胞(B16-F10)において発現したノッチ受容体の遺伝子発現プロファイリング。

【図15a】Mm5MTおよびKP1腫瘍細胞の細胞増殖およびアポトーシスに対するノッチデコイ1~13、10~24および1~24の影響。図15aは、Mm5MT-FGF細胞における癌増殖研究の結果である。図15bは、KP1-VEGFにおける増殖研究の結果である。アポトーシス細胞のパーセンテージは、右上象限に示されている。平均アポトーシス細胞パーセンテージ±S.D. 図15cは、Mm5MT-FGF4におけるアポトーシス研究の結果である。図15dは、KP1-VEGFにおけるアポトーシス研究の結果である。

【図15b】Mm5MTおよびKP1腫瘍細胞の細胞増殖およびアポトーシスに対するノッチデコイ1~13、10~24および1~24の影響。図15aは、Mm5MT-FGF細胞における癌増殖研究の結果である。図15bは、KP1-VEGFにおける増殖研究の結果である。アポトーシス細胞のパーセンテージは、右上象限に示されている。平均アポトーシス細胞パーセンテージ±S.D. 図15cは、Mm5MT-FGF4におけるアポトーシス研究の結果である。図15dは、KP1-VEGFにおけるアポトーシス研究の結果である。

【図15c】Mm5MTおよびKP1腫瘍細胞の細胞増殖およびアポトーシスに対するノッチデコイ1~13、10~24および1~24の影響。図15aは、Mm5MT-FGF細胞における癌増殖研究の結果である。図15bは、KP1-VEGFにおける増殖研究の結果である。アポトーシス細胞のパーセンテージは、右上象限に示されている。平均アポトーシス細胞パーセンテージ±S.D. 図15cは、Mm5MT-FGF4におけるアポトーシス研究の結果である。図15dは、KP1-VEGFにおけるアポトーシス研究の結果である。

【図15d】Mm5MTおよびKP1腫瘍細胞の細胞増殖およびアポトーシスに対するノッチデコイ1~13、10~24および1~24の影響。図15aは、Mm5MT-FGF細胞における癌増殖研究の結果である。図15bは、KP1-VEGFにおける増殖研究の結果である。アポトーシス細胞のパーセンテージは、右上象限に示されている。平均アポトーシス細胞パーセンテージ±S.D. 図15cは、Mm5MT-FGF4におけるアポトーシス研究の結果である。図15dは、KP1-VEGFにおけるアポトーシス研究の結果である。

【図16a】図16aは、ノッチ1デコイ1~13、10~24および1~24を発現するアデノウイルス、または対照としてのFcを静脈注射した、マウス血清中のFc、ノッチ1デコイ1~13、10~24および1~24のウエスタンブロット分析である。図16bおよび図16cは、抗ヒトIgG・Fc抗体により免疫染色し、またDAPIで対比染色した腫瘍切片である。スケールバー：30マイクロメータ。

【図16b】図16aは、ノッチ1デコイ1~13、10~24および1~24を発現するアデノウイルス、または対照としてのFcを静脈注射した、マウス血清中のFc、ノッチ1デコイ1~13、10~24および1~24のウエスタンブロット分析である。図16bおよび図16cは、抗ヒトIgG・Fc抗体により免疫染色し、またDAPIで対比

10

20

30

40

50

染色した腫瘍切片である。スケールバー：30マイクロメータ。

【図16c】図16aは、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24を発現するアデノウイルス、または対照としてのFcを静脈注射した、マウス血清中のFc、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24のウエスタンブロット分析である。図16bおよび図16cは、抗ヒトIgG・Fc抗体により免疫染色し、またDAPIで対比染色した腫瘍切片である。スケールバー：30マイクロメータ。

【図17a】図17aは、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24、または対照としてのFcを発現するマウスの画像である。ノッチ1デコイは、Mm5MT腫瘍の増殖を低下させた。腫瘍増殖は、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して発光信号からの全放射輝度を評価することによりモニターされた。その結果を図17b

10

【図17b】図17aは、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24、または対照としてのFcを発現するマウスの画像である。ノッチ1デコイは、Mm5MT腫瘍の増殖を低下させた。腫瘍増殖は、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して発光信号からの全放射輝度を評価することによりモニターされた。その結果を図17b

【図17c】図17aは、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24、または対照としてのFcを発現するマウスの画像である。ノッチ1デコイは、Mm5MT腫瘍の増殖を低下させた。腫瘍増殖は、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して発光信号からの全放射輝度を評価することによりモニターされた。その結果を図17b

20

【図18a】図18aは、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24、または対照としてのFcを発現するマウスの画像である。ノッチ1デコイは、KP1腫瘍の増殖を低下させた。腫瘍増殖は、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して発光信号からの全放射輝度を評価することによりモニターされた。その結果を図18b

【図18b】図18aは、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24、または対照としてのFcを発現するマウスの画像である。ノッチ1デコイは、KP1腫瘍の増殖を低下させた。腫瘍増殖は、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して発光信号からの全放射輝度を評価することによりモニターされた。その結果を図18b

30

【図18c】図18aは、ノッチ1デコイ1～13、10～24および1～24、または対照としてのFcを発現するマウスの画像である。ノッチ1デコイは、KP1腫瘍の増殖を低下させた。腫瘍増殖は、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して発光信号からの全放射輝度を評価することによりモニターされた。その結果を図18b

【図19a】腫瘍脈管構造に対するノッチ1の影響。エンドムチン(Endomucin)(緑色)およびDLL4(赤色)について、腫瘍切片を免疫染色した。その結果を図19aに示す。腫瘍脈管構造の定量化は、腫瘍切片におけるエンドムチン陽性の面積に基づいていた。その結果を図19bに示す。

40

【図19b】腫瘍脈管構造に対するノッチ1の影響。エンドムチン(Endomucin)(緑色)およびDLL4(赤色)について、腫瘍切片を免疫染色した。その結果を図19aに示す。腫瘍脈管構造の定量化は、腫瘍切片におけるエンドムチン陽性の面積に基づいていた。その結果を図19bに示す。

【図20a】腫瘍内皮含量の免疫蛍光分析。KP1腫瘍をエンドムチンおよびDLL4について免疫染色した。その結果を図20aに示す。腫瘍血管構造の定量化は、エンドムチン陽性の面積に基づいていた。腫瘍脈管構造の定量化は、KP1腫瘍切片におけるエンドムチン陽性の面積に基づいていた。その結果を図20bに示す。

【図20b】腫瘍内皮含量の免疫蛍光分析。KP1腫瘍をエンドムチンおよびDLL4について免疫染色した。その結果を図20aに示す。腫瘍血管構造の定量化は、エンドムチ

50

ン陽性の面積に基づいていた。腫瘍脈管構造の定量化は、K P 1 腫瘍切片におけるエンドムチン陽性の面積に基づいていた。その結果を図 2 0 b に示す。

【図 2 1 a】腫瘍血管構造に対するノッチ 1 デコイの影響。フルオレセインに結合されたレクチン (1 0 0 μ g) を、腫瘍収集の 2 分前にマウスに注射した。腫瘍切片をエンドムチン (赤色) について免疫染色し、また腫瘍血管と結合した灌流レクチン (緑色) について腫瘍切片を免疫染色した。その結果を図 2 1 a に示す。血管と結合したレクチンの量は、機能性の腫瘍血管を反映しており、その結果を図 2 1 b に示した。

【図 2 1 b】腫瘍血管構造に対するノッチ 1 デコイの影響。フルオレセインに結合されたレクチン (1 0 0 μ g) を、腫瘍収集の 2 分前にマウスに注射した。腫瘍切片をエンドムチン (赤色) について免疫染色し、また腫瘍血管と結合した灌流レクチン (緑色) について腫瘍切片を免疫染色した。その結果を図 2 1 a に示す。血管と結合したレクチンの量は、機能性の腫瘍血管を反映しており、その結果を図 2 1 b に示した。

【図 2 2 a】腫瘍切片を、エンドムチン (緑) および N G 2 (赤) について同時免疫染色し、その結果を図 2 2 a に記載した。N G 2 陽性面積のパーセンテージを、腫瘍における周皮細胞補充のパラメータとして測定し、その結果を図 2 2 b に示した。

【図 2 2 b】腫瘍切片を、エンドムチン (緑) および N G 2 (赤) について同時免疫染色し、その結果を図 2 2 a に記載した。N G 2 陽性面積のパーセンテージを、腫瘍における周皮細胞補充のパラメータとして測定し、その結果を図 2 2 b に示した。

【図 2 3 a】異なるノッチデコイ群からの発光信号を用いた L L C 腫瘍をもつマウスの第 1 2 日の写真が、図 2 3 a に示されている。腫瘍増殖がモニターされ、総放射輝度に基づいて定量された。その結果が図 2 3 b に示されている。第 1 2 日における腫瘍重量が腫瘍を収集する前に測定された。その結果が図 2 3 c に示されている。

【図 2 3 b】異なるノッチデコイ群からの発光信号を用いた L L C 腫瘍をもつマウスの第 1 2 日の写真が、図 2 3 a に示されている。腫瘍増殖がモニターされ、総放射輝度に基づいて定量された。その結果が図 2 3 b に示されている。第 1 2 日における腫瘍重量が腫瘍を収集する前に測定された。その結果が図 2 3 c に示されている。

【図 2 3 c】異なるノッチデコイ群からの発光信号を用いた L L C 腫瘍をもつマウスの第 1 2 日の写真が、図 2 3 a に示されている。腫瘍増殖がモニターされ、総放射輝度に基づいて定量された。その結果が図 2 3 b に示されている。第 1 2 日における腫瘍重量が腫瘍を収集する前に測定された。その結果が図 2 3 c に示されている。

【図 2 4 a】異なるノッチデコイ群からの発光信号を用いた、B 1 6 - F 1 0 腫瘍をもつマウスの第 1 2 日の写真が図 2 4 a に示されている。総放射輝度に基づいて腫瘍増殖をモニターし、その結果を図 2 4 b に記載した。第 1 2 日における腫瘍重量を腫瘍の収集前に測定し、その結果を図 2 4 c に示した。

【図 2 4 b】異なるノッチデコイ群からの発光信号を用いた、B 1 6 - F 1 0 腫瘍をもつマウスの第 1 2 日の写真が図 2 4 a に示されている。総放射輝度に基づいて腫瘍増殖をモニターし、その結果を図 2 4 b に記載した。第 1 2 日における腫瘍重量を腫瘍の収集前に測定し、その結果を図 2 4 c に示した。

【図 2 4 c】異なるノッチデコイ群からの発光信号を用いた、B 1 6 - F 1 0 腫瘍をもつマウスの第 1 2 日の写真が図 2 4 a に示されている。総放射輝度に基づいて腫瘍増殖をモニターし、その結果を図 2 4 b に記載した。第 1 2 日における腫瘍重量を腫瘍の収集前に測定し、その結果を図 2 4 c に示した。

【図 2 5 a】第 1 2 日に L L C 腫瘍を有するマウスから肺および肝臓を収集し、3 0 m g / m L の D ルシフェリン中でインキュベートし、ゼノジェン (Xenogen) I V I S 撮像システムにより解析した。撮像の結果を図 2 5 a に記載した。総輝度の結果は図 2 5 b に記載した。

【図 2 5 b】第 1 2 日に L L C 腫瘍を有するマウスから肺および肝臓を収集し、3 0 m g / m L の D ルシフェリン中でインキュベートし、ゼノジェン (Xenogen) I V I S 撮像システムにより解析した。撮像の結果を図 2 5 a に記載した。総輝度の結果は図 2 5 b に記載した。

10

20

30

40

50

【図26a】腫瘍を有するB16-F10マウスから第12日に肺および肝臓を収集し、30mg/mLのDルシフェリン中でインキュベートし、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して解析した。肺についてのFc群からの画像は図26aおよび図26bに記載し、肝臓についての画像は図26cに記載した。

【図26b】腫瘍を有するB16-F10マウスから第12日に肺および肝臓を収集し、30mg/mLのDルシフェリン中でインキュベートし、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して解析した。肺についてのFc群からの画像は図26aおよび図26bに記載し、肝臓についての画像は図26cに記載した。

【図26c】腫瘍を有するB16-F10マウスから第12日に肺および肝臓を収集し、30mg/mLのDルシフェリン中でインキュベートし、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して解析した。肺についてのFc群からの画像は図26aおよび図26bに記載し、肝臓についての画像は図26cに記載した。

10

【図27a】ノッチ1デコイは、温和な杯状細胞肥厚を誘導する。汎ノッチ阻害剤であるノッチ1デコイ1~24および1~36と同様に、リガンド特異的デコイは、杯状細胞の数を僅かに増大させた。小腸の正常なアーキテクチャーが保存され、対照と比較された。結果を図27aに示す。視野(field)当たりの平均杯状細胞数が計算され、その結果が図27bに示されている。図27cは、腫瘍を有するマウスがノッチ1デコイに十分に耐えられることを示している。治療群と対照群の間での体重変化に有意な相違は観察されない。平均体重変化 $\pm$ S.D. (n=5)。

【図27b】ノッチ1デコイは、温和な杯状細胞肥厚を誘導する。汎ノッチ阻害剤であるノッチ1デコイ1~24および1~36と同様に、リガンド特異的デコイは、杯状細胞の数を僅かに増大させた。小腸の正常なアーキテクチャーが保存され、対照と比較された。結果を図27aに示す。視野当たりの平均杯状細胞数が計算され、その結果が図27bに示されている。図27cは、腫瘍を有するマウスがノッチ1デコイに十分に耐えられることを示している。治療群と対照群の間での体重変化には有意な相違は観察されない。平均体重変化 $\pm$ S.D. (n=5)。

20

【図27c】ノッチ1デコイは、温和な杯状細胞肥厚を誘導する。汎ノッチ阻害剤であるノッチ1デコイ1~24および1~36と同様に、リガンド特異的デコイは、杯状細胞の数を僅かに増大させた。小腸の正常なアーキテクチャーが保存され、対照と比較された。結果を図27aに示す。視野当たりの平均杯状細胞数が計算され、その結果が図27bに示されている。図27cは、腫瘍を有するマウスがノッチ1デコイに十分に耐えられることを示している。治療群と対照群の間での体重変化には有意な相違は観察されない。平均体重変化 $\pm$ S.D. (n=5)。

30

【図28-1】ヒト・ノッチ1タンパク質のアミノ酸配列(配列番号1)。

【図28-2】図28-1の続き

【図28-3】図28-2の続き

【図28-4】図28-3の続き

【図29-1】ヒト・ノッチ1デコイ10~24の核酸配列が、配列番号2に記載される。ヒト・ノッチ1シグナルペプチドは、配列番号2のヌクレオチド1~69に対応し、EGF様反復10~24は、配列番号2のヌクレオチド70~1788に対応し、またヒトFcは配列番号2のヌクレオチド1789~2502に対応する。ヒト・ノッチ1デコイ10~24のアミノ酸配列は、配列番号3に記載されている。

40

【図29-2】図29-1の続き

【図29-3】図29-2の続き

【図30-1】ヒト・ノッチ1デコイ10~36の核酸配列が、配列番号4に記載されている。ヒト・ノッチ1シグナルペプチドは、配列番号4のヌクレオチド1~69に対応し、EGF様反復10~36は、配列番号4のヌクレオチド70~3243に対応し、またヒトFcは配列番号2のヌクレオチド3244~3957に対応する。ヒト・ノッチ1デコイ10~36のアミノ酸配列は、配列番号5に記載されている。

【図30-2】図30-1の続き

50

【図30-3】図30-2の続き

【図30-4】図30-3の続き

【図31-1】ヒト・ノッチ1デコイ14~21の核酸配列が、配列番号6に記載されている。ヒト・ノッチ1シグナルペプチドは、配列番号6のヌクレオチド1~69に対応し、EGF様反復14~24は、配列番号6のヌクレオチド70~1320に対応し、またヒトFcは配列番号6のヌクレオチド1321~2034に対応する。ヒト・ノッチ1デコイ14~24のアミノ酸配列は、配列番号7に記載されている。

【図31-2】図31-1の続き

【図32-1】ヒト・ノッチ1デコイ14~36の核酸配列が、配列番号8に記載されている。ヒト・ノッチ1シグナルペプチドは、配列番号8のヌクレオチド1~69に対応し、EGF様反復14~36は、配列番号8のヌクレオチド70~2775に対応し、またヒトFcは配列番号8のヌクレオチド2776~3489に対応する。ヒト・ノッチ1デコイ14~36のアミノ酸配列は、配列番号9に記載されている。

10

【図32-2】図32-1の続き

【図32-3】図32-2の続き

【図32-4】図32-3の続き

【図33a】ノッチ1デコイ変異体は、インビトロおよび網膜血管新生に対して独特の効果を示す。図33aは、HUV ECフィブリンビード発芽アッセイを使用したノッチ1デコイの評価を示している。7日後、管状構造体からの内皮細胞、N1¹⁻¹³デコイを発現するHUNECsは、有意に増大した発芽を示す。対照的に、N1¹⁰⁻²⁴またはN1¹⁻²⁴を発現するHUV ECは、Fc対象とは逆に、より短く且つより細い発芽を形成する。ルーメンを含む発芽の数が図33bに定量化されている。発芽の平均数±S.D. * P値<0.05。網膜をSMAで免疫染色して、血管平滑筋細胞を同定した。N1¹⁰⁻²⁴およびN1¹⁻²⁴デコイは、網膜動脈に沿った血管平滑筋細胞被覆を顕著に減少させる。結果を図33cに示す。

20

【図33b】ノッチ1デコイ変異体は、インビトロおよび網膜血管新生に対して独特の効果を示す。図33aは、HUV ECフィブリンビード発芽アッセイを使用したノッチ1デコイの評価を示している。7日後、管状構造体からの内皮細胞、N1¹⁻¹³デコイを発現するHUNECsは、有意に増大した発芽を示す。対照的に、N1¹⁰⁻²⁴またはN1¹⁻²⁴を発現するHUV ECは、Fc対象とは逆に、より短く且つより細い発芽を形成する。ルーメンを含む発芽の数が図33bに定量化されている。発芽の平均数±S.D. * P値<0.05。網膜をSMAで免疫染色して、血管平滑筋細胞を同定した。N1¹⁰⁻²⁴およびN1¹⁻²⁴デコイは、網膜動脈に沿った血管平滑筋細胞被覆を顕著に減少させる。結果を図33cに示す。

30

【図33c】ノッチ1デコイ変異体は、インビトロおよび網膜血管新生に対して独特の効果を示す。図33aは、HUV ECフィブリンビード発芽アッセイを使用したノッチ1デコイの評価を示している。7日後、管状構造体からの内皮細胞、N1¹⁻¹³デコイを発現するHUNECsは、有意に増大した発芽を示す。対照的に、N1¹⁰⁻²⁴またはN1¹⁻²⁴を発現するHUV ECは、Fc対象とは逆に、より短く且つより細い発芽を形成する。ルーメンを含む発芽の数が図33bに定量化されている。発芽の平均数±S.D. * P値<0.05。網膜をSMAで免疫染色して、血管平滑筋細胞を同定した。N1¹⁰⁻²⁴およびN1¹⁻²⁴デコイは、網膜動脈に沿った血管平滑筋細胞被覆を顕著に減少させる。結果を図33cに示す。

40

【図34a】ノッチ1デコイは、内皮細胞遊走を増大させる。レンチウイルスで形質導入されたHUV ECを、ウエル当たり1.0×10⁵細胞で24穴プレートに播種し、一晩で集密状態にした。次いで、各ウエルをスクラッチし、傷付けられた領域へのHUV ECの遊走を写真に撮り(図34a)、Tスクラッチプログラムを用いて定量化した。平均遊走率±S.D. * P値<0.03(図34b)。

【図34b】ノッチ1デコイは、内皮細胞遊走を増大させる。レンチウイルスで形質導入されたHUV ECを、ウエル当たり1.0×10⁵細胞で24穴プレートに播種し、一晩

50

で集密状態にした。次いで、各ウエルをスクラッチし、傷付けられた領域へのH U V E Cの遊走を写真に撮り(図34a)、Tスクラッチプログラムを用いて定量化した。平均遊走率 $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 03$ (図34b)。

【図34c】図34cは、ノッチ1デコイが内皮細胞増殖を増大させることを示している。レンチウイルスでFc、ノッチ1デコイ1~13、1~24、1~36、またはN1ICを形質導入されたH U V E Cを、ウエル当たり $1 . 0 \times 10^4$ 細胞で24穴プレートに播種した。第1日および第4日に細胞数を定量した。平均細胞数 $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 05$ 。

【図35a】ノッチ1デコイを発現するH U V E Cは、増大した内皮ネットワークおよび枝分かれを示している。図35a。H U V E Cは、ウエル当たり $1 . 0 \times 10^5$ 細胞で24穴プレート内のコラーゲン層の間に播種し、4日間培養した。図34b。ネットワークを形成するH U V E Cの能力を、枝分かれ点の数をカウントすることにより定量した。H U V E C - N1ICおよびH U V E C - ノッチ4 / i n t 3は、それらが適正なネットワークを欠いているため含められなかった。細分枝点の平均数 $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 05$ 。

【図35b】ノッチ1デコイを発現するH U V E Cは、増大した内皮ネットワークおよび枝分かれを示している。図35a。H U V E Cは、ウエル当たり $1 . 0 \times 10^5$ 細胞で24穴プレート内のコラーゲン層の間に播種し、4日間培養した。図34b。ネットワークを形成するH U V E Cの能力を、枝分かれ点の数をカウントすることにより定量した。H U V E C - N1ICおよびH U V E C - ノッチ4 / i n t 3は、それらが適正なネットワークを欠いているため含められなかった。細分枝点の平均数 $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 05$ 。

【図36】ノッチリガンドであるJ A G G E D - 1およびD L L 4についての定量的リアルタイムPCR。通常の培養プレートまたはコラーゲンゲル上でのものに比較して。フィブリンゲル上で培養されたH U V E Cは、J A G G E D - 1発現を有意に上方調節し、同時に、D L L 4発現を下方調節した。m R N A転写物の平均相対値 $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 02$ 。

【図37a】ノッチ1デコイ1~13、10~24、および1~24は、M m 5 M T F G F 4中でのコロニー形成を低下させる。図37a。M m 5 M T - F G F 4、K P 1 - V E G F、L L C、およびB 1 6 - F 1 0腫瘍細胞を、24穴プレートにおいて、 3×10^3 細胞/ウエルで半固形寒天培地中に播種し、3週間培養した。コロニーの可視化のために、 3 mg / mL のMTTを培養液に加えた。図37b。コロニー面積の定量化を行った。コロニー面積の平均パーセンテージ $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 001$ 。

【図37b】ノッチ1デコイ1~13、10~24、および1~24は、M m 5 M T F G F 4中でのコロニー形成を低下させる。図37a。M m 5 M T - F G F 4、K P 1 - V E G F、L L C、およびB 1 6 - F 1 0腫瘍細胞を、24穴プレートにおいて、 3×10^3 細胞/ウエルで半固形寒天培地中に播種し、3週間培養した。コロニーの可視化のために、 3 mg / mL のMTTを培養液に加えた。図37b。コロニー面積の定量化を行った。コロニー面積の平均パーセンテージ $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 001$ 。

【図38】ノッチ1デコイは、異種移植片の腫瘍増殖をブロックする。ヌードマウスに皮下注射されたM m 5 M T - F G F 4、K P 1 - V E G F、L L C、またはB 1 6 - F 1 0を用いて腫瘍増殖を評価した。異なるノッチ1デコイ変異体をコードするAdを、腫瘍移植の3日後に静脈注射した。腫瘍は、ノッチ1デコイ治療群の方が有意に小さかった。収集の時点で腫瘍重量を測定する。平均腫瘍重量 $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 05$ ($n = 4 \sim 5$)。

【図39a】ノッチ1デコイ1~24および1~36は、M m 5 M T - F G F 4(図39a)およびK P 1 - V E G F腫瘍(図39b)の増殖を同様に低下させた。腫瘍容積(V)は、長さ(L)および幅(W)から計算され($V = 0 . 5 \times L \times W$)、これは毎週ベースで測定された。平均腫瘍体積 $\pm$ S . D . * P値 $< 0 . 05$ 。ノッチ1デコイ1~24および1~36は、腫瘍血管構造を有意に低下させた。C D 3 1免疫蛍光は、ノッチ1デコイ群からの腫瘍における減少した血管含有量および崩壊された構造を示している。縮尺バ

10

20

30

40

50

ー：30マイクロメータ。データを図39cに示す。

【図39b】ノッチ1デコイ1~24および1~36は、Mm5MT-FGF4(図39a)およびKP1-VEGF腫瘍(図39b)の増殖を同様に低下させた。腫瘍容積(V)は、長さ(L)および幅(W)から計算され($V = 0.5 \times L \times W$)、これは毎週ベースで測定された。平均腫瘍体積 $\pm$ S.D.*P値 < 0.05 。ノッチ1デコイ1~24および1~36は、腫瘍血管構造を有意に低下させた。CD31免疫蛍光は、ノッチ1デコイ群からの腫瘍における減少した血管含有量および崩壊された構造を示している。縮尺バー：30マイクロメータ。データを図39cに示す。

【図39c】ノッチ1デコイ1~24および1~36は、Mm5MT-FGF4(図39a)およびKP1-VEGF腫瘍(図39b)の増殖を同様に低下させた。腫瘍容積(V)は、長さ(L)および幅(W)から計算され($V = 0.5 \times L \times W$)、これは毎週ベースで測定された。平均腫瘍体積 $\pm$ S.D.*P値 < 0.05 。ノッチ1デコイ1~24および1~36は、腫瘍血管構造を有意に低下させた。CD31免疫蛍光は、ノッチ1デコイ群からの腫瘍における減少した血管含有量および崩壊された構造を示している。縮尺バー：30マイクロメータ。データを図39cに示す。

【図40a】ノッチ1デコイは、異種移植された腫瘍増殖をブロックする。図40aは、ノッチ1¹⁻¹³デコイがD114/ノッチ活性をブロックし、増大した腫瘍血管構造をもたらす一方、ノッチ1¹⁰⁻²⁴またはノッチ1¹⁻²⁴デコイは、全ての腫瘍モデルにおいて腫瘍血管を減少させることを示している。腫瘍血管構造は、エンドムチン免疫蛍光(緑)によって分析された。図40bは、複数の腫瘍切片からエンドムチン陽性面積について定量化された図40aの画像についてのデータを示している。エンドムチン陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.*P値 < 0.003 (n=4~5)。縮尺バー：30マイクロメータ。

【図40b】ノッチ1デコイは、異種移植された腫瘍増殖をブロックする。図40aは、ノッチ1¹⁻¹³デコイがD114/ノッチ活性をブロックし、増大した腫瘍血管構造をもたらす一方、ノッチ1¹⁰⁻²⁴またはノッチ1¹⁻²⁴デコイは、全ての腫瘍モデルにおいて腫瘍血管を減少させることを示している。腫瘍血管構造は、エンドムチン免疫蛍光(緑)によって分析された。図40bは、複数の腫瘍切片からエンドムチン陽性面積について定量化された図40aの画像についてのデータを示している。エンドムチン陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.*P値 < 0.003 (n=4~5)。縮尺バー：30マイクロメータ。

【図41a】ノッチ1デコイは腫瘍血管新生を混乱させ、灌流を低下させて、低酸素症を誘導する。フルオレセイン結合レクチンを注射したマウスからの腫瘍切片を、エンドムチン(赤)および灌流レクチン(緑)で免疫染色する。エンドムチン結合したレクチンの量は、機能性腫瘍血管構造および正常な灌流を反映する。低酸素プローブを腹腔内注射されたマウスからの腫瘍切片を、APCに結合された抗低酸素プローブ抗体(赤)およびDAPI(青)で免疫染色し、腫瘍低酸素症について定量化した。データを図41aに示す。レクチン陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.*P値 < 0.006 (n=4~5)を図41bに示す。低酸素プローブ陽性面積 $\pm$ S.D.*P値 < 0.002 (n=4~5)、**P値 < 0.05 (n=4~5)を図41cに示す。デコイ治療されたマウスは、有意に増大した低酸素症およびネクロシスを示した。縮尺バー：30マイクロメータ。

【図41b】ノッチ1デコイは腫瘍血管新生を混乱させ、灌流を低下させて、低酸素症を誘導する。フルオレセイン結合レクチンを注射したマウスからの腫瘍切片を、エンドムチン(赤)および灌流レクチン(緑)で免疫染色する。エンドムチン結合したレクチンの量は、機能性腫瘍血管構造および正常な灌流を反映する。低酸素プローブを腹腔内注射されたマウスからの腫瘍切片を、APCに結合された抗低酸素プローブ抗体(赤)およびDAPI(青)で免疫染色し、腫瘍低酸素症について定量化した。データを図41aに示す。レクチン陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.*P値 < 0.006 (n=4~5)を図41bに示す。低酸素プローブ陽性面積 $\pm$ S.D.*P値 < 0.002 (n=4~5)、**P値 < 0.05 (n=4~5)を図41cに示す。デコイ治療されたマウスは、有

10

20

30

40

50

意に増大した低酸素症およびネクローシスを示した。縮尺バー：30マイクロメートル。

【図41c】ノッチ1デコイは腫瘍血管新生を混乱させ、灌流を低下させて、低酸素症を誘導する。フルオレセイン結合レクチンを注射したマウスからの腫瘍切片を、エンドムチン(赤)および灌流レクチン(緑)で免疫染色する。エンドムチン結合したレクチンの量は、機能性腫瘍血管構造および正常な灌流を反映する。低酸素プローブを腹腔内注射されたマウスからの腫瘍切片を、APCに結合された抗低酸素プローブ抗体(赤)およびDAPI(青)で免疫染色し、腫瘍低酸素症について定量化した。データを図41aに示す。レクチン陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D. * P値 < 0.006 (n=4~5)を図41bに示す。低酸素プローブ陽性面積 $\pm$ S.D. * P値 < 0.002 (n=4~5)、** P値 < 0.05 (n=4~5)を図41cに示す。デコイ治療されたマウスは、有意に増大した低酸素症およびネクローシスを示した。縮尺バー：30マイクロメートル。

【図42a】ノッチ1デコイは、腫瘍血管新生を崩壊させる。Mm5MT-FGF4腫瘍切片のIV型コラーゲン(赤)およびエンドムチン(緑)免疫蛍光。IV型コラーゲンの存在は、腫瘍血管構造と相関しており、ノッチ1デコイが、血管退行を生じることなく、腫瘍血管新生を阻害することを示唆している。画像が図42aに示されている。平均IV型コラーゲン陽性面積および平均エンドムチン陽性面積 $\pm$ S.D.が、それぞれ図42bおよび図42cに示されている。* P値 < 0.002 * P value < 0.002 .

【図42b】ノッチ1デコイは、腫瘍血管新生を崩壊させる。Mm5MT-FGF4腫瘍切片のIV型コラーゲン(赤)およびエンドムチン(緑)免疫蛍光。IV型コラーゲンの存在は、腫瘍血管構造と相関しており、ノッチ1デコイが、血管退行を生じることなく、腫瘍血管新生を阻害することを示唆している。画像が図42aに示されている。平均IV型コラーゲン陽性面積および平均エンドムチン陽性面積 $\pm$ S.D.が、それぞれ図42bおよび図42cに示されている。* P値 < 0.002 * P value < 0.002 .

【図42c】ノッチ1デコイは、腫瘍血管新生を崩壊させる。Mm5MT-FGF4腫瘍切片のIV型コラーゲン(赤)およびエンドムチン(緑)免疫蛍光。IV型コラーゲンの存在は、腫瘍血管構造と相関しており、ノッチ1デコイが、血管退行を生じることなく、腫瘍血管新生を阻害することを示唆している。画像が図42aに示されている。平均IV型コラーゲン陽性面積および平均エンドムチン陽性面積 $\pm$ S.D.が、それぞれ図42bおよび図42cに示されている。* P値 < 0.002

【図43a】JAGGED-1を標的とするノッチ1デコイは、腫瘍における壁細胞-内皮細胞の相互作用を遮断する。腫瘍切片を、エンドムチン(緑)およびNG2(赤)について同時免疫染色した。画像を図43aに示す。縮尺バー：10マイクロメートル。NG2陽性面積のパーセンテージを、腫瘍における周皮細胞被覆のパラメータとして測定した。エンドムチンまたはNG2陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.を、それぞれ図43bおよび43cにそれぞれ示す。図43dは、NG2陽性/エンドムチン陽性面積 * P値 < 0.02 (n=4~5)を示す。

【図43b】JAGGED-1を標的とするノッチ1デコイは、腫瘍における壁細胞-内皮細胞の相互作用を遮断する。腫瘍切片を、エンドムチン(緑)およびNG2(赤)について同時免疫染色した。画像を図43aに示す。縮尺バー：10マイクロメートル。NG2陽性面積のパーセンテージを、腫瘍における周皮細胞被覆のパラメータとして測定した。エンドムチンまたはNG2陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.を、それぞれ図43bおよび43cにそれぞれ示す。図43dは、NG2陽性/エンドムチン陽性面積 * P値 < 0.02 (n=4~5)を示す。

【図43c】JAGGED-1を標的とするノッチ1デコイは、腫瘍における壁細胞-内皮細胞の相互作用を遮断する。腫瘍切片を、エンドムチン(緑)およびNG2(赤)について同時免疫染色した。画像を図43aに示す。縮尺バー：10マイクロメートル。NG2陽性面積のパーセンテージを、腫瘍における周皮細胞被覆のパラメータとして測定した。エンドムチンまたはNG2陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.を、それぞれ図43bおよび43cにそれぞれ示す。図43dは、NG2陽性/エンドムチン陽性面積 * P値 < 0.02 (n=4~5)を示す。

10

20

30

40

50

【図43d】JAGGED-1を標的とするノッチ1デコイは、腫瘍における壁細胞-内皮細胞の相互作用を遮断する。腫瘍切片を、エンドムチン(緑)およびNG2(赤)について同時免疫染色した。画像を図43aに示す。縮尺バー:10マイクロメータ。NG2陽性面積のパーセンテージを、腫瘍における周皮細胞被覆のパラメータとして測定した。エンドムチンまたはNG2陽性面積の平均パーセンテージ $\pm$ S.D.を、それぞれ図43bおよび43cにそれぞれ示す。図43dは、NG2陽性/エンドムチン陽性面積 $\times$ P値 <0.02 ($n=4\sim5$)を示す。

【図44】JAGGED-1を標的とするノッチ1デコイは、腫瘍における壁細胞-内皮細胞の相互作用を攪乱させる。腫瘍切片をエンドムチン(緑)およびSMA(赤)について同時免疫染色する。血管平滑筋細胞被覆を伴う大きな血管が、腫瘍周辺に位置する。縮尺バー:10マイクロメータ。

【図45】ノッチ下流標的:HEY1、HEY2、HEYL、HES1についての、N1デコイまたはJAGGED-1shRNAを発現するHUVECに対する定量的TR-PCR。

【図46】VEGF受容体についての、ノッチ1デコイまたはJAGGED-1shRNAを発現するHUVECに対する定量的TR-PCRおよびフローサイトメトリー。

【図47a】図47aは、ノッチ1デコイを発現するHUVECに対する、またはVEGF受容体についての定量的RT-PCRを示す。図47bは、可溶性VEGFR-1についての酵素結合免疫吸着検定法の結果を示している。

【図47b】図47aは、ノッチ1デコイを発現するHUVECに対する、またはVEGF受容体についての定量的RT-PCRを示す。図47bは、可溶性VEGFR-1についての酵素結合免疫吸着検定法の結果を示している。

【図48a】腫瘍切片に対するVEGFR-1免疫蛍光は、N1₁₀₋₂₄デコイおよび1-24が、可溶性VEGFR-1の発現を増大させることを確認した。免疫蛍光画像を図48aに示す。平均VEGFR-1陽性面積 $\pm$ S.D.が図48bに示されている。 $\times$ P値 <0.02 。縮尺バー:30マイクロメータ。

【図48b】腫瘍切片に対するVEGFR-1免疫蛍光は、N1₁₀₋₂₄デコイおよび1-24が、可溶性VEGFR-1の発現を増大させることを確認した。免疫蛍光画像を図48aに示す。平均VEGFR-1陽性面積 $\pm$ S.D.が図48bに示されている。 $\times$ P値 <0.02 。縮尺バー:30マイクロメータ。

【図49】D11およびJag科の他のメンバーについてのノッチ1デコイのリガンド特異性。ノッチ信号活性化が、ノッチリガンドを発現するHeLa細胞と共培養された、全長ラット・ノッチ1および11CSL-Lucを発現するHeLa細胞において測定される。N1₁₋₁₃、N1₁₋₂₄、およびN1₁₋₃₆デコイだけが、DLL1に誘導されたノッチ信号伝達を阻害し、DLL1-に誘導されたノッチ信号伝達を阻害するためにはGF様反復1~9が不可欠であることを示唆する。しかしながら、N1₁₋₁₃デコイはJAG2を阻害しない。N1₁₀₋₂₄デコイだけがJAG2をブロックでき、ノッチ1のEGF様反復10~24がJAGGED特異性を与えることを示している。平均ルシフェラーゼ倍率誘導 $\pm$ S.D. $\times$ P値 <0.005 。

【発明の詳細な説明】

【0018】

<用語>

本願で使用するとき、別途明示的にここに記載する場合を除き、以下の用語の各々は下記に述べる意味を有するものとする。

【0019】

「投与する」とは、当業者知られた如何なる方法を用いて実施されてもよく、または行われてもよい。該方法には、例えば、病巣内、筋肉内、皮下、静脈内、腹腔内、リポソーム媒介性、経粘膜、腸、局所的、鼻、経口、肛門、眼球、または耳の送達手段が含まれている。

【0020】

10

20

30

40

50

「固定された」とは、何れかの手段によって付着されることを意味するものとする。一つの実施形態において、「固定された」とは共有結合により固定されることを意味する。もう一つの実施形態において、固定されたとは、非共有結合的に固定されることを意味する。

【0021】

「アミノ酸」、「アミノ酸残基」および「残基」は、ここではタンパク質、ポリペプチドまたはペプチドの中に組み込まれるアミノ酸を指すために互換的に使用される。このアミノ酸は、例えば、天然に生じるアミノ酸、または天然に生じるアミノ酸と同様に機能できる天然アミノ酸の類似体であることができる。

【0022】

「C末端」および「N末端」アミノ酸は、ここで用いるときは、与えられたタンパク質、タンパク質ドメインまたはアミノ酸配列モチーフのそれぞれカルボキシ末端またはアミノ末端にあるか、またはこれら末端に近接したアミノ酸を意味し、それにより前記タンパク質、タンパク質ドメインまたはアミノ酸配列モチーフの構造、機能または特徴に不可欠なアミノ酸残基が、前記C末端アミノ酸またはN末端アミノ酸の外へと越えないことを言う。

【0023】

「抗体」とは、(a)二つの重鎖および二つの軽鎖を含んでなり、抗原を認識する免疫グロブリン分子；(b)ポリクローナルまたはモノクローナル免疫グロブリン分子；(c)それらの一価または二価の断片を含むものであるが、これらに限定されない。免疫グロブリン分子は、共通に知られたクラスの何れかに由来するものであってよく、IgA、分泌性IgA、IgG、IgEおよびIgMを含むが、これらに限定されない。IgGサブクラスは当業者に周知であり、ヒトIgG1、IgG2、IgG3およびIgG4を含むが、これらに限定されない。抗体は、天然に生じるものおよび天然に生じないものの両方であることができる。更に、抗体にはキメラ抗体、全合成の抗体、単鎖抗体、およびそれらの断片が含まれる。抗体はヒト抗体または非ヒト抗体であってよい。非ヒト抗体は、ヒトにおけるそれらの免疫原性を低減するために、組み換え法によりヒト化されてよい。抗体断片には、FabおよびFc断片が含まれるが、これらに限定されない。一実施形態において、「抗体のFc部分」は、免疫グロブリンのパイン消化により得られる結晶性断片であり、ジスルフィド結合により連結された二つの重鎖のC末端側半分からなり、免疫グロブリンの「エフェクター領域」としても知られるものである。もう一つの実施形態において、「抗体のFc部分」は、一つの重鎖のC末端側半分の全部、または実質的に全部を意味する。

【0024】

抗体に関して「ヒト化された」とは、CDR領域外のアミノ酸の幾つか、殆どまたは全部が、ヒト免疫グロブリン分子由来の対応するアミノ酸で置き換えられた抗体を意味する。アミノ酸の小さな付加、欠失、挿入、置換または修飾は、それらが所定の抗原に結合する抗体の能力を抑制しない限り許容される。適切なヒト免疫グロブリンには、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgAおよびIgM分子が含まれるが、これらに限定されない。如何にしてヒト化抗体を作製するかについては、種々の刊行物、例えば米国特許第4,816,567号、同第5,225,539号、同第5,585,089号および同第5,693,761号、およびPCT国際公開WO90/07861に記載されている。

【0025】

ここで使用するとき、医薬組成物のような「組成物」の用語は、活性成分および担体を構成する不活性成分を含んでなる生成物、並びに、何れか二つ以上の成分の組み合わせ、複合体形成または集合から生じる何れかの生成物、または一以上の成分の解離から、または一以上の成分の他のタイプの反応もしくは相互作用から直接または間接に生じる何れかの生成物を包含するものである。

【0026】

10

20

30

40

50

ここで使用するとき、「有効量」とは、腫瘍、疾患または障害を有する患者を治療できる量を意味する。従って、有効量は治療される患者、並びに治療すべき状態と共に変化するであろう。当業者は、このような十分な量を決定するために、ルーチンの滴定実験を行うことができる。化合物の有効量は、患者および使用される特定の投与経路に依存して変化するであろう。化合物に基づいて、当該量は、例えば連続ポンプによって連続的に、または周期的間隔で（例えば一以上の別々の機会に）送達されることができる。特定化合物の複数の量の望ましい間隔は、過大な実験を伴うことなく当業者によって決定することができる。一つの実施形態において、前記有効量は約 $1 \mu\text{g} / \text{kg} \sim 10 \text{mg} / \text{kg}$ である。もう一つの実施形態において、前記有効量は約 $10 \mu\text{g} / \text{kg} \sim 1 \text{mg} / \text{kg}$ である。更なる実施形態において、前記有効量は $100 \mu\text{g} / \text{kg}$ である。

10

【0027】

ノッチ受容体タンパク質に関連して用いる「細胞外ドメイン」は、(i)細胞外に存在し(即ち、膜貫通部分としても細胞内部分としても存在しない)、また(ii)完全なノッチ受容体タンパク質が結合する細胞外リガンドに結合する、ノッチの全部または一部を意味する。ノッチの細胞外ドメインは、任意に、単一のペプチド(「sp」)を含んでよい。「細胞外ドメイン」、「ECD」および「エクトドメイン」は同義語である。

【0028】

障害または望ましくない生物学的プロセスの開始を「阻害する」とは、前記障害またはプロセスが開始する可能性を減少させること、または前記障害またはプロセスの開始を完全に防止することを意味するものである。好ましい実施形態において、障害またはプロセスの開始を阻害するとは、その開始を完全に防止することである。

20

【0029】

「ノッチ」、「ノッチタンパク質」および「ノッチ受容体タンパク質」は同義語である。以下のノッチアミノ酸配列は既知であり、本願明細書の一部として援用する：ノッチ1(Genbank 受付番号S18188(ラット))；ノッチ2(Genbank 受付番号NP_077334(ラット))；ノッチ3(Genbank 受付番号Q61982(マウス))；およびノッチ4(Genbank 受付番号T09059(マウス))。以下のノッチ核酸配列は既知であり、本明細書の一部として援用する：ノッチ1(Genbank 受付番号XM_342392(ラット)およびNM_017617(ヒト))；ノッチ2(Genbank 受付番号NM_024358(ラット)、M99437(ヒト)およびAF308601(ヒト))；ノッチ3(Genbank 受付番号NM_008716(マウス)およびXM_009303(ヒト))；およびノッチ4(Genbank 受付番号NM_010929(マウス)およびNM_004557(ヒト))。

30

【0030】

「核酸」、「ポリヌクレオチド」および「核酸配列」の用語は、ここでは互換的に使用され、各々がデオキシリボヌクレオチドおよび/またはリボヌクレオチドのポリマーを指称する。デオキシリボヌクレオチドおよびリボヌクレオチドは、天然に生じることができ、またはその合成類似体であることができる。「核酸」は何れかの核酸を意味し、限定するものではないが、DNA、RNAおよびそれらのハイブリッドを含むものである。核酸分子を形成する核酸塩基は、塩基A、C、G、TおよびU、並びにそれらの誘導体であることができる。これら塩基の誘導体は当該技術において周知であり、PCRシステム、試薬および消耗品(PCR Systems, Reagents and Consumables; Perkin Elmer Catalogue 1996-1997, Roche Molecular Systems, Inc., Branchburg, New Jersey, USA)に例示されている。核酸には、アンチセンス分子、およびリボザイム(ribozymes)およびDNAザイム(DNAzymes)のような触媒核酸分子が含まれるが、限定されるものではない。核酸にはまた、1以上のアミノ酸残基の同一性の点で天然に生じる形態とは異なり、天然に生じる形態のペプチドの幾つかまたは全ての性質を共有するペプチド類似体、断片または誘導体(特定の全部よりも少ない残基を含む欠失類似体；1以上の残基が1以上の残基で置き換えられた置換類似体；ペプチドの末端または中間部分に1以上の残基が加えられた付加類似体)をコードする核酸が含まれる。

40

50

【0031】

「ポリペプチド」、「ペプチド」および「タンパク質」は、ここでは互換的に用いられ、各々がアミノ酸残基のポリマーを意味する。該アミノ酸残基は天然に生じるもの、またはその化学的類似体であることができる。ポリペプチド、ペプチドおよびタンパク質はまた、グリコシル化、脂質結合、硫酸化、ヒドロキシル化、およびADP-リボシル化のような修飾を含むことができる。

【0032】

ここで用いるとき、「医薬的に許容可能な担体」とは、該担体が製剤の他の成分と適合し、そのレシピエントに対して有害でないことを意味し、標準的な医薬的に許容される担体の何れもが包含される。このような担体には、例えば、0.01~0.1M、好ましくは0.05Mのリン酸緩衝液、または0.8%の塩水が含まれる。加えて、このような医薬的に許容可能な担体は、水性または非水性の溶液、懸濁液、およびエマルジョンであることができる。非水性溶媒の例は、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリーブ油のような植物油、オレイン酸エチルのような注射可能な有機エステルである。水性担体には、水、アルコール/水の溶液、エマルジョンおよび懸濁液が含まれ、塩水およびバッファーされた媒質が含まれる。非経腸的担体には、塩化ナトリウム溶液、リンゲルのブドウ糖、ブドウ糖および塩化ナトリウム、乳酸加リンゲルおよび固定油が含まれる。静脈内担体には、流動物および栄養補充液、リンゲルのブドウ糖をベースとするもののような電解質補充液等が含まれる。防腐剤や、例えば抗菌剤、抗酸化剤、キレート化剤、不活性ガス等のような他の添加剤が存在してもよい。

10

20

【0033】

「患者」とは、マウス、ラット、イヌ、モルモット、ケナガイタチ、ウサギおよび霊長類のような哺乳類を含む如何なる生物をも意味するものである。一つの実施形態において、患者はヒトである。

【0034】

「治療する」とは、疾患または障害の進行を遅らせ、停止させ、または反転させることを意味する。ここで用いるとき、「治療する」とはまた、当該疾患または障害に付随しり症状の改善をも意味する。疾患には、腫瘍血管新生、アテローム性硬化症、創傷治癒、未熟児網膜症、前子癇(Pre-eclampsia)、糖尿病性網膜症、虚血、脳卒中、心臓血管系疾患、乾癬、リンパ浮腫、腫瘍形成、腫瘍リンパ管新生、加齢関連の黄斑変性症(age-related macular degeneration; AMD)、湿潤型AMD(wet AMD)、膵臓癌および乳癌が含まれるが、これらに限定されない。

30

【0035】

血管新生は創傷治癒プロセス、女性の月経サイクル、および子宮内膜再構築の際、並びに胎児発生および器官成長の際に遭遇する。病理的設定においては、リウマチ性関節炎、乾癬、黄斑変性、糖尿病性網膜症および腫瘍増殖のような異なる疾患において、血管新生は重要な役割を果たす。

【0036】

臨床的所見を含めて、異常な血管新生が、リウマチ性関節炎、炎症、癌、乾癬、変性眼症状(degenerative eye conditions)を含む多くの疾病条件に関連しているとの、インビボでのかなりの証拠が存在する。

40

【0037】

ノッチ融合タンパク質を使用するための他の疾患は、限定されるものではないが、糖尿病、肥満、前糖尿病状態、アテローム性硬化症、虚血、脳卒中、心臓血管系疾患、インスリンの発現調節、およびインスリンの機能調節のような代謝障害である。

【0038】

ノッチ融合タンパク質の使用はまた、メタボリック症候群についての適応症が指示されており、これは心臓血管系疾患および糖尿病の人々へのリスクを増大させる医学的障害の組み合わせを言う。このような症候群を指称する他の知られた名称は、シンドロームX、インスリン耐性症候群、レバン氏症候群(Reaven's syndrome)である。該症候群の幾つ

50

かの特徴には、空腹時高血糖、高血圧、中心性肥満（内臓肥満としても知られる）、高密度リポタンパク質（LDL）減少、高トリグリセド、高尿酸レベルが含まれる。上記で述べた空腹時高血糖は、2型糖尿病または空腹時血糖以上および耐糖能異常、またはインスリン耐性を含んでいる。メタボリック症候群に加えて、ノッチデコイは前糖尿病状態についての適応症を有する可能性がある。

【0039】

単位、接頭語および記号は、それらのSI許容形で表示されてよい。他に別途支持しない限り、核酸配列は左から右へと5'から3'の向きで、またアミノ酸配列は左から右へとアミノ末端からカルボキシ末端への向きで記載される。アミノ酸は、ここではそれらの普通に知られた三文字記号により、またはIUPAC-IUBバイオケミカル命名委員会が推奨する一文字記号によって指定されてよい。

10

【0040】

ここでは以下の略語が用いられる。ECD：細胞外ドメイン、IC：細胞間ドメイン、NECD/Fc：ノッチをベースとする融合タンパク質、N1：ノッチ1、N2：ノッチ2、N3：ノッチ3、N4：ノッチ4、D11：デルタ様、DLL1：デルタ様1、DLL4：デルタ様4、JAG：JAGGED、JG：JAGGED、JAGGED-1：JAGGED1、JG1：AGGED1、EC：内皮細胞、HUEC：ヒト臍帯静脈内皮細胞、m.o.i.：感染多重度、VEGF：血管内皮細胞増殖因子、VEGFR：血管内皮細胞増殖因子受容体、sp：シグナルペプチド、PDGF：血小板由来成長因子、PDGFR：血小板由来成長因子受容体、PlGF：胎盤成長因子。

20

【0041】

<発明の実施形態>

一つの実施形態において、前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含んでなる融合タンパク質であり、当該融合タンパク質のN末端で始まる前記連続的アミノ酸の配列が下記のアミノ酸配列：

- (a) ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインと、
- (b) これに続く、抗体のFc部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインが、

- (i) EGF様反復10のN末端に存在するアミノ酸で開始し、
- (ii) 少なくとも、EGF様反復23のC末端アミノ酸を通して伸びる

30

ものである。

【0042】

もう一つの実施形態において、本発明の融合タンパク質は、EGF様反復24のC末端アミノ酸まで伸びるヒト・ノッチ1受容体タンパク質における細胞外ドメインのアミノ酸配列と同一のアミノ酸配列を含んでなるものである。

【0043】

もう一つの実施形態において、前記連続的アミノ酸の配列は、24位のシスチンで始まり833位のリジンで終わる配列番号3に記載の配列を含んでなるものである。

【0044】

もう一つの実施形態において、本発明の融合タンパク質は、EGF様反復36のC末端アミノ酸にまで伸びるヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインにおけるアミノ酸配列と同一のアミノ酸配列を含んでなるものである。

40

【0045】

もう一つの実施形態において、前記連続的アミノ酸の配列は、24位のシスチンで始まり1318位のリジンで終わる配列番号5に記載の配列を含んでなるものである。

【0046】

本発明の融合タンパク質の何れかのもう一つの実施形態において、前記抗体のFc部分はヒト抗体のFc部分である。

【0047】

50

本発明の融合タンパク質のもう一つの実施形態において、(a) ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインにはシグナルペプチドが先行している。更なる実施形態において、前記シグナルペプチドは、ヒト・ノッチタンパク質のシグナルペプチド、またはIgG重鎖のシグナルペプチドである。

【0048】

本発明の融合タンパク質の何れかのもう一つの実施形態において、前記ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、EGF様反復24のC末端アミノ酸まで伸びる。更なる実施形態において、前記融合タンパク質は、配列番号3に記載の連続的アミノ酸の配列を含んでなるものである。

【0049】

本発明の融合タンパク質の何れかのもう一つの実施形態において、前記ヒト・ノッチ1受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、EGF様反復36のC末端アミノ酸まで伸びる。更なる実施形態において、前記融合タンパク質は、配列番号5に記載の連続的アミノ酸の配列を含んでなるものである。

【0050】

本発明の融合タンパク質の何れかおよび担体を含んでなる組成物もまた提供される。

【0051】

一つの実施形態において、前記融合タンパク質は、医薬的に許容可能な担体の中に、JAGGED-1の活性を阻害するのに十分な量で存在する。

【0052】

加齢関連の黄斑変性症(AMD)に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、本発明の融合タンパク質の何れかを、前記患者のAMDを治療するのに十分な量で投与することを含んでなる方法が提供される。

【0053】

一つの実施形態において、前記AMDは湿潤型AMD(wet AMD)である。もう一つの実施形態において、前記AMDは乾燥型AMD(dry AMD)である。

【0054】

また、糖尿病性網膜症に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、本発明の融合タンパク質の何れかを、前記患者の糖尿病性網膜症を治療するのに有効な量で投与することを含んでなる方法が提供される。

【0055】

本発明の何れかの方法の一実施形態において、当該方法は更に、血管内皮成長因子(VEGF)の阻害剤を投与することを含む。もう一つの実施形態では、前記VEGFの阻害剤はVEGF-A、PGIF、VEGF-B、VEGF-C、またはVEGF-Dの阻害剤である。

【0056】

本発明の方法の何れかの一つの実施形態において、当該方法は更に、VEGF受容体阻害剤を投与することを含む。もう一つの実施形態において、前記VEGF受容体阻害剤はVEGFR-1またはVEGFR-2阻害剤である。

【0057】

また、癌に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、本発明の融合タンパク質の何れかを、前記患者の癌を治療するのに有効な量で投与することを含んでなる方法も提供される。

【0058】

一実施形態において、前記癌は膵臓癌である。もう一つの実施形態において、前記癌は乳癌である。

【0059】

また、加齢関連の黄斑変性(AMD)に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者のAMDを治療するのに有効な量で融合タンパク質を投与することを含んでなり、前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含み、その配列は前記融合タンバ

10

20

30

40

50

ク質の N 末端で開始し、且つ下記アミノ酸の配列：

- (a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および
- (b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

- (i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、
- (i i) 少なくとも E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

方法が提供される：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

10

【 0 0 6 0 】

一つの実施形態において、A M D は湿潤型 A M D である。もう一つの実施形態において、前記 A M D は乾燥型 A M D である。

【 0 0 6 1 】

また、糖尿病性網膜症に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者の糖尿病性網膜症を治療するのに有効な量で融合タンパク質を投与することを含んでなり、前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含み、その配列は前記融合タンパク質の N 末端で開始し、且つ下記アミノ酸の配列：

- (a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および
- (b) これに続く抗体の F c 部分

20

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

- (i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、
- (i i) 少なくとも E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

方法が提供される：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

【 0 0 6 2 】

本発明の何れかの方法の一実施形態において、前記方法は更に、血管内皮成長因子の (F E G F) 阻害剤を投与することを含んでいる。更なる実施形態において、前記 F E G F の阻害剤は V E G F - A、P G I F、V E G F - B、V E G F - C、または V E G F - D の阻害剤である。

30

【 0 0 6 3 】

本発明の何れかの方法の一実施形態において、前記方法は更に、V E G F 受容体阻害剤を投与することを含む。更なる実施形態において、前記 F E G F 受容体阻害剤は、V E G F R - 1 または V E G F R - 2 阻害剤である。

【 0 0 6 4 】

また、癌に罹患した患者を治療する方法であって、前記患者に対して、前記患者の癌を治療するのに有効な量で融合タンパク質を投与することを含んでなり、前記融合タンパク質は連続的アミノ酸を含み、その配列は前記融合タンパク質の開始し、且つ下記アミノ酸の配列：

40

- (a) ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメイン、および
- (b) これに続く抗体の F c 部分

と同一であり、

前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインは

- (i) E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸を含み、
- (i i) 少なくとも E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸を通して伸びる

方法が提供される：

ただし、前記 N 末端アミノ酸が E G F 様反復 1 の N 末端アミノ酸であれば、前記 C 末端アミノ酸は E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸ではない。

50

【 0 0 6 5 】

一つの実施形態において、前記癌は膵臓癌である。もう一つの実施形態において、前記癌は乳癌である。

【 0 0 6 6 】

本発明の何れかの方法の一実施形態において、前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ E G F 様反復 2 3 の C 末端アミノ酸まで伸びる。

【 0 0 6 7 】

本発明の何れかの方法の一実施形態において、前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 9 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ E G F 様反復 3 6 の C 末端アミノ酸まで伸びる。

10

【 0 0 6 8 】

本発明の何れかの方法の一実施形態において、前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 1 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ E G F 様反復 1 3 の C 末端アミノ酸まで伸びる。

【 0 0 6 9 】

本発明の何れかの方法の一実施形態において、前記ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 1 の N 末端に存在するアミノ酸で開始され、且つ E G F 様反復 2 4 の C 末端アミノ酸まで伸びる。

【 0 0 7 0 】

本発明の何れかの融合タンパク質の一実施形態において、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 1 0 ~ 2 4 からなっている。更なる実施形態において、前記融合タンパク質は連続するアミノ酸を含んでなり、その配列は配列番号 3 に記載されている。

20

【 0 0 7 1 】

本発明の何れかの融合タンパク質の一実施形態において、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 1 0 ~ 3 6 からなっている。更なる実施形態において、前記融合タンパク質は連続するアミノ酸を含んでなり、その配列は配列番号 5 に記載されている。

【 0 0 7 2 】

本発明の何れかの融合タンパク質の一実施形態において、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 1 4 ~ 2 4 からなっている。更なる実施形態において、前記融合タンパク質は連続するアミノ酸を含んでなり、その配列は配列番号 7 に記載されている。

30

【 0 0 7 3 】

本発明の何れかの融合タンパク質の一実施形態において、ヒト・ノッチ 1 受容体タンパク質の細胞外ドメインのアミノ酸配列は、E G F 様反復 1 4 ~ 3 6 からなっている。更なる実施形態において、前記融合タンパク質は連続するアミノ酸を含んでなり、その配列は配列番号 9 に記載されている。

【 0 0 7 4 】

本発明の何れかの融合タンパク質の一実施形態において、前記抗体の F c 部分はヒト抗体の F c 部分である。本発明の何れかの融合タンパク質のもう一つの実施形態において、前記シグナルペプチドはヒト・ノッチ 1 タンパク質のシグナルペプチド、または I g G 重鎖のシグナルペプチドである。

40

【 0 0 7 5 】

ここに記載する融合タンパク質の何れか一つと、医薬的に許容可能な担体とを含有する医薬組成物もまた提供される。

【 0 0 7 6 】

本発明は、患者における加齢関連の黄斑変性症 (A M D) を治療する方法であって、前記患者に対して、本発明の何れか一つの融合タンパク質を、前記患者を治療するのに有効

50

な量で投与することを含んでなり、それによって患者におけるAMDを治療する方法を提供する。

【0077】

一つの実施形態において、前記融合タンパク質は、患者における加齢関連の黄斑変性症を治療するために使用するための、本発明の融合タンパク質の何れか一つである。

【0078】

本発明はまた、患者における加齢関連の黄斑変性症（AMD）を治療する方法であって、前記患者に対して、JAGGED-1阻害剤を、血管新生を減少させるのに有効な量で投与することを含んでなり、それによって患者におけるAMDを治療する方法を提供する。一つの実施形態において、前記AMDは湿潤型AMDである。もう一つの実施形態において、前記JAGGED阻害剤はノッチ1融合タンパク質である。

10

【0079】

例えば、ニューヨーク市のコロンビア大学信託財団の名義で2008年8月22に出願されたPCT国際出願番号PCT/US2008/010045には、追加のノッチ1融合タンパク質が記載されており、その全ての内容を本明細書の一部として本願に援用する。もう一つの実施形態において、前記ノッチ1融合タンパク質は、ここに記載する融合タンパク質の何れかである。

【0080】

本発明はまた、患者における加齢関連の黄斑変性を治療するために使用するための、JAGGED-1阻害剤を提供する。一つの実施形態において、前記AMDは湿潤型AMDである。もう一つの実施形態において、前記JAGGED阻害剤はノッチ1融合タンパク質である。もう一つの実施形態において、前記ノッチ1融合タンパク質は、ここに記載した融合タンパク質の何れかである。

20

【0081】

本発明の一つの実施形態において、前記方法は更に、血管内皮成長因子（VEGF）の阻害剤を投与することを含んでいる。更なる実施形態において、前記VEGFの阻害剤は、VEGF-A、PGIF、VEGF-B、VEGF-C、またはVEGF-Dの阻害剤である。

【0082】

本発明の一実施形態において、前記方法は更に、VEGF受容体阻害剤を投与することを含んでいる。更なる実施形態において、前記VEGF受容体阻害剤は、VEGFR-1またはVEGFR-2阻害剤である。

30

【0083】

本発明は、患者における膵臓癌を治療する方法であって、前記患者に対して、ここに記載した融合タンパク質の何れか一つを、前記患者を治療するのに有効な量で投与することを含んでなり、それによって膵臓癌を有する前記患者を治療する方法を提供する。

【0084】

一つの実施形態において、前記融合タンパク質は、患者において膵臓癌を治療するために使用するための本発明の融合タンパク質の何れか一つである。

【0085】

本発明は、腫瘍増殖を遅延させまたは阻害する方法であって、前記腫瘍は膵臓癌細胞を含んでなり、前記方法は、前記腫瘍を、前記腫瘍の増殖を遅延または阻害するのに有効なある量の、ここに記載した融合タンパク質の何れかと接触させることを含んでなる方法を提供する。

40

【0086】

一つの実施形態において、前記融合タンパク質は、腫瘍増殖を阻害するために使用するための本発明の融合タンパク質の何れか一つであり、前記腫瘍は膵臓癌を包含するものである。

【0087】

本発明は、患者における乳癌を治療する方法であって、前記患者に対して、本発明の融

50

合タンパク質の何れか一つを、前記患者を治療するのに有効な量で投与することを含んでなり、それによって患者における乳癌を治療する方法を提供する。

【0088】

一つの実施形態において、前記融合タンパク質は、患者において乳癌を治療することにおいて使用するための、本発明の融合タンパク質の何れか一つである。

【0089】

本発明は、腫瘍増殖を遅延または阻害する方法であって、前記腫瘍は乳癌細胞を包含するものであり、前記方法は、前記腫瘍を、前記腫瘍の増殖を遅延または阻害するのに有効な量で本発明の融合タンパク質の何れか一つと接触させることを含んでなる方法を提供する。

10

【0090】

一つの実施形態において、前記融合タンパク質は、腫瘍増殖を阻害することにおいて使用するための本発明の融合タンパク質の何れか一つであり、前記腫瘍は乳癌細胞を包含するものである。

【0091】

本発明を、以下の実験の詳細の項において例示する。この項は、本発明の理解を助けるために記載するものであり、後述の特許請求の範囲に記載する本発明を限定することを意図したものではなく、そのような限定として解釈されるべきではない。

【実験の詳細】

【0092】

20

第一実験シリーズ：

<序>

ノッチ信号伝達は、ノッチ受容体およびリガンドが相互作用することを可能にする細胞-細胞接触を必要とする。ノッチ細胞外ドメインの主な部分は、 Ca^{2+} -結合コンセンサス配列を含んだ36以下のEGF様反復を含んでいる。ノッチリガンドはまた、それらの細胞外領域にEGF様反復を含んでいるが、それらはシステインに富んだドメインの存在または不存在により識別することができる。JAGGEDリガンドファミリーは、16のEGF様反復およびシステインに富んだドメインを含んでいるのに対して、デルタ様リガンドファミリーは8以下のEGF様反復を含んでいる。幾つかの証拠は、DSL領域がノッチ結合に特異性を与え、またC末端EGF様反復が容易な結合を補助することを示した(Shimizu et al.; Glittenberg et al.; Henderson et al.)。ここでは、EGF様反復11~13が、ノッチ/D111とノッチ/JAGGED-1の相互作用のために必要であることが示される。

30

【0093】

新規な可溶性構築物が、ノッチ1阻害剤としてのヒトIgG・Fc(ノッチ1デコイ)と融合された、ラット・ノッチ1細胞外ドメインの36-EGF様反復に基づいて作成された(Funahashi et al.)。ノッチ1デコイは、ノッチリガンドJAGGED-1、D111、およびD114によって刺激されたノッチ活性を阻害することが示された。この発見は、EGF様反復がノッチ1リガンドと効果的に相互作用するのに十分であり、従ってノッチ受容体はそのリガンドにより活性化されるのを防止するのに十分であることを意味している。ノッチリガンドの特異性は、この細胞外EGF様反復によって決定されるかどうかの研究された。加えて、ノッチは抗血管新生療法の標的の一つであることが十分に確立されており、従って我々は、治療目的のために、ヒト・ノッチ1に基づく新たなノッチ1デコイ構築物を創出した。ラット・ノッチ1およびヒト・ノッチ1のタンパク質配列は98%相動性(92.6%同一)であり、またラットおよびヒト・ノッチ1デコイは、ノッチ信号伝達および機能の試験において識別できない活性を有することが示されてきた。ここでは、単にノッチ1デコイと称されるヒト・ノッチ1デコイが、次章でのインビトロ研究、並びにインビボおよび腫瘍実験において用いられる。

40

【0094】

ノッチ経路の広範な遺伝子的研究および細胞的研究にも拘わらず、ノッチ-リガンド相

50

相互作用の分子的特徴付けは未だ謎のままである。ノッチ-リガンド認識の分子的基础の理解を増大させるために、EGF様反復1~13および1~24を含むノッチデコイの短縮型断片が作成された。EGF様反復11~13はリガンド結合に関与しているため、該11~13はリガンド結合活性を未だ保持する最短縮形態のノッチであろうと仮定された。ノッチ1デコイ1~36の分子量は、そのグリコシル化された分泌形態において約180kDであるか、または250kDを超え、従って、それは治療目的のために更に高いレベルで製造および分泌されるように修飾または短縮され得るかが調査された。これらの新規なデコイ変異体は、それらの阻害効果並びにそれらのリガンド特異性を評価するために利用された。ここに記載した結果は、ノッチ1デコイ1~13がDLL4特異的阻害剤として作用し、またノッチ1デコイ1~24が汎ノッチ阻害剤として働くことを示している。

10

【0095】

JAGGED-1特異的阻害剤もまた成功裏に構築された。10~24、10~36および14~36を含む第二世代のノッチ1デコイが構築され、試験された。ノッチ1デコイ10~24だけが、JAGGED-1特異的であり、また内皮細胞ベースの試験、網膜血管新生、および遺伝子プロファイリング解析において異なる活性を示すことが証明された。それらの多様な活性に基づき、可能な抗腫瘍剤および抗血管新生剤としてのデコイ1~13、10~24、および1~24を用いて腫瘍研究が行われた。

【0096】

<材料および方法>

・ノッチ1デコイ変異体の創生：

全長ノッチ1デコイ1~36およびノッチデコイ1~24が、図1(a)に示されている。ノッチ1デコイ1~36および1~24構築物のPCR変異形成から誘導された、四つの短縮型ノッチ1デコイ変異体が作製された。これらは、ノッチ10~36デコイ、ノッチ14~36デコイ、ノッチ10~24デコイおよびノッチ14~24デコイであった。これらデコイの模式図が、図1bに記載されている。ヒト・ノッチ1のアミノ酸配列が配列番号1に記載されている。ヒト・ノッチ1デコイ10~24の核酸配列が配列番号2に記載されており、そのアミノ酸配列は配列番号3に記載されている。ヒト・ノッチ1デコイ10~36の核酸配列は配列番号4に記載されており、そのアミノ酸配列は配列番号5に記載されている。ヒト・ノッチ1デコイ14~24の核酸配列は配列番号6に記載されており、そのアミノ酸配列は配列番号7に記載されている。ヒト・ノッチ1デコイ14~26の核酸配列は配列番号8に記載されており、そのアミノ酸配列は配列番号9に記載されている。

20

30

【0097】

・293T細胞における短縮型ノッチ1デコイ変種の発現および分泌：

293T細胞に、リン酸カルシウムトランスフェクションにより、pCCLucベースのノッチ1デコイプラスミドを形質移入させた。形質移入の2日後に、全細胞溶解物を収集し、ウサギ抗ヒトFc抗体を用いてウエスタンブロッティングを行った。ノッチ1デコイ1~13、1~24および1~34の分子量は、それぞれ83kD、127kD、および178kDである。図2a参照。ノッチ1デコイ10~36、14~36、10~24および14~24の分子量は、それぞれ140kD、128kD、91kDおよび73kDである。図2b参照。

40

【0098】

・ノッチレポータ試験：

ノッチ信号伝達に対するノッチデコイ類の効果を試験するために、ルシフェラーゼ遺伝子に連結された複数のCSL結合部位を含むノッチレポータ構築物(11CSL-Luc)を利用した。ノッチ信号伝達の活性化は、ノッチリガンドを発現するHeLa細胞と共培養された、ノッチ1および11CSL-Lucを発現するHeLa細胞において測定した。全てのノッチデコイ類は、DLL4に誘導されたノッチ信号伝達を阻害した。しかし、ノッチ1~13はJAGGED-1を阻害しなかった。平均ルシフェラーゼ誘導倍数 $\pm$ S.D. * P値<0.002。図3参照。EGF様反復1~9は、DLL4に誘導さ

50

れたノッチ信号伝達を阻害するために不可欠であることが示された(図4 a 参照)。ノッチ1デコイ10~24だけがJAGGED-1をブロックでき、EGF様反復10~24がJAGGED-1特異性を保有し得ることが示された。図4 b 参照。

【0099】

・ノッチ1デコイと可溶性リガンドとの同時形質移入：

ノッチ1デコイを、可溶性リガンドと共に(図5 a 参照)または全長リガンドと共に(図5 b 参照)、293T細胞に同時形質移入した。293細胞は、pcDNA3.1-デコイ、およびpCRII-DLL4-FLAGもしくはpCRII-JAGGED-1-FLAG、または空のベクターを用いて同時形質移入された。タンパク質複合体としての前記デコイおよびリガンドの相互作用を安定化させるために、架橋剤のDSGもまた添加された。次いで、細胞溶解物を収集し、プロテインA/Gアガロースによりプルダウンした。次いで、このプルダウン複合体を、抗FLAG抗体により免疫プロットした。ノッチ1デコイ1~13はDLL4と相互作用し、またノッチ1デコイ10~24はJAGGED-1と相互作用した。

10

【0100】

・共免疫沈降アッセイ：

ノッチ1デコイおよび全長ノッチ1受容体を用いて共免疫沈降が行われた。細胞溶解物をプロテインA/Gアガロースによりプルダウンし、抗Fc抗体または抗ノッチ1抗体を用いてプロットした。ノッチ1デコイは、ノッチ1受容体と相互作用しない。図6 参照。

20

【0101】

・網膜血管新生：

異なるデコイ類(1~13、10~24、1~24、および1~36)を発現する50 μ Lの5.0 $\times$ 10⁹ffu/mLのアデノウイルス、または50 μ Lの2mg/mL DAPTをP2新生児瞳孔の中に皮下注射した。P5で網膜を採取し、網膜血管についてイソレクチンB4を用いて固定および免疫染色した。該デコイ類の発現および分泌を、血清のヒトFcウエスタンプロットングにより確認した。結果を図7 a~図7 dに示す。ノッチ1デコイ1~13および10~24は、網膜血管新生に対して逆の影響を示した。

【0102】

・遺伝子発現プロファイリング：

i) 初代細胞および癌細胞株

細胞培養は、5%CO₂および95%加湿空気中において37^oで維持した。HUV ECは、EGM-2培地(ロンザグループ、ウォーカーズビル、MD)中で増殖させた。Mm5MT、LLC、およびB16-F10は、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション(ATCC, Manassas, VA)から得たものであった。癌細胞株は、10%仔牛血清(FBS)およびPen-Strepを含む1 $\times$ 高グルコース濃度DMEM(Invitrogen, Carlsbad, CA)中で維持した。

30

【0103】

ii) ノッチ1デコイを発現するHUV EC

逆転写および定量的RT-PCRのために、レンチウイルスで形質導入したHUV ECからRNAを収集した。

40

【0104】

ノッチ受容体、ノッチ1~ノッチ4のmRNA転写物について、定量的RT-PCRを行った。結果を図8 a~図8 dに示す。平均相対値 $\pm$ S.D. * P値<0.03

HEY1およびHEY2のmRNA転写物について、定量的RT-PCRを行った。全てのノッチ1デコイがHEY1を下方調節したが、1~13および1~24だけがHEY2を下方調節した。結果を図9 aおよび図9 bに示す。平均相対値 $\pm$ S.D. * P値<0.03

HEYLおよびHES1のmRNA転写物について、定量的RT-PCRを行った。ノッチ信号伝達の下流標的、即ちHEYLおよびHES1もまた、HUV ECにおけるノッ

50

チ1デコイの発現によって下方調節された。結果を図10aおよび図10bに示す。平均相対値 $\pm$ S.D. * P値 < 0.03

DLL4、JAGGED-1、VEGFR-1、VEGFR-2およびVEGFR-3のmRNA転写物について、定量的RT-PCRを行った。ノッチ1デコイ1~13および10~24は、VEGFR-1転写物の異なる影響を有していた。結果を図11a~図11eに示す。平均相対値 $\pm$ S.D. * P値 < 0.03

iii) 癌細胞株の遺伝子発現プロファイリング

四つの異なる細胞株：マウス乳腺腫瘍細胞(Mm5MT)、ヒト膵臓癌細胞(KP1)、マウス・ルイス肺癌細胞(LLC)、およびマウス・メラノーマ細胞(B16-F10)を利用した。循環腫瘍細胞からRNAを単離し、逆転写した。PCRを行って、これら細胞株における全てのノッチ受容体およびリガンドの発現を探索した。このPCRの結果を図14に示す。

【0105】

・細胞増殖およびアポトーシス細胞試験：

腫瘍細胞は、異なるノッチ1デコイ変異体をレンチウイルスで形質導入され、細胞増殖およびアポトーシスについて評価された。アポトーシス試験は、FITC結合型のアネキシンV抗体を用いて行われた。アポトーシス細胞のパーセンテージを、図15cおよび図15dの右上象限に示した。

【0106】

・ウエスタンブロッティングおよび免疫染色によるノッチ1検出

ノッチ1デコイ1~13、10~24および1~24、または対照としてのFcを発現するアデノウイルスを、成人マウスに静脈注射した。ウエスタンブロット分析を行った。図16a参照。腫瘍を収集し、腫瘍切片中のデコイレベルを免疫蛍光法により評価した。図16b参照。結果を図16aおよび図16bに挙げた。

【0107】

・腫瘍増殖実験：

Mm5MT-FGF4およびKP1-VEGF腫瘍細胞を、最初にレンチウイルスで形質移入してルシフェラーゼを発現させ、ルシフェラーゼ活性または発光信号で腫瘍増殖をモニターした。実験は2方向で行った：第一にはレンチウイルス形質導入により、第二にはアデノウイルスを使用することによって、異なるノッチ1デコイまたはFcを直接腫瘍細胞の中に導入した。腫瘍低酸素症および血管灌流を解析するために、腫瘍収集の前に、組織における低酸素症のマーカーであるヒポキシプロブ(登録商標：Hypoxyprobe)、およびFITCに結合されたレクチンをマウスに注射した。ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムを使用して、発光信号からの総放射輝度を評価することにより腫瘍増殖をモニターした。平均総フラックス $\pm$ S.D. * P値 < 0.05 ($n = 4 \sim 5$)。結果は図17a~図17c、および図18a~図18cに記載されている。

【0108】

・腫瘍血管の特徴付け：

エンドムチン陽性(Endomucin-positive)の領域(緑)およびDLL4(赤)について、腫瘍切片を免疫染色した。平均エンドムチン陽性領域 $\pm$ S.D. * P値 < 0.003 ($n = 4 \sim 5$)。縮尺バー：30マイクロメータ。結果を、図19aおよび図19b、並びに図20aおよび図20bに記載した。

【0109】

フルオレセインに結合されたレクチン(100 μ g)を、腫瘍収集の2分前にマウスに注射した。エンドムチン(赤)について腫瘍切片を免疫染色し、また灌流レクチン(緑)は腫瘍血管と結合された。血管と結合したレクチンの量は機能性の腫瘍血管を反映する。平均レクチン陽性面積 $\pm$ S.D. * P値 < 0.006 ($n = 4 \sim 5$)。縮尺バー：30マイクロメータ。結果を、図21aおよび図21bに記載した。

【0110】

・Mm5MTおよびKP1腫瘍切片に対するNG2およびエンドムチン免疫蛍光法：

50

腫瘍切片を、エンドムチン（緑）およびNG2（赤）について同時免疫染色した。NG2陽性領域のパーセンテージを、腫瘍における周皮細胞補充のパラメータとして測定した。平均NG2陽性面積 $\pm$ S.D. * P値 < 0.02 (n = 4 ~ 5)。縮尺バー：10マイクロメータ。結果を、図22aおよび図22bに記載した。

【0111】

・腫瘍の浸潤および転移：

ルシフェラーゼを発現する皮下LLCおよびB16-F10腫瘍を使用して、腫瘍の浸潤および転移におけるノッチ1デコイ活性を評価した。腫瘍を有するマウスの写真が、異なるデコイ群（1~13、10~24および1~24）からの発光信号を用いて第12日に撮られた。腫瘍増殖は、総放射輝度に基づいてモニターおよび定量された。平均総フラックス $\pm$ S.D. (n = 5)。腫瘍重量を、腫瘍収集前の12日に測定した。平均腫瘍重量 $\pm$ S.D. * P値 < 0.05 (n = 5)。結果を、図23a~図23cおよび図24a~図24cに記載した。

10

【0112】

腫瘍を有するマウスから、第12日に肺および肝臓を収集し、30mg/mLのD-ルシフェリン中でインキュベートし、ゼノジェン(Xenogen)撮像システムIVIS撮像システムにより解析した。各群からのマウスは、LLCモデルについては第12日に肺転移を発症し、腫瘍負荷はグループ間で顕著には異ならなかった。何れのグループにおいても、肝臓転移は存在しなかった。平均総フラックス $\pm$ S.D. (n = 5)。その結果を図25aおよび図25bに示す。

20

【0113】

腫瘍を有するマウスから、第12日に肺および肝臓を収集し、30mg/mLのD-ルシフェリン中でインキュベートし、ゼノジェン(Xenogen)IVIS撮像システムにより解析した。器官の画像は、肺(図26aおよび図26b)および肝臓(図26c)においてFc群から転移病巣が表示された。デコイ治療群には転移は見られなかった。B16-F10腫瘍を有するマウスは、デコイ治療群において肺転移および肝臓転移の発症において遅延を示した。

【0114】

<結果>

・JAGGED-1特異的ノッチデコイの構築

30

幾つかのインビトロ機能検定によって示されるように、ノッチ1デコイ変異体は、ノッチリガンドに応じて異なる阻害活性を示した。ノッチ1デコイ1~13は、DLL4に誘導されたノッチ信号伝達だけを阻害することが示され、機能検定におけるその阻害効果は、可溶性DLL4-Fcおよび抗DLL4抗体を含む他のDLL4中和剤のそれと非常に類似していた。オリジナル構築物に基づけば、EGF様反復1~24は、DLL4およびJAGGED-1に誘導されたノッチ活性化の両方について必要とされる。また、EGF様反復1~13は、DLL4だけでなくJAGGED-1をもブロックした。従って、EGF様反復14~24および14~36は、JAGGED-1特異性を示し得る。にもかかわらず、幾つかの系統の証拠は、JAGGED-1とのノッチ相互作用に必要であることを示唆している。そこで、ノッチ1デコイ変異体10~24および10~36が、可能なJAGGED-1特異的物質として作製された。最初の9または13EGF様反復を欠失させるために、ノッチ1デコイ1~24または1~36プラスミドに対してPCR突然変異誘発を行った。この新たな構築物は、図2に示すように、293T細胞における発現および分泌によって確認された。それらの発現レベルは、より大きな変異体より小さい変異体よりも低いレベルで発現および分泌された点において、以前のデコイ変異体の場合と同様であった。

40

【0115】

・EGF様反復1~9または1~13を欠失したノッチ1デコイ変異体は、DLL4をブロックできなかったが、ノッチ1デコイ10~24はJAGGED-1に誘導されたノッチ信号伝達を顕著に阻害した

50

ノッチ1デコイ1~13は、DLL4特異的な阻害剤として機能する。当該新規なノッチ1デコイの構築が達成された後に、共培養信号伝達アッセイを利用して、前記阻害効果およびリガンド特異性を試験した。全ての第二世代ノッチ1デコイ類は、DLL4に誘導されたノッチ信号伝達を阻害しなかった(図3a~図3c)。これは、DLL4との受容体相互作用のために、EGF様反復1~9が必要であることを示唆した。しかしながら、ノッチ1デコイ10~24は、JAGGED-1に誘導されたノッチ信号伝達を顕著にブロックする一方、他のデコイ類は如何なる効果も有さなかった(図4a~図4b)。ノッチ1デコイ10~36もまた僅かなJAGGED-1阻害を示したが、その阻害効果は一貫せず、或いは顕著でなかった。EGF様反復11~13は、デルタ様リガンドおよびJAGGEDリガンドの両者と相互作用することが知られているが、ここに記載した細胞ベースの信号伝達アッセイは、EGF様反復1~9の不存在によってノッチ受容体の親和性がJAGGED-1の方にシフトされるように見えるので、この発見は特に興味深いものである。

【0116】

・ノッチ1デコイは、特異性をもってノッチリガンドに結合する：

ノッチ1デコイはノッチ阻害剤であることが証明されており、また受容体デコイ自身の性質に基づいていること、それらはノッチリガンドと競合的に相互作用することによりノッチ信号伝達をブロックすること、並びにそれによってノッチ受容体が活性化されるのを防止することが仮定されている。阻害の機構を更に探究するために、ノッチ1デコイおよび全長ノッチリガンド、DLL4およびJAGGED-1のを行った。予測した通り、ノッチ1デコイ1~13は、DLL4とだけ相互作用し、JAGGED-1とは相互作用しない一方、ノッチ1デコイ10~24は、JAGGED-1とだけ相互作用することが示された(図5aおよび図5b)。ノッチ1デコイ1~24は、DLL4およびJAGGED-1の両者と相互作用し、これは先の機能試験を支持した。

【0117】

ノッチ外部ドメインのオリゴマー化は現在のところ未知であるが、ノッチ1デコイがノッチ受容体と相互作用して、ノッチ活性をブロックできるかどうかを研究した。ノッチデコイおよび全長ラット・ノッチ1の共免疫沈降を293T細胞において行い、その結果を図6に示した。Fcプルダウンからはノッチ1は検出されなかったことから、ノッチ1デコイはリガンドと競合し、受容体と相互作用しないことによって、ノッチ信号伝達を阻害するらしいことが示唆された。

【0118】

・ノッチ1デコイは、網膜血管新生において抗血管新生的である：

出世以後で早期のマウス網膜は、広範に研究された血管新生モデルである。それは、抹消での血管発芽、中心におけるポンピングおよびリモデリングを含む十分に定義された一連の事象において、血管パターンを発達させる。従って、網膜血管新生が、我々のノッチ1デコイの効果をもっと研究するためのモデルとして利用された。DLL4のブロックまたはDLL4の欠失は血管新生発芽を増大させる(Lobov et al.)のに対して、内皮細胞特異的JAGGED-1の欠乏は、減少した血管新生発芽をもたらした(Benedito et al.)。網膜血管新生の一つの顕著な特徴は、血管全面の糸状仮足が伸びる内皮先端細胞(filopodia-extending endothelial tip cells)の出現である。ノッチデコイ1~13は、網膜血管が先端細胞および血管新生発芽の数における顕著な増大を示すことにおいて、DLL4欠乏を表現型模写した。しかしながら、ノッチデコイ10~24は、内皮細胞におけるJAGGED-1の喪失と同様に、減少した血管新生をもたらした。二つのデコイ間での網膜血管における相違は著しく劇的であり、ノッチリガンドの示差阻害(differential inhibition)を明瞭に示している。ノッチ1デコイ1~24および1~36、並びにGSI、DAPTは、発芽血管新生を増大させたが、これを著しく混乱させた(図7a)。

【0119】

・ノッチ1デコイ変異体を発現するHUVECの遺伝子プロファイリングは、

それらがノッチ信号伝達をブロックすることを示す。

【0120】

次に、ノッチ信号伝達およびその下流標的に対するノッチ1デコイの影響を探索した(図8~図11参照)。ノッチ1の転写レベルは、該デコイの発現と共に顕著に減少し(それぞれ99%、97%、および97%)、ノッチ1がノッチ活性のレベルによって自動的に調節されることを示した。興味深いことに、他のノッチの転写レベルはこれらのデコイによって影響されなかった。ノッチ2およびノッチ3は、内皮細胞では通常は発現されないが、時々、培養されたHUV ECにおいて検出することができる。ノッチリガンドであるJAGGED-1およびDLL4の発現は、ノッチ1デコイ発現では変化しなかった。加えて、インビトロアッセイの結果を確認するために、ノッチ信号伝達の直接下流の標的もまた探索された。HEY1、HEYL、およびHES1を含む殆どの標的が、全てのデコイの発現に伴って有意に減少し、ノッチ1デコイ類がノッチ活性を効果的にブロックすることを示した。しかし、他のデコイ類とは異なり、ノッチ1デコイ10~24は、HEY2の発現レベルを低減しなかった。この結果は、ノッチリガンドによる、異なるHEYsおよびHESsを介したノッチ活性の異なる調節を示唆する可能性がある。ノッチ信号伝達のJAGGED-1およびDLL4(または一般的にJAGおよびDLLリガンド)調節の機構は未だ完全には理解されておらず、これらの発現プロファイリングデータは、リガンド特異的ノッチ信号伝達において如何なる下流標的が重要であるかについての手掛かりを与えてくれるかも知れない。ノッチ経路は、VEGF信号伝達を調節するために十分に確立されている。従って、ノッチ1デコイがVEGF受容体の発現に対して何等かの影響を有するかどうかを更に探索した。全てのノッチ1デコイ変異体は、NICとは逆に、HUV ECにおけるVEGFR-2発現を増大させた。この発見は、ノッチ1デコイでのノッチ活性の阻害がHUV ECの増殖および遊走を増大させ、これはVEGFR-2の発現および活性における増大から生じるらしいとの所見を支持した。更に、ノッチの阻害はVEGFR-3の発現を顕著に減少させるように見えた。ノッチ1デコイ1~13および1~24は、VEGFR-1の発現を減少させた;しかし、ノッチ1デコイ10~24は、NICを発現するHUV ECにおけると同様に、その発現を増大させた。ノッチ1デコイ10~24が顕著なノッチ阻害活性を示したので、この結果は予測されなかったものである。VEGF受容体の遺伝子発現プロファイリングは、フローサイトメトリーによって確認された。VEGFR-2の細胞表面発現は、前記デコイを発現するHUV ECにおいて増大し、またVEGFR-3は図12のヒストグラムに示すように減少した。しかし、qRT-PCRデータが示唆するように、VEGFR-1の表面発現は劇的にはシフトされなかった。これらのアイソフォームは、異なるmRNAスプライス変異体から誘導される。qRT-PCRおよびフローサイトメトリーからのデータは、増大したVEGFR-1の発現が、表面受容体ではなく、可溶性のアイソフォーム転写物に起因し得ることを示唆した。次いで、前記可溶性アイソフォームのスプライス変異体に特異的なPCRプライマーを用いて、発現解析が繰り返された、図13に示すように、可溶性VEGFR-1転写物は、ノッチ1デコイ10~24によって14倍増加したが、ノッチ1デコイ1~13および1~24によっては有意に影響されることはなかった。この発見は、JAGGED-1阻害は可溶性VEGFR-1の上方調節を導くが、全長受容体の上方調節は導かず、またDLL4阻害は全長VEGFR-1を減少させ、可溶性VEGFR-1には影響がないことを意味していた。

【0121】

- ・発現したノッチ/ノッチリガンドを定義するための癌細胞株の遺伝子発現プロファイリング

ノッチ1デコイの腫瘍血管新生に対する影響を探索するために、我々は4つの異なる細胞株を用いた:即ち、マウス乳腺腫瘍細胞(Mm5MT)、ヒト膵臓癌細胞(KP1)、マウス・ルイス肺癌細胞(LLC)、マウス・メラノーマ細胞(B16-F10)である。Mm5MTおよびKP1細胞株は、皮下移植では転移しないが、LLCおよびB16-F10は肺および肝臓に転移する。従って、これら腫瘍モデルは、腫瘍増殖および腫瘍血

10

20

30

40

50

管新生に対するデコイ効果だけでなく、腫瘍細胞浸潤および転移に対する効果を研究することを可能にした。その結果を図14に示す。Mm5MTおよびLLCは、同様に、高レベルのノッチ1、ノッチ2、およびD111を発現し、低レベルのノッチ3、ノッチ4、およびJAGGED-1を発現した。KP1細胞はノッチ1、ノッチ2、ノッチ3、JAGGED-1、およびDLL4を発現した。また、B16-F10細胞は、ノッチ2、ノッチ3ノッチ4、および唯一のリガンドJAGGED-1を発現した。

【0122】

- ・ノッチ1デコイは、腫瘍細胞増殖およびアポトーシスに対して如何なる影響も有していなかった：

マウスでの腫瘍実験のためにこれら腫瘍細胞を利用する前に、我々は、我々のノッチ1デコイが培養中の腫瘍細胞増殖に対して何等かの影響を有するかどうかを試験した。最初に、全てのMm5MTおよびKP1腫瘍細胞に、異なるノッチ1デコイ変異体1~13、10~24、および1~24をレンチウイルスで形質移入し、増殖およびアポトーシスアッセイを行った。細胞増殖を4日間に亘って観察したところ、実験の終了時点において細胞の数に有意な相違はなかった(図15)。アポトーシスについては、培養細胞を際懸濁させ、FITCに結合されたアネキシンV(AnnexinV)抗体と共にインキュベートし、フローサイトメトリーにより解析した。アネキシンV陽性細胞の数に顕著な相違は観察されなかった。

【0123】

- ・アデノウイルスベクターを介した発現されたときに、ノッチデコイは血液循環の中に分泌され、腫瘍において検出された：

デコイ類の全身送達を模すために、アデノウイルス送達アプローチを用いた。ノッチ1デコイまたは対照としてのFcを発現するアでのウイルスを、成人マウスに静脈注射した。注射されたアデノウイルスは肝細胞に感染して、高血清レベルのコードされたノッチ1デコイを産生し、これはウエスタンブロットによって検出できた(図16aおよび図16b参照)。腫瘍を収集した後、腫瘍切片中のデコイレベルもまた免疫蛍光法によって評価され、これにより全てのデコイ変異体が腫瘍に到達したことが示された。

【0124】

- ・全てのノッチ1デコイ1~13、10~24、および1~24が腫瘍増殖を顕著に低下させ、また腫瘍血管新生に対して異なる効果を示した：

ノッチ1デコイ1~24および1~36は腫瘍増殖および腫瘍血管新生を同様に阻害したので、その後の腫瘍実験は、1~24変異体並びにリガンド特異的デコイだけを用いて行った。DLL阻害は、非機能的腫瘍血管を増大させることによって腫瘍を低減することが広範に示された(Noguera-Troise et al.; Ridgway et al.; Hoey et al.)。従って、DLL4特異的デコイ1~13は同じ方法で拳動することが予測された。Mm5MT-FGF4およびKP1-VEGF腫瘍細胞は、先ず、ルシフェラーゼを発現させるようにレンチウイルスで形質移入され、腫瘍増殖がルシフェラーゼ活性または発光信号についてモニターできるようにされた。この腫瘍実験は2つの方法で行われた：第一は、レンチウイルス形質導入により異なるノッチ1デコイまたはFcを直接腫瘍細胞の中に導入することによって；第二は、アデノウイルスを用いることによってである。加えて、組織における低酸素症のマーカであるヒポキシプロブ(登録商標)、およびFITCに結合したレクチンを、腫瘍低酸素症および血管灌流を解析するために、腫瘍収集の前にマウスに注射した。異なるデコイの存在は、腫瘍増殖において顕著な減少をもたらした。1~13、10~24、および1~36Mm5MT腫瘍は、対照よりも重量で69%、52%および39%小さく(図17a~図17c)、またKP1腫瘍はそれぞれ40%、49%および57%だけ小さかった(図18a~図18c)。デコイの影響は、腫瘍が迅速に増殖し始めた後に見られたが、それまでに通常は移植後約1週間を要した。デコイ群からの腫瘍増殖は、KP1腫瘍に見られるように遅延または逆転するよう見えた。腫瘍データは、生細胞でのルシフェラーゼ活性を表す発光信号から収集されたので、我々は、実験の終了に向かう腫瘍サイズの減少は腫瘍細胞の死滅およびネクローシスから生じたものであり得る

10

20

30

40

50

と予想した。

【0125】

- ・ノッチ1デコイ1～13は非機能性腫瘍血管構造の増加を導く：

腫瘍血管構造は、エンドムチン免疫蛍光法およびレクチン灌流によって解析した。図19aおよび図19b並びに図20aおよび図20bに示すように、ノッチ1デコイ1～13を持った腫瘍は、Mm5MTおよびKP1の両方のモデルにおいて血管密度の著な増加を示した。1～13腫瘍における血管構造は、対照腫瘍よりも、著しくより高度に分岐し且つより広範な内皮ネットワークを有していた。DLL4免疫蛍光法はまた、DLL4陽性内皮細胞の増加を示し、これはエンドムチン陽性細胞の超発芽ネットワーク(hypersprouting networks)を支持した。対照的に、10～24および1～24で治療されたマウスからの腫瘍は、エンドムチン免疫染色法による血管含量の減少を明瞭に示した。これらの形態学的変化はまた、エンドムチン免疫蛍光法からの血管面積の定量によっても示された。加えて、組織学的評価は、全ての実験群の全体に亘って更に広範な腫瘍低酸素症を示し、これにより、デコイ1～13群での増加した腫瘍血管構造は正しく機能しない可能性があることが示唆された。血管灌流の分布が血管内レクチンにより比較され、これはレクチン陽性面積および内皮エンドムチン免疫蛍光について定量化された。図21aおよび図21bに示すように、全てのデコイ治療群からの血管構造は乏しい血管灌流を示し、それぞれ72%、90%および84%減少した。幾つかの大きな腫瘍血管は正常に灌流されたが、殆どの小さい分岐血管は蛍光性レクチンを含んでいなかった。従って、腫瘍低酸素症およびレクチン灌流データは、ノッチ1デコイ1～13がノッチ/DLL4信号伝達経路を阻害し、増大した非機能性血管ネットワークを導くことを示唆した。

10

20

【0126】

- ・腫瘍血管拡張および崩壊した形態は、ノッチ1デコイ10～24の異なる活性を示した：

1～13腫瘍における増大した血管ネットワークとは異なり、10～24腫瘍における腫瘍血管構造は内皮細胞含量および補遺鵝飼した血管構造における顕著な減少を示した。殆どの腫瘍血管は大きく且つ拡張して見えた。ノッチ1デコイ10～24は、JAGGED-1特異的阻害剤として作用することがインビトロで示されており、従って、腫瘍血管構造におけるこれらの形態学的変化は、JAGGED-1阻害から生じる可能性がある。ノッチ3は、動脈アイデンティティーおよび血管平滑筋細胞成熟のための優勢なノッチ受容体であり、その発現および活性は内皮発現したJAGGED-1を必要とする(Domeng et al.; Liu, Kennard, and Lilly)。従って、JAGGED-1媒介性ノッチ信号伝達の阻害は、崩壊した壁細胞被覆および異常な腫瘍血管成熟をもたらす可能性がある。

30

【0127】

- ・ノッチデコイ10～24および1～24によるJAGGED-1遮断は、調節不全の内皮 周皮細胞相互作用をもたらす：

腫瘍における内皮細胞がデコイ治療群において顕著に影響されたので、更に、血管周囲成分、特に周皮細胞およびマクロファージも変化するかどうかを研究した。図22は、Mm5MTおよびKP1腫瘍切片上でのNG2およびエンドムチン免疫蛍光を示している。1～13群由来のNG2陽性周皮細胞の含量に顕著な増大があった。周皮細胞が腫瘍血管の周囲に見られ、それらと腫瘍内皮との相互作用は正常で、且つ対照腫瘍切片に類似しているように見えた。NG2陽性周皮細胞は稀に、エンドムチン陽性血管を伴わない遊離成分のように見えた。しかしながら、10～22および1～24腫瘍切片上のNG2免疫蛍光は、腫瘍血管に関連しない周皮細胞数の顕著な増大を示した。NG2およびエンドムチン信号伝達は減弱され、物理的には崩壊されるように見えた。個々の周皮細胞は、腫瘍血管から不規則に脱離し、正常な血管構造の喪失を示した。これらの結果は、内皮-周皮細胞の相互作用および機能の調節および維持のためにはJAGGED-1に媒介されたノッチ活性化が必要とされること、またこれら相互作用の調節解除は血管の不安定性および不完全な血管灌流を導くことを示唆した。

40

【0128】

50

・ノッチ1デコイはLLC腫瘍転移に影響しなかったが、肺および肝臓におけるB16-F10微小転移の形成を遅延させた：

皮下LLCおよびB16-F10腫瘍は、マウスにおいて肺および肝臓に転移する。従って、我々はこれら二つの追加の腫瘍モデルを利用し、ルシフェラーゼを発現する腫瘍株を用いることにより腫瘍浸潤および転移におけるデコイ活性を評価した。図23および図24は、全てのノッチデコイがLLCおよびB16-F10腫瘍の増殖を、重量で40%、37%、および58%、78%71%だけ顕著に阻害したことを示している（LLCおよびB16-F10；それぞれ1~13、10~24、および1~24）。腫瘍を持ったマウスから肺および肝臓を収集し、分析した（表1および表2）。肺および肝臓からの発光信号の解析により、信頼性をもって、転移病巣が検出された（図25および図26）。全体の臓器の総光子放射から総転移負荷を定量する一方、個々の信号から転移病巣の数およびサイズも評価した。LLCについては、総転移負荷はデコイ群の間で統計的に異なっておらず、また微小転移の数も異ならなかった。この時点では、肝臓転移は存在しなかった。興味深いことに、B16-F10腫瘍のデータは、対照群のマウスの幾らかが肺および肝臓転移を有していたのに対して、デコイ群は転移を有していないことを示した。腫瘍転移実験は、腫瘍増殖の長さを延長するように異なる実験設計を必要とする可能性があるが、これらのデータは、ノッチ1デコイが腫瘍転移を遅延させる可能性があることを示唆した。

10

30

40

50

【0129】

表1： LLC腫瘍を有するマウスにおける肺転移の数

群		肺転移の数
F c	1	1
	2	5
	3	2
	4	0
	5	3
1 ~ 13	1	3
	2	3
	3	1
	4	3
	5	1
10 ~ 24	1	0
	2	0
	3	5
	4	0
	5	4
1 ~ 24	1	1
	2	2
	3	1
	4	0
	5	0

表2： B16-F10腫瘍を有するマウスにおける肺および肝臓転移の数

群		肺転移の数	肝臓転移の数
F c	1	3	3
	2	5	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
1 ~ 13	1	0	0

	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
1 0 ~ 2 4	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
1 ~ 2 4	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0

10

・ノッチ1デコイは、温和な杯状細胞肥厚を誘導した：

汎ノッチ阻害剤の治療的応用に対する障害は、杯状細胞肥厚による腸毒性であった。以下のG S I治療に見られるように(Wu et al.)、このような毒性は、ノッチ1受容体およびノッチ2受容体の両方の障害を必要とすることが示されている。図27において、ノッチ1デコイが、ヌードマウスにおいて僅かに腸毒性を誘導することが分かった。しかし、この効果はG S I治療に比較して非常に温和であった。腸腺窩(intestinal crypts)の構造は変化せずに維持され、またデコイ治療を受けたマウスの体重には有意な変化はなかった。従って、個々のノッチ1デコイは、マウスにおけるノッチ信号伝達をブロックすることにおいて効果的であり、また杯状細胞肥厚を顕著に低減することが証明された。

20

30

40

50

【0130】

<考察>

本件のインビボ研究における主な発見は、(1)ノッチ1デコイが腫瘍細胞の増殖およびアポトーシスに影響しないこと；(2)ノッチ1デコイは、腫瘍血管新生および欠陥周囲成分を乱すことによって腫瘍増殖を顕著に阻害すること；(3)腫瘍細胞の浸潤および転移は、ノッチ1デコイ治療によって遅延されるように見えること；(4)G S Iとは異なり、全てのノッチ1デコイがマウスにおいて温和な腸毒性を生じることである。この研究は、リガンド特異的(1~13および10~24)または汎ノッチ1デコイ変異体は腫瘍血管新生に対して異なる効果を有するが、その全てが、腫瘍増殖および腫瘍転移を阻止することを示す最初の証拠である。

【0131】

・ノッチ1デコイ1~36と小さいデコイ変異体の間の相違

以前の発見によって、ノッチ1デコイ1~36が、リガンドJ A G G E D - 1、D 1 1 1、およびD L L 4に誘導されたノッチ1信号伝達を阻害することが示された(Funahashi et al.)。M m 5 M Tおよびヒトユーロプラストーマ腫瘍(N G P)研究は、ノッチ1デコイ1~36が腫瘍の血管および生存力を崩壊させることを示した。これら血管新生効果は、腫瘍におけるD L L 4阻害、特に、内皮超発芽の欠失について以前に報告したものと異なる。従って、ノッチ1デコイ1~36の活性は独特であり、D L L 4阻害において観察されたのとは逆に、複数のノッチ-リガンド相互作用の阻害を反映しているらしいことは明瞭である。これらのデータはまた、血管ネットワークが、異なる血管新生プロセスマたは異なる細胞タイプにおいて異なる役割を果たし得る異なったノッチ受容体およびリガンドによって調節されることを示唆している。

【0132】

もとのノッチ1デコイの構造に基づいて、ノッチ1の細胞外ドメインにおけるE G F様反復は、リガンドへの結合によるノッチ活性化を阻害するのに十分であることが証明された。E G F様反復11および12は、デルタ(Delta)との相互作用、および程度は低い

が鋸歯状腺腫 (Serrate) との相互作用を媒介する (Rebay et al.)。ノッチ 1 デコイ構築物は、D L L 4 特異的または J A G G E D - 1 特異的であるように修飾された。ノッチ / D L L 4 信号伝達の役割は、発生および腫瘍の血管新生の両方において十分に確立されているから、D L L 4 遮断は、我々にとって、ノッチ 1 デコイ変異体の効果を評価するための対照として効果的に役立った。加えて、異なるノッチリガンドが、異なるタイプの腫瘍において上方調節されたことが示されている。例えば、J A G G E D - 1 および D 1 1 1 は、M m 5 M T 細胞において F G F 4 により誘導されたのに対して、J A G G E D - 1 だけは B 1 6 - F 4 マウス・メラノーマ細胞において発現された。従って、これら腫瘍における内皮中のノッチ活性は、異なる組のノッチリガンドによって誘導されるらしい。リガンド特異的なノッチ 1 デコイは、異なるタイプの腫瘍では異なる効果を示し得るものと考えられる。結局、リガンド特異的なデコイは、癌治療のための治療剤をより良く設計するために、腫瘍の血管新生プロセスにおけるノッチリガンドの異なる役割を我々が理解することを可能にするであろう。

10

20

30

40

50

【 0 1 3 3 】

・ ノッチ 1 デコイの生体利用性 :

小さいデコイ変異体である 1 ~ 1 3、1 0 ~ 2 4、および 1 ~ 2 4 は、1 ~ 3 6 よりも高レベルで産生および分泌されることが示された。腫瘍分泌に対する免疫組織化学はまた、ノッチ 1 デコイ 1 ~ 3 6 が、腫瘍細胞の中に高度に浸透される小さいデコイとは対照的に、腫瘍血管構造に限定されることを示唆した。腫瘍血管新生におけるデコイの異なる効果は、部分的にはそれらの生体利用性に起因し得るものである。腫瘍血管の退行および過剰産生は、屢々、灌流の乏しい非機能的血管に付随しているので、小さいデコイは、腫瘍血管構造が損なわれた時でさえも、それらが容易に拡散し且つより良好に腫瘍にアクセスできる点において、大きい変異体を凌駕する幾つかの利点を有するかもしれない。

【 0 1 3 4 】

・ ノッチ 1 デコイの抗血管新生活性および抗腫瘍活性

J A G G E D - 1 特異的デコイおよび D L L 4 特異的デコイの両者は、我々の腫瘍モデルの全てにおいて腫瘍増殖を同様に低下させ、また腫瘍血管構造を崩壊させた。これらのデータは、ノッチ信号伝達の攪乱が腫瘍内皮および腫瘍細胞自体に対して顕著な影響を導入できることを示唆している。しかし、これらの影響は異なる機構から生じるらしい。D L L 4 / ノッチ信号伝達を遮断することが非機能的血管新生および乏しい血管灌流の増大を導くことは、十分に確立されている。ノッチ 1 デコイ 1 ~ 1 3 は同様の活性を有しており、D L L 4 遮断に対して類似の効果を与える。しかし、J A G G E D - 1 阻害は腫瘍血管新生を減少させる。ノッチは、内皮 - 周皮細胞の相互作用を促進する広範な信号伝達分子を調節することが示されている (Armulik, Abramsson, and Betsholtz)。従って、一つの可能な気候は、J A G G E D - 1 がデコイ 1 0 ~ 2 4 を介して阻害し、また 1 ~ 2 4 が血管の周皮細胞被覆を崩壊させ、それによって腫瘍血管新生を抑制することである。

【 0 1 3 5 】

・ ノッチ 1 デコイの抗転移活性

腫瘍細胞の浸潤および転移におけるノッチ 1 デコイの役割を研究するために、二つの転移モデルが利用された。この研究の重要な発見は、ノッチ 1 デコイ 1 ~ 1 3、1 0 ~ 2 4、1 ~ 2 4 が全て、B 1 6 - F 1 0 モデルにおける肺転移を遅延させるように見えるが、L L C ではそうでないことである。これらの腫瘍はヌードマウスにおいて顕著に迅速に増殖したので、この実験は 1 2 日後に終了した。これは、むしろ初期段階の転移プロセスでの正常サイズの腫瘍の解析を可能にしたにすぎない。これらの腫瘍は、腫瘍細胞の皮下移植に由来するものであり、従って、肺および肝臓転移は原発部位からの腫瘍細胞の侵入から来たものに違いない。従って、転移に対するデコイの効果は次のことに焦点を当てることができる : 即ち、腫瘍細胞血管内異物侵入、循環系における生存および輸送、転移性ニッシェの促進、並びにホーミングおよびコロニー形成。幾つかの証拠は、R i p 1 / T a g 2 膵臓腫瘍モデルにおいて、周皮細胞被覆の遺伝的崩壊が増大した転移を誘発することを示した (Xian et al.)。該デコイは腫瘍血管の一体性を低下させ、周皮細胞被覆を

減少させたので、原発腫瘍を越える腫瘍細胞の播種および転移が阻害されたい。

【 0 1 3 6 】

< 第一実験シリーズについての参考文献 >

【 参考文献 1 】

【 0 1 3 7 】

Armulik, Annika, Alexandra Abramsson, and Christer Betsholtz. "Endothelial/Pericyte Interactions." *Circulation Research* 97.6 (2005) : 512-523. Web.

Benedito, Rui et al. "The Notch Ligands Dll4 and Jagged1 Have Opposing Effects on Angiogenesis." *Cell* 137.6 (2009) : 1124-1135. Web.

Cordle, Jemima et al. "A Conserved Face of the Jagged/Serrate DSL Domain Is Involved in Notch Trans-Activation and Cis-Inhibition.." *Nature Structural & Molecular Biology* 15.8 (2008) : 849-857. Web.

10

Domenga, Valérie et al. "Notch3 Is Required for Arterial Identity and Maturation of Vascular Smooth Muscle Cells." *Genes & Development* 18.22 (2004) : 2730-2735. Web.

Funahashi, Yasuhiro et al. "A Notch1 Ectodomain Construct Inhibits Endothelial Notch Signaling, Tumor Growth, and Angiogenesis." *Cancer Research* 68.12 (2008) : 4727-4735. Web.

20

Glittenberg, Marcus et al. "Role of Conserved Intracellular Motifs in Serrate Signaling, Cis-Inhibition and Endocytosis.." *The EMBO Journal* 25.20 (2006) : 4697-4706. Web.

Hambleton, Sophie et al. "Structural and Functional Properties of the Human Notch-1 Ligand Binding Region." *Structure (London, England : 1993)* 12.12 (2004) : 2173-2183. Web.

30

Henderson, S T et al. "Functional Domains of LAG-2, a Putative Signaling Ligand for LIN-12 and GLP-1 Receptors in *Caenorhabditis Elegans*.." *Molecular Biology of the Cell* 8.9 (1997) : 1751-1762. Print.

Hoey, Timothy et al. "DLL4 Blockade Inhibits Tumor Growth and Reduces Tumor-Initiating Cell Frequency." *Cell Stem Cell* 5.2 (2009) : 168-177. Web.

Liu, Hua, Simone Kennard, and Brenda Lilly. "NOTCH3 Expression Is Induced in Mural Cells Through an Autoregulatory Loop That Requires Endothelial-Expressed JAGGED1." *Circulation Research* 104.4 (2009) : 466-475. Web.

40

(つづく)

(つづき)

Lobov, I B et al. "Delta-Like Ligand 4 (Dll4) Is Induced by VEGF as a Negative Regulator of Angiogenic Sprouting." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104.9 (2007) : 3219-3224. Web.

Nakatsu, M.N., and Hughes, C.C.W. (2008). An optimized three-dimensional in vitro model for the analysis of angiogenesis. *Meth Enzymol* 443, 65-82. 10

Noguera-Troise, Irene et al. "Blockade of Dll4 Inhibits Tumour Growth by Promoting Non-Productive Angiogenesis." *Nature* 444.7122 (2006) : 1032-1037. Web.

Rebay, I et al. "Specific EGF Repeats of Notch Mediate Interactions with Delta and Serrate: Implications for Notch as a Multifunctional Receptor." *Cell* 67.4 (1991) : 687-699. Print. 20

Ridgway, John et al. "Inhibition of Dll4 Signaling Inhibits Tumour Growth by Dereulating Angiogenesis." *Nature* 444.7122 (2006) : 1083-1087. Web.

Shimizu, K et al. "Mouse Jagged1 Physically Interacts with Notch2 and Other Notch Receptors. Assessment by Quantitative Methods.." *The Journal of Biological Chemistry* 274.46 (1999) : 32961-32969. Print. 30

Wu, Yan et al. "Therapeutic Antibody Targeting of Individual Notch Receptors." *Nature* 464.7291 (2010) : 1052-1057. Web.

Xian, Xiaojie et al. "Pericytes Limit Tumor Cell Metastasis.." *The Journal of Clinical Investigation* 116.3 (2006) : 642-651. Web.

40

< 序 >

ノッチは、細胞表面に発現されたりガンドと相互作用する膜貫通受容体である。哺乳類では、四つのノッチ遺伝子(1~4)、並びにJAGGED(JAGGED1およびJAGGED2)またはデルタ様(1、3および4)と称される五つのリガンドが知られている。ノッチ1を介して作用するデルタ様4(DLL4)は、生理学および病理学的網膜血管新生の際に、血管新生発芽限定において機能することが確立されている(Thurston, G and Kitajewski J, 2008)。対照的に、JAGGED-1は、前血管発生因子として関係づけられてきたが、この能力におけるJAGGED-1の作用機構は十分には理解されていない(Benedito R, et al. 2009)

加齢関連の黄斑変性症(AMD)は、失明の共通の原因であり、熟年個人の健康に対して著しい負のインパクトを有するものである。湿潤(滲出性)形態のAMDにおいて、血管は網膜の背後の脈絡膜から成長する。これらの異常な血管は漏出性であり、網膜を剥離させるに至る可能性がある。湿潤AMDの最前線の治療は、血管の異常成長を低減させる抗血管新生剤によるものであった。VEGF阻害剤は、このような治療に現在使用されている。これらの薬剤は、湿潤型AMD治療の有効な手段であるが、他の抗血管新生剤が同様に効果的で、抗VEGF剤と組み合わせたときに有用であり得ること、またはVEGFのブロックが長期の視力回復を導かないときに効果的であり得ることの可能性はある。ここでは、血管の成長および分化における重要な信号伝達経路であるノッチ(Dufraine, J. et al. 2008)を標的とする抗血管新生剤が研究される。即ち、タンパク質に基づく、ノッチ経路の受容体アンタゴニストであるノッチ1デコイが開発された(Funahashi Y, 2008)。JAGGED-1/ノッチ1経路を標的とするノッチ1デコイが開発され、これらは網膜血管新生および腫瘍血管新生のマウスモデルにおいて、抗血管新生剤であることが示された。ここでは、病理的血管新生のマウスモデルを用いて、網膜血管新生におけるJAGGED-1ノッチ1の治療的阻害が測定される。

【0138】

< 予備的研究 >

図1に模式化されたノッチ1¹⁻³⁶デコイは、DLL4およびJAGGED-1(Funahashi Y, et al. 2008)を含む幾つかのノッチリガンドに結合して、これを不活性化する。阻害抗体によるDLL4単独の阻害は、非機能的血管新生を促進し、超発芽したが灌流の乏しい血管をもたらすことが報告されている(Yan, M. et al. Nature 463 and Ridgway J, et al. Nature 2006)。対照的に、ノッチ1¹⁻³⁶デコイは、増大した発芽の証拠を伴わずに血管新生を阻止する(Funahashi Y, et al. 2008)。従って、ノッチ1¹⁻³⁶デコイは、DLL4遮断とは異なり、且つ血管に対して正常組織における異常増殖を導く効果を誘発しない機構を介して作用する(Yan, M. et al., Clin. Cancer Res. 2007 and Yan, M. et al., Nature 2010)。オリジナルのノッチ1¹⁻³⁶デコイから誘導されたりガンド特異的ノッチ1デコイ変異体が創生された。インビトロのノッチ信号伝達アッセイを用いると、ノッチ1¹⁻²⁴およびノッチ1¹⁻³⁶デコイは、DLL4およびJAGGED-1に媒介されたノッチ信号伝達を阻害する。ノッチ1¹⁻¹³デコイはDLL4媒介性のノッチ信号伝達を阻害したが、JAGGED-1を阻害しなかった。ノッチ1¹⁻¹³デコイはDLL4に特異的であり、またノッチ1¹⁻²⁴はDLL4およびJAGGED-1の両方をブロックするので、EGF反復14~24はJAGGED-1特異性の領域を包含する可能性がある。ノッチ1¹⁻²⁴デコイが製造され、JAGGED-1をブロックするが、DLL4媒介性のノッチ1信号伝達を阻止しないことが示された。従って、JAGGED-1およびDLL4の両方を阻止するノッチ1デコイ(ノッチ1¹⁻²⁴デコイ)、DLL4を阻止するがJAGGED-1は阻止しない変異体(ノッチ1¹⁻¹³デコイ)、およびJAGGED-1を阻止するが、DLL4は阻止しない変異体(ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイ)が存在する。これらの変異体をインビトロ血管新生アッセイを使用して試験し、ノッチ1¹⁻¹³デコイは、DLL4阻害剤から予測されるように内皮細胞の過剰な発芽を生じさせるのに対して、ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイはインビトロでの血管新生発芽を減少させることが示された(データは示さず)。ノッチ1デコ

10

20

30

40

50

イ変異体を、新生児においてノッチ1デコイを発現させることにより、網膜血管新生マウスモデルを使用して試験した。新たに成長された血管を可視化するために使用された全組織標本イソレクチン染色 (Wholmount isolectin staining) によって、ノッチ1¹⁻¹³デコイの発現は、化学的ノッチ信号伝達ガンマセクレターゼ阻害剤であるDAPTが新生児に投与されたときに見られるのに類似した、網膜血管の過剰増殖を生じさせることが示された。対照的に、ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイは新生児網膜における低下した血管分岐および増殖を生じさせた (図2C)。病理学的網膜血管新生のマウスモデルにおける、DLL4、JAGGED-1、または組み合わされたDLL4/JAGGED-1遮断の阻害の効果がここに記載される。

【0139】

<実験手順>

我々は、生理学および病理学的な網膜血管新生に対するノッチ1デコイの効果を測定する。

【0140】

ノッチ1受容体アンタゴニストを介したJAGGED-1阻害または汎ノッチリガンド阻害は、それらの抗血管新生効果により、低酸素症に駆動された網膜血管新生を阻止することができる。

【0141】

JAGGED-1/ノッチ1の特異的阻害は、湿潤型AMDの治療医に適用される抗血管新生を狙った極めて新規なアプローチであり、異常な血管新生に起因した失明のための改善された治療を促進するように探索すべき価値がある。

【0142】

<マウスでの生理学網膜血管新生についてのノッチ阻害の結果を決定する>

新生児を感染させるアデノウイルスベクターを使用して、全てのノッチリガンド (ノッチ1¹⁻²⁴)、DLL4 (ノッチ1¹⁻¹³)、またはJAGGED-1 (ノッチ1¹⁰⁻²⁴) を阻害するノッチ1デコイが新生児マウスにおいて発現され、網膜血管新生が研究される。網膜は、発芽血管新生を研究するための優れたモデルである (Connolly, SE. et al., 1988 and Gerhardt, H. et al. 2003)。ノッチ1デコイを発現する新生児由来の網膜を、出生後4日 (P4)、P8およびP21の時点で単離する。P4において、網膜は発芽血管新生を起こしている。P8において、主な神経叢は網膜縁に達しており、P21までに血管新生は完了している。イソレクチンでの全組織標本免疫染色 (IHC) を用いて内皮細胞を同定し、またCD11bまたはF4/80を用いて網膜骨髓性細胞を同定する。これらは網膜血管新生に積極的に関与するものである。内皮血管先端細胞は、血管先端細胞マーカーである高VEGFR-2およびDLL4についてのIHCによって決定される。標準の共焦点顕微鏡によって、血管密度、血管直径、内皮細胞含量、キャピラリー間ジャンクションの数、および糸状仮足の量/位置が調べられるであろう。視神経から成長した主要神経叢の距離が決定されるであろう。内皮細胞増殖またはアポトーシスをそれぞれ可視化するために、エンドムチン+細胞またはVEカドヘリン+細胞、およびホスホヒストン-3またはApotag (登録商標) 抗体についての二重染色が行われた。網膜切片のアルブミン染色を行って、血管外網膜アルブミン染色としてスコアリングされたキャピラリー透過性を評価する。

【0143】

<マウスにおいて、低酸素症で駆動された網膜血管新生についてのノッチ阻害の結果を決定する>

未熟児において、不適切な酸素露出は未熟児網膜症 (retinopathy of prematurity; ROP)、増大した血管透過性を伴う低酸素症に駆動された増殖性網膜症、基底膜の肥厚 (thickening of basement membrane)、および血管の制御されない増殖を導く。酸素に誘導された虚性網膜症 (OIR) のマウスモデル (Smith, LE et al. 1994) を、病理学的網膜血管新生の阻止におけるノッチ1デコイの薬効を評価する手段として使用した。新生児におけるノッチ1デコイの発現の後、上記のようにしてOIRモデルを導き、ここでは

10

20

30

40

50

P7マウスを75%酸素に5日間露出させる。網膜は、P8において中心網膜毛細血管閉塞を示し、P12までに広範囲になる。P12に部屋の空気に戻すと、内部網膜が低酸素症になり、VEGFが上方調節され、制御されない網膜新血管新生がP12～P17まで起きる。活性な新血管新生の際(P17)にマクロファージが骨髄から補充されること(Kataoka, K. et al. 2011)を示すために、また血管構造の正常化促進がマクロファージ含量について評価されることを示すために、OIRモデルが使用されてきた。OIR研究のために、実験マウスは、P8、P12、およびP17において、網膜の全組織標本IHCおよび切片IHCによって評価されるであろう。P8およびP12での網膜は、イソレクチンおよびCD11bまたはFA/80についての二重染色によって、中心網膜血管閉塞の範囲およびマクロファージ密度について評価される。P17における網膜は、調節不能になった新血管新生およびマクロファージ身づ度について評価される。

10

【0144】

<第二実験シリーズについての参考文献>

【参考文献2】

【0145】

Thurston G, Kitajewski J. VEGF and Delta-Notch: interacting signalling pathways in tumour angiogenesis. *Br J Cancer*. 2008;99:1204-9.

Benedito R, Roca C, Sorensen I, Adams S, Gossler A, Fruttiger M, et al. The notch ligands Dll4 and Jagged1 have opposing effects on angiogenesis. *Cell*. 2009;137:1124-35.

Dufraine J, Funahashi Y, Kitajewski J. Notch signaling regulates tumor angiogenesis by diverse mechanisms. *Oncogene*. 2008;27:5132-7. 10

Funahashi Y, Hernandez SL, Das I, Ahn A, Huang J, Vorontchikhina M, et al. A notch1 ectodomain construct inhibits endothelial notch signaling, tumor growth, and angiogenesis. *Cancer Res*. 2008;68:4727-35.

Yan M, Callahan CA, Beyer JC, Allamneni KP, Zhang G, Ridgway JB, et al. Chronic DLL4 blockade induces vascular neoplasms. *Nature*. 463:E6-7. 20

Ridgway J, Zhang G, Wu Y, Stawicki S, Liang WC, Chantery Y, et al. Inhibition of Dll4 signalling inhibits tumour growth by deregulating angiogenesis. *Nature*. 2006;444:1083-7.

(つづく)

30

40

(つづき)

Yan M, Plowman GD. Delta-like 4/Notch signaling and its therapeutic implications. Clin Cancer Res. 2007;13:7243-6.

Yan M, Callahan CA, Beyer JC, Allamneni KP, Zhang G, Ridgway JB, et al. Chronic DLL4 blockade induces vascular neoplasms. Nature. 2010;463:E6-7.

10

Connolly SE, Hores TA, Smith LE, D'Amore PA. Characterization of vascular development in the mouse retina. Microvasc Res. 1988;36:275-90.

Gerhardt H, Golding M, Fruttiger M, Ruhrberg C, Lundkvist A, Abramsson A, et al. VEGF guides angiogenic sprouting utilizing endothelial tip cell filopodia. J Cell Biol. 2003;161:1163-77.

Smith LE, Wesolowski E, McLellan A, Kostyk SK, D'Amato R, Sullivan R, et al. Oxygen-induced retinopathy in the mouse. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994;35:101-11.

20

Kataoka K, Nishiguchi KM, Kaneko H, van Rooijen N, Kachi S, Terasaki H. The roles of vitreal macrophages and circulating leukocytes in retinal neovascularization. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52:1431-8.

Ritter MR, Banin E, Moreno SK, Aguilar E, Dorrell MI, Friedlander M. Myeloid progenitors differentiate into microglia and promote vascular repair in a model of ischemic retinopathy. J Clin Invest. 2006;116:3266-76.

30

40

< 序 >

腫瘍血管新生は種々の信号伝達経路によって調節され、その幾つかは抗血管新生治療の有効な標的である。最初の承認された抗血管新生薬であるベパチズマブ (bevacizumab) (アバスチン(Avastin)) は、幾つかのタイプの癌において使用され、ある程度の成功が証明されてきている。しかし、VEGF経路を標的とする抗血管新生剤は、耐久性の腫瘍応答を示さず、最終的には薬物耐性を誘導し、または腫瘍転移に影響を及ぼす (Bergers and Hanahan, 2008; Ebos et al., 2009; Paez-Ribes et al., 2009)。腫瘍血管構造の崩壊は腫瘍灌流を妨害し、低酸素症をもたらす。次いで、これVEGF阻害にも拘らず腫瘍血管新生および腫瘍増殖を促進する広範囲の因子および化学誘因物質を誘導する。該ノッチ信号伝達経路は、抗血管新生療法のための標的を表しており、幾つかのノッチ阻害剤が開発されてきた。ノッチ信号活性化またはデルタ様4 (DLL4) の阻止のために必要とされるガンマセクレターゼ活性を阻止する薬剤は、腫瘍血管新生を崩壊させる (Noguer a-Troise et al., 2006; Ridgway et al., 2006; Kalen et al., 2011)。分子のおよび遺伝子的研究は、ノッチ信号伝達が、細胞の状況に応じて、細胞の運命、細胞増殖、分化、およびアポトーシスを調節することを解明する。内皮において、ノッチ信号伝達は増殖、遊走および発芽を調節する (Hellstroem et al., 2007)。

10

【0146】

ノッチ信号伝達は細胞-細胞接触を必要とし、ノッチタンパク質およびそのリガンドが隣接する細胞と相互作用することを可能にする。高度に保存されたノッチ遺伝子ファミリーは、膜貫通受容体であるノッチ1、ノッチ2、ノッチ3、およびノッチ4をコードする。ノッチのためのリガンドは、二つのクラスの膜貫通タンパク質：即ち、Jaggedリガンド (Jag)、Jagged1およびJag2；およびデルタ様リガンド (d11)、D111、D113、およびDLL4である。リガンド活性化時には、ガンマセクレターゼ依存性のタンパク質分解開裂により細胞間ノッチペプチドが放出され、核へと移行し、CSL転写抑制因子を活性化因子へと変換させる (Kopan and Ilagan, 2009)。ノッチ1リガンド結合ドメインは、36のEGF様反復を含んでなるものである。ノッチリガンドは保存された縮退EGF様反復、ノッチ結合に特異性を与えるDSLドメイン (Henderson et al., 1997; Shimizu et al., 1999; Glittenberg et al., 2006) およびこれに続くEGF様反復領域を共有している；JAGGEDは16のEGF様反復を有しており、D11は8以下のEGF様反復を含んでいる。ノッチEGF様反復11および12、並びにDSLドメインは、D111またはJAGGED-1とのノッチ相互作用のために必要である (Hambleton et al., 2004; Cordle et al., 2008)。EGF様反復24~29、またはアブルプテックス (Abruptex) 領域は、リガンド結合部位についてD111リガンドと競合することにより、ノッチの活性化に対抗する (Pei and Baker, 2008)。D11vs Jagリガンドと相互作用する異なるノッチEGF様反復が存在するかどうかは知られていない。知識におけるこのギャップは、ノッチとのリガンド特異的相互作用および信号伝達結果の我々の理解を制限してきた。

20

30

【0147】

ノッチ受容体およびリガンドは、幾つかの癌において上方調節されることが示されてきた。腫瘍細胞におけるノッチ信号伝達は、腫瘍のタイプに応じて、腫瘍の促進活性および抑制活性の両方を含んでいる (Takebe et al., 2010; Ranganathan et al., 2011)。内皮ノッチ機能の阻害は、腫瘍血管新生を崩壊させる。DLL4のブロックは、腫瘍血管新生を失調させることによって腫瘍の増殖を阻害するが、これは増大した内皮細胞増殖および先端細胞数を増大させ、非機能的血管構造をもたらすことを特徴とするものである (Noguer a-Troise et al., 2006; Ridgway et al., 2006)。

40

【0148】

ノッチおよびVEGF信号伝達経路は複雑にリンクされている。VEGFはノッチ受容体およびDLL4の発現を誘導し (Liu et al., 2003; Funahashi et al., 2011)、またノッチの活性化はVEGFR-2の発現を低下させるが、VEGFR-1/sT1t-1の発現を増大させる (Taylor et al., 2002; Shawber et al., 2007)。内皮細胞におい

50

て、VEGFR-3はノッチによって誘導され(Shawber et al., 2007; Geudens et al., 2010)、またはノッチ信号伝達によって減少される可能性がある(Tammela et al., 2011)。機能実験の内皮口スが異なるフェノタイプをもたらすので、網膜血管新生において、DLL4およびJAGGED-1は内皮において独特な活性を有することが示されてきた。

【0149】

我々は、ヒトIgG・Fc(ノッチ1デコイ)と融合された、異なるEGF様反復をコードする可溶性の細胞外ドメインノッチ1構築物を作製した。該ノッチ1デコイは、ノッチ阻害剤として機能する。全ての36EGF様反復を備えたヒト・ノッチ1デコイは、Jagged-1、DLL1およびDLL4を阻害するラット・ノッチ1デコイと同様に機能した(Funahashi et al., 2008)。我々は、異なるノッチ1・EGF様反復を組み込んだノッチ1デコイが選択的ノッチ1リガンドを中和するかどうかを自問した。DLL4またはJAGGED-1を選択的に阻害するノッチ1デコイ変異体が同定され、これはヒト・ノッチ1におけるリガンド特異的な相互作用ドメインの最初の描写を提供した。ノッチ1デコイ変異体を、インビトロでの網膜および腫瘍血管新生に対する効果について評価した。DLL4を特的に妨げるノッチ1デコイ変異体は、超発芽フェノタイプを生じ、機能障害性腫瘍血管新生を促進し、また腫瘍増殖を阻害した。JAGGED-1をブロックするノッチ1デコイ変異体は、低下したノッチ1信号伝達を生じ、網膜および腫瘍における血管新生増殖をブロックし、また腫瘍増殖を低下させた。JAGGED-1阻害は、抗血管新生性の可溶性VEGFR-1(sVEGFR-1/sFlt-1)レベルを増大させ、周皮細胞被覆を崩壊させ、それによってJAGGED-1阻害が腫瘍増殖を崩壊させる機構を提供した。

【0150】

<材料および方法>

・原発性細胞および癌細胞株：

細胞培養は、5%CO₂および95%加湿の空気中において37℃で維持された。HUVECを、EGM-2培地(Lonza Group, Walkersville, MD)中で増殖させた。Mm5MT、LLC、およびB16-F10は、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション(ATCC, Manassas, VA)から入手した。KPIは、ヒューマンサイエンス研究資源バンク(Health Science Research Resource Bank; Osaka, Japan)から入手した。癌細胞株は、10%仔牛血清(FBS)およびPen-Strepを伴う1X高グルコースDMEM(Invitrogen, Carlsbad, CA)中で維持した。

【0151】

・ノッチレポータ検定：

HEL細胞に、エフェクテン形質導入試薬(Effectene Transfection Reagent; Qiagen, Germantown, MD)を用いて、pBOS-ノッチ1、pGL3-11CSL-LucおよびRenillaを形質導入し、またはpCRII-JAGGED-1-FLAGもしくはpCRII-DLL4-FLAGを、または対照としてpCRII-GFP-FLAGを形質導入した。形質導入の24時間後に、24穴プレートにおいて受容体細胞およびリガンド細胞を共培養した。共培養の24時間後に細胞を収集し、デュアル-ルシフェラーゼレポータ検定システム(Promega Corporation, Madison, WI)を使用して、ルシフェラーゼ活性を測定した。検定は3回行った。

【0152】

・共免疫沈降：

ノッチ1デコイおよび全長DLL4-FLAGまたはJAGGED-1-FLAGを、リン酸カルシウム形質導入法により293T細胞に同時形質導入した。形質導入の24時間後に、該培養体にDSG(Thermo Scientific, Waltham, MA)を20nmol/mLの最終濃度で加え、30分間インキュベートし、10mMのTrisで15分間急冷した。この溶解物を、20μLのプロテインA/Gアガロース(Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA)によりプルダウンした。架橋を逆転させるために、免疫複合体を

50 $\mu\text{mol}/\text{mL}$ の DTT で処理し、電気泳動前に 5 分間煮沸した。

【0153】

・発芽血管新生検定：

発芽検定 (Nakatsu and Hughes, 2008) は、ビーズ当たり 400 細胞でサイトデックス 3 (Cytodex 3) デキストランビーズ (GE Healthcare Bio-Sciences Corp., Piscataway, NJ) に付着された HUVEC を使用した。24 穴プレートにおいて、2 mg/mL のフィブリノーゲン (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO)、0.15 U/mL のアプロチニン (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO)、および 0.0625 U/mL のスロンピン (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) で構成されたフィブリンクロット中にビーズをウエル当たり 250 ビーズで埋め込んだ。1 時間後に、Detroit 551 繊維芽細胞 (ATCC, Manassas, VA) を、ウエル当たり 1.0×10^5 細胞でフィブリンゲルの頂部に播種した。実験は 3 回行った。

10

【0154】

・網膜分析：

P2 子犬に、異なる ノッチ 1 デコイまたは Fc をコードする アデノウイルス (Ad) を皮下注射した。1 x PBS 中において 5.0×10^9 ffu/mL で Ad を調製し、子犬は 50 μL の一回投与量を受けた。P5 において集めた眼球を、4% PFA 中で固定した。網膜を切除し、1% BSA および 0.5 トリトン X-100 を含む 1 x PBS 中において室温で 2 時間透過処理し、続いて PBL-EC バッファー (pH 6.8 の 1 x PBS 中の、1% トリトン X-100、0.1 mM の MgCl_2 、0.1 mM の CaCl_2 、0.1 mM の MnCl_2) 中で 3 回洗浄した。免疫蛍光について、網膜を FITC に結合した イソレクチン B4 (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA) と共に一晩インキュベートし、PBL-EC で洗浄し、4% PFA で後固定し、マウントした。

20

【0155】

・定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応 (qRT-PCR)：

RNase-free ミニキット (Qiagen, Germantown, MD) を用いて培養細胞から RNA を収集した。単離された RNA を DNase I で 30 分間処理し、RT-PCR のためのスーパースク립ト第一鎖合成システム (Invitrogen, Carlsbad, CA) を用いて逆転写 PCR に使用した。qRT-PCR のために、Absoolute Blue QPCR SYBR Green Mix (Thermo Scientific, Waltham, MA) で反応を行った

30

・腫瘍実験：

4 ~ 6 週齢の雌 NCr ヌードマウス (NCI-Frederick, Frederick, MD) に、 1.0×10^5 の Mm5MT-FGF4 細胞、または 2.0×10^6 の KP1-VEG 細胞、または 5.0×10^5 の LLC 細胞もしくは B16-F10 細胞の上部脇腹への皮下移植を受けさせた。2 日後、ノッチ 1 デコイをコードする Ad を、眼窩後静脈注射を介して投与した。第 21 日に腫瘍を収集し、分析した。腫瘍低酸素症を測定するために、屠殺する 30 分前のマウスに、低酸素症プローブ 1 (Hypoxyprobe, Inc., Burlington, MA) を 60 mg/kg で腹腔内注射した。腫瘍を抗低酸素症プローブ抗体で免疫染色した。血管灌流を評価するために、マウスは左心室に、100 μg のフルオレセイン・リコペルシコン・エスキュレンタム・レクチン (fluorescein Lycopersicon esculentum lectin; Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA) の心臓内注射を受けた。2 分後、マウスは 1% PFA を灌流された。腫瘍を内皮細胞表面に結合したレクチンについて、蛍光顕微鏡により分析した。腸毒性分析のために、Ad 感染させた腫瘍保有マウスから十二指腸を収集した。該組織を 4% PFA 中で一晩固定し、30% 蔗糖溶液中で脱水した後にパラフィン包埋した。杯状細胞を分析するために PAS 染色を行った。

40

【0156】

・免疫蛍光染色

厚さ 7 μm の新鮮な凍結腫瘍組織切片を、例アセトン中で 3 分間の後固定を行い、1 x PBS 中で 5 分間の洗浄を 2 回を行い、次いで、3% BSA および 2% 血清を含有するブロッキング溶液中において室温で 1 時間ブロック処理した。次いで、一次抗体溶液を該ブ

50

ロッキング溶液に加え、スライドに添加し、4 で一晩インキュベートした。スライドを、1 × P B S 中で5分間の洗浄を2回行った。蛍光的に結合された二次抗体を前記切片に加え、30分間インキュベートした。該スライドを1 × P B S 中で2回洗浄し、マウントした。

【0157】

<結果>

・ノッチ1¹⁻¹³デコイは毛管発芽を増大させる一方、ノッチ1¹⁰⁻²⁴は発芽および血管平滑筋細胞被覆を低下させる：

内皮細胞による血管新生および内腔含有発芽形成に対するノッチ1デコイの効果を決定するために、我々は、H U V E C においてノッチ1デコイを発現させ、またインビトロ発芽検定を行った。H U V E C で被覆されたデキストランビーズをフィブリン中に埋設し、第7日に発芽形成を評価した。F c 制御において、内皮細胞発芽は吻合して多細胞の分岐した内腔を含むネットワークを形成した(図33A)。ノッチ1¹⁻¹³デコイを発現するH U V E C は、毛細血管発芽の数における76%増加に見られるように、増大した先端細胞を特徴とする超発芽フェノタイプを示した(図33Aおよび図33B)。抗D L L 4抗体が内皮細胞増殖および発芽を高めたことが示されているので(Ridgway et al., 2006)、ノッチ1¹⁻¹³デコイフェノタイプは、D L L 4 / ノッチ信号伝達の減衰と一致している。対照的に、ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイおよびノッチ1¹⁻²⁴デコイを発現するH U V E C は、発育を阻害された発芽、およびそれぞれ40%および68%の発芽数の減少を示した(図33B)。対照群において観察された吻合は、ノッチ1¹⁰⁻²⁴およびノッチ1¹⁻²⁴デコイを発現するH U V E C には存在しなかった。これらの結果は、J A G G E D - 1の阻害が抗血管新生性であること、および該効果がD L L 4阻害を凌駕することを示唆する。

【0158】

試験された全てのノッチ1デコイ(ノッチ1¹⁻¹³、ノッチ1¹⁰⁻²⁴、ノッチ1¹⁻²⁴、ノッチ1¹⁻³⁶)が、ノッチ1ICによるノッチ信号活性化とは逆に、単層中で増殖したときに、H U V E C の遊走および増殖を増大させた(図34A~図34C)。H U V E C をコラーゲンゲルの間に埋設した毛細血管様ネットワーク形成検定において、ノッチ1¹⁻¹³デコイは、H U V E C に、分岐点が増大した更に複雑な血管ネットワークを形成させたのに対して、ノッチ1¹⁰⁻²⁴は完全なネットワークを形成できなかった(図35Aおよび図35B)。ノッチ1¹⁻¹³およびノッチ1¹⁰⁻²⁴が、インビトロ検定において3次元(3D)で異なる血管新生応答を誘発させる能力(図33A)は、単層検定では見られなかった。この相違の可能な説明は、ノッチリガンドの発現が細胞外マトリックス(ECM)により影響を受けるということである。H U V E C がフィブリン上で増殖されたとき、コラーゲンに比較してJ A G G E D - 1発現は有意に増大し、またD L L 4は減少した(図36)。こうして、H U V E C 中においてノッチ1デコイ変種により誘発されたりガンド特異的な応答は、ECMによって影響され、また毛細血管様発芽の評価がインビトロで3Dにおいてモデル化されるときに顕在化される。

【0159】

我々は、ノッチ信号伝達が発芽形成を限定する場合に、ノッチ1デコイがマウス網膜血管新生に対して如何なる効果を有するかを問うた(Lobov et al., 2007; Suchting et al., 2007)。該デコイまたはF cを発現するアデノウイルスベクターを新生児に注射し、循環系におけるデコイ発現をウエスタンブロットティングにより検証し、循環するデコイの網膜血管新生に対する影響を評価した。アデノウイルス感染は、ノッチ1デコイの検出可能な血清レベルを導いた(データは示さず)。ノッチ1¹⁻¹³デコイは、D L L 4を選択的にブロックするその能力(図33A)に一致して、内皮発芽および発芽先端細胞の数を有意に増大させた(図33B)。ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイは、網膜における血管密度を低下させた(図7B)。従って、ノッチ1¹⁻²⁴デコイは、マウス網膜血管新生におけるD 1 1 4アンタゴニストおよびインビトロ発芽の際のJ A G G E D - 1アンタゴニストとして挙動した。

10

20

30

40

50

【0160】

J A G G E D - 1 は、血管平滑筋細胞の補充のために重要であることが示されてきた (High et al., 2008; Benedito et al., 2009)。平滑筋アクチン (S M A) 免疫蛍光の解析により、ノッチ 1¹⁰⁻²⁴ およびノッチ 1¹⁻²⁴ デコイ治療群において、動脈に沿った血管平滑筋細胞被覆の減少が明らかになり (図 33C)、内皮特異的 J A G G E D - 1 変異体マウスにおけるフェノタイプも見られた (High et al., 2008; Benedito et al., 2009)。N G 2 免疫蛍光法は、網膜周皮細胞被覆に有意な相違を示さなかった (データは示さず)。インビトロおよび印日簿での発芽血管新生に対する効果を評価したときに、ノッチ 1¹⁻¹³ デコイは D L L 4 阻害剤として機能し、またノッチ 1¹⁰⁻²⁴ デコイは J A G G E D - 1 阻害剤として機能した。

10

【0161】

・ノッチ 1¹⁻¹³ デコイ、ノッチ 1¹⁰⁻²⁴ デコイ、およびノッチ 1¹⁻²⁴ デコイは、

主要増殖を有意に低下させ、また腫瘍血管新生を不調不全にする：

我々は、腫瘍細胞に直接影響を与えるノッチ 1 デコイの能力を試験し；M m 5 M T - F G F 4 (マウス乳腺腫瘍)、K P 1 - V E G F (ヒト膵臓腫瘍)、L L C (マウス肺腫瘍)、および B 1 6 - F 1 0 (マウスメラノーマ) のインビトロでのコロニー形成、増殖、およびアポトーシスに対して、ノッチ 1¹⁻¹³、ノッチ 1¹⁰⁻²⁴、およびノッチ 1¹⁻²⁴ デコイが影響を及ぼすかどうかを評価した。全てのノッチ 1 デコイが M m 5 M T - F G F 4 のコロニー形成を阻害したが、他の主要細胞株を阻害しなかった (図 37)。従って、M m 5 M T - F G F 4 腫瘍において、ノッチ 1 デコイは、内皮細胞および壁細胞のような、腫瘍細胞および宿主細胞の両者を阻害する能力を有している。ノッチ 1 デコイは、単層培養において増殖した腫瘍株の何れにおいても、腫瘍細胞増殖またはアポトーシスに影響しなかった (図 15)。

20

【0162】

腫瘍におけるノッチ 1 デコイ変異体の作用を評価するために、我々は、4つの異なる腫瘍細胞株を使用して異種移植研究を行った。異なるノッチ 1 デコイをコードするアデノウイルスを、皮下腫瘍移植の3日後のマウスに静脈注射した。注射の2日後には早くも、ウエスタンブロットにより血清中に、また免疫蛍光法により腫瘍中に高レベルのタンパク質が検出された (図 18)。試験した全てのノッチ 1 デコイが、M m 5 M T - F G F 4、L L C、および B 1 6 - F 1 0 腫瘍の増殖を有意に減少させたのに対して；ノッチ 1¹⁰⁻²⁴ デコイおよびノッチ 1¹⁻²⁴ デコイだけが、K P 1 - V E G F 腫瘍の増殖を阻害した (図 39A ~ 図 38D)。M m 5 M T - F G F 4 および K P 1 - V E G F 腫瘍増殖を攪乱するノッチ 1¹⁻²⁴ デコイの能力は、全長ノッチ 1 デコイ (ノッチ 1¹⁻³⁶) について観察されたものと類似していた (図 39)。このノッチ 1 デコイの効果は腫瘍が迅速に増殖を始めた後に見られ、それは移植の約1週間後に起こった (データは示さず)。

30

【0163】

ノッチ 1¹⁻¹³ デコイ、ノッチ 1¹⁰⁻²⁴ デコイ、およびノッチ 1¹⁻²⁴ デコイは、腫瘍血管新生に対して異なる効果を有していた。ノッチ 1¹⁻¹³ デコイは、D L L 遮断で見られたもの (Ridgway et al., 2006) に類似して、全ての腫瘍モデルにおいて内皮細胞密度を有意に増加させた (図 40A ~ 図 40B)。対照的に、ノッチ 1¹⁰⁻²⁴ およびノッチ 1¹⁻²⁴ デコイ群からの腫瘍は、内皮細胞含量において減少を示した (図 40A ~ 図 40B)。M m 5 M T - F G F 4 モデルにおいて、血管灌流は、レクチン灌流に続く腫瘍内皮のエンドムチン染色によって決定された。F c 腫瘍に比較して、全てのノッチ 1 デコイ治療群由来の血管構造は乏しい血管灌流を示し、72% (ノッチ 1¹⁻¹³)、90% (ノッチ 1¹⁰⁻²⁴)、および84% (ノッチ 1¹⁻²⁴) 減少した (図 41A および図 41B)。乏しい灌流に一致して、ノッチ 1 デコイで治療された腫瘍は増大した低酸素症および腫瘍ネクローシスを有していた (図 41A および図 41C)。血管退化を決定するために、腫瘍をエンドムチンおよびコラーゲン I V について免疫染色した。コラーゲン I V 沈着は、ノッチ 1¹⁻¹³ デコイ治療された腫瘍において増大し、またノッチ

40

50

1¹⁰-2⁴ およびノッチ1¹-2⁴ デコイ腫瘍において減少した(図42A~図42C)。エンドムチン染色に対して正規化したときにFc群とノッチ1デコイ治療群の間に相違はなく(図42C)、減少した腫瘍血管構造が血管退化によるものでないことが示された。

【0164】

結論として、DLL4およびJAGGED-1阻害は、マウス腫瘍異種移植片において異なる血管新生フェノタイプをもたらした。ノッチ1¹-1³ デコイ、即ち、DLL4阻害剤は内皮細胞含量を増加させ、血管灌流を低下させ、腫瘍低酸素症およびネクローシスを増大させた。ノッチ1¹⁰-2⁴ デコイ、即ち、JAGGED-1阻害剤は腫瘍血管新生を低下させ、腫瘍血管の灌流を乏しくして増大した低酸素症を導いた。

10

【0165】

・ノッチ1デコイ類は腫瘍血管の壁細胞被覆を攪乱する異なった能力を示す：

ノッチ1デコイの網膜壁細胞被覆に対する効果に基づいて、我々は、ノッチ1デコイで処理されたMm5MT-FGF4腫瘍における壁細胞を評価した。腫瘍切片を、エンドムチンおよびNG2またはSMAについて免疫染色し、それぞれ周皮細胞および血管平滑筋細胞を可視化した。ノッチ1¹-1³ デコイ腫瘍において、周皮細胞は内皮細胞と密接に関連付けられた(図43A)。Fc群に比べ、ノッチ1¹-1³ デコイは、増大した内皮細胞含量と一致して周皮細胞を増大させ(図43B~図43D)、シュウヒ細胞密度が変化しないことを示した。ノッチ1¹⁰-2⁴ およびノッチ1¹-2⁴ デコイで治療された腫瘍において、周皮細胞は内皮細胞から解離された(図43A)。

20

【0166】

された。内皮細胞に対する周皮細胞の数は、ノッチ1¹⁰-2⁴ デコイ腫瘍においては有意に減少した(図43D)；即ち、血管の全体の周皮細胞被覆が減少した。SMA免疫染色は、ノッチ1¹⁰-2⁴ およびノッチ1¹-2⁴ デコイで治療された腫瘍について、大きな動脈の減少した血管平滑筋細胞被覆を明らかにした(図44)。ノッチ1¹⁰-2⁴ デコイおよびノッチ1¹-2⁴ デコイの同様の効果が、B16-F10腫瘍の壁細胞について観察された(データは示さず)。KP1-VEGFおよびLLC対照腫瘍は、乏しい壁細胞被覆を有している(データは示さず)。従って、腫瘍血管新生において、D114阻害は血管壁細胞に対して明らかな影響を有していなかったのに対して、ノッチ1¹-2⁴ デコイおよびノッチ1¹⁰-2⁴ デコイを介してJAGGED-1をブロックすることは、血管のある周皮細胞および血管平滑筋細胞被覆をもたらした。

30

・JAGGED特異的ノッチ1¹⁰-2⁴ デコイは、可溶性VEGFR-1/sFlt-1を増加させる：

我々は、ノッチ標的遺伝子発現を評価することによって、DLL4特異的およびJAGGED-1特異的なノッチ1デコイ変種が、内皮細胞において異なる効果を誘発する機構を探求した。HUVECにFc、ノッチ1¹-1³ デコイ、ノッチ1¹⁰-2⁴ デコイ、またはノッチ1¹-2⁴ デコイをコードするレンチウイルスを感染させ、内皮ノッチ下流評価に対する効果を決定した。shRNA含有レンチウイルス(J1KD)を使用して、HUVECにおいてJAGGED-1をノックダウンした。ノッチ1¹-1³ デコイ、ノッチ1¹⁰-2⁴ デコイ、およびノッチ1¹-2⁴ デコイ、並びにJ1KDの発現は、ノッチ/CSLトランス活性化の直接の標的(Nakagawa et al., 2000)であるHEY1、HEYLおよびHES1の発現を抑制した(図45)。他のノッチ1デコイとは異なり、ノッチ1¹⁰-2⁴ デコイまたはJ1KDは、HEY2転写物を減少させなかった(図45)。従って、ノッチのDLL4およびJAGGED-1活性化は、内皮細胞におけるHEY2の発現を差別的に調節する。

40

【0167】

ノッチ信号伝達は、殆どはVEGF受容体の調節を介して、内皮細胞におけるVEGF信号伝達を調節する(Thurston and Kitajewski, 2008)。我々は、VEGF受容体の発現に対するノッチ1デコイ変異体またはJ1KDの効果を決定するために、定量的RT-PCRおよびFACSを使用した。ノッチ1¹-1³、ノッチ1¹⁰-2⁴、ノッチ1¹

50

・^{2 4} デコイ変異体および J1KD のノックダウンは、VEGFR - 2 を減少させた（データは示さず）ノッチ1細胞内ドメイン（ノッチ1IC）とは逆に、HUVECにおいて VEGFR - 2 発現を増大した。ノッチ1デコイによる VEGFR - 2 の増加は、HUVEC の増殖および遊走における増大に寄与するらしい（図34）。全てのノッチ1デコイ変異体および J1KD は、VEGFR - 3 発現を有意に増加させる（図45）。

【0168】

ノッチ1デコイによる DLL4 または JAGGED - 1 に媒介されたノッチ信号伝達の阻害は、VEGFR - 1 発現を差別的に調節した。ノッチ1^{1 - 13} デコイおよびノッチ1^{1 - 24} デコイは、VEGFR - 1 転写物を減少させた；これに対して、ノッチ1^{10 - 24} デコイまたは J1KD は、VEGFR - 1 を増大させた（図46）。しかし、VEGFR - 1 の表面発現は、ノッチ1^{10 - 24} デコイ HUVEC において増大しなかった（図46）。

VEGFR - 1 は、膜貫通受容体（VEGFR - 1）または可溶性タンパク質（sVEGFR - 1 / sFlt - 1）を産生する二つのスプライス変異体として存在する。sVEGFR - 1 / sFlt - 1 に特異的な PCR プライマーを使用することにより、我々は、ノッチ1^{10 - 24} デコイまたは J1KD が sVEGFR - 1 / sFlt - 1 転写物を有意に増大させることを見出した（図47A）。DLL4 および JAGGED - 1 の両方を阻害するノッチ1^{1 - 24} デコイはまた、HUVEC において、sVEGFR - 1 / sFlt - 1 発現を増大させた。sVEGFR - 1 / sFlt - 1 スプライス変異体は、HUVEC において、DLL4 特異的なノッチ1^{1 - 13} デコイにより影響されなかった（図47A）。我々は、異なるノッチ1デコイ類、J1KD またはノッチ1IC を発現する HUVEC 由来の馴らし培地上での ELISA を用いることにより、JAGGED - 1 ノッチ信号伝達が sVEGFR - 1 / sFlt - 1 を調節することを確認した。sVEGFR - 1 / sFlt - 1 のレベルは、ノッチ1^{10 - 24} デコイおよびノッチ1^{1 - 24} デコイまたは JAGGED - 1 のノックダウンと共に有意に増大し、またノッチ1^{1 - 13} デコイまたはノッチ1IC によって影響されなかった（図47B）。

【0169】

Mm5MT - FGF4 腫瘍の VEGFR - 1 / sFlt - 1 免疫蛍光は、ノッチ1^{10 - 24} デコイおよびノッチ1^{1 - 24} デコイ群における VEGFR - 1 / sFlt - 1 の有意な増加を示した（図48A および図48B）。ノッチ1^{10 - 24} デコイおよびノッチ1^{1 - 24} デコイで治療された腫瘍における核酸および非血管染色パターンは、増大した可溶性の VEGFR - 1 / sFlt - 1 を示している。こうして、我々は、ノッチ1^{10 - 24} またはノッチ1^{10 - 24} デコイの何れかが、HUVEC およびマウス腫瘍異種移植片における sVEGFR - 1 / sFlt - 1 のレベルを特異的に増大させることを発見した。sVEGFR - 1 / sFlt - 1 が VEGF / VEGFR - 2 信号伝達の競争的アンタゴニストとして機能するので、ノッチ1^{10 - 24} デコイおよびノッチ1^{1 - 24} デコイで知慮いうされた腫瘍において我々が観察した腫瘍血管新生における減少は、減少した VEGFR - 2 信号伝達によって起きるかもしれない。

【0170】

・ノッチ1デコイは腫瘍を有するマウスに対して有毒ではない：

先の刊行物は、GSI、または組み合わされたノッチ1 / ノッチ2 遮断で治療されたマウスにおける腸杯状細胞の肥厚を報告した（van Es et al., 2005; Wu et al., 2010）。ノッチ1^{1 - 13} デコイ、ノッチ1^{1 - 24} デコイ、またはノッチ1^{10 - 24} デコイは、3週間の実験の終了時に、腫瘍を有するマウスの腸において、杯状細胞数を2倍未満で穏やかに増加させた（図27A および図27B）。対照的に、GSI（化合物E）で治療されたマウスは、杯状細胞における5倍の増加を有していた。温和な腸フェノタイプと一致して、ノッチ1デコイ変種腫瘍を持ったマウスにおいて体重口入は観察されなかった（図27C）。これらの結果は、ノッチ1デコイには有意な腸毒性がなく、抗血管新生療法のための別のノッチを標的とする薬剤を表すことを示唆している。

【0171】

< 考察 >

ノッチリガンドと生産的に相互作用するために、ノッチ受容体はEGF様反復11および12、並びにカルシウムイオンを必要とする(Rebay et al., 1991; Rand et al., 2000);しかし、ノッチ上のリガンド特異的相互作用ドメインに関しては僅かしか知られていない。我々は、DLL4およびJAGGED-1に焦点を当てて、リガンド特異的相互作用のためのドメインを決定するために、生化学的および機能的検定を利用した。この知識を用いることにより、我々は、DLL4またはJAGGED-1に媒介されたノッチ信号伝達のための、独特な下流信号伝達事象を解明した。即ち、ノッチ1¹⁻²⁴デコイは汎リガンド阻害剤として機能し、DLL4またはJAGGED-1により誘発された信号伝達と相互作用し、且つ阻害する。ノッチ1¹⁻¹³デコイは、DLL4特異的アンタゴニストとして機能し、DLL4を妨害できるがJAGGED-1は妨害しない第一の13EGF様反復を定義する。逆に、ノッチ1のEGF様反復10~24を含んだノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイは、JAGGED-1を阻害したが、DLL4は阻害しなかった。これらのリガンド選択的なノッチ1デコイを使用して、我々は、DLL4またはJAGGED-1阻害により誘発されたsVEGFR-1/sFlt-1の反対の調節を見出し、DLL4およびJAGGED-1がノッチ1の下流の異なる信号伝達効果を有することを示した。最後に、我々は、DLL4またはJAGGED-1の何れかを選択的に阻害し、またはその両方を阻害するノッチ1デコイを使用して、腫瘍阻害が達成され得ることを示した。しかし、DLL4またはJAGGED-1の阻害は、網膜および腫瘍異種移植片において、異なる血管新生フェノタイプをもたらした。

10

20

【0172】

・内皮細胞におけるJAGGED-1対DLL4リガンド特異的ノッチ信号伝達:

我々は以前に、JAGGED-1、DLL1またはDLL4によりノッチ1信号伝達をブロックするラット・ノッチ1¹⁻³⁶デコイを記載した(Funahashi et al., 2008)。我々は、ヒト・ノッチ1¹⁻³⁶デコイおよびノッチ1¹⁻²⁴デコイを作製し(図36)、それらがJAGGED-1およびDLL4をブロックすることを示した。ノッチ1¹⁻³⁶デコイおよびノッチ1¹⁻²⁴デコイは、それらがDLL4(その阻害は超発芽応答を誘発するはず)と相互作用するとの事実にも拘わらず、抗血管新生剤として機能した。我々は、ノッチ1¹⁻³⁶デコイおよびノッチ1¹⁻²⁴デコイの項血管新生活性が、JAGGED-1をブロックすることにより、またはDLL4およびJAGGED-1の両方をブロックすることにより誘発されたフェノタイプを反映すると仮定した。

30

【0173】

活性なアンタゴニストである全てのノッチ1デコイ変異体は、ノッチ1のEGF様反復11~13を含んでいた。我々は、ノッチ1のEGF様反復10~13の上流側の反復が、DLL4に対する阻害活性を与え(図3Bおよび図3C)、またDLL4に対する特異的結合を与える(図5B)ことを発見した。逆に、EGF様反復10~13の下流側の反復は、JAGGED-1に対する阻害活性を与え(図4Aおよび図4B)、またJAGGED-1に対する結合を与える(図5B)が、DLL4に対しては与えない。これは、ノッチ1タンパク質におけるリガンド選択的な会合ドメインの最初の記述である。

40

【0174】

我々の研究は、JAGGED-1/ノッチおよびDLL/ノッチの信号伝達が重なりを有しており、また独特な分子標的を有していることを示している。汎リガンドであるノッチ1¹⁻²⁴デコイ、DLL4-特異的ノッチ1¹⁻¹³デコイ、およびJAGGED-1特異的ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイは、全て、ノッチ標的であるHEY1、HEYL、HES1、VEGFR-3のレベルの減少、およびVEGFR-2における増大を生じさせ、これら遺伝子がDLL4/ノッチおよびJAGGED-1/ノッチの両方の信号伝達の標的であることを示した。ノッチ1デコイ変異体活性における相違は、我々が、VEGFR-1のためのデコイ受容体として機能する抗血管新生剤であり、且つVEGFR-2信号伝達を弱める可溶性VEGFR-1/sFlt-1のリガンド特異的調節を分析したときに発見された(Shibuya, 2006)。DLL4-特異的ノッチ1¹⁻¹³デコイは、sV

50

EGFR-1/sFlt-1 スプライス変異体およびタンパク質レベルを低下させたのに対して、JAGGED-1 特異的なノッチ 1^{10-24} デコイは、増大したsVEGFR-1/sFlt-1 をもたらした。従って、インビトロの発芽検定および腫瘍異種移植において、JAGGED-1 特異的なノッチデコイについて観察された抗血管新生フェノタイプは、sVEGFR-1/sFlt-1 における増大から生じたのかも知れない。

【0175】

・ノッチ1デコイの抗血管新生活性および抗腫瘍活性

JAGGED-1 特異的およびDLL 特異的なノッチ1デコイは、両者共に腫瘍増殖を低下させ、また腫瘍における低酸素症を誘導して、該ノッチ1デコイが腫瘍への血流を効果的にブロックすることを示した。我々の解析により、DLL4 およびノッチ1またはJAGGED-1 が標的であるとき、ノッチ1デコイ変異体の腫瘍阻害効果は異なる血管新生機構から生じることが示された。

10

【0176】

DLL4/ノッチの遮断は、増大した内皮細胞増殖および増大した先端細胞を導き、最終的には、非機能的血管新生および血管灌流をもたらす (Noguera-Troise et al., 2006; Ridgway et al., 2006; Li et al., 2007; Hoey et al., 2009)。これらの研究と一致して、DLL4 特異的なノッチ 1^{1-13} デコイは、インビトロフィブリンビード検定において (図33A および図33B)、網膜血管新生の際 (図7B および図7C)、および四つの異なる腫瘍異種移植において (図38)、超発芽を生じた。ノッチ 1^{1-13} デコイは、VEGFR-2 の上昇およびVEGFR-1 の減少を生じ、該超発芽フェノタイプの根底にあるものとして提案される変化はDLL4 遮断により生じる (Potente et al., 2011)。従って、ノッチ 1^{1-13} デコイの血管新生フェノタイプは、DLL4 阻害剤としての生化学的活性と一致した。

20

【0177】

JAGGED-1 阻害剤であるノッチ 1^{10-24} デコイは、インビトロで (図33A)、網膜血管新生の際 (図7B および図7C)、および複数の腫瘍異種移植において (図38)、低下した発芽を生じた。これは先の研究と一致するものであり、ここでは内皮JAGGED-1 が網膜血管新生発芽を低下させる (High et al., 2008; Benedito et al., 2009)。ノッチ 1^{10-24} デコイによるJAGGED-1 阻害は、減少したJAGGED-1/ノッチ1 に誘導されたCSL レポート発現、並びにHEY1、HEYL、およびHES1 の発現に見られるように、低下したノッチ信号伝達と関連していた。しかしながら、JAGGED-1 の阻害は、内皮細胞におけるsVEGFR-1/sFlt-1 産生を特異的に増大させた。従って、ノッチ 1^{10-24} デコイによるJAGGED-1 遮断の効果は、内皮細胞により産生される抗血管新生剤のレベルを上昇させることであった。事実、sVEGFR-1/sFlt-1 の有意な上昇が、ノッチ 1^{10-24} デコイで治療された腫瘍においてみられた (図48)；従って、低下した腫瘍血管新生は、高いsVEGFR-1/sFlt-1 レベルと相関していた。

30

【0178】

ノッチ 1^{10-24} デコイ発現は、網膜および腫瘍血管の両方に付随した血管壁細胞を低下および崩壊させた。網膜において、JAGGED-1 特異的阻害は、小動脈の血管平滑筋細胞被覆を低減した (図33D)。周皮細胞もまた、ノッチ 1^{10-24} デコイで治療された腫瘍において、腫瘍内皮と結合できなかった。ノッチ 1^{10-24} デコイで観察された壁細胞被覆の方がいはまた、JAGGED-1/ノッチ相互作用が、動脈上での適正な平滑筋細胞結合について必要とされることを示した先の研究 (High et al., 2008; Benedito et al., 2009) と一致した。

40

【0179】

我々は、JAGGED-1 に媒介されたノッチ活性化が内皮-周皮細胞相互作用の調節および維持のために必要とされることを見出し、これらの相互作用の調節解除が血管の不安定性に寄与することを提案した。従って、sVEGFR-1/sFlt-1 を上昇させることに加えて、我々は、ノッチ 1^{10-24} デコイが腫瘍血管新生をブロックする追加

50

の機構を提案する。ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイは、JAGGED-1の阻害を介して、内皮週細胞相互作用を攪乱させることにより、腫瘍血管を不安定化する。ノッチは、内皮-壁細胞相互作用を促進する広範囲の信号伝達分子(Armulik et al., 2005)を調節し、また平滑筋細胞において、ノッチは分化を促進することにより内皮JAGGED-1に应答する(Domenga et al., 2004)。周皮細胞はVEGF-Aを産生するものであり、また内皮細胞生存を促進することが知られている(Franco et al., 2011)。ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイは、腫瘍血管の周皮細胞被覆を酷く崩壊させ、またsVEGFR-1/sFlt-1を上昇させるので、この腫瘍内皮は、VEGF-Aにより提供される生存促進信号の欠失に対して特に敏感であろう。従って、ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイは、腫瘍において、周皮細胞を崩壊させ且つsVEGFR-1/sFlt-1を上昇させるように働く強力な血管新生剤を代表するものである。

10

【0180】

・JAGGED-1：血管新生促進性ノッチリガンド

血管におけるノッチ信号伝達の調節は、内皮ノッチリガンド、即ち、JAGGED-1およびDLL4に起因する。DLL4とは異なり、ノッチがマニックフリンジ(Manic Fringe; Benedito et al., 2009)によりグリコシル化されるなら、内皮JAGGED-1がノッチ信号伝達を活性化する減少した能力を有することが示されるまで、JAGGED-1の役割は幾分わかり難いままであった。このデータは、内皮JAGGED-1が、DLL4/ノッチ相互作用を妨害することにより、またはDLL4により媒介されるものよりも低いノッチ信号伝達を促進することにより、DLL4/ノッチ信号伝達を妨害するモデルを示唆する(Benedito et al., 2009)。このモデルのサポートにおいて、JAGGED-1の内皮特異的喪失は、網膜血管内において増大したノッチ標的であるHey1及びHes1を導く(Benedito et al., 2009)。

20

【0181】

我々は、内皮JAGGED-1が、sVEGFR-1/sFlt-1および未だ同定されていない他の可能なJAGGED-1特異的ノッチ標的を下方調節することによって血管新生を促進するために、ノッチ信号活性化を介して作用できることを提案する。培養された内皮細胞において、ノッチ信号伝達を活性化するJAGGED-1の能力は、概ねDLL4と同様であった(図3B~3C、および図4A~4b)。ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイまたはJ1KDを介してJAGGED-1活性をブロックすることは、HEY1、HEYL、HES1、VEGFR-3を含む殆どのノッチ下流標的を下方調節し、またVEGFR-2を上方調節した(図45)。しかし、ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイまたはJ1KDによるJAGGED-1/ノッチ信号伝達の阻害は、DLL4遮断とは異なり、HEY2を阻止せず、またsVEGFR-1/sFlt-1を上昇させた。従って、ノッチ1¹⁰⁻²⁴デコイまたはJ1KDを使用した機能喪失実験は、内皮JAGGED-1が、ノッチ信号伝達を活性化し、これがsVEGFR-1/sFlt-1の下方調節をもたらすことにより、血管新生を促進できることを示している。JAGGED-1が活性化リガンドであるとき、内皮細胞はsVEGFR-1/sFlt-1を減少させることによって应答するであろう。これに対して、JAGGED-1がマニック・フリンジで修飾され(manifric fringe-modified)、且つリガンドとして活性が低ければ、増大したDLL4信号伝達が発芽形成を限定するであろう。従って、血管新生におけるJAGGED-1の特別な役割は状況に依存するものであり、ノッチのレベルおよびグリコシル化状態、またはJAGGED-1を内皮細胞ノッチに提示する細胞タイプに基づいて異なる。我々の研究から得られた全ての証拠は、JAGGED-1活性が生産的血管新生のために決定的に重要であるとの結論と一致している。

30

40

【0182】

・DLL4およびJAGGED-1の両方をブロックするノッチ1デコイの機能：

DLL4およびJAGGED-1の両方を各々について選択的にブロックするノッチ1デコイを開発することによって、我々は、リガンド選択的な遮断を用いて、組み合わされたDLL4およびJAGGED-1遮断の効果を比較する機会を持った。ノッチ1¹⁰

50

・^{2 4}デコイと同様に、ノッチ1^{1 - 2 4}デコイはインビトロのフィブリンビード発芽試験を使用した内皮発芽をブロックし(図33A)、またノッチ1^{1 0 - 2 4}デコイのように協力にはないが、sVEGFR1/sFlt-1のタンパク質レベルを増大させた(図47B)。しかしながら、ノッチ1^{1 - 2 4}デコイはまた、増大したHVEC増殖、遊走およびネットワーク形成によってわかるように、DLL4特異的なノッチ1^{1 - 1 3}デコイと同様に機能した。網膜において、ノッチ1^{1 - 2 4}デコイは混合型フェノタイプを示し、超発芽を生じたが(図7B)、また壁細胞被覆も低減させた(図33D)。従って、ノッチ1^{1 - 2 4}デコイは、網膜血管において、D114およびJAGGED-1機能の両方を乱すことができる。対照的に、ノッチ1^{1 - 2 4}デコイは、四つの異なる腫瘍モデルにおいてノッチ1^{1 0 - 2 4}デコイを表現型模写して腫瘍血管構造を低減させ、またMm5MT腫瘍モデルにおいてVEGFR-1/sFlt-1を上昇させた。ノッチ1^{1 - 2 4}デコイは、腫瘍微小環境において主にJAGGED-1阻害剤として作用し、腫瘍におけるその有用性は、明らかに、異なるノッチリガンドの存在および活性に依存するであろう。

10

【0183】

・ノッチ1デコイの治療的能力

腫瘍血管新生の阻害におけるノッチ1デコイ類の他と異なる示差的能力は、それらの生体利用性によって影響されるであろう。ノッチ1^{1 - 1 3}デコイおよびノッチ1^{1 - 2 4}デコイは、ノッチ1^{1 - 3 6}デコイよりも高いレベルで発現および分泌され、従って、製造がより容易である可能性があり、また潜在的にはより効果的である。腫瘍切片の分析により、ノッチ1^{1 - 3 6}デコイは、腫瘍血管の周囲で検出され且つ腫瘍細胞をおおって拡散されるより小さいノッチ1デコイ変異体とは逆に、腫瘍血管構造に限定されることが示された(図39)。より拡散性であるため、ノッチ1^{1 - 1 3}デコイおよびノッチ1^{1 - 2 4}デコイは、腫瘍微小環境において、腫瘍血管新生、腫瘍細胞、癌細胞、および他の細胞に影響する能力を有している。JAGGED-1を過剰発現する腫瘍細胞は、マウスにおける腫瘍血管新生を促進し(Zeng et al., 2005; Funahashi et al., 2008)、腫瘍由来のJAGGED-1が、VEGF遮断のケースにおいて代替の血管新生経路として働き得ることを示唆した。従って、JAGGED-1に媒介されたノッチ信号伝達の選択的阻害は、多くの細胞タイプに由来するJAGGED-1の腫瘍促進活性をターゲティングするために重要である。

20

30

【0184】

ノッチ1^{1 - 3 6}デコイの血管局在化の潜在的な利点は、オフ・ターゲット副作用を最小化することであり得るであろう。ガンマセクレターゼ阻害剤(van Es et al., 2005)、またはノッチ1/ノッチ2の組み合わせられた阻害抗体(Wu et al., 2010)を使用したノッチ遮断の大きな副作用は、損なわれた胃腸機能である。我々は、GSI治療に比較して、ノッチ1^{1 - 1 3}デコイ、ノッチ1^{1 0 - 2 4}デコイ、ノッチ1^{1 - 2 4}デコイが、最小限の杯細胞異型性のみを誘導し、またノッチ1デコイ類を発現するマウスが8週までは耐容性を示すことを見出した(データは示さず)。

【0185】

活性および標的の相違にも拘わらず、ノッチ1^{1 - 1 3}デコイ、ノッチ1^{1 0 - 2 4}デコイ、ノッチ1^{1 - 2 4}デコイは、全て、四つの異なる腫瘍モデルにおいて、最小限の毒性で腫瘍増殖を抑制する上で効果的であった。ノッチ経路の複雑さおよびノッチが機能するプロセスの多様性が、我々に対して、該信号伝達経路を様々に調節できる広範な治療剤、および癌治療のための新規な代替法を研究および開発する機会を提供した。

40

【0186】

<第三実験シリーズについての参考文献>

【参考文献3】

【0187】

Armulik, A., Abramsson, A., and Betsholtz, C. (2005).
Endothelial/pericyte interactions. *Circulation Research* 97,
512-523.

Benedito, R., Roca, C., Sørensen, I., Adams, S., Gossler, A., Fruttiger,
M., and Adams, R.H. (2009). The notch ligands Dll4 and Jagged1 have
opposing effects on angiogenesis. *Cell* 137, 1124-1135. 10

Bergers, G., and Hanahan, D. (2008). Modes of resistance to
anti-angiogenic therapy. *Nat Rev Cancer* 8, 592-603.

Cordle, J., Johnson, S., Tay, J.Z.Y., Roversi, P., Wilkin, M.B., de
Madrid, B.H., Shimizu, H., Jensen, S., Whiteman, P., Jin, B., et
al. (2008). A conserved face of the Jagged/Serrate DSL domain is
involved in Notch trans-activation and cis-inhibition. *Nat Struct
Mol Biol* 15, 849-857. 20

Domenga, V., Fardoux, P., Lacombe, P., Monet, M., Maciazek, J., Krebs,

(つづく)

30

40

(つづき)

- L.T., Klonjowski, B., Berrou, E., Mericskay, M., Li, Z., et al. (2004). Notch3 is required for arterial identity and maturation of vascular smooth muscle cells. *Genes & Development* 18, 2730-2735.
- Ebos, J.M.L., Lee, C.R., Cruz-Munoz, W., Bjarnason, G.A., Christensen, J.G., and Kerbel, R.S. (2009). Accelerated metastasis after short-term treatment with a potent inhibitor of tumor angiogenesis. *Cancer Cell* 15, 232-239. 10
- Franco, M., Roswall, P., Cortez, E., Hanahan, D., and Pietras, K. (2011). Pericytes promote endothelial cell survival through induction of autocrine VEGF-A signaling and Bcl-w expression. *Blood* 118, 2906-2917.
- Funahashi, Y., Hernandez, S.L., Das, I., Ahn, A., Huang, J., Vorontchikhina, M., Sharma, A., Kanamaru, E., Borisenko, V., Desilva, D.M., et al. (2008). A notch1 ectodomain construct inhibits endothelial notch signaling, tumor growth, and angiogenesis. *Cancer Res* 68, 4727-4735. 20
- Funahashi, Y., Shawber, C.J., Sharma, A., Kanamaru, E., Choi, Y.K., and Kitajewski, J. (2011). Notch modulates VEGF action in endothelial cells by inducing Matrix Metalloprotease activity. *Vascular Cell* 3, 2. 30
- Geudens, I., Herpers, R., Hermans, K., Segura, I., Ruiz de Almodovar, C., Bussmann, J., de Smet, F., Vandeveld, W., Hogan, B.M., Siekmann, A., et al. (2010). Role of delta-like-4/Notch in the formation and wiring of the lymphatic network in zebrafish. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology* 30, 1695-1702.
- Glittenberg, M., Pitsouli, C., Garvey, C., Delidakis, C., and Bray, S. (2006). Role of conserved intracellular motifs in Serrate signalling, cis-inhibition and endocytosis. *The EMBO Journal* 25, 4697-4706. 40
- Hambleton, S., Valeyev, N.V., Muranyi, A., Knott, V., Werner, J.M., McMichael, A.J., Handford, P.A., and Downing, A.K. (2004). Structural and functional properties of the human notch-1 ligand binding region. *Structure* 12, 2173-2183.

(つづく)

(つづき)

- Hellström, M., Phng, L.-K., Hofmann, J.J., Wallgard, E., Coultas, L., Lindblom, P., Alva, J., Nilsson, A.-K., Karlsson, L., Gaiano, N., et al. (2007). Dll4 signalling through Notch1 regulates formation of tip cells during angiogenesis. *Nature* 445, 776-780.
- Henderson, S.T., Gao, D., Christensen, S., and Kimble, J. (1997). Functional domains of LAG-2, a putative signaling ligand for LIN-12 and GLP-1 receptors in *Caenorhabditis elegans*. *Mol. Biol. Cell* 8, 1751-1762. 10
- High, F.A., Lu, M.M., Pear, W.S., Loomes, K.M., Kaestner, K.H., and Epstein, J.A. (2008). Endothelial expression of the Notch ligand Jagged1 is required for vascular smooth muscle development. *Proc Natl Acad Sci USA* 105, 1955-1959.
- Hoey, T., Yen, W.-C., Axelrod, F., Basi, J., Donigian, L., Dylla, S., Fitch-Bruhns, M., Lazetic, S., Park, I.-K., Sato, A., et al. (2009). DLL4 blockade inhibits tumor growth and reduces tumor-initiating cell frequency. *Cell Stem Cell* 5, 168-177. 20
- Kalén, M., Heikura, T., Karvinen, H., Nitzsche, A., Weber, H., Esser, N., Ylä-Herttua, S., and Hellström, M. (2011). Gamma-Secretase Inhibitor Treatment Promotes VEGF-A-Driven Blood Vessel Growth and Vascular Leakage but Disrupts Neovascular Perfusion. *PLoS ONE* 6, e18709. 30
- Kopan, R., and Ilagan, M.X.G. (2009). The canonical Notch signaling pathway: unfolding the activation mechanism. *Cell* 137, 216-233.
- Li, J.-L., Sainson, R.C.A., Shi, W., Leek, R., Harrington, L.S., Preusser, M., Biswas, S., Turley, H., Heikamp, E., Hainfellner, J.A., et al. (2007). Delta-like 4 Notch ligand regulates tumor angiogenesis, improves tumor vascular function, and promotes tumor growth in vivo. *Cancer Res* 67, 11244-11253. 40
- Liu, Z.-J., Shirakawa, T., Li, Y., Soma, A., Oka, M., Dotto, G.P., Fairman, R.M., Velazquez, O.C., and Herlyn, M. (2003). Regulation of Notch1 and Dll4 by vascular endothelial growth factor in arterial endothelial cells: implications for modulating arteriogenesis and angiogenesis. *Mol Cell Biol* 23, 14-25.

(つづく)

(つづき)

Lobov, I.B., Renard, R.A., Papadopoulos, N., Gale, N.W., Thurston, G., Yancopoulos, G.D., and Wiegand, S.J. (2007). Delta-like ligand 4 (Dll4) is induced by VEGF as a negative regulator of angiogenic sprouting. *Proc Natl Acad Sci USA* 104, 3219-3224.

Nakagawa, O., McFadden, D.G., Nakagawa, M., Yanagisawa, H., Hu, T., Srivastava, D., and Olson, E.N. (2000). Members of the HRT family of basic helix-loop-helix proteins act as transcriptional repressors downstream of Notch signaling. *Proc Natl Acad Sci USA* 97, 13655-13660.

10

Nakatsu, M.N., and Hughes, C.C.W. (2008). An optimized three-dimensional in vitro model for the analysis of angiogenesis. *Meth Enzymol* 443, 65-82.

Noguera-Troise, I., Daly, C., Papadopoulos, N.J., Coetzee, S., Boland, P., Gale, N.W., Lin, H.C., Yancopoulos, G.D., and Thurston, G. (2006). Blockade of Dll4 inhibits tumour growth by promoting non-productive angiogenesis. *Nature* 444, 1032-1037.

20

Pàez-Ribes, M., Allen, E., Hudock, J., Takeda, T., Okuyama, H., Viñals, F., Inoue, M., Bergers, G., Hanahan, D., and Casanovas, O. (2009). Antiangiogenic therapy elicits malignant progression of tumors to increased local invasion and distant metastasis. *Cancer Cell* 15, 220-231.

30

Pei, Z., and Baker, N.E. (2008). Competition between Delta and the Ahrp1 domain of Notch. *BMC Dev Biol* 8, 4.

Potente, M., Gerhardt, H., and Carmeliet, P. (2011). Basic and therapeutic aspects of angiogenesis. *Cell* 146, 873-887.

Rand, M.D., Grimm, L.M., Artavanis-Tsakonas, S., Patriub, V., Blacklow, S.C., Sklar, J., and Aster, J.C. (2000). Calcium depletion dissociates and activates heterodimeric notch receptors. *Mol Cell Biol* 20, 1825-1835.

40

Ranganathan, P., Weaver, K.L., and Capobianco, A.J. (2011). Notch signalling in solid tumours: a little bit of everything but not all the time. *Nat Rev Cancer* 11, 338-351.

(つづく)

(つづき)

- Rebay, I., Fleming, R., Fehon, R., Cherbas, L., Cherbas, P., and Artavanis-Tsakonas, S. (1991). Specific EGF repeats of Notch mediate interactions with Delta and Serrate: implications for Notch as a multifunctional receptor. *Cell* 67, 687-699.
- Ridgway, J., Zhang, G., Wu, Y., Stawicki, S., Liang, W.-C., Chantbery, Y., Kowalski, J., Watts, R.J., Callahan, C., Kasman, I., et al. (2006). Inhibition of Dll4 signalling inhibits tumour growth by deregulating angiogenesis. *Nature* 444, 1083-1087. 10
- Shawber, C.J., Funahashi, Y., Francisco, E., Vorontchikhina, M., Kitamura, Y., Stowell, S.A., Borisenko, V., Feirt, N., Podgrabinska, S., Shiraishi, K., et al. (2007). Notch alters VEGF responsiveness in human and murine endothelial cells by direct regulation of VEGFR-3 expression. *J Clin Invest* 117, 3369-3382. 20
- Shibuya, M. (2006). Vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1/Flt-1): a dual regulator for angiogenesis. *Angiogenesis* 9, 225-230; discussion231.
- Shimizu, K., Chiba, S., Kumano, K., Hosoya, N., Takahashi, T., Kanda, Y., Hamada, Y., Yazaki, Y., and Hirai, H. (1999). Mouse jagged1 physically interacts with notch2 and other notch receptors. Assessment by quantitative methods. *J Biol Chem* 274, 32961-32969. 30
- Suchting, S., Freitas, C., Le Noble, F., Benedito, R., Bréant, C., Duarte, A., and Eichmann, A. (2007). The Notch ligand Delta-like 4 negatively regulates endothelial tip cell formation and vessel branching. *Proc Natl Acad Sci USA* 104, 3225-3230.
- Takebe, N., Harris, P.J., Warren, R.Q., and Ivy, S.P. (2010). Targeting cancer stem cells by inhibiting Wnt, Notch, and Hedgehog pathways. *Nature Reviews Clinical Oncology*.
- Tammela, T., Zarkada, G., Nurmi, H., Jakobsson, L., Heinolainen, K., Tvorogov, D., Zheng, W., Franco, C.A., Murtomäki, A., Aranda, E., et al. (2011). VEGFR-3 controls tip to stalk conversion at vessel fusion sites by reinforcing Notch signalling. *Nature*. 40
- Taylor, K.L., Henderson, A.M., and Hughes, C.C.W. (2002). Notch

(つづく)

(つづき)

activation during endothelial cell network formation in vitro targets the basic HLH transcription factor HESR-1 and downregulates VEGFR-2/KDR expression. *Microvascular Research* 64, 372-383.

Thurston, G., and Kitajewski, J. (2008). VEGF and Delta-Notch: interacting signalling pathways in tumour angiogenesis. *British Journal of Cancer* 99, 1204-1209. 10

van Es, J.H., van Gijn, M.E., Riccio, O., van den Born, M., Vooijs, M., Begthel, H., Cozijnsen, M., Robine, S., Winton, D.J., Radtke, F., et al. (2005). Notch/gamma-secretase inhibition turns proliferative cells in intestinal crypts and adenomas into goblet cells. *Nature* 435, 959-963.

Wu, Y., Cain-Hom, C., Choy, L., Hagenbeek, T.J., de Leon, G.P., Chen, Y., Finkle, D., Venook, R., Wu, X., Ridgway, J., et al. (2010). Therapeutic antibody targeting of individual Notch receptors. *Nature* 464, 1052-1057. 20

Zeng, Q., Li, S., Chepeha, D., Giordano, T., Li, J., Zhang, H., Polverini, P., Nor, J., Kitajewski, J., and Wang, C. (2005). Crosstalk between tumor and endothelial cells promotes tumor angiogenesis by MAPK activation of Notch signaling. *Cancer Cell* 8, 13-23. 30

【 図 1 a 】

図 1a

Fig. 1a

【 図 1 b 】

図 1b

Fig. 1b

【 図 2 a 】

図 2a

Fig. 2a

【 図 2 b 】

図 2b

Fig. 2b

【 図 3 a 】

図 3a

Fig. 3a

【 図 3 b 】

図 3b

Fig. 3b

【 図 4 a 】

図 4a

Fig. 4a

【 図 3 c 】

図 3c

Fig. 3c

【 図 4 b 】

図 4b

Fig. 4b

【 図 7 c 】

図 7c Fig. 7c

【 図 8 b 】

図 8b Fig. 8b

【 図 8 a 】

図 8a Fig. 8a

【 図 8 c 】

図 8c Fig. 8c

【 図 8 d 】

図 8d

【 図 9 a 】

図 9a Fig. 9a

【 図 9 b 】

図 9b Fig. 9b

【 図 1 0 a 】

図 10a

Fig. 10a

【 図 1 0 b 】

図 10b

Fig. 10b

【 図 1 1 a 】

図 11a

Fig. 11a

【 図 1 1 b 】

図 11b

Fig. 11b

【 図 1 1 d 】

図 11d

Fig. 11d

【 図 1 1 c 】

図 11c

Fig. 11c

【 図 1 1 e 】

図 11e

Fig. 11e

【図 1 2 a】

【図 1 2 b】

【図 1 2 c】

【図 1 4】

FIGURE 14

【図 1 3 a】

【図 1 3 b】

【図 1 5 a】

【図 1 5 b】

【 図 15 c 】

【 図 15 d 】

【 図 16 a 】

【 図 16 b 】

【 図 16 c 】

【 図 17 b 】

【 図 17 a 】

【 図 17 c 】

【図 18 a】

図 18a

Fig. 18a

【図 18 c】

図 18c

Fig. 18c

【図 18 b】

図 18b

Fig. 18b

【図 19 a】

図 19a

Fig. 19a

【図 19 b】

図 19b

Fig. 19b

【図 20 b】

図 20b

Fig. 20b

【図 20 a】

図 20a

Fig. 20a

【図 21 a】

図 21a

Fig. 21a

【 図 2 1 b 】

図 21b

Fig. 21b

【 図 2 2 a 】

図 22a

Fig. 22a

【 図 2 2 b 】

図 22b

Fig. 22b

【 図 2 3 a 】

図 23a

Fig. 23a

【 図 2 3 c 】

図 23c

Fig. 23c

【 図 2 3 b 】

図 23b

Fig. 23b

【 図 2 4 a 】

図 24a

Fig. 24a

【 図 2 4 b 】

図 24b

Fig. 24b

【 図 2 4 c 】

図 24c

Fig. 24c

【 図 2 5 a 】

図 25a

Fig. 25a

【 図 2 5 b 】

図 25b

Fig. 25b

【 図 2 6 a 】

図 26a

Fig. 26a

【 図 2 6 c 】

図 26c

Fig. 26c

【 図 2 6 b 】

図 26b

Fig. 26b

【 図 2 7 a 】

図 27a

Fig. 27 a

【 図 27 b 】

図 27b

Fig. 27 b

【 図 27 c 】

図 27c

Fig. 27 c

【 図 28 - 2 】

図 28-2

Figure 28 続き

781 EGFSGPNCQT NINECASNPC LMQGTICDDV AGYKCNCLLP YTGATCEVVL APCAPSFCRN
23

841 GGECRQSEDEY ESFSCVCPFG WQGTCEVDI NECVLSPCRH GASCQNTHGG YRCHCQAGYS
24 25

901 GRNCEVDIDD CRPNPCNNGG SCTDGINATF CDCLPGFRGT FCEEDINECA SDPCRNAGNC
26

961 TDCVDSYTCT CPAGFSGIHC EMNTPDCTES SCFNGGTGVD GINSFTCLCP PGFTGSYCOH
27 28

1021 DVNECDSDPC LHGGTCQDGC GSYRCTCPQG YTGPNQNLV HWCDSSPCKN GGRKQWHTQ
29

1081 YRCECPGSGWT GLYCDVPSVS CEVAQRQGV DVARLCQHGG LCVDAGNTHH CRCQAGYGS
30 31

1141 YCEDLVDECS PSPCQNGATC TDYLGYSCK CVAGYHGVCN SEEIDELSH PCQNGGTCLD
32

1201 LPTYKCSGCP RGTQGVHCEI NVDDCNPPVD PVSRSRPFKN NGTCVDQVGG YSCTCPFGV
33 34

1261 GERCEGDVNE CLSNPCDARG TQNCVQRVND FHCECRAGHT GRCESVING CKGKPCKNGG
35

1321 TCASVANTAR GFICKPAGF EGATCENDAR TCGSLRCLNG GTCISGSRSP TCLCLGPFPTG
36

1381 PECQFPASSP CLGNPCYNO GTCEPTSESP FYRCLCPAKF NGLLCHILDY SPGGAGRDI
LNR 1 2

1441 PPPLIEEACE LPECQEDAGN KVCSLQCNH ACGWDDGDCS LNFNDPWKNC TQSLQCKWYF
3

1501 SDGHCDSDCN SAGCLFDGFD CQRAEQCNF LYDQYCKDF SDGHCDQGCN SARCEWDLG
1

1561 CAEHVPERLA AGTLVVVVLM PPEQLRNSSF HFLRELSRVL HTNVVFKRDA HQQQMIPFY
S1

【 図 28 - 1 】

図 28

Figure 28:

ヒト・ノッチ1タンパク質配列 (SEQ ID NO:1)

SP EGF-様反復1

1 MPPLLAPLLC LALLPALAAR GPRCSQPGET CLNGGKCEAA NGTEACVCGG AFVGPQCQDP
2 3

61 NPCLSTPCRN AGTCHVVDRR GVADYACSCA LGFSGPLCLT PLDNACTNPN CRNGGTCDLL
4

121 TLTEYKRCRCP PGWSGKSCQQ ADPCASNPCA NGGQCLFFEA SYICHCPPSP HGPTCRQDVN
5 6

181 ECGQKPGLCR HGGTCHNEVG SYRVCVRATH TGPNCERPVP EGSFSPCQNG GTCRPTGDVT
7 8

241 HECACLPGFT GQCNCEENIDD CPGNNCKNGG ACVDGVNTYN CRCPEWETGQ YCTEDVDECO
9

301 LMPNACQNGG TCHNTHGGYN CVCVNGWTE DCSENIDDC A SAACFHGATC HDRVASFYCE
10 11

361 CPHGRTGLLC HLNDAISNP CNEGNSCDTN PVNGKAICTC PSGYTPACS QDVDECSLGA
12

421 NPEHAGKCI NTLGSFECQC LQGYTGPRCE IDVNECVSNP CQNDATCLDQ IGFQICIMP
13 14

481 GYEGVHCEVN TDECASSPCL HNGRCLDKIN EFQCECPTGF TGHLCQYDVD ECASCTCKNG
15

541 AKCLDGPNTY TCVCTEGYTG THCEVDIDEC DDPDCHYGSC KDGVAFTTCL CRPGYTGHH
16 17

601 ETNINECSSQ PCRHGGTCQD RDNAYLCFCL KGTGPNCEI NLDDCASSPC DSGTCLDKID
18 19

661 GYECACEFGY TGSMTNINID ECAGNPFCHNG GTCEEDGNGF TCRCEGYHD FTCLSEVNEC
20

721 NSNPCVHGAC RDSLNGYKCD CDPGWSGTNC DINNNECESN PCVNGGTCKD MTSGLYVCTCR
21 22

【 図 28 - 3 】

図 28-3

Figure 28 続き

1621 GREBELAKHP IKRAAEGWAA PDALLGQVKA SLIPGGSEGG RRRRELDPMD VRGSIVYLEI
S2 TM

1681 DNRQCVQASS CQFQSATDVA AFLGALASLG SLNIPYKIEA VQSETVPEPPP PAQLHFMVVA
S3

1741 AAAFVLLFFV CGVLLSRKR RRQHGQLWFP EGFVSEASK KKRREPLGED SVGLKPLKNA

1801 SDGALMDDNQ NEWGDEDLET KKRFRPEEPVV LPDLDQTDH RQWTQQHLDA ADLRMSAMAP

1861 TTPQGEVDAD CMDVNVGRPD GFTPLMIASC SGGLETGNS EEEEDAPAVI SDFIYQASL
ANK反復1

1921 HNQTDRGTGET ALHLAARYSR SDAAKRLLA SADANIQDNM GRTFLHAASV ADAQGVFQIL

1981 IRNRATDLDA RMHDGTTFLI LAARLAVEGM LEDLINSHAD VNAVVDLGRS ALHWAAAVNN

2041 VDAAVVLLKN GANKDMQNNR EETPLFLAAR EGSYETAKVL LDHFANRDTI DHMDRLPRDI
1

2101 AQERMMHDIIV RLLDEYNLVR SPQLHGAPLG GTPTLSPLPC SPNGYLSLK PGVQGGKVRK

2161 PSSKGLACGS KEAKDLKARR KKSQDGGKCL LDSSGMLSPV DSLESFHGYL SDVASPPLLP

2221 SPFQSPSPVFN LNHLPGMPDT HLGHLNLVA AKPEMAALGG GRLAFETGP PRLSHLPVAS

2281 GTSTVLGSSS GGALNFTVGG STSLNGQCEW LSRQLQSGMVF NQYNPLRGSV APGLSTQAP

2341 SLQHGVMGVL HSSLAASALS QMSYQGLFS TRLATQPHLV QTQQVQPNL QMQQNLQPA

2401 NIQQQOSLQF PPPPPPHLGG VSSAASGHLG RSFLSGEPSQ ADVQPLGPSS LAVHTILPQE
PEST

【 図 28 - 4 】

図 28-4

Figure 28 続き

2461 SPALPTSLPS SLVFPVTAQA FLTPFSQHSY SSPVDNTPSH QLQVPEHPFL TFSFESPDQW

2521 SSSSPHSNVS DWSEGVSSPP TSMQSIARI PEAFK

【 図 29 - 1 】

図 29

Figure 29:

ノッチ1デコイ10-24(2502)

ヒト・ノッチ1シグナルペプチド:1-69

EGF-様反復10-24:70-1788

ヒトFc:1789-2502

DNA配列 (SEQ ID No:2)

1 ATGCCGCCGC TCCTGGCGCC CCTGCTCTGC CTGGCGCTGC TGCCCGCGCT GCCCGCACGA
61 GGCCCGCGAT GCATCAGCAA CCCTGTAAAC GAGGGCTCCA ACTGCGACAC CAACCTGTGC
121 AATGGCAAGG CCATCTGCAC CTGCCCTCG GGTACACGG GCCCGGCTG CAGCCAGGAC
181 GTGGATGAGT GCTCGTGGG TGCCAAACCC TGCGAGCATG CGGGCAAGTG CATCAACAGC
241 CTGGGCTCCT TCGAGTGCCA GTGTCTGCAG GGCTACACGG GCCCGCGATG CGAGATCGAC
301 GTCAACGAGT GGTCTCGAA CCCGTGCCAG AACGACGCCA CCTGCCGGA CGAGATTGGG
361 GAGTCCAGT GCATCTGCAT GCCCGGCTAC GAGGGTGTGC ACTGCGAGT CAACACAGAC
421 GAGTGTCCA GCAGCCCTG CCTGCACAAT GGCCGCTGCC TGGACAAGAT CAATGATTC
481 CAGTGCAGT GCCCCACGG CTTCACTGG CATCTGTGC AGTACGATG GGACGAGTGT
541 GCCAGCACCC CTGCAAGAA TGGTGCCAA TGCCGACG GACCCAACAC TTACACCTGT
601 GTGTGCACGG AAGGTACAC GGGGACGAC TCGAGGTGG ACATCGATGA GTGGACCCC
661 GACCCCTGCC ACTACGGCTC CTGCAAGGAC GCGCTGCCA CCTTCACCTG CCTCTGCCG
721 CCAGGCTACA CGGGCCACCA CTGGGAGACC AACATCAACG AGTGTCCAG CCAGCCCTGC
781 CGCCACGGGG GCACCTGCA GACCCGCGAC AAGCCCTACC TCTGCTTCTG CCTGAAGGGG
841 ACCACAGGAC CCAACTGCGA GATCAACCTG GATGACTGTG CCAGCAGCCC CTGGACTCG
901 GGCACCTGTC TGGACAAGT CGATGGTAC GAGTGTGCT GTGACCGGG CTACACAGGG
961 AGCATGTGTA ACATCAACAT CGATGAGTGT GCGGCAACC CCTGCACAA CGGGGGCAC
1021 TCGGAGGAGC GCATCAATG CTTCACTGC CGCTGCCCG AGGGTACCA CGACCCAC
1081 TGCCGTCTG AGTCAATGA GTGCACAGC AACCCCTGG TCCACGGGG CTGCCGGGAC
1141 AGCCTCAACG GGTACAAGT CGACTGTGAC CCTGGGTGA GTGGGACCAA CTGTGACATC
1201 AACACAATG AGTGTGAAT CAACCTTGT GTCAACGGC GCACCTGCAA AGACATGACC
1261 AGTGGCTAG TGTGACCTG CCGGGAGGG TTCAGCGGT CCAACTGCAA GACCAACATC
1321 AACGAGTGTG CTTCAACCC ATGCTGAC CAGGGCAGT GTATTGACGA CGTTCGGGG
1381 TCAAGTGA ACTGCTGCT GCCTACACA GGTGCCAGT GTGAGTGTG GTGGCCCC

【 図 29 - 2 】

図 29-2

Figure 29 続き

1441 TGTGCCCCCA GCCCTGACG AAACGGGGG GAGTGCAGC AATCCGAGGA CTATGAGAGC
1501 TTTCTCTGTG TCTGCCAC GGGCTGGCAA GGGCAGACCT GTGAGGTGCA CATCAACGAG
1561 TCGTPTCTGA GCCCTGCGC GCACGGCGCA TCCTCCAGA ACACCCACGG CGGCTACCGC
1621 TGCCACTGCC AGGCCGGTA CAGTGGCGC AACTGCGAGA CCGACATCGA CGACTGCCGG
1681 CCCAACCCGT GTCACAACGG GGGCTCTGC ACAGACGGCA TCAACACGGC CTTCTGCGAC
1741 TGCCCTCCCG GCTTCCGGG CACTTCTGT GAGGAGGACA TCAACGAGGA TCTGGGCGG
1801 GGGAGGCCA AATCTTGTGA CAAACTGAC ACATGCCAC CGTGCCAGC ACCTGAATC
1861 CTGGGGGAC CGTCAGCTT CTTCTTCCC CCAAACCA AGGACACCT CATGATCTC
1921 CGGACCCCTG AGGTACATG CTTGGTGGT GACGTGAGC ACGAAGACC TGAGTCAAG
1981 TTCAACTGGT ACGTGGAGG CTTGGAGGT CATAATGCC AGACAAGCC GCGGAGGAG
2041 CAGTACACA GCACGTACC TGTGTCAGC GTCTCACG TCTGACCA GSACTGGCTG
2101 AATGGCAAGG AGTACAAGT CAGGTCTCC AACAAAGCC TCCCAGCCC CATCGAGAAA
2161 ACCATCTCCA AAGCCAAAG GCAGCCCGA GAACACAGG TGTACACCT GCCCCATCC
2221 CGGGAGGAGA TGACCAAGAA CCAAGTCCG CTGACCTGCC TGGTCAAAG CTCIATCCC
2281 AGCGACATCG CCSTGGAGT GGAGAGCAAT GGGCAGCCG AGACAACCTA CAAGACCAG
2341 CCTCCGTCG TGGACTCGA CGGCTCCTT TCTCTTACA GCAAGCTGAC CGTGGACAAG
2401 AGCAGTGGC AGCAGGGAA CGTCTTCTA TGCTCCCTGA TGCATGAGG CTTGCACAC
2461 CACTACACGC AGAAGAGCCT CTCCTGTCT CCGGTAAT GA

タンパク質配列 (SEQ ID No:3)

1 MPPLLAFLLC LALLPALAAR GPRCISNFCN EGSNCDTNPV NGKAICTCPS GYTGPACSQD
61 VDECSLGANP CEHAGKINT LGSFECQCLQ GYTGPCEID VNECVSNPCQ NDATCLDQIG
121 EFQCICMPFY EGVHCEVNTD ECASSPLHN GRCLDKINEF QCCEPTGFTG HLCQYDVDEC
181 ASTPCRNGAK CLDGPNTYTC VCTEGYTGTH CEVDIDECDP DPCHYGSCKD GVATFTCLCR
241 PSYTGHCET NINECSSQPC RHGGTQDRD NAYLFCFLG TTGNCEINL BDCASSPCDS
301 GTCLDKIDGY ECACEPGYTG SMCNINIDEC AGNPNHNGT CEDGINGFTC RCPEGYHDPT
361 CLSEVNECNS NPCVHGACRD SLNGYKDCD PGWSGTNCDI NNECESNPC VNGGTCKEHT
421 SGYVCTCREG FSGPNCQTN NECASMPCLN QGTCIBDVAG YRCNLLPYT GATCEVVLAF
481 CAPSPCRNGG ECRQSEDEYS FSCVCTPGWQ GQTCVDINE CVLSPCRHGA SCQNHGGYR

【 図 29 - 3 】

図 29-3

Figure 29 続き

541 CHCQAGYSR NCETDIDDR PNPCHNGSSC TDGINTAFCD CLPGRFRGTF EEDINEDLGP
601 GERKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGFSVFLP PKPKDTLIMS RPEVTCVWV DVSHEDPEVK
661 FNWYVDGVEV HNARTKPRE QYNSTYRVVS VLTVLHQDLV NGKEYKCKVS NKALPAPIEK
721 TISKAKQPR EPQVYTLFPS REEMTKNQS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT
781 PVLDSGSP FLYSKLTVDK SRWQQNVFS CSVMHEALHN HYTKSLSLV PKG*

【 図 3 0 - 1 】

図 30

Figure 30:

ノッチ1デコイ10-36(3957)

ヒト・ノッチ1シグナルペプチド:1-69

EGF-様反復10-36:70-3243

ヒトFc:3244-3957

DNA配列 (SEQ ID NO:4)

1 ATGCCGCGCC TCCTGGCGCC CCTGCTCTGC CTGGCGCTGC TGCCCGCGCT CGCCGCACGA
61 GCGCCGCGAT GCATCAGCAA CCCCTGTAA CAGGGCTCCA ACTGGGACAC CAACCTGTCT
121 AATGGCAAGG CCATCTGCAC CTGCCCCCTGC GGGTACACGG GCCCGCCCTG CAGCCAGGAC
181 GTGGATGAGT GCTCGTGGG TGCCAAACCC TGCGAGCATG CCGGCAAGTG CATCAACACG
241 CTGGGCTCCT TCGAGTGCCT GTGTCTGCAG GGCTACACGG GCCCCCGATG CGAGATCGAC
301 GTCAACGAGT GCGTCTCGAA CCGGTGCCAG AACGACGCCA CCTGCGCTGA CGAGATTGGG
361 GAGTTCAGT GCATCTGCAT GCCCGGCTAC GAGGGTGTGC ACTGCGAGGT CAACACAGAC
421 GAGTGTGCCA GCAGCCCGCT CCTGCACAA TGCCGCTGCC TGGACAAGAT CAATGAGTTC
481 CAGTGCAGT GCCCCACGGG CTTCACCTGG CATCTGTGCC AGTACAGATG GGACGAGTGT
541 GCCAGCACC CCTGCAAGAA TGGTCCAAAG TGCCCTGGACG GACCCACAC TTACACCTGT
601 GTGTGCACGG AAGGTACAC GGGGACGCAC TGGGAGGTGG ACATCGATGA GTGGGACCCC
661 GACCCCTGCC ACTACGGCTC CTGCAAGGAC GCGTGCACA CCTTCACCTG CCTCTGCCGC
721 CCAGGCTACA GCGGCCACCA CTGGGAGACC AACATCAACG AGTGTCCAG CCAGCCCTTCG
781 CGCCACGGGG GCACCTGCCA GGACCCGAC AACGCCATCC TCTGCTCTG CCTGAAGGGG
841 ACCACAGGAC CCAACTGCGA GATCAACCTG GATGACTGTG CCAGCAGCCC CTGGCACTCG
901 GGCACCTGTC TGGACAAGAT CGATGGCTAC GAGTGTGCTT GTGAGCCGGG CTACACAGGG
961 AGCATGTGTA ACATCAADAT CGATGGTGT CCGGGCAACC CCTGCCACAA CGGGGGCAC
1021 TGGCAGGAGC GCATCAATGG CTTCACCTGC CGTGCCTCCG AGGGCTACCA CGACCCACAC
1081 TGCCGTCTCG AGGTCATGTA GTGCAACAGC AACCCCTGCG TCCACGGGG CTGCCGGGAC
1141 AGCCTCAACG GGTCAAGTGT CCACTGTGAC CCTGGTGGG GTGGGACCAA CTGTGACATC
1201 AACCAACAATG AGTGTGAATG CAACCTTGTG GTCAAGGGG GCACCTGCAA AGACATGACC
1261 AGTGGCTACG TGTCCACTCG CCGGGAGGGG TTCAGGGTCC CCAACTGCAA GACCAACATC
1321 AACGAGTGTG CTTCAACCC ATGTCTGAAC CAGGGCAGGT GTATTGACGA CGTTGCCGGG
1381 TACAAGTGCA ACTGCTGCTT GCCTTACACA GGTGCCAGT GTGAGTGGT GCTGGCCCCG

【 図 3 0 - 3 】

図 30-3

Figure 30 続き

3121 GCGGGCAACC CCTGTACAA CAGGGGACC TGTGAGCCCA CATCCGAGAG CCCCTTCTAC
3181 CGTGTGCTGT GCCCGCCAA ATTCACAGGG CTCTTGTGCC ACATCCTGGA CTCACAGTTC
3241 GGAGATCTGG GCCCGGGCA GCCCAATCT TGTGACAAA CTCACATGT CCCACCGTGC
3301 CCAGCACCTG AACTCCTGGG GGGACGCTCA GTCTTCTCTT TCCCCCAA ACCCAAGGAC
3361 ACCCTCATGA TCTCCCGGAC CCTGAGGTG ACATGCGTGG TGGTGGAGT GAGCCACGAA
3421 GACCTGAGG TCAAGTCAA CTGGTACGTG GACGGCGTGG AGGTGCATAA TGCCAAAGCA
3481 AAGCCGCGGG AGGAGCAGTA CAACAGCAGC TACCCTGTGG TCAGCGCTCT CACCGTCTG
3541 CACCAGGACT GGCTGAATGG CAAGGAGTAC AAGTCAAGG TCTCCAACA AGCCCTCCCA
3601 GCCCCCATCG AGAAAACCAT CTCCAAGCC AAAGGGCAGC CCGGAAACC ACAGGTGTAC
3661 ACCCTGCCCC CATCCCGGGA GGAGATGAC AAGAACCAGG TCAGCCTGAC CTGCTTGGTC
3721 AAAGGCTTCT ATCCACGCGA CATGCCCGTG GAGTGGGAGA GCAATGGGGA GCCGGAGAAC
3781 AACTACAAGA CCACGCTCC CBTGCTGGAC TCCGACGGCT CCTTCTTCT CTACAGCAAG
3841 CTCACCGTGG ACAAGAGCAG GTGGCAGCAG GGAACGTCT TCTCATGCTC CGTGATGCAT
3901 GAGGCTCTGC ACAACCACTA CACGCAGAAG AGCCTCTCCC TGTCTCCGG TAAATGA

タンパク質配列 (SEQ ID NO:5)

1 MPPLLAFLLC LALLPALAAR GPRCISNPCN EGSNCDTNFV NGKAICTCPS GYTGPAACSQD
61 VDECSLGNP CEHAGKCIINT LGSFECQCLQ GYTGFRCEID VNECVSNPCQ NDATCLDQIG
121 EFQCICMPGY EGVHCEVNTD ECASSPCLHN GRCLDKINEF QCECPTGFTG HLCQYDVDEC
181 ASTPCKNGAK CLDGPNTYTC VCTEGYTGTH CEVDIDEDCP DPCHYGSKD GVATFTCLCR
241 PGYTGHHCET NINECSQPC RHGGTCDQDRD NAYLCFCLKG TTPGNCBILN DDCASSPCDS
301 GTCLDKIDGY ECACEPGYTG SMCNINIDEC AGNPCHNGGT CEDGINGFTC RCPBEGYHDPT
361 CLSEVNECNS NCVHAGACRD SLNGYKCDGD PGWSGTNCDI NNNECESNPC VNGGTCKDMT
421 SGYVCTCREG FSGPNCQINI NECASNPCLN QGTCIDVAV YKCNLLPYT GATCEVVLAP
481 CAPSPCRNGG ECRQSEDIYES FSCVCPWTGQG QGTCEVDINE CVLSPCRHGA SQNTHGGYR
541 CHCQAGYSGR NCETDIDDCR FNPCHNGSSC TDGINFAFCD CLPGFRGTFC EEDINECASD
601 PCRNANCTD CVDSYTCYCP AGFSGHCEN NTPDCTESSC FNGGTCVDGI NSFTCLCFPG

【 図 3 0 - 2 】

図 30-2

Figure 30 続き

1441 TGTGCCCCCA GCCCTGCAG AAACGGCGGG GAGTGCAGG AATCCGAGGA CTATGAGAGC
1501 TTCTCCTGTG TCTGCCACAC GGGCTGGCAA GGGCAGACCT GTGAGGTGCA CATCAACGAG
1561 TCGCTTCTGA GCCCGTGGG GCACGGCGCA TCCTGCCAGA ACACCCACGG CGGTACCGC
1621 TGCCACTGCC AGGCCGGCTA CAGTGGCGGC AACTGCGAGA CGACATCGA CGACTGCCGG
1681 CCCAACCCGT GTCACACGG GGGCTCCTGC ACAGAGCGCA TCAACACGGC CTTCGCGAC
1741 TGCTGCCCG GCTTCCGGGG CACTTCTGTG GAGGAGGACA TCAACGAGTG TGCCAGTGAC
1801 CCTTGCCGA ACGGGGCCAA CTGCAGGAC TGCCTGGACA GCTACACGTG CACCTGCCCC
1861 GCAGGCTCA GCGGGATCCA CTGTGAGAAC AACACGCGCT ACTGACAGA GAGTCTCTGC
1921 TTCACCGGT GCACTGGGT GGACGGGATC AACTGTTCA CTGCTGTGT TCCACCCGGG
1981 TTCACGGGA GCTACTGCA GCACAGTGC AATGATGCG ACTGACAGC CTGCTGTCAT
2041 GCGGGCACCT GTCAGGACGG CTGGGGTCC TACAGTGTGA CCTGCCCA GGGTACACT
2101 GGGCCCACT GCGAGAACCT TGTGACTGG TGTGACTCTT CGCCCTGCAA GAACGGCGGC
2161 AAATGCTGC AGACCCACAC CCAGTACCG TGCAGTGGC CCAGCGGCT GACCGGCTT
2221 TACTGCGAG TGCCAGCGT GTCTGTGAG GTGGCTGCG AGCGACAAGG TGTGACGTT
2281 GCCCGCTGT GCCAGATGG AGGGCTCTG GTGGAGCGG GCAACACGA CCACTGCCGC
2341 TGCCAGCGG GCTACACAG CAGCTACTGT GAGGACCTG TGGACAGTG CTCACCCAGC
2401 CCTGCCAGA ACGGGGCCAC CTGCAGGAC TACTGGGGG GCTACTCTG CAAGTGCCTG
2461 GCGGCTACC ACGGGGTCAA CTGCTGAGG GAGATCGAG AGTGCCTCT CACCCCTGC
2521 CAGAACGGG GCACCTGCTT GACCTCCCC AACACTTACA AGTGTCTCT CACCCGGGG
2581 ACTCAGGGT TGCAGTGTG GATCAACGTG GACGACTGCA ATCCCCCGT TGACCCCGTG
2641 TCCCGGAGC CCAAGTCTT TAACACCGC ACCTCGGTG ACCAGTGGG CGGCTACAGC
2701 TGCACTGCC CGCCGGGCTT CGTGGGTGAG CGCTGTGAG GGGATGTCAA TGACTGCTG
2761 TCCAATCCTT GCGACGCGG TGGCACCCAG AACTGCTGTC AGCCGCTCAA TGACTTCCAC
2821 TGCAGTGGC GTGCTGTGA CACCGGGGC CGCTCGAGT CCGTATCAA TGCTGCAAA
2881 GGCAAGCCTT GCAAGATGG GGGCAGCTG GCGTGGCTT CCAACACGC CGCGGGTTC
2941 ATCTGCAAGT GCCCTGCGG CTTGAGGGC GCCACGTGTG AGAATGACG TGTACTCTG
3001 GCGACCTGC GCTGCTCAA CGCGGCACA TGCATCTCG GCCCGCGAG CCCACCTGC
3061 CTGTGCTGG GCCCCTTAC GGGCCCGAA TCCAGTTC CCGCAGAG CCCCTGCTG

【 図 3 0 - 4 】

図 30-4

Figure 30 続き

661 FTGSYQDHD NECDSPCLH GGTQDGGG YRCTCPGYT GPNCQNLVHW CDSPPCKNGG
721 KCWQHTQYR CECPGWTGL YCDVPSVCE VAAQRFQVDV ARLCQHGLG VDAIGNHHR
781 CQAGYTGYSY EDLWDECSPS PQNGATCTD YLGGYSKCV AGYHGVNCE EIDECISHPC
841 QNGGTLDLN NYYKCSQPRG TQGVHCEINV DDCNPFVDFV SRSPCFNNG TCVDQVGGYS
901 CTCPPFVGE RCEGDVNECL SNPCDARGTQ NCVQRVNDHF CECRAGHTGR RCEVINGCK
961 GKPCKNNGTC AVASNTARG ICKCPAGFEG ATCENDARTC GSLRCLNGGT C1SGPRSPFC
1021 LCLGPFPTGE CQFPASSPCL GGNPCYNQGT CEPTSESPFY RCLCPARFNG LCHILDYF
1081 GDLGPEPKS CDKTHCTPPC PAPELLGGPS VFLFPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH
1141 DPEVKFNWY DGEVHNART KPREEQYNS YRVSVLTVL HQDNLNGEY KCVSNKALP
1201 APIERTISKA KGQPREPQVY TLPSPREMT KNQVSLTCLV RGFYPSDIAV EWESNGQPEN
1261 NYKTPPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQ GWVFSQVNH EALHNYHTQK SLSLSPGK*

【 図 3 1 - 1 】

図 31

Figure 31:

ノッチ1デコイ14-24(2034)

ヒト・ノッチ1シグナルペプチド:1-69

EGF-様反復14-24:70-1320

ヒトFc:1321-2034

DNA配列 (SEQ ID No:6)

1 ATGCCGCGCC TCGTGGCGCC CCTGCTCTGC CTGGCGCTGC TGCCCGCGCT CGCCGCACGA
61 GGCCCGCGAT GTGGCAGCAC CCGCTGCAAG AATGGTGCCA AGTGCTTGGG CGGACCCAAC
121 ACTTACACCT GTGTGTGCAC GGAAGGGTAC ACGGGGACGC ACTGCGAGGT GGACATCGAT
181 GAGTGGGACC CCGACCCCTG CCACTACGGC TCCTGCAAGG ACGGCGTCCG CACCTTCACC
241 TGCCCTTGCC GCCCAGGCTA CACGGGCCAC CACTGGGAGA CCAACATCAA CGAGTGTCTC
301 AGCCAGCCCT GCGCCACGG GGGCACCTGC CAGGACCGCG ACAACGCTTA CCTCTGCTTC
361 TGCCTGAAGG GGACCAACAG ACCCAACTGC GAGATCAACC TGGATGACTG TGCACGACGC
421 CCGTGGGACT CGGGCACCTG TCTGGACAAG ATCGATGGCT ACGAGTGTGC CTGTGAGCCG
481 GSCTACACAG GGAGCATGTG TAACATCAAC ATCGATGAGT GTGCGGGCAA CCGCTGCCAC
541 AACGGGGGCA CCGTGGAGGA CGGCATCAAT GGCTTCACCT GCCCTGCCCC CGAGGGCTAC
601 CACGACCCCA CCGTGCCTGC TGAGTCAAT GAGTGAACA GCAACCCCTG CGTCCACGGG
661 GCCTGCCGGG ACACCTCAA GGGGTACAG TCGACTGTG ACCCTGGGTG GAGTGGGACC
721 AACTGTGACA TCAACAACAA TGAGTGTGAA TCCAACCTTT GTGTCAACGG CGGCACCTGC
781 AARGACATGA CCACTGGCTA CGTGTGCACC TGCCGGGAGG GCTTCAGCGG TCCCAACTGC
841 CAGACCAACA TCAACGAGTG TCGTCCAAAC CCATGTCTGA ACCAGGGCAC GTGTATTGAC
901 GACGTTGCCG GGTACAAGTG CAACTGCCTG CTGCCCTACA CAGGTGCCAC GTGTGAGGTG
961 GTGCTGGCCC CGTGTGCCCC CAGCCCTCGC AGAACCGGC GGGAGTGCAG GCAATCCGAG
1021 GACTATGAGA GCTTCTCTCT GTGTGCCCC ACGGGCTGGC AAGGGCAGAC CTGTGAGGTC
1081 GACATCAACG AGTGGCTTCT GAGCCCTGCG CGGCACGGCG CATCTGCCCA GAACACCCAC
1141 GCGGGCTACC GCTGCCACTG CCAAGCCGGC TACAGTGGGC GCAACTGCGA GACCGACATC
1201 GACGACTGCC GGCCCAACCC GTGTCAACA GGGGGCTCCT GCACAGACGG CATCAACAGC
1261 GCCTTCTGGC ACTGCTCCGC CGGCTTCGGC GGCACCTTCT GTGAGGAGGA CATCAACGAG
1321 GATCTGGGCC CGGGCAGACC AACTCTTGT GACAAAACCT ACACATGCCC ACCGTGCCCA
1381 GCACCTGAAC TCGTGGGGGG ACCGTGAGT TTCTCTTCC CCCCAAAACC CAAGGACACC

【 図 3 1 - 2 】

図 31-2

Figure 31 続き

1441 CTCATGATCT CCCGGACCCC TGAGTGCACA TGCGTGGTGG TGGACGTGAG CCACGAAGAC
1501 CCTGAGGTCA AGTTCAACTG GTACGTGGAC GCGGTGGAGG TGCATAATGC CAAGACAAAG
1561 CCGCGGGAGG AGCAGTACAA CAGCACGTAC CGTGTGGTCA GCGTCTCAC CGTCTGCAC
1621 CAGGACTGGC TGAATGGCAA GGAGTACAAG TGCAAGGTCT CCAACAAGAG CCTCCACGCC
1681 CCCATCGAGA AAACCATCTC CAAAGCCAAA GGGCAGCCCC GAGAACCACA GGTGTACACC
1741 CTGCCCCCAT CCGGGGAGGA GATGACCAAG AACCAAGTCA GCCTGACCTG CTTGGTCAAA
1801 GCCTTCTATC CCAGCGACAT CCGCGTGGAG TGGGAGAGCA ATGGGACGCC GGAGAACAAAC
1861 TACAAGACCA CGCCTCCCGT GCTGGACTCC GACGCTCTCT TCTTCTCTTA CAGCAGCTC
1921 ACCGTGGACA AGAGCAGGTG GCAGCAGGGG AACGCTCTCT CATGCTCCGT GATGATGAG
1981 GCTCTGCACA ACCACTACAC GCAGAAGAGC CTCTCCCTGT CTCCGGGTAA ATGA

タンパク質配列 (SEQ ID No:7)

1 MPPELLAPLLC LALLPALAAR GPRCASTPK NGAKCLDGNP TYTCVTEGY TGTHCEVDID
61 ECDPDECHYG SKDGVATFT CLCRPYTGH HCEITNINECS SQPRRHGTC QDRDNAYLCF
121 CLKGTTGPNL EINLDDCASS PCDSGTCLDK IDGYEACPEP GYTGSMCNIN IDECAGNPNCH
181 NGGTCEGDN GFTCRCEPEY HDPTCLSEVN ECNSNCFVHG ACRDSLNGYK CDCDPPWGST
241 NCDINNECE SNPCVNGGTC KDMTSGVYTH CREGFSFGNC QTNINECAN PCIMOGTCTID
301 DVAGYKCNCL LPYTATCEV VLAACPSPFC RRGECRQSE DYVESFCVCP TQWQOQTEV
361 DINECVLSPC RHGASCQNTG GYRCHCQAG YSRNCEIDI DDCRPNPCHN GSSCTDGINI
421 AFCDCLEPFR GTFCEEDINE DLGPEPEKSC DRHTCTPCFP APELLGGFSV FLFFPKFKDT
481 LMISRTPEVT CUVVDVSHED PEVKFNMYVD GVEVHNKTR PREBQYNSTY RVVSLVILVH
541 QDWLNGKEYK KVSNSKALFA PIEKTIKAK GQPREPQVYI LPPSREEMTK NQVSLTCLVK
601 GFYPDSIAVE WESNGQPENN YKTTFPVLDL DGSFPLYSLK TVDKSRWQQG NVFSCSVWHE
661 ALHNHYTQKS LSLSFGK*

【 図 3 2 - 1 】

図 32

Figure 32:

ノッチ1デコイ14-38(3489)

ヒト・ノッチ1シグナルペプチド:1-69

EGF-様反復14-36:70-2775

ヒトFc:2776-3489

DNA配列 (SEQ ID No:8)

1 ATGCCGCGCC TCGTGGCGCC CCTGCTCTGC CTGGCGCTGC TGCCCGCGCT CGCCGCACGA
61 GGCCCGCGAT GTGGCAGCAC CCGCTGCAAG AATGGTGCCA AGTGCTTGGG CGGACCCAAC
121 ACTTACACCT GTGTGTGCAC GGAAGGGTAC ACGGGGACGC ACTGCGAGGT GGACATCGAT
181 GAGTGGGACC CCGACCCCTG CCACTACGGC TCCTGCAAGG ACGGCGTCCG CACCTTCACC
241 TGCCCTTGCC GCCCAGGCTA CACGGGCCAC CACTGGGAGA CCAACATCAA CGAGTGTCTC
301 AGCCAGCCCT GCGCCACGG GGGCACCTGC CAGGACCGCG ACAACGCTTA CCTCTGCTTC
361 TGCCTGAAGG GGACCAACAG ACCCAACTGC GAGATCAACC TGGATGACTG TGCACGACGC
421 CCGTGGGACT CGGGCACCTG TCTGGACAAG ATCGATGGCT ACGAGTGTGC CTGTGAGCCG
481 GSCTACACAG GGAGCATGTG TAACATCAAC ATCGATGAGT GTGCGGGCAA CCGCTGCCAC
541 AACGGGGGCA CCGTGGAGGA CGGCATCAAT GGCTTCACCT GCCCTGCCCC CGAGGGCTAC
601 CACGACCCCA CCGTGCCTGC TGAGTCAAT GAGTGAACA GCAACCCCTG CGTCCACGGG
661 GCCTGCCGGG ACACCTCAA GGGGTACAG TCGACTGTG ACCCTGGGTG GAGTGGGACC
721 AACTGTGACA TCAACAACAA TGAGTGTGAA TCCAACCTTT GTGTCAACGG CGGCACCTGC
781 AARGACATGA CCACTGGCTA CGTGTGCACC TGCCGGGAGG GCTTCAGCGG TCCCAACTGC
841 CAGACCBACA TCAACGAGTG TCGTCCAAAC CCATGTCTGA ACCAGGGCAC GTGTATTGAC
901 GACGTTGCCG GGTACAAGTG CAACTGCCTG CTGCCCTACA CAGGTGCCAC GTGTGAGGTG
961 GTGCTGGCCC CGTGTGCCCC CAGCCCTCGC AGAACCGGC GGGAGTGCAG GCAATCCGAG
1021 GACTATGAGA GCTTCTCTCT GTGTGCCCC ACGGGCTGGC AAGGGCAGAC CTGTGAGGTC
1081 GACTACACAG AGTGGCTTCT GAGCCCTGCG CGGCACGGCG CATCTGCCCA GAACACCCAC
1141 GCGGGCTACC GCTGCCACTG CCAAGCCGGC TACAGTGGGC GCAACTGCGA GACCGACATC
1201 GACGACTGCC GGCCCAACCC GTGTCAACA GGGGGCTCCT GCACAGACGG CATCAACAGC
1261 GCCTTCTGGC ACTGCTCCGC CGGCTTCGGC GGCACCTTCT GTGAGGAGGA CATCAACGAG
1321 TGTGCCAGTG ACCCGTCCG CCAAGCGGGC AACTGCACGG ACTGCGTGA CAGCTACAGC
1381 TGACCTGCC CGCAGGCTT CAGCGGGTAC CACTGTGAGA ACAACACGCC TGAAGTGCACA

【 図 3 2 - 2 】

図 32-2

Figure 32 続き

1441 GAGAGCTCCT GCTTCAACGG TGCCACTCTG GTGGACGGCA TCAACTCGTT CACCTGCCTG
1501 TGTCCACCCG GCTTCAACGG CAGCTACTGC CAGCAGCATG TCAATGAGTG CGACTCACAG
1561 CCTTGCCTGC ATGGCGGCAC CTGTCAAGAC GGCTGCGGCT CCTACAGATG CACCTGCCCC
1621 CAGGGCTACA TGGCCCCAA CTGCCAAGAC CTGTGACTCT GGTGTGACTC CTCGCCCTGC
1681 AAGAACGGGG GCAAATGCTG GCAGACCCAC ACCCAGTACC GCTGCGAGTG CCCCAGCGGC
1741 TGGACCGGCC TTTACTGCGA CBTGCCAGC GTGTCTGTG AGGTGGCTGC GCAGCAGCAA
1801 GGTGTGAGC TTTGCCCGCT GTGCCAGCAT GGAGGGCTCT GTGTGACGC GGGCAACACG
1861 CACCACTGCC GCTGCCAGGC GGGCTACAGA GGCAGCTACT GTGAGGACCT GGTGGACGAG
1921 TGCTACCCA CCGCCCTGCC GAACCGGGCC ACCTGCACGG ACTACCTGGG CGGCTACTCC
1981 TGCAAGTGGC TGGCCCGCTA CCACGGGGTG AACTGCTCTG AGGAGATCGA CAGTGTCTCC
2041 TCCCACCCCT GCCAGAACGG GGGCACCTGC CTCGACCTCC CCAACACTTA CAAGTCTCC
2101 TGGCCACGGG GCACTCAGGG TGTGACTGTG GAGATCAAGC TGGACGACTG CAATCCCCCC
2161 GTTGACCCCG GTTCCCGGAG CCCCAGTCT TTTAACAAC GCACCTCGCT GGACGAGTG
2221 GCGGGCTACA GCTGCACCTG CCGCCCGGGC TTTGTTGGTG AGCGTGTGA GGGGGATGTC
2281 AACGAGTGGC TGTCCAATCC CTGCGACGCC CGTGGCACCC AGAAGTGGGT GCAGCGGCTC
2341 AATGACTTCC ACTSCGAGTG CCGTGTGCTG CACACCGGGC CGCGTGTGCA GTCCGTCTATC
2401 AATGGCTGCA AAGSCAAGCC CTGCAAGAT GGGGGCACCT GCGCCGTGGC CTCCAACACC
2461 GCGCGGGGT TCACTGCAA GTGCCGTGG GGTCTCAGG GCGCACAGTG TGAATATGAC
2521 GCTGTAACCT CGGGCAGCCT CGCTGCCTC AACGGCGGCA CATGCATCTC CGGCCCGGCG
2581 AGCCCCACCT GCCTGTGCTT GGGCCCTTCT ACGGGCCCCG AATGCCAGTT CCGCGCCAGC
2641 AGCCCCGCT TGGCGGGCAA CCGCTGTACT AACCGGGGGA CCGTGTGAGCC CACATCCGAG
2701 AGCCCCCTCT ACCGTGCTT GTGCCCGGCC AAATTAACCG GGCTTGTGTG CCACATCCAG
2761 GACTACAGCT TCGAGATCT GGGCCCGGGC GAGCCCAAAAT CTTGTGACAA AACTCACACA
2821 TGCCCCACGT GCCCAGCAC TGAACCTCTG GGGGGACCGT CAGTCTTCTT CTTCGCCCCA
2881 AAACCCAAGG ACACCCCTAT GATCTCCCG ACCCCCTGAG TCACATGCGT GGTGTGGGAC
2941 GTGAGCCACG AAGACCTTGA GGTCAAGTGT AACTGTGAGC TGGACGCGGT GGAGTGTGAT
3001 AATGCCAAGA CAAAGCGCGG GGAGGAGCAG TACAACAGCA CGTACCGGTG GTTCAGCGTC
3061 CTCACCGTCC TGCACCAGGA CTGGCTGAAT GGCAAGAGT ACAAGTGCAA GGTCTCCACAC

【 図 3 2 - 3 】

図 32-3
Figure 32 続き

```

3121 AAAGCCCTCC CAGCCCCCAT CGAGAAAACC ATCTCCAAAG CCAAAGGGCA GCCCCGAGAA
3181 CCACAGGTGT ACACCCCTGCC CCCATCCCGG GAGGAGATGA CCAAGAACCA GGTGAGCCTG
3241 ACCTGCTGG TCAAAGGCTT CTATCCAGC GACATGCGCG TGGAGTGGGA GAGCAATGGG
3301 CAGCCGGAGA ACAAACRCPA GACCACGCTT CCGTGCTGG ACTCCGACGG CTCCTTCTTC
3361 CTCTACAGCA AGCTCACCGT GGACAAGAGC AGGTGGCAGC AGGGGAACGT TTCTCATGC
3421 TCGGTGATGC ATGAGGCTCT GCACAACCAC TAGACGCAGA AGAGCCTCTC CCTGTCTCCG
3481 GGTAAATGA

```

タンパク質配列 (SEQ ID NO:9)

```

1 MPPLLAPLLC LALLPALAAR GPRCASTPCK NGAKCLDGNP TYTCVCTEGY TGTHCEVDID
61 ECDPDPCHYG SCKDGVATFT CLCRPGYTGH HCEITNIECS SQPCRHHGTC QDRDNAYLCF
121 CLRGTGPNC EINLDCASS PCDSGTCLDK IDGYEACAPF GYTGMCNIN IDECAGNFCF
181 NGGTCEGIN GFTCRPEGY HDPTCLSEVN ECNSNPCVHG ACRDSLNGYK CDCDFGWSGT
241 NCDINNECE SNPCVNGGTC KDMTSGYVCT CREGFGPNC QTNINECASN FCLNQGTGID
301 DVAGYKCNCL LPYTATGEV VLAPCAPSPC RGGEGCRQSE DYESFSCVCP TGWQGTCEV
361 DINECVLSPC RHGASCQNTF GGYRCHQAG YSGRNCETDI DDCRNPCHN GGSDTGINF
421 AFCDCPLGFR GTFCEEDINE CASDFCRNGA NCTDCVBSYT CTCFAGFSGI HCENNIFDCT
481 ESSCFNGGTC VDGINSFTCL CPPGFTGYSY QHDVNECDSQ PCLHGCTQD GCGSYRCTCF
541 QGYTGPNCQN LVHWCDSSTPC KNGKRCQWTH TQYRCEPFSG WTGLYCDVPS VSCEVAAQRQ
601 GVDVARLCQH GGLCVDAAGT HHCRCQAGY TGSYCELDVDE CSPSPCQNGA TCTDYLGYS
661 KCVAGYHGV NCSEIDECL SHPCQNGGTC LDLPNTYKCS CPRGTQGVHC EINVDDCNPP
721 VDPVSRSPKC FNNGTCDVOV GYSCTCPPG FVGERCEGV NECLSNPCDA RGTQNCVQV
781 NDFHCECRAG HTGRRCESVI NGCKGPKCN GGTCAVASNT ARGFICKCPA GFEGATCEND
841 ARTCGSLRCL NGGTCSIGPR SPTCLCLGPF TGPEQCFFAS SPCIGNFCY NQGTCEPTSE
901 SFFYRCLCPA KFNGLLCHIL DYSFGDLGPG EPKSCDKTHT CFPCEPELL GGSVFLFPP
961 KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NMYVDGVEVH NARTKPREEQ YNSTYRVVSV
1021 LTVLHQDWLN GKEYCKVSN KALPAPIERT ISKAKGQPRE FQVYTLPPSR EEMTKNQVSL
1081 TCLVKGFYPS DIAVEVESNG QPENNYKTPP PVLDSGGSFF LYSKLTVDKS RMQQGIVFSC

```

【 図 3 3 c 】

図 33c
Fig. 33c

【 図 3 4 a 】

図 34a
Fig. 34a

【 図 3 2 - 4 】

図 32-4
Figure 32 続き

1141 SVMHEALHNNH YTKRSLSLSP GK*

【 図 3 3 a 】

Fig. 33a

【 図 3 3 b 】

図 33b

Fig. 33b

【 図 3 4 b 】

図 34b

Fig. 34b

【 図 3 4 c 】

図 34c

Fig. 34c

【 図 3 5 a 】

図 35a

Fig. 35a

【 図 3 6 】

図 36

FIGURE 36

【 図 3 5 b 】

図 35b

Fig. 35b

【 図 3 7 a 】

図 37a

Fig. 37a

【 図 3 8 】

図 38

FIGURE 38

【 図 3 7 b 】

図 37b

Fig. 37b

【 図 3 9 a 】

図 39a

【 図 3 9 b 】

図 39b

【 図 3 9 c 】

図 39c

【 図 4 0 a 】

図 40a

【 図 4 0 b 】

図 40b

【 図 4 1 a 】

図 41a

【 図 4 1 b 】

図 41b

【 図 4 1 c 】

図 41c

Fig. 41c

【 図 4 2 b 】

図 42b

Fig. 42b

【 図 4 2 a 】

図 42a

Fig. 42a

【 図 4 2 c 】

図 42c

Fig. 42c

【 図 4 3 a 】

図 43a

Fig. 43a

【 図 4 3 c 】

図 43c

Fig. 43c

【 図 4 3 b 】

図 43b

Fig. 43b

【 図 4 3 d 】

図 43d

Fig. 43d

【 図 4 4 】

図 44

FIGURE 44

【 図 4 5 】

図 45

FIGURE 45

【 図 4 6 】

図 46

FIGURE 46

【 図 4 7 a 】

図 47a

【 図 4 7 b 】

図 47b

Fig. 47b

【 図 4 8 a 】

【 図 4 8 b 】

【 図 4 9 】

【配列表】

2014532061000001.app

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US2012/058662
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(8) - A61K 39/395 (2012.01) USPC - 424/134.1 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC(8) - A61K 38/17 39/395; A61P 35/00; C07K 14/705, 16/00, 16/46 (2012.01) USPC - 424/18.1, 134.1; 514/12; 530/350, 387.3, 391.1 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) PatBase, Google Patents, Google, PubMed		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X -- Y Y A A A A	US 2011/0008342 A1 (KITALEWSKI et al) 13 January 2011 (13.01.2011) entire document AHMAD et al. Regulation of Ocular Angiogenesis by Notch Signaling: Implications in Neovascular Age-Related Macular Degeneration. IOVS 52(6): 2868-2878. May 2011 entire document FUNAHASHI et al. A Notch1 Ectodomain Construct Inhibits Endothelial Notch Signaling, Tumor Growth, and Angiogenesis. Cancer Res 68:4727-4735. 16 June 2008 entire document US 6,379,925 B1 (KITAJEWSKI et al) 30 April 2002 (30.04.2002) entire document US 2008/0030694 A1 (KITAJEWSKI et al) 09 February 2006 (09.02.2006) entire document US 6,090,922 A (ARTAVANIS-TSAKONAS et al) 18 July 2000 (18.07.2000) entire document	24, 27-34 ----- 25, 26 25, 26 1-10, 24-34 1-10, 24-34 1-10, 24-34 1-10, 24-34
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 27 November 2012		Date of mailing of the international search report 18 JAN 2013
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. 571-273-3201		Authorized officer: Blaine R. Copenheaver PCT Helpdesk: 571-272-4300 PCT OSP: 571-272-7774

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2012/058662

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.: 11-23, 35-38
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

フロントページの続き

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
A 6 1 P 43/00 (2006.01)	A 6 1 P 43/00 1 1 1	
A 6 1 P 27/02 (2006.01)	A 6 1 P 27/02	
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	C 1 2 N 15/00 A	

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC

(72) 発明者 キタジェウスキー、ジャン
 アメリカ合衆国、ニュージャージー州 0 7 4 5 0、リッジウッド、ヒルクレスト・ロード 3 2 3

(72) 発明者 ショーバー、キャリー
 アメリカ合衆国、ニュージャージー州 0 7 6 7 6、タウンシップ・オブ・ワシントン、ビーチ・ストリート 4 1 8

(72) 発明者 カンサマクシン、タネド
 タイ王国、5 2 1 0 0、ランパン、ムアン、ブンヤワット・ロード・スアンドク 2 1 2

F ターム(参考) 4B024 AA01 BA61 BA63 BA80 CA01 DA02 EA02 GA11 HA08
 4C084 AA02 AA07 BA01 BA08 BA41 CA53 NA14 ZA331 ZB211 ZB261
 ZC411
 4H045 AA10 AA11 AA30 BA09 BA41 CA40 DA50 DA75 EA20