

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-501618

(P2008-501618A)

(43) 公表日 平成20年1月24日(2008.1.24)


(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>C07D 231/16</b> (2006.01)	C07D 231/16	4C050
<b>C07D 231/20</b> (2006.01)	C07D 231/20	CSPC 4C055
<b>C07D 231/38</b> (2006.01)	C07D 231/38	B 4C086
<b>A61P 1/04</b> (2006.01)	A61P 1/04	
<b>A61P 9/00</b> (2006.01)	A61P 9/00	
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 45 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2006-516844 (P2006-516844)	(71) 出願人	503062312 アスピオファーマ株式会社 東京都港区赤坂二丁目9番11号
(86) (22) 出願日	平成16年6月11日 (2004.6.11)	(74) 代理人	100083301 弁理士 草間 攻
(85) 翻訳文提出日	平成17年12月1日 (2005.12.1)	(72) 発明者	井上 英和 大阪府三島郡島本町青葉一丁目18-5-207
(86) 国際出願番号	PCT/JP2004/008643	(72) 発明者	村藤 秀宣 大阪府茨木市真砂二丁目9-14-303
(87) 国際公開番号	W02004/111054	(72) 発明者	林 靖浩 大阪府三島郡島本町山崎一丁目9-5-803
(87) 国際公開日	平成16年12月23日 (2004.12.23)	Fターム(参考)	4C050 AA01 BB05 CC08 EE04 FF02 GG03 HH04
		最終頁に続く	


(54) 【発明の名称】 PDE7阻害作用を有するピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体

## (57) 【要約】


PDE7を選択的に阻害する作用を有し、これによって、細胞内cAMPレベルが高まり、さらにはT細胞の活性化を阻害することによって様々なアレルギー疾患、炎症・免疫疾患の予防および治療に有用である化合物の提供であり、下記の式(IA)または(IB)：




(IA)



(IB)



(IA)



(IB)


で表されるピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体であり、特に、R<sup>1</sup>がシクロヘキシル基またはシクロヘブチル基であり、R<sup>2</sup>がメチル基であり、R<sup>3</sup>が基：-NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>または-S(O)<sub>0-2</sub>であり、R<sup>4</sup>がメトキシ基またはエトキシ基であるピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体。

## 【特許請求の範囲】


## 【請求項 1】

一般式 ( I A ) または ( I B ) :

## 【化 1】



(IA)



(IB)

10

( 式中、

$R^1$  は、置換若しくは非置換の  $C_3 - 8$  のシクロアルキル基または、tert-ブチル基を示し、

$R^2$  は、水素原子または  $C_1 - 3$  のアルキル基を示し、

$R^3$  は、基：  $-NR^5R^6$ 、 $-C(=O)R^7$  または  $-S(O)_{0-2}R^8$  を示し、

$R^4$  は水素原子または必要に応じて1つ以上のフッ素で置換された  $C_1 - 3$  のアルコキシ基を示し、

20

$R^5$  および  $R^6$  は、同一または異なって、水素原子、置換若しくは非置換の  $C_1 - 6$  のアルキル基、置換若しくは非置換のアシル基、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル基、またはそれらが結合している窒素原子と一緒に置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル環を形成し、

$R^7$  は、基：  $-OR^9$  または  $-NR^5R^6$  を示し、

$R^8$  は、水素原子、ハロゲン原子、基：  $-NR^5R^6$ 、置換若しくは非置換の  $C_1 - 6$  のアルキル基、または置換若しくは非置換のアリール基を示し、

$R^9$  は、水素原子または置換若しくは非置換の  $C_1 - 6$  のアルキル基を示す。) )

で表されるピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体、その薬理的許容される塩またはその溶媒和物。

30

## 【請求項 2】

一般式 ( I A ) で表される請求項 1 に記載の化合物。

## 【請求項 3】

一般式 ( I B ) で表される請求項 1 に記載の化合物。

## 【請求項 4】

$R^1$  がシクロヘキシル基またはシクロヘプチル基である請求項 1、2 または 3 に記載の化合物。

## 【請求項 5】

$R^2$  がメチル基である請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の化合物。

## 【請求項 6】

$R^4$  がメトキシ基またはエトキシ基である請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の化合物。

40

## 【請求項 7】

$R^3$  が基：  $-NR^5R^6$  である請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載の化合物。

## 【請求項 8】

請求項 1 ないし 7 のいずれかに記載の化合物、その薬理的に許容される塩、またはその溶媒和物を有効成分として含有する医薬組成物。

## 【請求項 9】

請求項 1 ないし 7 のいずれかに記載の化合物、その薬理的に許容される塩、またはその溶媒和物を有効成分として含有する PDF 7 阻害剤。

## 【発明の詳細な説明】

50

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、選択的なPDE7(VII型ホスホジエステラーゼ)阻害作用を有するピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体、その薬理的に許容される塩及び溶媒和物に関する。これらの化合物は、アレルギー疾患や炎症・免疫疾患を含む様々な治療分野の疾患に対して、有効な化合物である。

## 【背景技術】

## 【0002】

細胞内セカンドメッセンジャーであるcAMPもしくはcGMPは、ホスホジエステラーゼ(PDE1~11)によって分解され、不活化される。このうちのPDE7は、選択的にcAMPを分解するものであり、同じくcAMPを分解するPDE4の選択的阻害剤であるロリプラムによって阻害されない酵素として、特徴付けられている。

## 【0003】

PDE7は、T細胞の活性化に重要な役割を果たしていることが示唆されており(Beavora; Science, 283(1999)848)、また、T細胞の活性化が様々なアレルギー疾患や炎症・免疫疾患、例えば、気管支喘息、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患、アレルギー性鼻炎、乾癬、アトピー性皮膚炎、結膜炎、変形性関節症、慢性関節リウマチ、多発性硬化症、全身性エリテマトーデス、炎症性腸炎、肝炎、膵炎、脳脊髄炎、敗血症、クローン病、移植における拒絶反応、移植片対宿主病(GVH病)、血管形成術後の再狭窄などに対する疾患における病態の増悪化に関与していることが知られている(J. Allergy Clin. Immunol., 2000 Nov; 106(5 Suppl):S221-6; Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1996 Feb; 153(2): 629-32; Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1999 Nov; 160(5 Pt 2):S33-7; Clin. Exp. Allergy, 2000 Feb; 30(2):242-54; Hosp. Med., 1998 Jul; 59(7):530-3; Int. Arch. Allergy Immunol., 1998 Mar; 115(3): 179-90; J. Immunol., 1991 Feb 15; 146(4):1169-74; Osteoarthritis Cartilage, 1999 Jul; 7(4):401-2; Rheum. Dis. Clin. North Am., 2001 May; 27(2):317-34; J. Autoimmun., 2001 May; 16(3):187-92; Curr. Rheumatol. Rep., 2000 Feb; 2(1):24-31; Trends Immunol., 2001 Jan; 22(1):21-6; Curr. Opin. Immunol., 2000 Aug; 12(4):403-8; Diabetes Care, 2001 Sep; 24(9):1661-7; J. Neuroimmunol., 2000 Nov 1; 111(1-2):224-8; Curr. Opin. Immunol., 1997 Dec; 9(6):793-9; JAMA, 1999 Sep 15; 282(11):1076-82; Semin. Cancer Biol., 1996 Apr; 7(2):57-64; J. Interferon Cytokine Res., 2001 Apr; 21(4):219-21)。したがって、PDE7阻害活性を有する化合物は、T細胞が関与する様々なアレルギー疾患や炎症・免疫疾患に対して有用であると考えられる。

## 【0004】

これまでにPDE7を選択的に阻害する化合物として、イミダゾピリジン誘導体(特許国際公報WO 01/34601号)、ジヒドロプリン誘導体(特許国際公報WO 00/68203号)、ピロール誘導体(特許国際公開WO 01/32618号)、ベンゾチオピラノイミダゾロン誘導体(ドイツ特許第19950647号)、複素環化合物(特許国際公開WO 02/88080号、特許国際公開WO 02/87513号)、キナゾリンおよびピリドピリミジン誘導体(特許国際公開WO 02/102315号)、スピロ三環系誘導体(特許国際公開WO 02/74754号)、チアゾールおよびオキサチアゾール誘導体(特許国際公開WO 02/28847号)、スルホンアミド誘導体(特許国際公開WO 01/98274号)、ヘテロピアリルスルホンアミド誘導体(特許国際公開WO 01/74786号)、ジヒドロイソキノリン誘導体(特許国際公開WO 02/40450号)、グアニン誘導体(Bioorg. Med.Chem. Lett., 11(2001)1081)、ベンゾチアジアジン(J. Med. Chem., 43(2000)683)、及びベンゾチエノチアジアジン誘導体(Eur. J. Med. Chem., 36(2001)333)等が提供されているが、当該酵素の阻害作用を主薬効メカニズムとする治療薬は開発されていない。

## 【0005】

一方、ピラゾロピリミジノン骨格を有する化合物(ヨーロッパ特許公開第463756

10

20

30

40

50

号、ヨーロッパ特許公開第526004号、ヨーロッパ特許公開第349239号、ヨーロッパ特許公開第636626号、ヨーロッパ特許公開第995751号、及び特開平8-253484号公報)が、cGMP特異的PDE阻害剤として知られているが、PDE7阻害活性については何ら示唆されていない。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明は、PDE7阻害活性を有する新たな化合物、および当該化合物を有効成分とするPDE7阻害剤を提供することを目的とする。

本発明により提供される化合物は、PDE7を選択的に阻害することにより、細胞内cAMPレベルが高まり、さらにはT細胞の活性化を阻害することによって、様々なアレルギー疾患、炎症・免疫疾患に対して有用な化合物である。

【0007】

具体的には、気管支喘息、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患、アレルギー性鼻炎、乾癬、アトピー性皮膚炎、結膜炎、変形性関節症、慢性関節リウマチ、多発性硬化症、全身性エリテマトーデス、炎症性腸炎、肝炎、膵炎、脳脊髄炎、敗血症、クローン病、移植における拒絶反応、GVH病、血管形成術後の再狭窄などに対する疾患の予防または治療剤として有用である。

【課題を解決するための手段】

【0008】


本発明者らは、優れたPDE7阻害作用を有する化合物を開発するべく、鋭意研究を進めた結果、後記する一般式(IA)または(IB)で示されるピリジニルピラゾロピリミジノン骨格を有する化合物に、強力なPDE7阻害作用および優れたPDE7阻害選択性が存在することを新たに見出し、本発明を完成させるに至った。

【0009】


すなわち、本発明に従えば、下記一般式(IA)または(IB)：

【0010】

【化1】



(IA)



(IB)

【0011】

(式中、

R<sup>1</sup> は、置換若しくは非置換のC<sub>3</sub> - 8のシクロアルキル基または、tert-ブチル基を示し、

R<sup>2</sup> は、水素原子またはC<sub>1</sub> - 3のアルキル基を示し、

R<sup>3</sup> は、基：-NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>、-C(=O)R<sup>7</sup>または-S(O)<sub>0-2</sub>R<sup>8</sup>を示し、

R<sup>4</sup> は水素原子または必要に応じて1つ以上のフッ素で置換されたC<sub>1</sub> - 3のアルコキシ基を示し、

R<sup>5</sup> およびR<sup>6</sup> は、同一または異なって、水素原子、置換若しくは非置換のC<sub>1</sub> - 6のアルキル基、置換若しくは非置換のアシル基、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル基、またはそれらが結合している窒素原子と一緒に置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル環を形成し、

R<sup>7</sup> は、基：-OR<sup>9</sup>または-NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>を示し、

10

20

30

40

50

R<sup>8</sup> は、水素原子、ハロゲン原子、基：-NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>、置換若しくは非置換のC<sub>1</sub>~6のアルキル基、または置換若しくは非置換のアリール基を示し、

R<sup>9</sup> は、水素原子または置換若しくは非置換のC<sub>1</sub>~6のアルキル基を示す。) で表されるピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体、その薬理学的に許容される塩またはその溶媒和物を提供する。

【0012】

また本発明は、上記で提供されたピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体、その薬理的許容される塩またはその溶媒和物を有効成分として含有するPDE7阻害剤を提供するものでもある。

【発明を実施するための最良の形態】

【0013】

以下に本発明を詳細に説明していく。

本明細書において、「C<sub>1</sub>~3のアルキル基」とは炭素数1から3までの直鎖または分岐状のアルキル基であり、具体例としては、メチル、エチル、プロピル基などをあげることができ、「C<sub>1</sub>~6のアルキル基」とは、炭素数1から6個までの直鎖または分岐状のアルキル基であり、具体例としては、メチル、エチル、プロピル、及び、ブチル、ペンチル、ヘキシル基などをあげることができる。また、「C<sub>3</sub>~8のシクロアルキル基」とは、炭素数3~8のシクロアルキル基であり、具体例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル基などをあげることができる。

【0014】

「ヘテロシクロアルキル基」とは、酸素原子、窒素原子あるいは硫黄原子からなるヘテロ原子を1個ないし4個含有する3ないし7員環であり、具体例としては、ピロリジニル、ペリジニル、ペラジニル、ホモペラジニル、テトラヒドロフリル、テトラヒドロピラニル、モルホニル、アゼチジニル基などをあげることができる。

【0015】

「C<sub>1</sub>~3のアルコキシ基」とは、炭素数1~3のアルコキシ基であり、具体例としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ基をあげることができる。

また、「アシル基」とは、炭素数が1ないし8個であるアシル基であり、具体例としては、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブタノイル、ペンタノイル、ベンゾイル、トルオイル基などをあげることができ、「ハロゲン原子」とは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素原子である。

【0016】

また、「アリール基」とは、炭素数が6ないし12個からなるフェニル、ナフチル、ピフェニル基などをあげることができ、「ヘテロアリール基」とは、炭素数が2ないし8個であり、酸素原子、窒素原子あるいは硫黄原子からなるヘテロ原子を1個ないし4個含有する5ないし7員環からなる単環もしくはそれらの同一または異なる2以上の単環が融合した多環式のヘテロアリール基、例えばピロール、フリル、チエニル、イミダゾリル、チアゾリル、ピラジル、インドリル、キノリル、イソキノリル、テトラゾリル、ピリジニル、ピラゾリル、ピリダジニル、ピリミジニル基などをあげることができる。

【0017】

本発明において、「置換若しくは非置換のC<sub>1</sub>~6のアルキル基」の好ましい置換基の例としては、水酸基、ハロゲン原子などをあげることができ、「置換若しくは非置換のアシル基」の好ましい置換基の例としては、ハロゲン原子、ニトロ基をあげることができ、「置換若しくは非置換のアリール基」の好ましい置換基の例としては、C<sub>1</sub>~3のアルキル基、ハロゲン原子、アミノ基、アシル基、アミド基、水酸基、アシルアミノ基、カルボキシ基、スルホニル基などをあげることができ、「置換若しくは非置換のC<sub>3</sub>~8のシクロアルキル基」の好ましい置換基の例としては、C<sub>1</sub>~3のアルキル基、水酸基、オキソ基などをあげることができ、「置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル基」の好ましい置換基の例としてはカルボキシ基、アシル基、アルコキシ基、アミノ基、アルキルア

10

20

30

40

50

ミノ基、アシルアミノ基、水酸基、オキシ基、エチレンジオキシ基、メチル基、エチル基、ヒドロキシエチル基などをあげることができる。

【0018】

本発明が提供する一般式 ( I A ) および ( I B ) の化合物において、好ましい化合物の群は、 $R^1$  がシクロヘキシル基またはシクロヘプチル基であり、 $R^2$  がメチル基であり、 $R^3$  が基： $-NR^5R^6$  または  $-S(O)_{0-2}R^8$  であり、 $R^4$  がメトキシ基またはエトキシ基である化合物である。

【0019】

なお、一般式 ( I A ) および ( I B ) の化合物は、互変異性体の形で存在してもよく、個々の互変異性体および、個々の互変異性体の混合物として存在してもよい。さらに、一般式 ( I A ) および ( I B ) の化合物の放射能標識した誘導體も、また本発明に含まれる。

10

【0020】

また、本発明が提供する化合物は、1個ないし複数個の不斉炭素原子を有するものも含み、これに基づく ( R ) 体、( S ) 体の光学異性体、ラセミ体、ジアステレオマーなどが存在する。また、置換基の種類によっては二重結合を有するので、( Z ) 体、( E ) 体などの幾何異性体も存在する。したがって、本発明が提供する化合物中には、これらの異性体の分離されたもの、あるいは異性体の混合物であっても、いずれの場合をも包含するものである。

【0021】

本発明が提供する化合物は、各種の酸により塩を形成することができるものがある。かかる塩としては、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸などの鉱酸や、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸、安息香酸、ピクリン酸、メタンスルホン酸、トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、アスパラギン酸、グルタミン酸などの有機酸との酸付加塩をあげることができる。

20

【0022】

また、本発明が提供する化合物は、さらに、金属、特にアルカリ金属、アルカリ土類金属と共に医療用として許容しうる金属塩を形成することができる。そのような塩の例としては、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩などをあげることができる。さらに、本発明の化合物は、水和物、エタノール、イソプロパノールなどの溶媒和物や、結晶多形の物質も含むことができる。

30

【0023】

本発明が提供する一般式 ( I A ) または ( I B ) で示されるピリジニルピラゾロピリミジノン誘導體のなかで、特に好ましい具体例としては、以下のものを例示することができる。

【0024】

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

40

1 - シクロヘキシル - 5 - ( 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル ) - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - ( 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル ] - 3 - ピリジニル ) - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - ( 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル ) - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 - ピペラジニル ) -

50

3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - モルフォリニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 , 4 - ジアゼパン - 1 - イル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 6 - ( 1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカ - 8 - イル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - オキソ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 6 - ( 4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

**【 0 0 2 5 】**

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - メトキシ - 6 - [ 4 - ( メチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - { 6 - [ 4 - ( ジメチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

6 - [ 6 - ( 4 - アミノ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 1 - シクロヘキシル - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

N - { 1 - [ 5 - ( 1 - シクロヘキシル - 3 - メチル - 7 - オキソ - 6 , 7 - ジヒドロ - 1 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 5 - イル ) - 6 - メトキシ - 2 - ピリジニル ] - 4 - ピペリジニル } アセタミド ;

1 - シクロヘキシル - 5 - ( 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ) - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 6 - ( 1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカ - 8 - イル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - オキソ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 6 - ( 4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - ( 2 - メトキシ - 6 - [ 4 - ( メチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 3 - ピリジニル ) - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - { 6 - [ 4 - ( ジメチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

**【 0 0 2 6 】**

6 - [ 6 - ( 4 - アミノ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリ

10

20

30

40

50

ミジン - 4 - オン ;

N - { 1 - [ 5 - ( 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 4 - オキソ - 4 , 5 - ジヒドロ - 1 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 6 - イル ) - 6 - メトキシ - 2 - ピリジニル ] - 4 - ピペリジニル } アセタミド ;

1 - シクロヘキシル - 5 - ( 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ) - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 - ピペラジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - モルフォリニル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ; 10

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 , 4 - ジアゼパン - 1 - イル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 6 - ( 1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカ - 8 - イル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - オキソ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ; 20

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 6 - ( 4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

【 0 0 2 7 】

3 - シクロヘキシル - 6 - { 2 - メトキシ - 6 - [ 4 - ( メチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

3 - シクロヘキシル - 6 - { 6 - [ 4 - ( ジメチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ; 30

6 - [ 6 - ( 4 - アミノ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

N - { 1 - [ 5 - ( 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 4 - オキソ - 4 , 5 - ジヒドロ - 1 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 6 - イル ) - 6 - メトキシ - 2 - ピリジニル ] - 4 - ピペリジニル } アセタミド ;

3 - シクロヘキシル - 6 - ( 2 - メトキシ - 6 - スルファニル - 3 - ピリジニル ) - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

5 - ( 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 4 - オキソ - 4 , 5 - ジヒドロ - 1 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 6 - イル ) - 6 - メトキシ - 2 - ピリジンスルホニルクロリド ; 40

3 - シクロヘキシル - 6 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチル - 1 , 4 - ジアゼパン - 1 - イル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルフィニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

【 0 0 2 8 】

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - エトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニ 50

ル] - 3 - ピリジニル} - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ]  
ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - エトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル} - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ]  
ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 - ピペラジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1, 4 - ジアゼパン - 1 - イル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

10

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 6 - ( 1, 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカ - 8 - イル ) - 2 - エトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - オキソ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - { 6 - [ 4 - ( ジメチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 2 - エトキシ - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

20

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - エトキシ - 6 - [ 4 - ( メチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4, 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン ;

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1, 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ H [ 4, 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン。


【 0 0 2 9 】

本発明にかかる式 ( I A ) の化合物は、たとえば以下に示す方法によって合成することができる。

【 0 0 3 0 】

30

## 【化2】



10

20

30

40

50

## 【0031】

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  および  $R^8$  は前記定義のとおりであり、 $L$  は  $C_{1-3}$  の低級アルキル基であり、 $Y$  は水酸基またはハロゲン原子、好ましくは塩素原子である。)

## 【0032】

本方法を実施するには、公知方法に従い、先ず、化合物(X)と $R^1-NHNH_2$ またはその塩を反応させ化合物(IX)を得る。この反応は、塩酸、硫酸などの無機酸水溶液類；ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類；酢酸などの有機酸類；メタノール、エタノールなどのアルコール類あるいはこれらの混合物中、もしくは無溶媒中、室温～120にて化合物(X)に対し、1～2当量、好ましくは約1当量の $R^1-NHNH_2$ またはその塩を作用させ、反応終了後、無機塩基、例えば水酸化ナトリウムの水溶液を加え、水と混和しない有機溶媒で抽出し、全有機物を水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することにより、目的化合物(IX)を得ることができる。なお、必要であれば、再結晶などで精製することができる。

## 【0033】

出発原料である化合物(X)は市販の化合物、または公知の化合物を用いることができる。また、化合物 $R^1-NHNH_2$ またはその塩についても、市販の化合物または公知の化合物を用いることができるが、公知の方法(例えば、J. Org. Chem., 1981, 46, 5414-5415)に記載の方法により、容易に合成して得た化合物を用いることも可能である。

## 【0034】

次いで、得られた化合物(IX)から、公知方法に従って化合物(VIII)へ変換される。この反応は、例えば、トルエン、ベンゼンなどの芳香族炭化水素類、または無溶媒中、室温から還流温度にて化合物(IX)に対し1～5当量のオキシ塩化リン、塩化チオ

ニルなどのハロゲン化試薬を作用させることにより実施することができる。反応終了後、溶媒を留去することによって、目的化合物(VIII)を得ることができる。

【0035】

得られた化合物(VIII)は、精製することなく、公知方法に従って、ニトロ基を導入した化合物(VII)へ変換される。この反応は、濃硫酸中、または無水酢酸中、-20 ~ 室温にて硝酸を用いる反応で行うことができる。反応終了後、反応液を氷に注ぎ、析出した固体を濾取することによって、目的化合物(VII)を得ることができる。なお、必要であれば、再結晶などで精製することができる。

【0036】

次いで、得られた化合物(VII)から、公知方法に従って、化合物(VI)を得る。具体的には、N,N-ジメチルホルムアミドなどのような極性溶媒中、室温~120にて、シアン化カリウム、シアン化ナトリムのような金属シアン化物を1~3当量用いる反応により行うことができる。反応終了後、水を加え、水と混和しない有機溶媒で抽出した後、全抽出物を水、飽和食塩水で順次洗浄し、溶媒を留去することによって、目的化合物(VI)を得ることができる。なお、必要であれば、カラムクロマトグラフィーなどで精製することができる。

10

【0037】

得られた化合物(VI)から、公知方法に従って、化合物(V)を得ることができる。この反応は、ニトリル基の加水分解により酸アミドを合成する方法であり、多くの方法で実施することができる。例えば、水、またはメタノール、エタノールなどのアルコール類; 1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類、あるいはこれらの混合液中、0 ~ 室温にて、水酸化ナトリウム、炭酸カリウムなど塩基存在下、過酸化水素を作用させる方法で実施することができる。反応終了後、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水で順次洗浄し、溶媒を留去することによって目的化合物(V)を得ることができる。なお、必要であれば、再結晶などで精製することができる。

20

【0038】

次いで、得られた化合物(V)から公知方法に従って、化合物(III)を得る。この反応は、ニトロ基を還元反応により還元し、アミノ基にする方法であり、多くの方法により実施することができる。例えば、塩酸などの無機酸類中0 ~ 還流温度にて、化合物(V)に対して2~10当量の二塩化スズを作用させることにより実施することができる。反応終了後、水酸化ナトリウムなどの無機塩基で中和し、セライト(登録商標)濾過した後、濾液を水と混和しない有機溶媒で抽出し、抽出した有機溶媒層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、溶媒を留去することにより目的化合物(III)を得ることができる。なお、必要であればカラムクロマトグラフィーなどで精製することができる。

30

【0039】

得られた化合物(III)から、公知方法に従って化合物(II)を得るのであるが、この反応は、アミン化合物(III)とカルボン酸成分(IV)から酸アミド化合物(II)を合成する方法であり、多くの方法で実施することができる。例えば、Yがハロゲン原子(好ましくは塩素原子)の場合には、不活性溶媒、例えばジクロロメタン中、0 ~ 室温にて、化合物(III)に対し1~5当量、好ましくは2.5当量の第3級アミン、例えばトリエチルアミンの存在下、化合物(III)に対し1~1.5当量好ましくは1.2当量の化合物(IV)を用いて、場合により触媒、例えば4-ジメチルアミノピリジンの存在下、行うことができる。

40

【0040】

また、Yが水酸基の場合には、不活性溶媒、例えばジクロロメタン中、0 ~ 室温にて、化合物(III)に対し1~1.5当量、好ましくは1.2当量の縮合剤、例えば1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩の存在下、化合物(III)に対し1~1.5当量好ましくは1.2当量の化合物(IV)を用いて、場合により触媒、例えば4-ジメチルアミノピリジンの存在下に行うことができる。反応終了後、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去

50

することによって目的化合物(II)を得ることができる。なお、必要であれば、カラムクロマトグラフィーなどで精製することができる。

【0041】

次いで、得られた化合物(II)から、ピリミジン環形成反応を行い、化合物(IA')へ変換する。この環化反応は、例えば、化合物(II)を水酸化ナトリウム、カリウムt-ブトキシドまたは炭酸カリウムのような塩基を用いて、封管容器中、エタノール-水溶媒中、120~140にて反応させることにより実施することができる。さらに、高沸点溶媒、例えば、メトキシエタノール中、カリウムt-ブトキシドのような塩基を用い、120~140にて反応させてもよい。反応終了後、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することによって目的化合物(IA')を得ることができる。なお、必要であれば、カラムクロマトグラフィーまたは再結晶などで精製することができる。

10

【0042】

さらに官能基の変換反応に付し、化合物(IA')からm-クロロ安息香酸やマグネシウムモノパーオキシフタレートなどの過酸を用い、ジクロロメタンまたはクロロホルム中、0から室温で反応させ、化合物(IA'')に変換することができる。

【0043】

得られた化合物(IA'')に対し、アミンをn-ブチルリチウムなどで処理したりチウムアミドを作用させることによって、化合物(IA''')に変換することができる。反応は、例えば、1,4-ジオキサソラン、テトラヒドロフランなどのエーテル類中、化合物(IA'')に対し2~5当量のアミンに、-78~0にてアミンと当量のn-ブチルリチウムを滴下し、リチウムアミドとした後、化合物(IA'')を加え反応させることにより実施することができる。反応終了後、水を加え、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することによって化合物(IA''')を得ることができる。


20

【0044】

なお、上記の反応で使用したカルボン酸成分(IV)は、例えば、以下に示す方法によって合成することができる。

【0045】

【化3】



30

【0046】

(式中、L、Y、R<sup>4</sup>およびR<sup>8</sup>は前記定義のとおりであり、Xはハロゲン原子を示す。)

【0047】

本方法を実施するには、公知方法(Chem. Pharm. Bull., 48(12), 1847-1853 (2000))に従い、化合物(XIII)から化合物(XII)を得る。この反応は、N,N-ジメチルホルムアミドなどの極性溶媒中、化合物(XIII)に対して約1当量のエタンチオールやベンゼンチオールなどのチオール類を、t-ブトシカリウムなどの塩基で処理し、室温~-30、好ましくは-30にて化合物(XIII)を作用させることにより実施することができる。反応終了後、水を加え、水と混和しない有機溶媒で抽出し、全有機物を水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することにより目的化合物(XII)を得ることができる。なお、必要であれば再結晶などで精製することができる。

40

【0048】

次いで、得られた化合物(XII)から公知方法に従って、化合物(XI)を得る。反

50

応は、例えば、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類中、化合物(XII)に対して、例えばナトリウムメチラートなどのアルコールの金属塩を少過剰加え、室温～還流温度で、化合物(XII)を加え反応させる。反応終了後、水を加え、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することによって化合物(XI)を得ることができる。なお、必要であれば再結晶などで精製することができる。

【0049】

得られた化合物(XI)は、公知方法に従って化合物(IV)へ変換される。この反応は、エステルの加水分解反応であり、多くの方法で実施することができる。例えば、メタノールなどのアルコール類、水、あるいはそれらの混合溶媒中、水酸化ナトリウムなどの塩基を用い、室温から還流温度で反応を行うことができる。反応終了後、溶媒を濃縮し、塩酸などで中和することによって、化合物(IV)が得られる。

10

【0050】

以上で説明した製造方法に基づく反応は、すべて全く一般的なものであり、これらの実施のための適当な試薬および条件は、標準的教科書および後述の実施例を参考することにより直ちに確立することができる。

【0051】

また、本発明が提供する化合物(IA)で定義されるすべての化合物を調製することのできる別法、および変法もまた、当業者であれば明らかである。


【0052】

本発明が提供する式(IB)で示される化合物は、例えば、以下に示す方法によって合成することができる。

20

【0053】

【化4】



30

40

【0054】

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  は前記定義のとおりであり、 $Y$  は水酸基またはハロゲン原子、好ましくは塩素原子である。)

【0055】

本方法を実施するには、公知方法(例えば、J. Chem. Soc., Perkin Trans. I, 1996, 1545-1552)に従い、先ず、化合物(XX)から化合物(XIX)を得る。この反応は、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素類；トルエン、ベンゼンなどの芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類、またはこれらの混合物中、0

50

～室温にて、化合物(X X)に対し2～2.5当量の水素化ナトリウム、水素化カリウムなどの水素化アルカリ金属、またはトリエチルアミンなどの3級アミンの存在下、化合物(X X)に対して1～1.5当量の化合物(X X I)を作用させることにより実施することができる。反応終了後、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することによって目的化合物(X I X)を得ることができる。必要であれば、カラムクロマトグラフィーなどで精製することができる。

【0056】

次いで、得られた化合物(X I X)から、公知方法(例えば、J. Chem. Soc., Perkin Trans. I, 1996, 1545-1552)に従って化合物(X V I I I)へ変換する。反応は、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素類；トルエン、ベンゼンなどの芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類、またはこれらの混合物中、室温～還流温度にて、化合物(X I X)に対して5～10当量のジメチル硫酸などのメチル化試薬を用いる反応で実施することができる。反応終了後、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することによって目的化合物(X V I I I)を得ることができる。なお、必要であれば、カラムクロマトグラフィーなどで精製することができる。

10

【0057】

得られた化合物(X V I I I)から、公知方法(例えば、J. Chem. Soc., Perkin Trans. I, 1996, 1545-1552)に従って、化合物(X V I)を得ることができる。この反応は、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素類；トルエン、ベンゼンなどの芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類、またはこれらの混合物中、室温～還流温度にて、化合物(X V I I I)に対し1～1.5当量の化合物(X V I I)を用いる反応で実施することができる。反応終了後、溶媒を留去することによって目的化合物(X V I)を得ることができる。なお、必要であれば、カラムクロマトグラフィーなどで精製することができる。

20

【0058】

次いで、得られた化合物(X V I)から、公知方法に従って化合物(X V)へ変換する。この反応はニトリル基の加水分解により酸アミドを合成する方法であり、多くの方法が実施することができる。例えば、水、またはエタノール、メタノールなどのアルコール類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル類、あるいはこれらの混合液中、室温～100℃にて硫酸、塩酸などの触媒を作用させることにより実施することができる。反応終了後、反応液を弱アルカリ性にし、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することによって目的の化合物(X V)を得ることができる。必要であれば再結晶などで精製することができる。

30

【0059】

得られた化合物(X V)から、公知方法に従って化合物(X I V)を得ることができる。反応は、化合物(X V)と化合物(I V)を反応させることにより、対応するアミド化合物(X I V)を得る。一般に、Yがハロゲン原子(好ましくは塩素原子)の場合には、不活性溶媒、例えばジクロロメタン中、0℃～室温にて、化合物(X V)に対し1～5当量、好ましくは約2.5当量の第3級アミン、例えばトリエチルアミン存在下、化合物(X V)に対し1～2当量、好ましくは約1.4当量の化合物(I V)を用いて、場合により触媒、例えば4-ジメチルアミノピリジンの存在下、行うことができる。また、第3級アミンの代わりに、ピリジンを溶媒として用いてもよい。

40

【0060】

また、Yが水酸基の場合には、不活性溶媒、例えばジクロロメタン中、0℃～室温にて、化合物(X V)に対し1～1.5当量、好ましくは約1.2当量の縮合剤、例えば1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩存在下、化合物(X V)に対し1～1.5当量、好ましくは約1.2当量の化合物(I V)を用いて、場合により触媒、例えば4-ジメチルアミノピリジンの存在下行うことができる。反応終了後、水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去す

50

ることによって目的化合物 (XIV) を得ることができる。

【0061】

次いで、得られた化合物 (XIV) は精製することなく次の反応に用い、ピリミジン環形成について公知の反応 (例えば、J. Med. Chem., 39 1635-1644 (1996)) により、目的とする化合物 (IB) を得ることができる。この環化反応は、例えば、化合物 (XIV) を水酸化ナトリウム、カリウム t-ブトキシドまたは炭酸カリウムのような塩基を用いて、封管容器中、エタノール-水溶媒中、120~140 にて反応させることにより行うことができる。さらに高沸点溶媒、例えば、メトキシエタノール中、カリウム t-ブトキシドのような塩基を用い120~140 にて反応させてもよい。反応終了後水と混和しない有機溶媒にて希釈した後、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、溶媒を留去することによって、目的化合物 (IB) を得ることができる。なお、必要であれば、カラムクロマトグラフィーまたは再結晶などで精製することができる。

10

【0062】

この上記した反応は、すべて全く一般的なものであり、これらの実施のための適当な試薬および条件は、標準的教科書および後述の実施例を参考することにより直ちに確立することができる。したがって、化合物 (IB) で定義されるすべての化合物を調製することができる別法および変法もまた、当業者であれば明らかである。

【実施例】

【0063】

以下に、試験例、実施例により、本発明を更に詳細に説明するが、本発明の範囲はこれらの試験例、実施例によって限定されるものではないことはいうまでもない。

20

本発明の化合物の合成およびそこで用いるための中間体を、後述する実施例で詳しく説明する。

また、実施例で製造された本発明化合物およびその中間体の化学構造およびその同定データは、実施例の後に表としてまとめて示した。

なお、実施例における各化合物は、後記する表中において対応する実施例番号として記載している。

【0064】

以下の実施例で製造された本発明化合物の PDE7 (VII型ホスホジエステラーゼ) 阻害活性は、以下に示す試験例により確認された。

30

【0065】

試験例 1 . PDE7 阻害活性測定法

PDE7 (VII型ホスホジエステラーゼ) を抑制する本発明化合物の能力を評価するために、Biochemical. Pharmacol., 48(6), 1219-1223 (1994) の方法を一部改変して、以下のアッセイを用いた。

【0066】

1) PDE7 (VII型ホスホジエステラーゼ) 活性画分を得た。すなわち、ヒト急性リンパ芽球様リンパ腫 T細胞株である MOLT-4 (ATCC から、ATCC 番号 CRL-1582 として購入できる) を、10% ウシ胎児血清を含む RPMI 1640 培地で培養し、 $5 \times 10^8$  個の MOLT4 を得た。遠心分離により細胞を回収し、10 mL の緩衝液 A (25 mM トリス-HCl、5 mM 2-メルカプトエタノール、2 mM ベンズアミジン、2 mM EDTA、0.1 mM 4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルフォニルヒドロクロリド、pH = 7.5) に懸濁した。ポリトロン (登録商標) ホモジナイザーにより細胞をホモジナイズし、遠心分離 (4、25、000 G、10 分間) 後の上清をさらに超遠心分離 (4、100、000 G、60 分間) することにより得られた上清を 0.2  $\mu$ m フィルタで濾過することにより可溶性画分を得た。

40

【0067】

2) 緩衝液 A で平衡化された HiTrap Q カラム (5 mL x 2) に、得られた可溶性画分を充填した。0 ~ 0.8 M 塩化ナトリウムの線形勾配液を含有する緩衝液 A 300 mL を用いてホスホジエステラーゼを溶離し、5 mL 分画 60 本を回収した。各分画を cA

50

M P代謝ホスホジエステラーゼ活性について検査した。各分画中 c A M Pの代謝活性を有し、かつ 10 μ Mロリブラム ( I V型ホスホジエステラーゼ選択的阻害薬 ) および 10 μ Mミルリノン ( I I I型ホスホジエステラーゼ選択的阻害薬 ) により代謝活性を消失しない分画のうち、350 mM塩化ナトリウム付近を中心とする活性ピークとして溶出される分画を集め、P D E 7阻害活性を検査するための貯蔵溶液として使用した。

【 0 0 6 8 】

3) 試験化合物は、所望の濃度を 20 mMトリス - H C l ( p H 7 . 5 )、1 mM M g C l <sub>2</sub>、100 μ M E D T A、330 μ g / m Lウシ血清アルブミン、4 μ g / m L 5' -ヌクレオチダ - ゼ、0 . 1 μ C i <sup>3</sup> H - c A M P ( 0 . 0 6 4 μ M c A M P )、10 μ Mロリブラムおよび V I I型ホスホジエステラーゼ貯蔵溶液の含有している反応混合液中で、25 2時間反応させた。反応液に 10 mMヘPes - N a ( p H = 7 . 0 ) に懸濁した Q A E - セファデックスを加え 5 分間静置した後、上清を得てさらに Q A E - セファデックスを加え 5 分間静置した後得られた上清中にある放射活性を測定した。

【 0 0 6 9 】

4) I C <sub>50</sub> は、P D E 7の代謝活性を 50% 阻害する試験化合物濃度として、各化合物について算出した。

【 0 0 7 0 】

各化合物の P D E 7阻害活性

上記測定法により測定され、ホスホジエステラーゼ 7 阻害活性の I C <sub>50</sub> 値が 0 . 1 μ M以下を確認した実施例番号の化合物を示す。

化合物 16、17、18、20、21、22、25、26、27、28、29、32、33、36、37、43、44、47、48、49

さらに、上記の測定法により得られたホスホジエステラーゼ 7 阻害活性の I C <sub>50</sub> 値の具体例を以下に示す。

化合物 26 : I C <sub>50</sub> = 0 . 0 0 2 6 μ M

化合物 32 : I C <sub>50</sub> = 0 . 0 0 3 2 μ M

【 0 0 7 1 】

上記ホスホジエステラーゼ阻害活性試験の結果、本発明によるピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体は、極めて良好な P D E 7 阻害効果を示すことが確認された。

本発明化合物は、P D E 7 に選択的な阻害剤であり、他のホスホジエステラーゼイソ酵素に対し、10 倍以上の選択性を有していた。このことから、他のイソ酵素に起因する副作用は少ないであろうことが予想された。

【 0 0 7 2 】

例として、本発明化合物の P D E 4 ( I V型ホスホジエステラーゼ ) 阻害活性は、以下に示す試験により確認された。

【 0 0 7 3 】

試験例 2 . P D E 4 阻害活性測定法

P D E 7 を抑制する本発明化合物の P D E 4 抑制を評価するために、Biochemical . P h a r m a c o l . , 48(6), 1219-1223 (1994)の方法を一部改変して、以下のアッセイを用いた。

【 0 0 7 4 】

1) P D E 4 活性画分を得た。すなわち、3匹の B a l b / c マウス ( 雌、12 週齢 ) ( 日本クレアより購入できる ) より得た肝臓を、30 mLの緩衝液 B ( 20 mMピス - トリス、5 mM 2 -メルカプトエタノール、2 mMベンズアミジン、2 mM E D T A、0 . 1 mM 4 - ( 2 -アミノエチル ) ベンゼンスルフォニルヒドロクロリド、50 mM酢酸ナトリウム、p H = 6 . 5 ) に懸濁した。ポリトロンホモジナイザーにより肝臓をホモジナイズし、遠心分離 ( 4、25, 000 G、10 分間 ) 後の上清をさらに超遠心分離 ( 4、100, 000 G、60 分間 ) することにより得られた上清を 0 . 2 μ m フィルタ - で濾過することにより、可溶性画分を得た。

【 0 0 7 5 】

2) 緩衝液 B で平衡化された 1 x 10 cm D E A E セファロースカラムに、得られた可

10

20

30

40

50

溶性画分を充填した。0.05 ~ 1 M 酢酸ナトリウムの線形勾配液を含有する緩衝液 B 120 mL を用いてホスホジエステラーゼを溶離し、5 mL 分画 24 本を回収した。各分画を cAMP 代謝ホスホジエステラーゼ活性について検査した。各分画中 cAMP の代謝活性を有し、かつ 30 μM ロリプラム (PDE 4 選択的阻害薬) により代謝活性を消失した分画のうち、620 mM 酢酸ナトリウム付近を中心とする活性ピークとして溶出される分画を集め、PDE 4 阻害活性を検査するための貯蔵溶液として使用した。

【0076】

3) 試験化合物は、所望の濃度を 20 mM トリス - HCl (pH 7.5)、1 mM MgCl<sub>2</sub>、100 μM EDTA、330 μg/mL ウシ血清アルブミン、4 μg/mL 5'-ヌクレオチダゼ、0.1 μCi <sup>3</sup>H-cAMP (0.064 μM cAMP) および PDE 4 貯蔵溶液の含有している反応混合液中で 25 ~ 2 時間反応させた。反応液に 10 mM ヘプス - Na (pH = 7.0) に懸濁した QAE - セファデックスを加え 5 分間静置した後、上清を得てさらに QAE - セファデックスを加え 5 分間静置した後得られた上清中にある放射活性を測定した。 10

【0077】

4) IC<sub>50</sub> は PDE 4 の代謝活性を 50% 阻害する試験化合物濃度として、各化合物について算出した。

上記試験の結果、本発明化合物のホスホジエステラーゼ 4 に対する IC<sub>50</sub> は、同一化合物のホスホジエステラーゼ 7 阻害作用に比べ、10 倍以上弱い阻害活性であった。

上記の測定法で得られたホスホジエステラーゼ 4 に対する IC<sub>50</sub> 値の具体例を、以下に示す。 20

化合物 26 : IC<sub>50</sub> = 1.2 μM

化合物 32 : IC<sub>50</sub> = 0.98 μM

【0078】

本発明の化合物は、PDE 7 を選択的に阻害することにより、細胞内 cAMP レベルが高まり、さらには T 細胞の活性化を阻害することによって様々なアレルギー疾患、炎症・免疫疾患に有用である。すなわち、気管支喘息、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患、アレルギー性鼻炎、乾癬、アトピー性皮膚炎、結膜炎、変形性関節症、慢性関節リウマチ、多発性硬化症、全身性エリテマトーデス、炎症性腸炎、肝炎、膵炎、脳脊髄炎、敗血症、クローン病、移植における拒絶反応、GVH 病、血管形成術後の再狭窄などに対する疾患の予防または治療剤として有用である。 30

【0079】

本発明の有効成分を医薬組成物、または PDE 7 阻害剤として使用するには、本発明の化合物を 1 種類もしくは 2 種類以上を配合して、常法にしたがって投与方法に応じた剤形に製剤して用いれば良い。例えば、経口投与には、カプセル剤、錠剤、顆粒剤、細粒剤、シロップ剤、ドライシロップ剤等の剤形が例示され、非経口投与には、注射剤の他、坐薬、膣坐薬等の坐剤、噴霧剤等の経鼻投与剤、軟膏、経皮吸収性のテープ等の経皮吸収剤が例示される。

【0080】

本発明の化合物の臨床投与量は、投与する患者の症状、重症度、年齢、合併症の有無等によって異なり、また製剤によっても異なるが、経口投与の場合は、有効成分として、通常成人 1 日当り 0.1 ~ 1000 mg、好ましくは 0.1 ~ 500 mg、より好ましくは 1 ~ 100 mg、非経口投与の場合は、経口投与の場合の 10 分の 1 量 ~ 2 分の 1 量を投与すればよい。これらの投与量は、患者の年齢、症状等により適宜増減することが可能である。 40

【0081】

更に、本発明化合物の毒性は低く、これらの化合物の安全性は高いと予想される。

【0082】

[製造例及び実施例]

次に、本発明の化合物の合成およびそこで用いるための中間体を、以下の実施例により 50

説明する。なお、以下の実施例における化合物の化学構造及び同定データを後記の表中にまとめて示した。実施例の化合物は、表中の実施例番号と対応している。

## 【0083】

## 実施例 1

2 - シクロヘキシル - 5 - メチル - 2 , 4 - ジヒドロ - 3 H - ピラゾール - 3 - オン

アセト酢酸メチル 14.5 mL (0.134 mol) とシクロヘキシルヒドラジン塩酸塩 20.2 g (0.134 mol) の混合物を 2 時間 120 で攪拌し、次いで冷却した。反応液を 4 M 水酸化ナトリウム水溶液 30 mL で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し減圧下溶媒を留去した。残渣にヘキサンを加え、析出した結晶を濾取することにより標記化合物 19.0 g (79%) を得た。

10

## 【0084】

## 実施例 2

5 - クロロ - 1 - シクロヘキシル - 3 - メチル - 4 - ニトロ - 1 H - ピラゾール

実施例 1 で得た化合物 9.3 g (51.6 mmol) にオキシ塩化リン 10 mL (107 mmol) を加え 120 で 10 時間攪拌した。次に反応液を室温にし、過剰のオキシ塩化リンを減圧下留去した。残渣に無水酢酸 45 mL を加えて溶かし、この溶液に氷冷下発煙硝酸 9 mL をゆっくりと滴下した。同温度で 2 時間攪拌した後、反応液を氷に注ぎ固体を濾取した。この固体をジクロロメタンに溶かし、炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。残渣をヘキサンから再結晶 (ヘキサン) にて精製することにより標記化合物 6.28 g (50%) を得た。また、濾液を減圧下留去して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン / 酢酸エチル = 6 / 1) にて精製することにより、標記化合物 4.21 g (33%) を得た。

20

## 【0085】

## 実施例 3

1 - シクロヘキシル - 3 - メチル - 4 - ニトロ - 1 H - ピラゾール - 5 - カルボニトリル

実施例 2 で得た化合物 10.3 g (42.4 mmol) の N, N - ジメチルホルムアミド 90 mL 溶液にシアン化ナトリウム 4.2 g (84.9 mmol) を加え、80 で 1.5 時間攪拌した。次に反応液を室温にし、水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン / 酢酸エチル = 6 / 1) にて精製し、標記化合物 9.18 g (93%) を得た。

30

## 【0086】

## 実施例 4

4 - アミノ - 1 - シクロヘキシル - 3 - メチル - 1 H - ピラゾール - 5 - カルボニトリル

実施例 3 で得た化合物 1.0 g (4.27 mmol) のメタノール 10 mL、濃塩酸 10 mL の混合懸濁液に鉄粉 1.2 g (21.4 mmol) を加え、2 時間加熱還流した。次に反応液を室温にし、炭酸水素ナトリウム水溶液で反応液を中和後セライト濾過した。濾液をジクロロメタンで抽出し、有機層を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン / 酢酸エチル = 7 / 1) にて精製し、標記化合物 0.75 g (87%) を得た。

40

## 【0087】

## 実施例 5

1 - シクロヘキシル - 3 - メチル - 4 - ニトロ - 1 H - ピラゾール - 5 - カルボキサミド

実施例 3 で得た化合物 9.0 g (38.5 mmol) のメタノール 25 mL 溶液に、30% 過酸化水素水溶液 12 mL、3 M 水酸化ナトリウム水溶液 30 mL を加え、室温で 1.5 時間攪拌した。次に反応液を水で希釈し、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去することにより、標記化合物 7.8 g (80%) を得た。

50

## 【0088】

## 実施例 6

4 - アミノ - 1 - シクロヘキシル - 3 - メチル - 1 H - ピラゾール - 5 - カルボキサミド

実施例 5 で得た化合物 7.7 g (30.6 mmol) の濃塩酸 180 mL 懸濁液に二塩化スズ 2 水和物 27.6 g (122 mmol) を加え 80 で 1.5 時間攪拌した。次に反応液を室温にし、水酸化ナトリウム水溶液で中和した後、セライト濾過した。濾液をジクロロメタンで抽出し、有機層を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル) にて精製し、標記化合物 6.05 g (89%) を得た。

## 【0089】

## 実施例 7

2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル ] ニコチン酸

メチル 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチルベンジルチオ ) ピリジン - 3 - カルボキシレート 9.25 g (31.96 mmol) のメタノール 80 mL 懸濁液に 1 N - 水酸化ナトリウム水溶液 38.36 mL (38.36 mmol) を加え 1 時間加熱還流した。次に反応液を室温に戻し、減圧下溶媒を濃縮後、水で薄め、2 N - 塩酸を加え、析出固体を集めることによって、標記化合物 8.92 g (定量的) を得た。

## 【0090】

## 実施例 8

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 7 で得た化合物 3.03 g (11 mmol) の 1, 2 - ジクロロエタン 30 mL 懸濁液に、塩化チオニル 1.60 mL (22 mmol) を加え、1.5 時間加熱還流した。次に反応液を室温にし、減圧下溶媒を留去することによって、薄黄色固体の酸クロリドを得た。

実施例 6 で得た化合物 2.22 g (10 mmol) のクロロホルム 30 mL の溶液に、室温で上記酸クロリドのクロロホルム 20 mL 溶液、トリエチルアミン 3.48 mL (25 mmol)、ジメチルアミノピリジン 5 mg を加え、一晚攪拌した。次に反応液に水を加えた後、クロロホルムで抽出し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して、薄黄色固体のアミド体を得た。

上記アミド体をメトキシエタノール 50 mL に懸濁し、カリウム t - ブトキシド 2.81 g (25 mmol) を加え、130 で 40 分間攪拌した。次に反応液を室温に戻し、減圧下溶媒を濃縮後、水で薄め、1 N - 塩酸 26 mL を加え、クロロホルムで抽出、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン / 酢酸エチル = 3 / 1) にて精製し、標記化合物 3.64 g (79%) を得た。

## 【0091】

## 実施例 9

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 8 で得た化合物 1.5 g (3.25 mmol) のジクロロメタン 40 mL 溶液に、0 で m - クロロ過安息香酸 1.54 g (7.15 mmol) を加え、2 時間攪拌した。次に反応液に飽和重曹水を加えた後、ジクロロメタンで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥、減圧下溶媒を留去して、標記化合物 1.75 g (定量的) を得た。この化合物は精製することなく次の反応に用いた。

## 【0092】

## 実施例 10

2 - [ シクロヘキシル ( ヒドロキシ ) メチレン ] マロノニトリル

10

20

30

40

50

マロノニトリル 3.96 g (0.06 mol) のテトラヒドロフラン 60 mL 溶液に、0 で水素化ナトリウム 4.8 g (60% 油状懸濁物、0.12 mol) を 4 回に分けて加え、0 で 30 分撪拌した。次にシクロヘキサンカルボン酸クロリドを滴下し、室温にて 30 分撪拌後、1 M 塩酸 150 mL をゆっくりと加え、酢酸エチルで抽出した。次に、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。残渣をジイソプロピルエーテルで再結晶を行い標記化合物 8.16 g (77%) を得た。

【0093】

#### 実施例 1 1

##### 2 - [シクロヘキシル(メトキシ)メチレン]マロノニトリル

実施例 10 で得た化合物 2.64 g (15 mmol) の 1, 4 - ジオキサン 24 mL、水 4 mL の混合溶液に、室温で炭酸水素ナトリウム 10 g を加え、さらにジメチル硫酸 10 mL を 5 分間で滴下した。85 で 2.5 時間加熱後、室温に戻し、水を加え、ジエチルエーテルで抽出し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル = 3/1) で精製し、標記化合物 2.35 (82%) を得た。

【0094】

#### 実施例 1 2 - 1

##### 5 - アミノ - 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 4 - カルボニトリル

実施例 11 で得た化合物 2.3 g (12.1 mmol) のエタノール 20 mL の溶液に、室温でメチルヒドラジン 0.643 mL (12.1 mmol) を加え、5 時間加熱還流した。室温に戻し、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/メタノール = 50/1) で精製し、標記化合物 1.48 g (60%) を得た。

【0095】

#### 実施例 1 2 - 2

##### 5 - アミノ - 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 4 - カルボニトリル

窒素気流下、マロノニトリル 17.2 g (260 mmol) のテトラヒドロフラン 260 mL 溶液に水素化ナトリウム 20.8 g (約 60% 油状懸濁物、520 mmol) を 0 でゆっくりと加えた。次に同温度でシクロヘキサンカルボニルクロリド 35 mL (260 mmol) 滴下し、滴下後反応液を室温にし 1.5 時間撪拌した。次にこの反応液にジメチル硫酸 30 mL (312 mmol) を加え、3 時間加熱還流をし、その後氷冷下でトリエチルアミン 17.4 mL (125 mmol)、メチルヒドラジン 13.8 mL (260 mmol) を加え、1 時間加熱還流した。反応液を室温にし、減圧下反応液を留去した後、残渣に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール = 30/1 ~ 20/1) で精製し、更に得られた粗結晶を再結晶(ヘキサン - 酢酸エチル)にて精製し、標記化合物 20.7 g (39%) を得た。また、母液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル = 2/1)にて精製することで、標記化合物 11.3 g (21%) を得た。

【0096】

#### 実施例 1 3

##### 5 - アミノ - 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 1 H - ピラゾール - 4 - カルボキサミド

実施例 12 で得た化合物 25.3 g (124 mmol) に氷冷下濃塩酸 75 mL を加え、室温で 15 分間撪拌して、更に 60 で 1 時間撪拌した。次に反応液を氷に注ぎ、水酸化ナトリウム水溶液で中和した後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。残渣を再結晶(酢酸エチル)にて精製し、標記化合物 20.0 g (73%) を得た。

【0097】

#### 実施例 1 4

##### 3 - シクロヘキシル - 6 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル

10

20

30

40

50

3 - シクロヘキシル - 6 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 7 で得た化合物 2.70 g ( 9.81 mmol ) の 1, 2 - ジクロロエタン 30 mL 懸濁液に、塩化チオニル 1.43 mL ( 19.6 mmol ) を加え、2 時間加熱還流した。次に反応液を室温にし、減圧下溶媒を留去することによって、薄黄色固体の酸クロリドを得た。

上記酸クロリドのピリジン 30 mL 溶液に実施例 13 で得た化合物 1.82 g ( 8.17 mmol )、ジメチルアミノピリジン 5 mg を加え、室温で 20 時間攪拌した。次に反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えた後、クロロホルムで抽出し、有機層を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去して、薄黄色固体のアミド体を得た。

上記アミド体をメトキシエタノール 50 mL に懸濁し、カリウム t - ブトキシド 2.30 g ( 20.4 mmol ) を加え、140 で 2 時間攪拌した。次に反応液を室温に戻し、減圧下溶媒を濃縮後、水で薄め、1 N - 塩酸 21 mL を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ジクロロメタン / メタノール = 100 / 1 ) にて精製し、さらにシリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ヘキサン / 酢酸エチル = 2 / 1 ) にて精製し、さらに酢酸エチルから再結晶することにより、標記化合物 1.12 g ( 30% ) を得た。

【0098】

実施例 15

3 - シクロヘキシル - 6 - { 2 - メトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 9 において実施例 8 で得た化合物に代えて、実施例 14 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 1.02 g ( 87% ) を得た。

【0099】

実施例 16

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 - ピペラジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

N - メチルピペラジン 134  $\mu$ L ( 1.22 mmol ) のテトラヒドロフラン 5 mL 溶液に、-30 で n - ブチルリチウムのヘキサン溶液 779  $\mu$ L ( 1.56 M ヘキサン溶液、1.22 mmol ) を滴下し、同温度で、15 分間で攪拌した。次に、実施例 9 で得た化合物を -30 で加え、15 分間で攪拌した。水を加え、室温に戻し、酢酸エチルで抽出し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ジクロロメタン / メタノール = 30 / 1 ) で精製し、標記化合物 123 mg ( 93% ) を得た。

【0100】

実施例 17

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - モルフォリニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 16 において N - メチルピペラジンに代えて、モルホリンを用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 72 mg ( 56% ) を得た。

【0101】

実施例 18

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 , 4 - ジアゼパン - 1 - イル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 16 において N - メチルピペラジンに代えて、N - メチルホモピペラジンを用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 16 mg ( 12% ) を得た。

【 0 1 0 2 】

実施例 19

1 - シクロヘキシル - 5 - ( 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ) - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 6 で得た化合物 200 mg ( 0.90 mmol ) のジクロロメタン 3 mL 溶液に、2 - メトキシニコチン酸 165 mg ( 1.08 mmol )、1 - エチル - 3 - ( 3 - ジメチルアミノプロピル ) カルボジイミド塩酸塩 207 mg ( 1.08 mmol ) を加え、室温で一晩攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣にエタノール 6 mL、水酸化ナトリウム水溶液 3 mL を加え、9 時間加熱還流した。反応液を室温に冷却後、水で希釈し、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ヘキサン / 酢酸エチル = 2 / 1 ) にて精製し、さらに酢酸エチル - ヘキサンの混合溶媒から再結晶することにより標記化合物 78 mg ( 26% ) を得た。

10

【 0 1 0 3 】

実施例 20

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 - ピペラジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 16 において実施例 9 で得た化合物に代えて、実施例 15 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 86 mg ( 65% ) を得た。

20

【 0 1 0 4 】

実施例 21

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - モルフォリニル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 16 において N - メチルピペラジンに代えて、モルホリンを用い、実施例 9 で得た化合物の代わりに、実施例 15 で得た化合物も用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 58 mg ( 45% ) を得た。

30

【 0 1 0 5 】

実施例 22

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 , 4 - ジアゼパン - 1 - イル ) - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 16 において N - メチルピペラジンに代えて、N - メチルホモピペラジンを用い、実施例 9 で得た化合物の代わりに、実施例 15 で得た化合物も用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 115 mg ( 84% ) を得た。

40

【 0 1 0 6 】

実施例 23

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 6 - ( 1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカ - 8 - イル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 16 において N - メチルピペラジンに代えて、1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 , 5 ] デカンを用い、実施例 9 で得た化合物の代わりに、実施例 15 で得た化合物も用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 776 mg ( 定量的 ) を得た。

【 0 1 0 7 】

実施例 24

50

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - オキソ - 1 - ピペリジニル ) - 3 -  
- ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミ  
ジン - 4 - オン

実施例 2 3 で得た化合物 7 4 3 m g ( 1 . 5 5 m m o l ) のアセトン 3 0 m L、水 3 m L 混合懸濁液に p - トルエンスルホン酸一水和物 3 5 3 m g ( 1 . 8 6 m m o l ) を加え、5 時間加熱還流した。次に反応液を室温に戻し、溶媒を減圧下留去した。残渣に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣を酢酸エチル - エタノール混合溶媒から再結晶することにより、標記化合物 4 0 5 m g ( 9 3 % ) を得た。

【 0 1 0 8 】

10

実施例 2 5

3 - シクロヘキシル - 6 - [ 6 - ( 4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ  
- 3 - ピリジニル ] - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピ  
リミジン - 4 - オン

実施例 2 4 で得た化合物 1 2 0 m g ( 0 . 2 8 m m o l ) のメタノール 3 m L 懸濁液に、水素化ホウ素ナトリウム 1 2 . 5 m g ( 0 . 3 3 m m o l ) を加え、室温で 2 . 5 時間攪拌した。次に反応液にアセトンを加え、減圧下溶媒を留去した。残渣に水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ジクロロメタン / 酢酸エチル = 2 / 1 ~ 1 / 2 ) にて精製し、得られた粗結晶をエタノールから再結晶することにより、標記化合物 8 5 m g ( 7 0 % ) を得た。

20

【 0 1 0 9 】

実施例 2 6

3 - シクロヘキシル - 6 - { 2 - メトキシ - 6 - [ 4 - ( メチルアミノ ) - 1 - ピペリジ  
ニル ] - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 -  
d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 2 4 で得た化合物 1 2 0 m g ( 0 . 2 8 m m o l ) の 1 , 2 - ジクロロエタン 2 m L 懸濁液にメチルアミン 5 7 μ M ( 3 0 % エタノール溶液、0 . 5 5 m m o l )、酢酸 1 0 μ M および水素化トリアセトキシホウ素ナトリウム 8 7 m g ( 0 . 4 1 m m o l ) を加え、室温で 2 時間攪拌した。次に反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をアルカリ性シリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ジクロロメタン / 酢酸エチル / メタノール = 1 0 / 1 0 / 1 ) にて精製し、得た粗結晶を酢酸エチル - ヘキサン混合溶媒から再結晶することにより、標記化合物 8 7 m g ( 7 0 % ) を得た。

30

【 0 1 1 0 】

実施例 2 7

3 - シクロヘキシル - 6 - { 6 - [ 4 - ( ジメチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 2 -  
メトキシ - 3 - ピリジニル } - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4  
- d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 2 6 においてメチルアミンに代えて、ジメチルアミンを用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 1 0 3 m g ( 8 0 % ) を得た。

40

【 0 1 1 1 】

実施例 2 8

6 - [ 6 - ( 4 - アミノ - 1 - ピペリジニル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 -  
シクロヘキシル - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミ  
ジン - 4 - オン

実施例 2 4 で得た化合物 2 4 0 m g ( 0 . 5 5 m m o l ) に 4 M アンモニアエタノール溶液 1 0 m L、5 % パラジウム - 炭素 2 4 m g を加え、水素置換し、2 4 時間室温、常圧で攪拌した。反応液をセライト濾過し、濾液を減圧下留去した。残渣をアルカリ性シリカ

50

ゲルカラムクロマトグラフィー（ジクロロメタン / 酢酸エチル / メタノール = 10 / 10 / 1）にて精製し、得られた粗結晶をエタノールから再結晶することにより、標記化合物 169 mg（70%）を得た。

【0112】

実施例 29

N - { 1 - [ 5 - ( 3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 4 - オキソ - 4 , 5 - ジヒドロ - 1 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 6 - イル ) - 6 - メトキシ - 2 - ピリジニル ] - 4 - ピペリジニル } アセタミド

実施例 28 で得た化合物 80 mg（0.18 mmol）のジクロロメタン 2 mL 溶液に無水酢酸 21  $\mu$ L（0.22 mmol）、トリエチルアミン 38  $\mu$ L（0.28 mmol）を加え、室温で 1.5 時間攪拌した。次に反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をエタノールから再結晶することにより、標記化合物 79 mg（90%）を得た。

10

【0113】

実施例 30

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 6 - ( 1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカ - 8 - イル ) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 16 において N - メチルピペラジンに代えて、1, 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカンを用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 588 mg（86%）を得た。

20

【0114】

実施例 31

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - オキソ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 24 において、実施例 23 で得た化合物に代えて実施例 30 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 255 mg（50%）を得た。

【0115】

実施例 32

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - メトキシ - 6 - [ 4 - ( メチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 26 において、実施例 24 で得た化合物に代えて実施例 31 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 68 mg（55%）を得た。

30

【0116】

実施例 33

1 - シクロヘキシル - 5 - { 6 - [ 4 - ( ジメチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 26 において、実施例 24 で得た化合物に代えて実施例 31 で得た化合物を、メチルアミンに代えてジメチルアミンを用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 102 mg（94%）を得た。

40

【0117】

実施例 34

3 - シクロヘキシル - 6 - ( 2 - メトキシ - 6 - スルファニル - 3 - ピリジニル ) - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [ 3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 15 で得た化合物 230 mg（0.47 mmol）のメタノール 5 mL 懸濁液に水酸化ナトリウム 100 mg を加え、4 時間加熱還流した。冷後、反応液に 1 M 塩酸水溶

50

液を加え、析出した固体を濾取した。得られた個体をシリカゲルカラムクロマトグラフィ（ジクロロメタン/メタノール = 20/1）にて精製し、標記化合物 132 mg (76%) を得た。

【0118】

実施例 35

5 - (3 - シクロヘキシル - 1 - メチル - 4 - オキソ - 4 , 5 - ジヒドロ - 1 H ピラゾロ [3 , 4 - d ] ピリミジン - 6 - イル) - 6 - メトキシ - 2 - ピリジンスルホニル クロリド

実施例 34 で得た化合物 120 mg (0.32 mmol) のアセトニトリル 3 mL 懸濁液に硝酸カリウム 82 mg (0.81 mmol) を加え、0 下塩化スルフルル 65 μL (0.81 mmol) を加え、室温で 2 時間攪拌した。次に、反応液に氷水を加え、析出した不溶物を濾取することにより、標記化合物 114 mg (81%) を得た。

10

【0119】

実施例 36

3 - シクロヘキシル - 6 - {2 - メトキシ - 6 - [(4 - メチル - 1 , 4 - ジアゼパン - 1 - イル)スルホニル] - 3 - ピリジニル} - 1 - メチル - 1 , 5 - ジヒドロ - 4 H - ピラゾロ [3 , 4 - d ] ピリミジン - 4 - オン

実施例 35 で得た化合物 104 mg (0.24 mmol) のジクロロメタン 2 mL 溶液に N - メチルホモピペラジン 35 μL (0.29 mmol)、トリエチルアミン 83 μL (0.59 mmol) を加え、室温で 1 時間攪拌した。次に反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をアルカリ性シリカゲルカラムクロマトグラフィ（酢酸エチル）にて精製し、得た粗結晶を酢酸エチル - ヘキサンから再結晶することにより、標記化合物 68 mg (56%) を得た。

20

【0120】

実施例 37

1 - シクロヘキシル - 5 - [6 - (4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジニル) - 2 - メトキシ - 3 - ピリジニル] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 25 において、実施例 24 で得た化合物に代えて実施例 31 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 73 mg (60%) を得た。

30

【0121】

実施例 38

1 - シクロヘキシル - 5 - {2 - メトキシ - 6 - [(4 - メチルフェニル)スルフィニル] - 3 - ピリジニル} - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 8 で得た化合物 1.5 g (3.25 mmol) のジクロロメタン 30 mL 溶液に、0 で m - クロロ過安息香酸 701 mg (3.25 mmol) を加え、40 分攪拌した。次に反応液に飽和重曹水を加えた後、ジクロロメタンで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥、減圧下溶媒を留去して、2 - ブタノンで再結晶することによって、標記化合物 1.0 g (64%) を得た。

40

【0122】

実施例 39

エチル 2 - エトキシ - 6 - [(4 - メチルフェニル)スルファニル]ニコチン酸

p - トルエンチオール 11.5 g (92.4 mmol) の N , N - ジメチルホルムアミド 55 mL 溶液に、0 でカリウム t - ブトキシド 10.8 g (96.0 mmol) を加え、室温で 15 分攪拌した。上記溶液を -30 としたエチル 2 , 6 - ジクロロニコチン酸 19.56 g (88.9 mmol) の N , N - ジメチルホルムアミド 150 mL 溶液に 15 分かけて滴下し、同温度で 1 時間攪拌した。次に反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチル/ヘキサン = 2/1 混合液で抽出し、有機層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリ

50

ウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去することにより、淡褐色油状物質のエチル 2 - クロロ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル ] ニコチン酸中間体を得た。

【 0 1 2 3 】

上記中間体のテトラヒドロフラン 1 8 0 m L 溶液に 2 0 % ナトリウムエトキシドのエタノール溶液 3 1 . 4 g ( 9 2 . 4 m m o l ) を加え、2 時間加熱還流した。反応液を室温に冷却し、濾過した後、濾液を減圧下留去した。残渣をクロロホルムで希釈し、有機層を水、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ヘキサン / 酢酸エチル = 5 / 1 ) にて精製し、標記化合物 2 3 . 4 g ( 8 3 % ) を得た。

【 0 1 2 4 】

実施例 4 0

2 - エトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル ] ニコチン酸

実施例 7 においてメチル 2 - メトキシ - 6 - ( 4 - メチルベンジルチオ ) ピリジン - 3 - カルボキシレートに代えて、実施例 3 9 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 2 0 . 1 6 g ( 9 7 % ) を得た。

【 0 1 2 5 】

実施例 4 1

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - エトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルファニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ]  
ピリミジン - 7 - オン

実施例 4 0 で得た化合物 3 . 1 8 g ( 1 1 m m o l ) の 1 , 2 - ジクロロエタン 3 0 m L 懸濁液に、塩化チオニル 1 . 6 0 m L ( 2 2 m m o l ) を加え、2 時間加熱還流した。次に反応液を室温にし、減圧下溶媒を留去することによって、薄黄色固体の酸クロリドを得た。

上記酸クロリドのジクロロメタン 3 0 m L 溶液に、0 でトリエチルアミン 3 . 4 8 m L ( 2 5 m m o l )、実施例 6 で得た化合物 2 . 2 2 g ( 1 0 m m o l )、さらにジクロロメタン 5 0 m L を加え、室温で 2 時間攪拌した。次に反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えた後、クロロホルムで抽出し、水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去することにより、中間体であるアミド体を得た。

【 0 1 2 6 】

上記アミド体をエタノール 1 0 0 m L に懸濁し、カリウム t - ブトキシド 2 . 8 1 g ( 2 5 m m o l ) を加え、1 4 時間加熱還流した。次に反応液を室温にし、減圧下溶媒を留去後、水で希釈し、2 N - 塩酸 2 0 m L を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ( ジクロロメタン / ヘキサン / 酢酸エチル = 1 0 / 2 0 / 1 ~ 1 0 / 1 0 / 1 ) にて精製し、標記化合物 3 . 4 8 g ( 7 3 % ) を得た。

【 0 1 2 7 】

実施例 4 2

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - エトキシ - 6 - [ ( 4 - メチルフェニル ) スルホニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ]  
ピリミジン - 7 - オン

実施例 9 において実施例 8 で得た化合物に代えて、実施例 4 1 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 2 . 9 7 g ( 9 3 % ) を得た。

【 0 1 2 8 】

実施例 4 3

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 - ピペラジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ]  
ピリミジン - 7 - オン

実施例 1 6 において実施例 9 で得た化合物に代えて、実施例 4 2 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 1 3 1 m g ( 9 8 % ) を得た。

10

20

30

40

50

【0129】

実施例 4 4

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - メチル - 1 , 4 - ジアゼパン - 1 - イル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 1 6 において N - メチルピペラジンに代えて、N - メチルホモピペラジンをを用い、実施例 9 で得た化合物に代えて、実施例 4 2 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 1 2 8 m g ( 9 3 % ) を得た。

【0130】

実施例 4 5

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 6 - ( 1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカ - 8 - イル ) - 2 - エトキシ - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 1 6 において N - メチルピペラジンに代えて、1 , 4 - ジオキサ - 8 - アザスピロ [ 4 . 5 ] デカンを用い、実施例 9 で得た化合物に代えて、実施例 4 2 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 9 3 4 m g ( 9 6 % ) を得た。

【0131】

実施例 4 6

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - オキソ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 2 4 において実施例 2 3 で得た化合物に代えて、実施例 4 5 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 7 9 1 m g ( 9 7 % ) を得た。

【0132】

実施例 4 7

1 - シクロヘキシル - 5 - { 6 - [ 4 - ( ジメチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 2 - エトキシ - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 2 6 においてメチルアミンに代えて、ジメチルアミンを用い、実施例 2 4 で得た化合物に代えて、実施例 4 6 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 1 2 2 m g ( 8 6 % ) を得た。

【0133】

実施例 4 8

1 - シクロヘキシル - 5 - { 2 - エトキシ - 6 - [ 4 - ( メチルアミノ ) - 1 - ピペリジニル ] - 3 - ピリジニル } - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 2 6 において実施例 2 4 で得た化合物に代えて、実施例 4 6 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 1 0 3 m g ( 8 3 % ) を得た。

【0134】

実施例 4 9

1 - シクロヘキシル - 5 - [ 2 - エトキシ - 6 - ( 4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジニル ) - 3 - ピリジニル ] - 3 - メチル - 1 , 6 - ジヒドロ - 7 H - ピラゾロ [ 4 , 3 - d ] ピリミジン - 7 - オン

実施例 2 5 において実施例 2 4 で得た化合物に代えて、実施例 4 6 で得た化合物を用いた他は同様に反応を行い、標記化合物 9 2 m g ( 7 6 % ) を得た。

【0135】

上記実施例で、製造された化合物の化学構造およびその同定データは、以下の表にまとめて示した。

【0136】





10

20

30

40

【表 1】

実施例 番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+) <sup>+</sup>
1		無色固体 147.6-150.4	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.36(1H, m), 1.39-1.52(2H, m), 1.71-1.98(7H, m), 2.09(3H, s), 3.20(2H, s), 3.95-4.02(1H, m)	181
2		無色固体 104.8-105.2 (ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.50(3H, m), 1.70-1.79(1H, m), 1.88-2.01(6H, m), 2.54(3H, s), 4.23-4.33(1H, m)	244
3		無色固体 109.0-110.2 (ヘキサン-酢酸 エチル)	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.37(1H, m), 1.39-1.54(2H, m), 1.72-1.82(1H, m), 1.91-2.10(6H, m), 2.58(3H, s), 4.32-4.43(1H, m)	235
4		淡黄色固体 85.5-87.0 (ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.18-1.31(1H, m), 1.32-1.48(2H, m), 1.66-1.75(1H, m), 1.79-2.03(6H, m), 2.16(3H, s), 3.33(2H, brs), 4.02-4.14(1H, m)	205

10





20

30

40





【 0 1 3 7 】

【表 2】

実施例番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+) <sup>+</sup>
5		無色固体 148.1-149.0 (酢酸エチル- ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.19-1.48(3H, m), 1.64-1.77(1H, m), 1.84-2.07(6H, m), 2.52(3H, s), 4.41-4.54(1H, m), 6.04(1H, brs), 6.77(1H, brs)	253
6		無色固体 193-194 (酢酸エチル)	CDCl <sub>3</sub> 1.18-1.31(1H, m), 1.38-1.52(2H, m), 1.63-1.74(1H, m), 1.79-2.01(6H, m), 2.21(3H, s), 2.80(2H, s), 5.18-5.29(1H, m)	223
7		無色固体 174-175	CDCl <sub>3</sub> 2.41(3H, s), 4.03(3H, s), 6.58(1H, d, J=8.1Hz), 7.26-7.31(2H, m), 7.46-7.51(2H, m), 8.14(1H, d, J=8.1Hz)	276
8		無色固体 165-168	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.35(1H, m), 1.40-1.52(2H, m), 1.65-1.74(1H, m), 1.83-2.06(6H, m), 2.41(3H, s), 2.47(3H, s), 4.02(3H, s), 4.95-5.05(1H, m), 6.64(1H, d, J=8.3Hz), 7.23-7.27(2H, m), 7.47-7.51(2H, m), 8.56(1H, d, J=8.3Hz), 10.72(1H, brs)	462

【 0 1 3 8 】

【表 3】

実施例番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
9		無色固体 213-215	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.34(1H, m), 1.40-1.53(2H, m), 1.67-1.75(1H, m), 1.83-2.06(6H, m), 2.43(3H, s), 2.53(3H, s), 4.11(3H, s), 4.95-5.05(1H, m), 7.31-7.36(2H, m), 7.91-7.97(3H, m), 8.99(1H, d, J=8.0Hz), 10.63(1H, brs)	494
10		微黄固体 124-129 (ジイソプロピル エーテル)	CDCl <sub>3</sub> 1.12-1.41(3H, m), 1.45-1.58(2H, m), 1.68-1.89(5H, m), 2.77-2.86(1H, m)	177
11		微黄固体 58-59	CDCl <sub>3</sub> 1.12-1.51(5H, m), 1.66-1.85(5H, m), 2.77-2.86(1H, m), 4.34(1H, s)	191
12		無色固体 139-141	CDCl <sub>3</sub> 1.20-1.41(3H, m), 1.48-1.62(2H, m), 1.65-1.73(1H, m), 1.77-1.85(2H, m), 1.88-1.97(2H, m), 2.57-2.66(1H, m), 3.58(3H, s), 4.13(2H, br-s)	205





10

20

30

40

【表 4】

実施例番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
13		無色固体 172-173.5	CDCl <sub>3</sub> 1.20-1.40(3H, m), 1.52-1.66(2H, m), 1.71-1.78(1H, m), 1.83-1.92(2H, m), 1.98-2.06(2H, m), 2.54-2.63(1H, m), 3.56(3H, s), 5.30(2H, br-s), 5.41(2H, br-s)	223
14		無色固体 181-183 (酢酸エチル)	CDCl <sub>3</sub> 1.27-1.49(3H, m), 1.67-1.87(5H, m), 1.94-2.02(2H, m), 2.41(3H, s), 3.01-3.12(1H, m), 3.90(3H, s), 4.02(3H, s), 6.65(1H, d, J=8.2Hz), 7.22-7.29(2H, m), 7.47-7.53(2H, m), 8.58(1H, d, J=8.2Hz), 10.62(1H, brs)	462
15		無色固体 215-216.5	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.50(3H, m), 1.66-1.88(5H, m), 1.93-2.04(2H, m), 2.44(3H, s), 3.01-3.11(1H, m), 3.97(3H, s), 4.11(3H, s), 7.31-7.39(2H, m), 7.91-8.00(3H, m), 9.41(1H, d, J=7.9Hz), 10.50(1H, brs)	494
16		微黄色固体 213-215	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.36(1H, m), 1.41-1.59(2H, m), 1.67-1.76(1H, m), 1.84-2.09(6H, m), 2.35(3H, s), 2.48-2.55(7H, s), 3.65-3.70(4H, m), 4.09(3H, s), 4.95-5.05(1H, m), 6.34(1H, d, J=8.7Hz), 8.58(1H, d, J=8.7Hz), 10.81(1H, brs)	438

10

20

30

40

【表 5】

実施例番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+) <sup>+</sup>
17		無色固体 220-223	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.35(1H, m), 1.41-1.57(2H, m), 1.67-1.75(1H, m), 1.84-2.08(6H, m), 2.52(3H, s), 3.59-3.64(4H, s), 3.80-3.85(4H, m), 4.09(3H, s), 4.95-5.05(1H, m), 6.34(1H, d, J=8.7Hz), 8.61(1H, d, J=8.7Hz), 10.80(1H, brs)	425
18		無色固体 135-138	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.36(1H, m), 1.41-1.57(2H, m), 1.67-1.75(1H, m), 1.84-2.07(8H, m), 2.39(3H, s), 2.51(3H, s), 2.54-2.59(2H, s), 2.70-2.75(2H, m), 3.65-3.72(2H, m), 3.81-3.88(2H, m), 4.08(3H, s), 4.94-5.04(1H, m), 6.23(1H, d, J=8.7Hz), 8.55(1H, d, J=8.7Hz), 10.82(1H, brs)	452
19		無色固体 172-174 (酢酸エチル- ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.38(1H, m), 1.44-1.58(2H, m), 1.68-1.79(1H, m), 1.85-2.09(6H, m), 2.55(3H, s), 4.19(3H, s), 4.98-5.09(1H, m), 7.13(1H, dd, J=4.9 and 7.7Hz), 8.31(1H, dd, J=1.9 and 4.9Hz), 8.83(1H, dd, J=1.9 and 7.7Hz), 10.86(1H, brs)	340
20		無色固体 229.5-232 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.26-1.51(3H, m), 1.68-1.87(5H, m), 1.95-2.03(2H, m), 2.35(3H, s), 2.46-2.54(4H, m), 3.01-3.11(1H, m), 3.64-3.74(4H, m), 3.92(3H, s), 4.09(3H, s), 6.35(1H, d, J=8.8Hz), 8.59(1H, d, J=8.8Hz), 10.65(1H, brs)	438





10

20

30

40

【表 6】

実施例番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
21		緑黄色固体 251.5-255 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.26-1.51(3H, m), 1.69-1.88(5H, m), 1.96-2.04(2H, m), 3.01-3.11(1H, m), 3.60-3.69(4H, m), 3.78-3.86(4H, m), 3.92(3H, s), 4.09(3H, s), 6.34(1H, d, J=8.7Hz), 8.62(1H, d, J=8.7Hz), 10.64(1H, brs)	425
22		無色固体 179.5-180.5	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.51(3H, m), 1.68-1.87(5H, m), 1.96-2.09(4H, m), 2.39(3H, s), 2.52-2.61(2H, m), 2.69-2.79(2H, m), 3.01-3.11(1H, m), 3.63-3.77(2H, m), 3.80-3.96(2H, m), 3.91(3H, s), 4.08(3H, s), 6.24(1H, d, J=8.7Hz), 8.57(1H, d, J=8.7Hz), 10.65(1H, brs)	452
23		無色固体 232.5-234	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.50(3H, m), 1.69-1.89(9H, m), 1.95-2.05(2H, m), 3.01-3.11(1H, m), 3.73-3.83(4H, m), 3.92(3H, s), 4.00(4H, s), 4.08(3H, s), 6.39(1H, d, J=8.9Hz), 8.58(1H, d, J=8.9Hz), 10.65(1H, brs)	481
24		無色固体 284-286 (酢酸エチル- エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.51(3H, m), 1.68-1.88(5H, m), 1.96-2.05(2H, m), 2.53-2.62(4H, m), 3.01-3.11(1H, m), 3.93(3H, s), 3.98-4.07(4H, m), 4.12(3H, s), 6.45(1H, d, J=8.8Hz), 8.66(1H, d, J=8.8Hz), 10.62(1H, brs)	437





10

20

30

40

【表 7】

実施例番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
25		無色固体 205-206.5 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.50(3H, m), 1.53-1.65(2H, m), 1.69-1.88(5H, m), 1.94-2.04(4H, m), 3.00-3.10(1H, m), 3.30-3.40(2H, m), 3.92(3H, s), 3.94-4.03(1H, m), 4.06-4.17(2H, m), 4.09(3H, s), 6.38(1H, d, J=8.8Hz), 8.58(1H, d, J=8.8Hz), 10.65(1H, brs)	439
26		無色固体 202-203.5 (酢酸エチル- ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.63(5H, m), 1.68-1.87(5H, m), 1.93-2.03(4H, m), 2.47(3H, s), 2.60-2.71(1H, m), 3.00-3.13(3H, m), 3.91(3H, s), 4.08(3H, s), 4.29-4.39(2H, m), 6.36(1H, d, J=8.8Hz), 8.57(1H, d, J=8.8Hz), 10.66(1H, brs)	452
27		無色固体 178.5-180 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.58(5H, m), 1.68-1.88(5H, m), 1.90-2.03(4H, m), 2.30(6H, s), 2.38-2.48(1H, m), 2.91-3.11(3H, m), 3.91(3H, s), 4.08(3H, s), 4.40-4.50(2H, m), 6.36(1H, d, J=8.8Hz), 8.57(1H, d, J=8.8Hz), 10.65(1H, brs)	466
28		無色固体 206-208.5 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.27-1.66(5H, m), 1.69-1.87(5H, m), 1.90-2.04(4H, m), 2.93-3.11(4H, m), 3.92(3H, s), 4.03(3H, s), 4.31-4.40(2H, m), 6.37(1H, d, J=8.8Hz), 8.57(1H, d, J=8.8Hz), 10.65(1H, brs)	438

10





20

30

40

【 0 1 4 3 】

## 【 表 8 】

実施例 番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
29		無色固体 253.5-255.5 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.24-1.50(5H, m), 1.69-1.88(5H, m), 1.94-2.11(4H, m), 1.98(3H, s), 3.01-3.15(3H, m), 3.92(3H, s), 4.01-4.14(1H, m), 4.08(3H, s), 4.33-4.42(2H, m), 5.30-5.39(1H, m), 6.37(1H, d, J=8.8Hz), 8.58(1H, d, J=8.8Hz), 10.63(1H, brs)	480
30		微黄色固体 230-232	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.36(1H, m), 1.41-1.56(2H, m), 1.65-1.80(5H, m), 1.84-2.06(6H, m), 2.51(3H, s), 3.75-3.80(4H, m), 4.00(4H, s), 4.08(3H, s), 4.94-5.04(1H, m), 6.38(1H, d, J=8.8Hz), 8.57(1H, d, J=8.8Hz), 10.81(1H, brs)	481
31		無色固体 277-278 (酢酸エチル-エ タノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.36(1H, m), 1.42-1.56(2H, m), 1.69-1.77(1H, m), 1.85-2.10(6H, m), 2.52(3H, s), 2.55-2.61(4H, m), 3.97-4.03(4H, m), 4.12(3H, s), 4.94-5.04(1H, m), 6.45(1H, d, J=8.7Hz), 8.66(1H, d, J=8.7Hz), 10.77(1H, brs)	437
32		無色固体 185-189 (酢酸エチル-ジ イソプロピル エーテル)	CDCl <sub>3</sub> 1.20-1.42(5H, m), 1.66-1.74(1H, m), 1.83-2.06(8H, m), 2.47(3H, s), 2.51(3H, s), 2.60-2.69(1H, m), 3.00-3.09(2H, m), 4.08(3H, s), 4.28-4.36(2H, m), 4.94-5.04(1H, m), 6.36(1H, d, J=8.8Hz), 8.56(1H, d, J=8.8Hz), 10.82(1H, brs)	452





10

20

30

40

【表 9】

実施例 番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
33		無色固体 230-231 (エタノール-酢 酸エチル)	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.36(1H, m), 1.42-1.58(4H, m), 1.66-1.75(1H, m), 1.83-2.08(8H, m), 2.30(6H, s), 2.36-2.46(1H, m), 2.51(3H, s), 2.89-2.99(2H, m), 4.08(3H, s), 4.39-4.48(2H, m), 4.95-5.05(1H, m), 6.36(1H, d, J=8.8Hz), 8.56(1H, d, J=8.8Hz), 10.82(1H, brs)	466
34		無色固体 184(分解)	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.51(3H, m), 1.69-1.91(5H, m), 1.98-2.09(2H, m), 3.03-3.17(1H, m), 3.96(3H, s), 4.15(1H, s), 4.17(3H, s), 7.02(1H, d, J=8.1Hz), 8.65(1H, d, J=8.1Hz), 10.62(1H, brs)	372
35		淡黄色固体 229-232	CDCl <sub>3</sub> 1.28-1.52(3H, m), 1.68-1.90(5H, m), 1.98-2.06(2H, m), 3.04-3.15(1H, m), 3.99(3H, s), 4.33(3H, s), 7.87(1H, d, J=7.8Hz), 9.12(1H, d, J=7.8Hz), 10.54(1H, brs)	438
36		淡黄色固体 153.5-155.5 (酢酸エチル- ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.51(3H, m), 1.60-2.04(9H, m), 2.37(3H, s), 2.61-2.72(4H, m), 3.02-3.15(1H, m), 3.53-3.67(4H, m), 3.98(3H, s), 4.22(3H, s), 7.74(1H, d, J=7.8Hz), 9.00(1H, d, J=7.8Hz), 10.56(1H, brs)	516





10

20

30

40

【表 10】

実施例 番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
37		無色固体 217-220	CDCl <sub>3</sub> 1.20-1.35(1H, m), 1.42-1.64(4H, m), 1.68-1.75(1H, m), 1.83-2.08(8H, m), 2.51(3H, s), 3.27-3.35(2H, m), 3.94-4.02(1H, m), 4.09(3H, s), 4.08-4.17(2H, m), 4.94-5.04(1H, m), 6.38(1H, d, J=8.8Hz), 8.57(1H, d, J=8.8Hz), 10.81(1H, brs)	439
38		無色結晶 231-233 (2-ブタノン)	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.34(1H, m), 1.41-1.57(2H, m), 1.69-1.76(1H, m), 1.85-2.06(6H, m), 2.37(3H, s), 2.52(3H, s), 4.11(3H, s), 4.95-5.06(1H, m), 7.27(2H, d, J=8.1Hz), 7.67(2H, d, J=8.1Hz), 7.84(1H, d, J=8.0Hz), 8.96(1H, d, J=8.0Hz), 10.59(1H, brs)	478
39		淡黄色油状物 質	CDCl <sub>3</sub> 1.30(3H, t, J=7.1Hz), 1.32(3H, t, J=7.1Hz), 2.39(3H, s), 4.29(2H, q, J=7.1Hz), 4.32(2H, q, J=7.1Hz), 6.42(1H, d, J=8.1Hz), 7.19-7.29(2H, m), 7.43-7.52(2H, m), 7.91(1H, d, J=8.1Hz)	318
40		無色固体 136.5-140	CDCl <sub>3</sub> 1.38(3H, t, J=7.1Hz), 2.41(3H, s), 4.49(2H, q, J=7.1Hz), 6.58(1H, d, J=8.1Hz), 7.22-7.30(2H, m), 7.43-7.50(2H, m), 8.14(1H, d, J=8.1Hz)	290





10

20

30

40

【表 1 1】

実施例番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
41		無色固体 190-191 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.20-1.35(1H, m), 1.39-1.52(2H, m), 1.42(3H, t, J=7.1Hz), 1.66-1.76(1H, m), 1.83-2.09(6H, m), 2.41(3H, s), 2.49(3H, s), 4.64(2H, q, J=7.1Hz), 4.92-5.02(1H, m), 6.63(1H, d, J=8.2Hz), 7.20-7.28(2H, m), 7.46-7.51(2H, m), 8.57(1H, d, J=8.2Hz), 10.93(1H, brs)	476
42		淡黄色固体 229-230 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.36(1H, m), 1.40-1.52(2H, m), 1.46(3H, t, J=7.1Hz), 1.69-1.75(1H, m), 1.86-2.08(6H, m), 2.43(3H, s), 2.53(3H, s), 4.57(2H, q, J=7.1Hz), 4.94-5.03(1H, m), 7.31-7.38(2H, m), 7.9-7.99(3H, m), 9.00(1H, d, J=8.1Hz), 10.78(1H, brs)	508
43		無色固体 162.5-163.5 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.35(1H, m), 1.40-1.57(2H, m), 1.53(3H, t, J=7.1Hz), 1.67-1.75(1H, m), 1.83-2.09(6H, m), 2.34(3H, s), 2.45-2.57(4H, m), 2.51(3H, s), 3.60-3.71(4H, m), 4.56(2H, q, J=7.1Hz), 4.93-5.05(1H, m), 6.34(1H, d, J=8.8Hz), 8.59(1H, d, J=8.8Hz), 11.02(1H, brs)	452
44		無色固体 151-152 (酢酸エチル〜ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.36(1H, m), 1.40-1.58(2H, m), 1.52(3H, t, J=7.1Hz), 1.61-1.78(1H, m), 1.82-2.09(8H, m), 2.38(3H, s), 2.51(3H, s), 2.54-2.51(2H, s), 2.69-2.77(2H, m), 3.62-3.73(2H, m), 3.80-3.91(2H, m), 4.54(2H, q, J=7.1Hz), 4.92-5.06(1H, m), 6.22(1H, d, J=8.9Hz), 8.56(1H, d, J=8.9Hz), 11.02(1H, brs)	466

10

20

30

40

【表 12】

実施例 番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
45		無色固体 166-167	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.38(1H, m), 1.41-1.56(2H, m), 1.52(3H, t, J=7.1Hz), 1.68-1.79(5H, m), 1.84-2.09(6H, m), 2.51(3H, s), 3.71-3.81(4H, m), 4.00(4H, s), 4.55(2H, q, J=7.1Hz), 4.92-5.04(1H, m), 6.38(1H, d, J=8.8Hz), 8.57(1H, d, J=8.8Hz), 11.01(1H, brs)	495
46		無色固体 220-221 (酢酸エチル)	CDCl <sub>3</sub> 1.21-1.36(1H, m), 1.40-1.59(2H, m), 1.55(3H, t, J=7.1Hz), 1.67-1.79(1H, m), 1.84-2.10(6H, m), 2.52(3H, s), 2.53-2.61(4H, m), 3.94-4.04(4H, m), 4.38(2H, q, J=7.1Hz), 4.91-5.03(1H, m), 6.45(1H, d, J=8.7Hz), 8.66(1H, d, J=8.7Hz), 10.97(1H, brs)	451
47		無色固体 186-186.5 (エタノール)	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.39(1H, m), 1.41-1.59(4H, m), 1.54(3H, t, J=7.1Hz), 1.68-1.77(1H, m), 1.85-2.10(8H, m), 2.31(6H, s), 2.35-2.49(1H, m), 2.53(3H, s), 2.89-3.00(2H, m), 4.38-4.49(2H, m), 4.57(2H, q, J=7.1Hz), 4.97-5.08(1H, m), 6.37(1H, d, J=8.8Hz), 8.58(1H, d, J=8.8Hz), 11.03(1H, brs)	480
48		無色固体 155-156.5 (酢酸エチル→ヘキサン)	CDCl <sub>3</sub> 1.22-1.62(5H, m), 1.54(3H, t, J=7.1Hz), 1.69-1.78(1H, m), 1.86-2.10(8H, m), 2.48(3H, s), 2.53(3H, s), 2.61-2.70(1H, m), 3.00-3.10(2H, m), 4.27-4.38(2H, m), 4.57(2H, q, J=7.1Hz), 4.96-5.08(1H, m), 6.37(1H, d, J=8.8Hz), 8.58(1H, d, J=8.8Hz), 11.04(1H, brs)	466

10

20

30

40

【表 1 3】

実施例 番号	化学構造	性状 融点(°C) (再結晶溶媒)	<sup>1</sup> H-NMR	MS(FAB) (M+1) <sup>+</sup>
49		無色固体 198-199 (エタノール)	CDCI <sub>3</sub> 1.22-1.37(1H, m), 1.41-1.65(4H, m), 1.54(3H, t, J=7.1Hz), 1.68-1.78(1H, m), 1.86-2.10(8H, m), 2.53(3H, s), 3.26-3.37(2H, m), 3.94-4.03(1H, m), 4.07-4.16(2H, m), 4.57(2H, q, J=7.1Hz), 4.94-5.05(1H, m), 6.38(1H, d, J=8.8Hz), 8.59(1H, d, J=8.8Hz), 11.03(1H, brs)	453

10

20

30

40

## 【産業上の利用可能性】

## 【0149】

本発明のピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体は、PDE7を選択的に阻害する作用を有し、これによって、細胞内cAMPレベルが高まり、さらにはT細胞の活性化を阻害することによって、様々なアレルギー疾患、炎症・免疫疾患の予防および治療に有用である。

また、本発明のピリジニルピラゾロピリミジノン誘導体はPDE7を選択的に阻害するため、他のPDEに対する影響が少なく、医薬として使用した場合の副作用の低減が期待

50

される。

## 【 国際調査報告 】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/JP2004/008643

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C07D487/04 C07D519/00 A61K31/519 A61P29/00 A61P37/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C07D A61K A61P		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BEILSTEIN Data, CHEM ABS Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 1 176 147 A (PFIZER LTD ; PFIZER (US)) 30 January 2002 (2002-01-30) examples	1-9
Y	EP 1 092 720 A (PFIZER LTD ; PFIZER (US)) 18 April 2001 (2001-04-18) page 1 - page 6	1-9
Y	EP 0 995 750 A (PFIZER LTD ; PFIZER (US)) 26 April 2000 (2000-04-26) claims	1-9
Y	US 5 541 187 A (BACON EDWARD R ET AL) 30 July 1996 (1996-07-30) column 4; tables	1-9
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 15 September 2004		Date of mailing of the international search report 22/09/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5816 Patentplan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Fazzi, R

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/JP2004/008643

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1176147	A	30-01-2002	AU 754962 B2 28-11-2002
			AU 5767201 A 31-01-2002
			AU 7547900 A 23-04-2001
			BG 106568 A 29-12-2002
			BR 0014695 A 18-06-2002
			BR 0103072 A 09-04-2002
			CA 2354175 A1 28-01-2002
			CA 2387353 A1 19-04-2001
			CN 1378547 T 06-11-2002
			CN 1335317 A 13-02-2002
			CZ 20012713 A3 17-04-2002
			CZ 20021151 A3 12-03-2003
			EE 200200192 A 16-06-2003
			EP 1222190 A1 17-07-2002
			EP 1176147 A1 30-01-2002
			HU 0103075 A2 29-07-2002
			HU 0203438 A2 28-01-2003
			WO 0127112 A1 19-04-2001
			JP 2002105076 A 10-04-2002
			JP 2003511452 T 25-03-2003
			NO 20021695 A 07-06-2002
			NZ 517324 A 26-09-2003
			PL 348935 A1 11-02-2002
			PL 357522 A1 26-07-2004
			RU 2224759 C2 27-02-2004
			SK 4562002 A3 01-04-2003
			TR 200200954 T2 23-09-2002
			US 6756373 B1 29-06-2004
			US 2002038024 A1 28-03-2002
			ZA 200106161 A 27-01-2003
EP 1092720	A	18-04-2001	AU 6543600 A 12-04-2001
			BG 104840 A 31-10-2001
			BR 0004787 A 22-05-2001
			CA 2322995 A1 11-04-2001
			CN 1292379 A 25-04-2001
			CZ 20003754 A3 12-06-2002
			EA 3145 B1 27-02-2003
			EE 200000537 A 15-06-2001
			EG 22775 A 31-08-2003
			EP 1092720 A2 18-04-2001
			HR 20000674 A1 31-08-2001
			HU 0003979 A2 28-12-2001
			ID 27539 A 12-04-2001
			JP 2001114783 A 24-04-2001
			MA 25867 A1 01-10-2003
			NO 20005104 A 17-04-2001
			NZ 507431 A 27-09-2002
			OA 11495 A 05-05-2004
			PL 343140 A1 23-04-2001
			SG 97950 A1 20-08-2003
SK 15052000 A3 09-01-2003			
TR 200002959 A2 23-07-2001			
ZA 200005581 A 11-04-2002			
EP 0995750	A	26-04-2000	AT 250063 T 15-10-2003
			AU 5995699 A 15-05-2000
			BR 9905877 A 12-09-2000

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/JP2004/008643

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0995750	A	BR 9915532 A	14-08-2001
		CA 2287552 A1	23-04-2000
		CA 2347950 A1	04-05-2000
		DE 69911448 D1	23-10-2003
		DE 69911448 T2	08-04-2004
		DK 1123296 T3	08-12-2003
		EP 0995750 A1	26-04-2000
		EP 1123296 A1	16-08-2001
		ES 2205945 T3	01-05-2004
		WO 0024745 A1	04-05-2000
		JP 2000128883 A	09-05-2000
		JP 2002528456 T	03-09-2002
		PT 1123296 T	31-12-2003
		US 6670366 B1	30-12-2003
US 5541187	A	30-07-1996	US 5294612 A
			15-03-1994

## フロントページの続き

(51) Int.Cl.		F I	テーマコード(参考)
<b>A 6 1 P 11/00</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 11/00	
<b>A 6 1 P 11/06</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 11/06	
<b>A 6 1 P 31/04</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 31/04	
<b>A 6 1 P 17/00</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 17/00	
<b>A 6 1 P 19/02</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 19/02	
<b>A 6 1 P 1/16</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 1/16	
<b>A 6 1 P 1/18</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 1/18	
<b>A 6 1 P 37/08</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 37/08	
<b>A 6 1 P 37/06</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 37/06	
<b>A 6 1 P 27/16</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 27/16	
<b>A 6 1 P 27/14</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 27/14	
<b>C 0 7 D 487/04</b>	<b>(2006.01)</b>	C 0 7 D 487/04	1 4 3
<b>A 6 1 P 43/00</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 P 43/00	1 1 1
<b>C 0 7 D 213/80</b>	<b>(2006.01)</b>	C 0 7 D 213/80	
<b>A 6 1 K 31/519</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 K 31/519	
<b>A 6 1 K 31/44</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 K 31/44	
<b>A 6 1 K 31/415</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 K 31/415	
<b>A 6 1 K 31/4152</b>	<b>(2006.01)</b>	A 6 1 K 31/4152	

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

Fターム(参考) 4C055 AA01 BA03 BA43 BA48 BB03 BB04 CA02 CA57 CB19 DA01  
 4C086 AA01 AA03 BC19 BC36 CB06 MA01 MA04 NA14 ZA01 ZA33  
 ZA34 ZA36 ZA59 ZA66 ZA68 ZA75 ZA89 ZA96 ZB01 ZB08  
 ZB11 ZB13 ZB15 ZB35