



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本 (11)證書號數：TW I812438 B

(45)公告日：中華民國 112(2023)年 08 月 11 日

(21)申請案號：111132669

(22)申請日：中華民國 103(2014)年 12 月 25 日

(51)Int. Cl. : A61K47/68 (2017.01)

C07K16/30 (2006.01)

A61K39/395 (2006.01)

A61K31/4745 (2006.01)

C07D491/22 (2006.01)

A61P35/00 (2006.01)

(30)優先權：2013/12/25 日本

2013-267548

(71)申請人：日商第一三共股份有限公司 (日本) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

(JP)

日本

北海道公立大學法人札幌醫科大學 (日本) SAPPORO MEDICAL UNIVERSITY

(JP)

日本

(72)發明人：我妻利紀 AGATSUMA, TOSHINORI (JP)；高橋秀 TAKAHASHI, SHU (JP)；長谷川淳 HASEGAWA, JUN (JP)；岡嶽大祐 OKAJIMA, DAISUKE (JP)；濱田洋文 HAMADA, HIROFUMI (JP)；山口美樹 YAMAGUCHI, MIKI (JP)

(74)代理人：王彥評；賴碧宏

(56)參考文獻：

US 7041818B2

US 2011/0293513A1

US 2012/0121615A1

審查人員：張茜毓

申請專利範圍項數：9 項 圖式數：27 共 243 頁

(54)名稱

抗體-藥物結合物之用途

(57)摘要

抗腫瘤效果及安全性面優異、具有優異治療效果的抗腫瘤藥之提供。

提供一種抗 TROP2 抗體，其包含：於其重鏈可變區之序列識別號 23 之胺基酸序列所構成的 CDRH1、序列識別號 24 之胺基酸序列所構成的 CDRH2 及序列識別號 25 之胺基酸序列所構成的 CDRH3；及於其輕鏈可變區之序列識別號 26 之胺基酸序列所構成的 CDRL1、序列識別號 27 之胺基酸序列所構成的 CDRL2 及序列識別號 28 之胺基酸序列所構成的 CDRL3。



I812438

## 【發明摘要】

### 【中文發明名稱】

抗體 - 藥物結合物之用途

### 【英文發明名稱】

USE OF ANTIBODY DRUG CONJUGATE

### 【中文】

抗腫瘤效果及安全性面優異、具有優異治療效果的抗腫瘤藥之提供。

提供一種抗 TROP2 抗體，其包含：於其重鏈可變區之序列識別號 23 之胺基酸序列所構成的 CDRH1、序列識別號 24 之胺基酸序列所構成的 CDRH2 及序列識別號 25 之胺基酸序列所構成的 CDRH3；及於其輕鏈可變區之序列識別號 26 之胺基酸序列所構成的 CDRL1、序列識別號 27 之胺基酸序列所構成的 CDRL2 及序列識別號 28 之胺基酸序列所構成的 CDRL3。

### 【指定代表圖】

無。

### 【代表圖之符號簡單說明】

無。

### 【特徵化學式】

無。

## 【發明說明書】

### 【中文發明名稱】

抗體-藥物結合物之用途

### 【英文發明名稱】

USE OF ANTIBODY DRUG CONJUGATE

### 【技術領域】


**【0001】**本發明係關於使抗 TROP2 抗體與抗腫瘤性藥物藉由連接物(linker)結構部分而結合之有用於作為抗腫瘤藥的抗體-藥物結合物。

### 【先前技術】

**【0002】**使與於癌細胞表面表現且可於細胞中內在化的抗原結合的抗體與具有細胞毒性的藥物結合的抗體-藥物結合物(Antibody-Drug Conjugate；ADC)，因可選擇性地將藥物送達至癌細胞，可期待藥物蓄積於癌細胞內、使癌細胞消滅(參照非專利文獻 1~3)。作為 ADC，例如有使抗 CD33 抗體與卡奇黴素(calicheamicin)結合的 Mylotarg(註冊商標；gemtuzumab ozogamicin)被認可作為急性骨髓性白血病之治療藥。又，抗 CD30 抗體與奧利司他汀 E(auristatin E)結合的 Adcetris(註冊商標；brentuximab vedotin)最近已被認可作為何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin's lymphoma)與未分化大細胞淋巴瘤之治療藥(參照非專利文獻 4)。迄今被認可的 ADC 所含有的藥物係以 DNA 或微管蛋白(tubulin)作為標的。

**【0003】**就抗腫瘤性之低分子化合物而言，已知有抑制拓樸異構酶 I(topoisomerase I)而表現抗腫瘤作用的化合物的喜樹鹼(camptothecin)衍生物。其中下式

【 0004 】



【 0005 】 所 示 的 抗 腫 瘤 性 化 合 物 (依 喜 替 康 (exatecan) , 化 學 名 : (1S,9S)-1- 胺 基 -9- 乙 基 -5- 氟 -2,3- 二 氢 -9- 細 基 -4- 甲 基 -1H,12H- 苯 并 [de] 啓 哌 并 [3',4':6,7] 呃 啐 并 [1,2-b] 噻 吡 -10,13(9H,15H)- 二 酮 ) 係 水 溶 性 之 喜 樹 鹼 衍 生 物 (專 利 文 獻 1 、 2) 。 此 化 合 物 係 與 現 在 臨 床 上 使 用 的 愛 萊 諾 迪 肯 (irinotecan) 相 異 , 抗 腫 瘤 效 果 的 表 現 不 需 要 酵 素 所 致 之 活 性 化 。 又 , 愛 萊 諾 迪 肯 之 藥 效 本 體 的 SN-38 , 較 相 同 於 臨 床 上 使 用 的 拓 樸 替 康 (topotecan) 有 更 強 的 拓 樸 異 構 酶 I 抑 制 活 性 , 活 體 外 對 各 種 癌 細 胞 具 有 更 強 的 殺 細 胞 活 性 。 尤 其 藉 由 P- 糖 蛋 白 之 表 現 , 亦 對 於 對 SN-38 等 顯 示 耐 性 的 癌 細 胞 有 有 效 果 。 又 , 小 鼠 之 人 類 腫 瘤 皮 下 移 植 模 式 中 亦 呈 現 強 的 抗 腫 瘤 效 果 , 雖 然 已 進 行 臨 床 試 驗 , 但 迄 今 尚 未 上 市 (參 照 非 專 利 文 獻 5~10) 。 依 喜 替 康 作 為 ADC 是 否 有 效 地 作 用 係 不 清 楚 。

【 0006 】 DE-310 係 於 生 物 分 解 性 之 羥 基 甲 基 葡 聚 糖 多 元 醇 聚 合 物 上 與 依 喜 替 康 介 隔 GGFG 胜 肽 間 隔 物 而 結 合 的 複 合 體 (專 利 文 獻 3) 。 將 依 喜 替 康 藉 由 高 分 子 前 藥

化，使保持高血中滯留性，進一步利用腫瘤新生血管之通透性的亢進及腫瘤組織滯留性，被動地提高對腫瘤部位的指向性。DE-310 係藉由酵素所致的勝肽間隔物之切斷，活性本體的依喜替康、及甘胺酸與胺基結合的依喜替康為持續地游離，其結果為藥物動態被改善。於非臨床試驗中的各種腫瘤之評價模式，儘管 DE-310 係其中所含的依喜替康之總量較依喜替康單劑投予時更為減少，但較單劑投予時顯示更高的有效性。與 DE-310 有關之臨床試驗被實施而有效例亦被確認，已有確認活性本體較正常組織更集積於腫瘤的報告，另一方面，亦有 DE-310 及活性本體對人類中的腫瘤之集積與對正常組織之集積有很大差異，於人類未見被動標的的報告(參照非專利文獻 11~14)。結果為 DE-310 亦未上市，依喜替康是否有效地發揮作為此種指向標的之藥物的作用則尚不清楚。

**【0007】**作為 DE-310 之關連化合物，將 -NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-C(=O)- 所示的結構部分插入 -GGFG- 間隔物與依喜替康之間，將 -GGFG-NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-C(=O)- 作為間隔物結構的複合體雖亦已知(專利文獻 4)，但相同複合體之抗腫瘤效果則完全未知。

**【0008】**人類 TROP2(TACSTD2：腫瘤相關鈣訊號傳導蛋白 2 (tumor-associated calcium signal transducer 2), GA733-1, EGP-1, M1S1；以下標記為 hTROP2)係由 323 個胺基酸殘基所構成的 1 次跨膜型之 1 型細胞膜蛋白

質。自以前，人類滋養層細胞(trophoblasts)與癌細胞共通的與免疫抵抗性有關的細胞膜蛋白質之存在(非專利文獻 15)雖已被暗示，但由抗人類絨毛癌細胞株之細胞膜蛋白質的單株抗體(162-25.3, 162-46.2)辨識的抗原分子被特定，且作為人類滋養層細胞表現的分子之一者，被命名為 TROP2(非專利文獻 16)。之後，相同分子被其他研究者發現，亦稱為藉由將胃癌細胞株免疫而獲得的小鼠單株抗體 GA733 所辨識的腫瘤抗原 GA733-1(非專利文獻 17)、藉由非小細胞肺癌細胞免疫而獲得的小鼠單株抗體 RS7-3G11 所辨識的上皮糖蛋白質(EGP-1；非專利文獻 18)，但於 1995 年 TROP2 基因被選殖，確認此等為相同分子(非專利文獻 19)。hTROP2 之 DNA 序列及胺基酸序列已被公開於公眾資料庫，例如，可參考 NM\_002353、NP\_002344(NCBI)等之登錄號。

hTROP2 基因係與具有約 50% 之同源性的人類 Trop-1(EpCAM, EGP-2, TACSTD1)一起構成 TACSTD 基因家族(非專利文獻 21)。hTROP2 蛋白質係包含 N 末端 26 胺基酸殘基所構成的訊息序列、248 胺基酸殘基所構成的細胞外區域、23 胺基酸殘基所構成的跨膜區域(transmembrane domain)、26 胺基酸殘基所構成的細胞內區域。細胞外區域上有 4 個 N 結合型糖鏈附加部位，已知表觀分子量係較理論計算值 35 仟道爾頓增加 10 仟道爾頓左右(非專利文獻 19)。

迄今 hTROP2 之生理學上的配位體尚未被鑑定，分子機能並不清楚，但於腫瘤細胞傳達鈣訊號已被呈現

(非專利文獻 20)，又藉由為  $\text{Ca}^{2+}$  依賴性激酶的蛋白質激酶 C 而細胞內絲氨酸 303 殘基被磷酸化(非專利文獻 18)，由於細胞內區域具有  $\text{PIP}_2$  結合序列，暗示有腫瘤細胞中的訊息傳達機能(非專利文獻 22)。

藉由使用臨床檢體的免疫組織化學解析，hTROP2 係於各種上皮細胞癌種類過度表現，且於正常組織僅於一些組織之上皮細胞中表現，其表現量與腫瘤組織相比較亦呈現低值(非專利文獻 23~27)。又 hTrop2 之表現於大腸癌(非專利文獻 23)、胃癌(非專利文獻 24)、胰臟癌(非專利文獻 25)、口腔癌(非專利文獻 26)、神經膠瘤(非專利文獻 27)亦被報告與預後不良有關。

再者由使用大腸癌細胞的模式，亦已報告 hTROP2 之表現與腫瘤細胞之錨定非依賴性細胞增殖及免疫不全小鼠中的腫瘤形成有關(非專利文獻 28)。

**【0009】**由暗示與此等癌症之關連性的情報，迄今已建立複數個抗 hTROP2 抗體，且其抗腫瘤效果已被檢討。其中除了未結合化的抗體單獨呈現於裸鼠異種移植模式中的抗腫瘤活性(專利文獻 5~8)之外，作為抗體與抗細胞藥劑之 ADC 而呈現抗腫瘤活性者(專利文獻 9~12)等已被揭示。然而，彼等之活性強度或適用範圍尚未充分，hTROP2 作為治療標的存有未滿足的醫療需求(unmet medical needs)。

[先前技術文獻]

[專利文獻]

**【0010】**

專利文獻 1 特開平 5-59061 號公報  
 專利文獻 2 特開平 8-337584 號公報  
 專利文獻 3 國際公開第 1997/46260 號  
 專利文獻 4 國際公開第 2000/25825 號  
 專利文獻 5 國際公開第 2008/144891 號  
 專利文獻 6 國際公開第 2011/145744 號  
 專利文獻 7 國際公開第 2011/155579 號  
 專利文獻 8 國際公開第 2013/077458 號  
 專利文獻 9 國際公開第 2003/074566 號  
 專利文獻 10 國際公開第 2011/068845 號  
 專利文獻 11 國際公開第 2013/068946 號  
 專利文獻 12 美國專利第 7999083 號說明書

[非專利文獻]

**【0011】**

非專利文獻 1 Ducry, L., et al., Bioconjugate Chem. (2010) 21, 5-13.

非專利文獻 2 Alley, S. C., et al., Current Opinion in Chemical Biology (2010) 14, 529-537.

非專利文獻 3 Damle N.K., Expert Opin. Biol. Ther. (2004) 4, 1445-1452.

非專利文獻 4 Senter P. D., et al., Nature Biotechnology (2012) 30, 631-637.

非專利文獻 5 Kumazawa, E., Tohgo, A., Exp. Opin. Invest. Drugs (1998) 7, 625-632.

非專利文献 6 Mitsui, I., et al., Jpn J. Cancer Res. (1995) 86, 776-786.

非專利文献 7 Takiguchi, S., et al., Jpn J. Cancer Res. (1997) 88, 760-769.

非專利文献 8 Joto, N. et al., Int J Cancer (1997) 72, 680-686.

非專利文献 9 Kumazawa, E. et al., Cancer Chemother. Pharmacol. (1998) 42, 210-220.

非專利文献 10 De Jager, R., et al., Ann N Y Acad Sci (2000) 922, 260-273.

非專利文献 11 Inoue, K. et al., Polymer Drugs in the Clinical Stage, Edited by Maeda et al. (2003) 145-153.

非專利文献 12 Kumazawa, E. et al., Cancer Sci (2004) 95, 168-175.

非專利文献 13 Soopenberg, O. et al., Clinical Cancer Research, (2005) 11, 703-711.

非專利文献 14 Wente M. N. et al., Investigational New Drugs (2005) 23, 339-347.

非專利文献 15 Faulk WP, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 75(4), 1947-1951 (1978).

非專利文献 16 Lipinski M, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 78(8), 5147-5150 (1981).

非專利文献 17 Linnenbach A J, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 86(1), 27-31 (1989).

非專利文獻 18 Basu A, et al., Int. J. Cancer, 62(4), 472-479 (1995).

非專利文獻 19 Fornaro M, et al., Int. J. Cancer, 62(5), 610-618 (1995).

非專利文獻 20 Ripani E, et al., Int. J. Cancer, 76(5), 671-676 (1998).

非專利文獻 21 Calabrese G, et al., Cell Genet., 92(1-2), 164-165 (2001).

非專利文獻 22 El Sewedy T, et al., Int. J. Cancer, 75(2), 324-330 (1998).

非專利文獻 23 Ohmachi T, et al., Clin. Cancer Res., 12(10), 3057-3063 (2006).

非專利文獻 24 Muhlmann G, et al., J. Clin. Pathol., 62(2), 152-158 (2009).

非專利文獻 25 Fong D, et al., Br. J. Cancer, 99(8), 1290-1295 (2008).

非專利文獻 26 Fong D, et al., Mod. Pathol., 21(2), 186-191 (2008).

非專利文獻 27 Ning S, et al., Neurol. Sci., 34(10), 1745-1750 (2013).

非專利文獻 28 Wang J, et al., Mol. Cancer Ther., 7(2), 280-285 (2008).

## 【發明內容】

### [發明概要]

### [解決課題之手段]

【0012】於抗體所致的腫瘤治療，亦有觀察到即使抗體辨識抗原而與腫瘤細胞結合，抗腫瘤效果亦不充分的情形，有需要更高效果的抗腫瘤抗體的情形。又，於抗腫瘤性之低分子化合物，即使抗腫瘤效果優異，大多具有副作用或毒性面等之安全性上之問題，更提高安全性而獲得更優異的治療效果係成為課題。即，本發明之課題係提供抗腫瘤效果及安全性面向為優異之獲得具有優異治療效果的抗腫瘤藥。


#### [用以解決課題之手段]

【0013】本發明者們認為達成下列效果為可能的，抗 TROP2 抗體係可以腫瘤細胞為標的的抗體，即因係具有可辨識腫瘤細胞的特性、可與腫瘤細胞結合的特性、或可於腫瘤細胞中內在化的特性等的抗體，藉由將抗腫瘤性化合物依喜替康介隔連接物結構部分而變換為與相同抗體結合的抗體-藥物結合物，可獲得利用相同抗體的細胞毒性，又使抗腫瘤性化合物藉由腫瘤細胞而確實地移動而可使該化合物之抗腫瘤效果於腫瘤細胞特異性地發揮，因此抗腫瘤效果之確實發揮的同時，抗腫瘤性化合物之投予量亦可較該化合物之單體投予時更為減少，進一步藉由此等而使抗腫瘤性化合物對正常細胞的影響緩和，即藉由此等而可達成較高安全性。

因此，本發明者們創造特定結構之連接物，成功獲得介隔此連接物而使抗 TROP2 抗體與依喜替康結合的抗體-藥物結合物，發現該結合物發揮優異的抗腫瘤效果，遂而完成本發明。

【0014】即，本發明係關於：

[1]一種抗體-藥物結合物，其特徵為其係下式



所示的抗腫瘤性化合物與抗 TROP2 抗體，介隔下式：

$-\text{L}^1-\text{L}^2-\text{L}^{\text{P}}-\text{NH}-(\text{CH}_2)^{\text{n}^1}-\text{L}^{\text{a}}-(\text{CH}_2)^{\text{n}^2}-\text{C}(=\text{O})-$  所示的結構之連接物，藉由使存在於抗 TROP2 抗體之鉸鏈區 (hinge region) 的雙硫鍵部分形成的硫醚鍵而結合。

【0015】其中，抗 TROP2 抗體係於  $\text{L}^1$  之末端結合，抗腫瘤性化合物係將第 1 位之胺基之氮原子作為結合部位，與  $-(\text{CH}_2)^{\text{n}^2}-\text{C}(=\text{O})-$  部分之羰基結合。

式中， $\text{n}^1$  表示 0 至 6 之整數，

$\text{n}^2$  表示 0 至 5 之整數，

$\text{L}^1$  表示  $-(\text{琥珀醯亞胺}-3-\text{基}-\text{N})-(\text{CH}_2)^{\text{n}^3}-\text{C}(=\text{O})-$ ，

其中， $\text{n}^3$  表示 2 至 8 之整數，


$\text{L}^2$  表示  $-\text{NH}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O})^{\text{n}^4}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-C}(=\text{O})-$  或單鍵，

其中， $\text{n}^4$  表示 1 至 6 之整數，

$\text{L}^{\text{P}}$  表示 2 至 7 個之胺基酸所構成的勝肽殘基，

$\text{L}^{\text{a}}$  表示  $-\text{O}-$  或單鍵，

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-係下式所示的結構：



其第3位與抗TROP2抗體結合，第1位之氮原子上與含此的連接物結構內之亞甲基鍵結。

【0016】再者，本發明係關於以下各者。

[2]如[1]記載之抗體-藥物結合物，其中L<sup>P</sup>之勝肽殘基係選自包含苯丙氨酸、甘氨酸、纈氨酸、離氨酸、瓜氨酸、絲氨酸、麩氨酸、天冬氨酸之胺基酸的勝肽殘基。

[3]如[1]或[2]記載之抗體-藥物結合物，其中L<sup>P</sup>係選自以下之群組的勝肽殘基：

- GGF-、
- DGGF-、
- (D-)D-GGF-、
- EGGF-、
- GGFG-、
- SGGF-、
- KGGF-、
- DGFGG-、
- GGFGG-、
- DDGGFG-、
- KDGGFG-、及

-GGFGGGF-；

其中『(D-)D』係表示D-天冬胺酸。

[4]如[1]或[2]記載之抗體-藥物結合物，其中L<sup>P</sup>係由4個胺基酸所構成的胜肽殘基。

[5]如[1]至[4]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中L<sup>P</sup>係四胜肽殘基之-GGFG-。

【0017】[6]如[1]至[5]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中n<sup>3</sup>係2至5之整數，L<sup>2</sup>係單鍵。

[7]如[1]至[5]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中n<sup>3</sup>係2至5之整數，L<sup>2</sup>係-NH-(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O)n<sup>4</sup>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-，n<sup>4</sup>係2或4。

[8]如[1]至[7]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中-NH-(CH<sub>2</sub>)n<sup>1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)n<sup>2</sup>-C(=O)-係具有4至7原子之鏈長的部分結構。

[9]如[1]至[7]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中-NH-(CH<sub>2</sub>)n<sup>1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)n<sup>2</sup>-C(=O)-係具有5或6原子之鏈長的部分結構。

[10]如[1]至[9]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中-NH-(CH<sub>2</sub>)n<sup>1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)n<sup>2</sup>-C(=O)-係

-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、或

-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-。


[11] 如 [1] 至 [9] 中任一項記載之抗體 - 藥物結合物，其中  $-NH-(CH_2)^n-L^a-(CH_2)^n-C(=O)-$  係  
 $-NH-CH_2CH_2CH_2-C(=O)-$ 、  
 $-NH-CH_2-O-CH_2-C(=O)-$  或  
 $-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-C(=O)-$ 。

【0018】[12] 如 [1] 至 [9] 中任一項記載之抗體 - 藥物結合物，其中使  $-L^1-L^2-L^p-NH-(CH_2)^n-L^a-(CH_2)^n-C(=O)-$  與藥物結合的藥物 - 連接物結構部分係選自下列群組的 1 種之藥物 - 連接物結構：

- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、


-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

【0019】其中，-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-係下式所示的結構：



以其第3位與抗TROP2抗體結合，於第1位之氮原子上與含其之連接物結構內的亞甲基結合。

-(NH-DX)係表示下式：



所示的第 1 位之胺基之氮原子成為結合部位的基。

-GGFG- 表示 -Gly-Gly-Phe-Gly- 之四胜肽殘基。

【0020】[13]如 [1] 至 [9] 中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中使  $-L^1-L^2-L^P-NH-(CH_2)n^1-L^a-(CH_2)n^2-C(=O)-$  與藥物結合的藥物-連接物結構部分係選自下列群組的 1 種之藥物-連接物結構：


- (琥珀醯亞胺-3-基-N)- $CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2-O-CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)- $CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)- $CH_2CH_2-C(=O)-NH-CH_2CH_2-O-CH_2CH_2-O-CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 。

【0021】其中，-(琥珀醯亞胺-3-基-N)、-(NH-DX)、及-GGFG-係如上述。

【0022】[14]一種抗體-藥物結合物，其特徵為使下式所示的抗腫瘤性化合物



與抗 TROP2 抗體，介隔下式：

-L<sup>1</sup>-L<sup>2</sup>-L<sup>P</sup>-NH-(CH<sub>2</sub>)n<sup>1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)n<sup>2</sup>-C(=O)-所示的結構之連接物，介隔於抗 TROP2 抗體之鉸鏈區存在的雙硫鍵部分所形成的硫醚鍵而結合。

其中，抗 TROP2 抗體係於 L<sup>1</sup> 之末端結合，抗腫瘤性化合物係與 -(CH<sub>2</sub>)n<sup>2</sup>-C(=O)-部分之羧基結合。

式中，n<sup>1</sup> 表示 0 至 6 之整數，

n<sup>2</sup> 表示 0 至 5 之整數，

L<sup>1</sup> 表示 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-(CH<sub>2</sub>)n<sup>3</sup>-C(=O)-，

其中，n<sup>3</sup> 表示 2 至 8 之整數，


L<sup>2</sup> 表示 -NH-(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O)n<sup>4</sup>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-或單鍵，

其中，n<sup>4</sup> 表示 1 至 6 之整數，

L<sup>P</sup> 表示 -GGFG- 之四勝肽殘基，

L<sup>a</sup> 表示 -O- 或單鍵，

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-係下式所示的結構：



其第 3 位與抗 TROP2 抗體結合，第 1 位之氮原子上與含其的連接物結構內之亞甲基結合。

【0023】[15]如 [14]記載之抗體-藥物結合物，其中 n<sup>1</sup> 係 3，n<sup>2</sup> 係 0，n<sup>3</sup> 係 2，L<sup>2</sup> 係 -NH-(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O)n<sup>4</sup>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-，n<sup>4</sup> 係 2，L<sup>a</sup> 係單鍵，或 n<sup>1</sup> 為 1，n<sup>2</sup> 為 1，n<sup>3</sup> 為 5，L<sup>2</sup> 為單鍵，L<sup>a</sup> 為 -O-，或

$n^1$  為 2， $n^2$  為 1， $n^3$  為 5， $L^2$  為單鍵， $L^a$  為 -O-。

[16]如[14]或[15]記載之抗體-藥物結合物，其中 $n^3$ 為2或5，且 $L^2$ 為單鍵。

[17]如[14]或[15]記載之抗體-藥物結合物，其中 $n^3$ 為2或5，且 $L^2$ 為-NH-(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O)n<sup>4</sup>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-， $n^4$ 係2或4。

[18]如[14]至[17]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中-NH-(CH<sub>2</sub>)n<sup>1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)n<sup>2</sup>-C(=O)-係-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、或-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-。

【0024】[19]如[14]至[18]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中使-L<sup>1</sup>-L<sup>2</sup>-L<sup>p</sup>-NH-(CH<sub>2</sub>)n<sup>1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)n<sup>2</sup>-C(=O)-與藥物結合的藥物-連接物結構部分係選自下列群組的1種之藥物-連接物結構：

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、


-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、


-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)；

【0025】其中，-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-係下式所示的結構：



其第3位與抗TROP2抗體結合，第1位之氮原子上與含其的連接物結構內之亞甲基結合。

-(NH-DX)係表示下式：



所示的第 1 位之胺基之氮原子成為結合部位的基。

-GGFG- 表示 -Gly-Gly-Phe-Gly- 之四胜肽殘基。

**【0026】** [20]如 [14]至 [18]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中使  $-L^1-L^2-L^P-NH-(CH_2)^{n^1}-L^a-(CH_2)^{n^2}-C(=O)-$  與藥物結合的藥物-連接物結構部分係選自下列群組的 1 種之藥物-連接物結構：

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)- $CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2-O-CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)- $CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)- $CH_2CH_2-C(=O)-NH-CH_2CH_2-O-CH_2CH_2-O-CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 。

其中，- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-、-(NH-DX) 及 -GGFG- 係如上述。

**【0027】** [21]如 [1]至 [20]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中經選擇的 1 種之藥物-連接物結構的每 1 抗體的平均結合數係 1 至 10 個之範圍。

[22]如[1]至[20]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中經選擇的1種之藥物-連接物結構的每1抗體的平均結合數係2至8個之範圍。

[23]如[1]至[20]中任一項記載之抗體-藥物結合物，其中經選擇的1種之藥物-連接物結構的每1抗體的平均結合數係3至8個之範圍。

**【0028】**[24]一種醫藥，其含有如[1]至[23]中任一項記載之抗體-藥物結合物、其鹽、或彼等之水合物。

[25]一種抗腫瘤藥及/或抗癌藥，其含有如[1]至[23]中任一項記載之抗體-藥物結合物、其鹽、或彼等之水合物。

[26]如[25]記載之抗腫瘤藥及/或抗癌藥，其適用於肺癌、腎癌、尿道上皮癌、大腸癌、前列腺癌、多形性神經膠質母細胞瘤(glioblastoma multiforme)、卵巢癌、胰癌、乳癌、黑色素瘤、肝癌、膀胱癌、胃癌、子宮頸癌、頭頸部癌、或食道癌。

[27]一種醫藥組成物，其含有作為活性成分之如[1]至[23]中任一項記載之抗體-藥物結合物、其鹽、或彼等之水合物、及藥學上可容許的製劑成分。

[28]如[27]記載之醫藥組成物，其係適用於肺癌、腎癌、尿道上皮癌、大腸癌、前列腺癌、多形性神經膠質母細胞瘤、卵巢癌、胰癌、乳癌、黑色素瘤、肝癌、膀胱癌、胃癌、子宮頸癌、頭頸部癌、或食道癌。

[29]一種腫瘤及/或癌之治療方法，其特徵為投予如[1]至[23]中任一項記載之抗體-藥物結合物、其鹽、或彼等之水合物。

【0029】[30]一種抗體-藥物結合物之製造方法，其特徵為使下式所示的化合物：(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $(CH_2)n^3-C(=O)-L^2-L^P-NH-(CH_2)n^1-L^a-(CH_2)n^2-C(=O)-(NH-DX)$ 與抗TROP2抗體或其反應性衍生物反應，藉由於該抗體之鉸鏈區存在的雙硫鍵部分使硫醚鍵形成的方法使藥物-連接物部分與該抗體結合。

【0030】式中， $n^3$ 表示整數之2至8，

$L^2$ 表示 $-NH-(CH_2CH_2-O)n^4-CH_2CH_2-C(=O)-$ 或單鍵，

其中， $n^4$ 表示1至6之整數，


$L^P$ 表示由選自苯丙氨酸、甘氨酸、纈氨酸、離氨酸、瓜氨酸、絲氨酸、麩氨酸、天冬氨酸的2至7個之氨基酸所構成的勝肽殘基，

$n^1$ 表示0至6之整數，

$n^2$ 表示0至5之整數，


$L^a$ 表示 $-O-$ 或單鍵，

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-係下式



所示的氮原子成為結合部位的基。

$-(NH-DX)$ 係下式



所示的第 1 位之胺基之氮原子成為結合部位的基。

**【0031】** [31]如 [30]記載之製造方法，其中使藥物-連接物部分與抗 TROP2 抗體結合的方法係將該抗體作還原處理而變換為反應性衍生物的方法。

**【0032】** [32]如 [30]或 [31]記載之製造方法，其中經選擇的 1 種之藥物-連接物結構的每 1 抗體的平均結合數係 1 至 10 個之範圍。

[33]如 [30]或 [31]記載之製造方法，其中經選擇的 1 種之藥物-連接物結構的每 1 抗體的平均結合數係 2 至 8 個之範圍。

[34]如 [30]或 [31]記載之製造方法，其中經選擇的 1 種之藥物-連接物結構的每 1 抗體的平均結合數係 3 至 8 個之範圍。

[35]一種抗體-藥物結合物，其係藉由如 [30]至 [34] 中任一項之製造方法而獲得。

**【0033】** [36]一種抗體-藥物結合物，其特徵為其係將抗 TROP2 抗體於還原條件下處理後，使與選自以下之群組的化合物反應，於該抗體之鉸鏈區之雙硫鍵部分使硫醚鍵形成而獲得：

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、


(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、及


(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

【0034】其中，(順丁烯二醯亞胺-N-基)-係下式



所示的氮原子成為結合部位的基。

-(NH-DX)係下式



所示的第1位之氨基之氮原子成為結合部位的基。

-GGFG-表示-Gly-Gly-Phe-Gly-之四胜肽殘基。

【0035】[37]一種抗體-藥物結合物，其特徵為將抗TROP2抗體於還原條件下處理後，使與選自以下之群組的化合物反應，且於該抗體之鉸鏈區之雙硫鍵部分使硫醚鍵形成而獲得：

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、及

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

其中，(順丁烯二醯亞胺-N-基)-、-(NH-DX)、及-GGFG-係如上述。

**【0036】** [38]如[36]或[37]記載之抗體-藥物結合物，其中經選擇的1種之藥物-連接物結構的每1抗體的平均結合數係1至10個之範圍。

[39]如[36]或[37]記載之抗體-藥物結合物，其中經選擇的1種之藥物-連接物結構的每1抗體的平均結合數係2至8個之範圍。

[40]如[36]或[37]記載之抗體-藥物結合物，其中經選擇的1種之藥物-連接物結構的每1抗體的平均結合數係3至8個之範圍。

### [發明之效果]

**【0037】** 藉由介隔特定結構之連接物使抗腫瘤性化合物依喜替康結合的抗TROP2抗體-藥物結合物，可達成優異的抗腫瘤效果及安全性。

### [圖式簡單說明]

#### **【0038】**

[第1圖]呈示cTINA1抗體重鏈之核苷酸序列(序列識別號7)及胺基酸序列(序列識別號8)。

[第2圖]呈示cTINA1抗體輕鏈之核苷酸序列(序列識別號9)及胺基酸序列(序列識別號10)。

[第 3 圖] 呈示 hTINA1-H1 重鏈之核苷酸序列(序列識別號 11)及胺基酸序列(序列識別號 12)。

[第 4 圖] 呈示 hTINA1-H2 重鏈之核苷酸序列(序列識別號 13)及胺基酸序列(序列識別號 14)。

[第 5 圖] 呈示 hTINA1-H3 重鏈之核苷酸序列(序列識別號 15)及胺基酸序列(序列識別號 16)。

[第 6 圖] 呈示 hTINA1-L1 輕鏈之核苷酸序列(序列識別號 17)及胺基酸序列(序列識別號 18)。

[第 7 圖] 呈示 hTINA1-L2 輕鏈之核苷酸序列(序列識別號 19)及胺基酸序列(序列識別號 20)。

[第 8 圖] 呈示 hTINA1-L3 輕鏈之核苷酸序列(序列識別號 21)及胺基酸序列(序列識別號 22)。

[第 9 圖] 呈示 TINA1 抗體之 CDRH1 之胺基酸序列(序列識別號 23)、CDRH2 之胺基酸序列(序列識別號 24)、CDRH3 之胺基酸序列(序列識別號 25)、CDRL1 之胺基酸序列(序列識別號 26)、CDRL2 之胺基酸序列(序列識別號 27)、及 CDRL3 之胺基酸序列(序列識別號 28)。

[第 10 圖] 呈示抗 CD9 抗體、抗 CD46 抗體、抗 CD55 抗體、抗 CD59 抗體、抗 CD71 抗體、抗 CD73 抗體、抗 CD147 抗體、抗 CD276 抗體、抗 EpCAM 抗體、抗 EGFR 抗體、及抗 TROP2 抗體(TINA1 抗體)之細胞內在化能力。

[第 11 圖] 呈示抗 CD59 抗體、抗 CD71 抗體、抗 EGFR 抗體、抗 EpCAM 抗體、及抗 TROP2 抗體(TINA1 抗體)之細胞內在化能力。

[第 12 圖] 呈示各種抗 TROP2 抗體之細胞內在化能力。

[第 13 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(1)、(6)、或(12)對人類大腸癌細胞株 COLO205 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 14 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(1)、(6)、或(12)對人類胰臟腺癌 (pancreatic adenocarcinoma) 細胞株 BxPC-3 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 15 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(1)、(6)、或(12)對人類胰臟腺癌細胞株 Capan-1 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 16 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(2)、(5)、(7)、或(10)對人類大腸癌細胞株 COLO205 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 17 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(2)、(5)、(7)、或(10)對人類胰臟癌細胞株 BxPC-3 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 18 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、或(9)對人類大腸癌細胞株 COLO205 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 19 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、或(9)對人類胰臟癌細胞株 BxPC-3 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 20 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、或(9)對人類卵巢癌細胞株 NIH : OVCAR-3 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 21 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、或(9)對人類胃癌細胞株 NCI-N87 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 22 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、或(9)對人類肺癌細胞株 NCI-H292 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 23 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、或(9)對人類咽癌細胞株 FaDu 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 24 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、或(9)對人類胰臟腺癌細胞株 CFPAC-1 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 25 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(8)或(13)對人類胰臟腺癌細胞株 CFPAC-1 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 26 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(8)或(13)對人類胰臟腺癌細胞株 HPAC 皮下移植 BALB/c-nu/nu 小鼠所示的抗腫瘤效果。

[第 27 圖] 呈示抗體 - 藥物結合物(8)或(13)對人類食道癌組織皮下移植 NOD-scid 小鼠所示的抗腫瘤效果。

### 【實施方式】

[實施發明之形態]

【0039】以下，一邊參照圖式一邊說明用以實施本發明之較佳形態。又，以下說明的實施形態係呈示本發明之代表性的實施形態之一例，並非藉由此等而狹窄解釋本發明之範圍。

【0040】本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物係於抗 TROP2 抗體介隔連接物結構部分而與抗腫瘤性化合物結合的抗腫瘤性藥物，詳細說明如下。

【0041】

[抗體]

本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物所使用的抗 TROP2 抗體可來自任一物種，但較佳可例示人類、大鼠、小鼠、及兔。來自人類以外之物種的情形，使用周知之技術而嵌合化或人類化為較佳。本發明之抗體可為多株抗體，亦可為單株抗體，但單株抗體為較佳。

抗 TROP2 抗體係可以腫瘤細胞為標的的抗體，即，具備可辨識腫瘤細胞的特性、可與腫瘤細胞結合的特性、而且併入腫瘤細胞內而內在化的特性等，可將具有抗腫瘤活性的化合物，使介隔連接物而結合作成抗體-藥物結合物。

抗體之對腫瘤細胞的結合性係可使用流動式細胞測量術(flow cytometry)而確認。就至腫瘤細胞內之抗體之併入的確認方法而言，可列舉(1)使用與治療抗體結合的二次抗體(螢光標識)而將併入細胞內的抗體藉由螢光顯微鏡加以可視化的試驗法(Cell Death and Differentiation (2008) 15, 751-761)、(2)使用與治療抗體結合的二次抗體(螢光標識)而測量併入細胞內的螢光量的試驗法(Molecular Biology of the Cell Vol. 15, 5268-5282, December 2004)、或(3)使用與治療抗體結合的免疫毒素，一旦被併入細胞內則毒素被釋放而細胞增殖被

抑制的 Mab-ZAP 試驗法 (Bio Techniques 28:162-165, January 2000) 等。又，就免疫毒素而言，亦可使用白喉毒素之觸媒區與 Protein G 之重組複合蛋白質。

抗體-藥物結合物由於使與發揮抗腫瘤效果的化合物結合的緣故，抗體本身具有抗腫瘤效果雖較佳，但非必須。由在腫瘤細胞使抗腫瘤性化合物之細胞毒性特異性・選擇性地發揮的目的觀之，抗體具有內在化而轉移至腫瘤細胞內的性質者係重要且較佳。

【0042】抗 TROP2 抗體係可使用於此領域通常實施的方法，將作為抗原的多肽對動物免疫，採集活體內產生的抗體，經由純化而獲得。抗原之來源並未限於人類，亦可將來自小鼠、大鼠等之人類以外之動物的抗原對動物免疫。於此情形，藉由試驗與取得的異種抗原結合的抗體與人類抗原之交叉性，可選出可適用於人類疾病的抗體。

又，依據周知之方法(例如，Kohler and Milstein, Nature(1975)256, p.495-497；Kennet, R.ed., Monoclonal Antibodies, p.365-367, Plenum Press, N.Y.(1980))，藉由使產生抗抗原的抗體的抗體產生細胞與骨髓瘤細胞融合，而建立融合瘤，亦可獲得單株抗體。

又，抗原可藉由基因操作使編碼抗原蛋白質的基因於宿主細胞中產生而獲得。具體而言，製作可表現抗原基因的載體，將其導入宿主細胞而使該基因表現，可純化表現的抗原。藉由使用將藉由上述之基因操作而表現抗原的細胞、或表現抗原的細胞株對動物免疫的方法，亦可取得抗體。

抗 TROP2 抗體係可藉由周知之手段而取得。

【0043】本發明可使用的抗 TROP2 抗體並未特別限制，但例如，可較佳使用本案序列表所示的胺基酸序列所特定者。就本發明所使用的 TROP2 抗體而言，具有以下特性者為所欲的。

(1)一種抗體，其特徵為具有以下特性；

(a)特異性結合 TROP2；

(b)藉由與 TROP2 結合而具有於 TROP2 表現細胞中內在化的活性。

(2)如上述(1)記載之抗體，其中 TROP2 為人類 TROP2。

(3)如上述(1)或(2)記載之抗體，其具有序列識別號 23 記載之胺基酸序列所構成的 CDRH1、序列識別號 24 記載之胺基酸序列所構成的 CDRH2、及序列識別號 25 記載之胺基酸序列所構成的 CDRH3 作為重鏈中的互補決定區，以及具有序列識別號 26 記載之胺基酸序列所構成的 CDRL1、序列識別號 27 記載之胺基酸序列所構成的 CDRL2、及序列識別號 28 記載之胺基酸序列所構成的 CDRL3 作為輕鏈中的互補決定區。

(4)如上述(1)至(3)中任一項記載之抗體，其中恆定區係來自人類的恆定區。

(5)如上述(1)至(4)中任一項記載之抗體，其係經人類化。

(6)如上述(5)記載之抗體，其具有(a)於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列、(b)於序

列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列、(c)於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列、(d)對(a)至(c)之序列至少具有 95% 以上之同源性的胺基酸序列、及(e)選自包含於(a)至(c)之序列有 1 或數個之胺基酸被刪除、取代或添加的胺基酸序列之群組之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區，以及(f)於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列、(g)於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列、(h)於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列、(i)對(f)至(h)之序列至少具有 95% 以上之同源性的胺基酸序列、及(j)選自包含於(f)至(h)之序列有 1 或數個之胺基酸被刪除、取代或添加的胺基酸序列之群組的胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區。

(7)如上述(6)記載之抗體，其具有選自包含下列群組的重鏈之可變區及輕鏈之可變區：

於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 14 之胺基酸編號

20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、以及於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區。

(8)如上述(7)記載之抗體，其具有選自包含下列群組的重鏈之可變區及輕鏈之可變區：

於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記

載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區、以及於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的重鏈之可變區及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈之可變區。

(9)如上述(6)或(7)記載之抗體，其包括選自包含下列群組的重鏈及輕鏈：

於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於

序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、以及於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈。

(10)如上述(6)或(7)記載之抗體，其包括選自包含下列群組的重鏈及輕鏈：

序列識別號 12 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、序列識別號 12 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 20 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、序列識別號 12 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 22 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、序列識別號 14 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、序列識別號 14 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 20 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、序列識別號 14 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 22 記載之胺基酸序列所構成的輕

鏈、序列識別號 16 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、序列識別號 16 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 20 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、以及序列識別號 16 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 22 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈。

(11)如上述(8)記載之抗體，其包括選自包含下列群組的重鏈及輕鏈：

於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈、以及於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈。

(12)如上述(1)至(11)中任一項記載之抗體，其重鏈羧基末端之離胺酸殘基被刪除。

(13)一種抗體，其係藉由下列抗體之製造方法而獲得的抗體，該方法包含培養宿主細胞的步驟，該宿主細胞係藉由含有編碼如上述(1)至(12)中任一項記載之抗體

的多核苷酸的表現載體而轉形；及自該步驟獲得的培養物採集目的抗體的步驟。

**【0044】**以下，說明於本發明所使用的抗 TROP2 抗體。

於本說明書，「癌」與「腫瘤」係以相同意義被使用。

於本說明書，所謂「基因」一詞不僅包含 DNA，亦包含其 mRNA、cDNA、及其 cRNA。

於本說明書，所謂「多核苷酸」一詞係與核酸相同的意義使用，亦包含 DNA、RNA、探針、寡核苷酸、及引子。

於本說明書，「多肽」與「蛋白質」並未區別地使用。

於本說明書，「細胞」亦包含動物個體內之細胞、培養細胞。

於本說明書，「TROP2」係以與 TROP2 蛋白質相同意義使用。

本說明書中的「CDR」係意指互補決定區(CDR：Complementarity determining region)。已知抗體分子之重鏈及輕鏈各自有 3 處所之 CDR。CDR 亦稱為高度變異區(hypervariable domain)，係於抗體之重鏈及輕鏈之可變區內，一次結構之變異性為特高的部位，於重鏈及輕鏈之多肽鏈之一次結構上，分別於分離的 3 處所。於本說明書中，於抗體之 CDR，將重鏈之 CDR 自重鏈胺基酸序列之胺基末端側標記為 CDRH1、CDRH2、CDRH3，

將輕鏈之 CDR 自輕鏈胺基酸序列之胺基末端側標記為 CDRL1、CDRL2、CDRL3。此等之部位係於立體結構上相互接近，而決定對結合的抗原的特異性。

於本發明，「嚴格條件下雜交」係指於市售之雜交溶液 ExpressHyb Hybridization Solution(Clontech 公司製)中，藉由於 68°C 雜交，或使用固定有 DNA 的濾紙，於 0.7-1.0M 之 NaCl 存在下、於 68°C 進行雜交後，使用 0.1-2 倍濃度之 SSC 溶液(1 倍濃度 SSC 係包含 150 mM NaCl、15 mM 檸檬酸鈉)，於 68°C 洗淨，而可鑑定的條件或與其相同的條件下雜交。

### 【0045】

#### 1. TROP2

TROP2 係於人類滋養層細胞(trophoblasts)表現的 TACSTD 家族之一者，與人類滋養層細胞及癌細胞共通的免疫抵抗性有關的 1 次跨膜型之 1 型細胞膜蛋白質。

本發明所使用的 TROP2 蛋白質係可自人類、非人類哺乳動物(大鼠、小鼠等)之 TROP2 表現細胞直接純化而使用、或者將該細胞之細胞膜劃分(fraction)調製而使用，又，可藉由將 TROP2 於活體外合成、或藉由基因操作使於宿主細胞中產生而獲得。基因操作具體而言，將 TROP2 cDNA 重組至可表現的載體後，於含有轉錄及轉譯所必要的酵素、基質及能量物質的溶液中合成、或藉由使其他原核生物、或真核生物之宿主細胞轉形後，藉由使 TROP2 表現，可獲得該蛋白質。又，將前述基因操作所致的 TROP2 表現細胞、或表現 TROP2 的細胞株作為 TROP2 蛋白質而使用亦為可能的。

TROP2 之 DNA 序列及胺基酸序列已於公開資料庫上公開，例如，藉由 NM\_002353、NP\_002344(NCBI)等之存取編號可參照。

又，於上述 TROP2 之胺基酸序列，有 1 或數個之胺基酸被取代、刪除及/或添加的胺基酸序列而成，具有與該蛋白質同等之生物活性的蛋白質亦包含於 TROP2。

人類 TROP2 蛋白質係包含 N 末端 26 個胺基酸殘基所構成的訊息序列、248 個胺基酸殘基所構成的細胞外區域、23 個胺基酸殘基所構成的跨膜區域、26 個胺基酸殘基所構成的細胞內區域。

#### 【0046】

##### 2. 抗 TROP2 抗體之製造

本發明之抗 TROP2 的抗體係可藉由使用此領域通常實施的方法，將選自 TROP2 或 TROP2 之胺基酸序列的任意多肽對動物免疫，採集活體內產生的抗體、純化而獲得。成為抗原的 TROP2 之生物種並未限定於人類，亦可將來自小鼠、大鼠等之人類以外的動物的 TROP2 對動物免疫。於此情形，藉由試驗與取得的異種 TROP2 結合的抗體及人類 TROP2 之交叉性，可選出可適用於人類之疾病的抗體。

又，依據周知之方法(例如，Kohler and Milstein, Nature(1975)256, p.495-497; Kennet, R.ed., Monoclonal Antibodies, p.365-367, Plenum Press, N.Y.(1980))，藉由使產生抗 TROP2 抗體的抗體產生細胞與骨髓瘤細胞融合而建立融合瘤，亦可獲得單株抗體。

又，成為抗原的 TROP2 係可藉由基因操作使 TROP2 基因於宿主細胞中表現而獲得。

具體而言，製作可表現 TROP2 基因的載體，將其導入宿主細胞而使該基因表現，即可純化表現的 TROP2。

又，上述之基因操作所致的 TROP2 表現細胞、或將表現 TROP2 的細胞株作為 TROP2 蛋白質使用亦為可能的。以下，具體地說明抗 TROP2 抗體之取得方法。

### 【0047】

#### (1)抗原之調製

就用以製作抗 TROP2 抗體之抗原而言，可列舉 TROP2 或其至少 6 個連續的部分胺基酸序列所構成的多肽、或於彼等有附加任意之胺基酸序列或載體的衍生物等。

TROP2 係可使用人類之腫瘤組織或自腫瘤細胞直接純化使用，又，藉由將 TROP2 於活體外合成、或藉由基因操作使於宿主細胞中產生可獲得。

基因操作具體而言，將 TROP2 之 cDNA 重組至可表現的載體後，於含有轉錄及轉譯所必要的酵素、基質及能量物質的溶液中合成、或藉由將其他原核生物或真核生物之宿主細胞轉形而使 TROP2 表現，可獲得抗原。

又，藉由使連結膜蛋白質 TROP2 之細胞外區域與抗體之恆定區的融合蛋白質於適當宿主・載體系統中表現，亦可獲得作為分泌蛋白質之抗原。

TROP2 之 cDNA，例如，可列舉將表現 TROP2 之 cDNA 的 cDNA 庫作為模板，藉由使用特異性增幅

TROP2 cDNA 的引子而進行聚合酶連鎖反應(以下稱為「PCR」；參照 Saiki, R. K., et al., *Science*(1988)239, p.487-489)之所謂的 PCR 法而取得。

就多肽之活體外合成而言，例如，可列舉 Roche Diagnostics 公司製之快速轉譯系統(Rapid Translation System)(RTS)，但未限定於此。

就原核細胞之宿主而言，例如，可列舉大腸桿菌(*Escherichia coli*)或枯草桿菌(*Bacillus subtilis*)等。使目的基因於此等之宿主細胞內轉形，於含有來自可適合作為宿主種之複製單元(replicon)，即複製起點、及調節序列的質體載體中使宿主細胞轉形。又，就載體而言，於轉形細胞具有可賦予表型(表現型)之選擇性的序列者為較佳。

真核細胞之宿主細胞包含脊椎動物、昆蟲、酵母等之細胞，就脊椎動物細胞而言，例如，可使用猴之細胞的 COS 細胞(Gluzman, Y. *Cell*(1981)23, p.175-182、ATCC CRL-1650；ATCC : American Type Culture Collection)、小鼠纖維母細胞 NIH3T3(ATCC No.CRL-1658)或中國倉鼠卵巢細胞(CHO 細胞、ATCC CCL-61)之二氫葉酸還原酵素缺損株(Urlaub, G. and Chasin, L.A. *Proc.Natl.Acad.Sci.USA*(1980)77, p.4126-4220)等，但未限定於此等。

如上述獲得的轉形體可依據此領域通常實施的方法加以培養，藉由該培養，於細胞內或細胞外產生目的多肽。

該培養所使用的培養基，本項技術領域者可因應採用的宿主細胞而適當選擇各種者，若為大腸桿菌，例如，因應必要可於 LB 培養基添加安比西林(ampicillin)等之抗生素或 IPMG 而使用。

藉由上述培養，轉形體之細胞內或細胞外所產生的重組蛋白質可藉由利用該蛋白質之物理性質或化學性質等的各種周知分離操作法而分離・純化。

就該方法而言，具體而言，例如，可例示通常之蛋白質沉澱劑的處理、超過濾、分子篩層析(凝膠過濾)、吸附層析、離子交換層析、親和性層析等之各種液體層析、透析法、此等之組合等。

又，藉由於經表現的重組蛋白質連接 6 個殘基所構成的組胺酸標籤，可以鎳親和性管柱有效率地純化。或者，藉由於經表現的重組蛋白質連接 IgG 之 Fc 區域，可以蛋白質 A 管柱有效率地純化。

藉由組合上述方法，可輕易以高產率、高純度為目的大量製造多肽。

將上述所述轉形體本身作為抗原使用亦為可能的。又，將表現 TROP2 的細胞株作為抗原使用亦為可能的。就如此細胞株而言，可列舉人類化肺癌株 NCI-H322、PC14、NCIH-H2122、或 LCAM1、人類前列腺癌株 PC3、人類胰臟癌株 BxPC-3、Capan-1、或 PK-1、人類卵巢癌株 SKOV3 以及人類大腸癌株 COLO205，但只要表現 TROP2 即可，並未限定於此等之細胞株。

## 【 0048 】

## (2) 抗 TROP2 單株抗體之製造

就與 TROP2 特異性結合的抗體之例而言，可列舉與 TROP2 特異性結合的單株抗體，其取得方法如以下記載。

於單株抗體之製造，一般而言如下述的作業步驟係必要的。

即，

- (a) 作為抗原使用的活體高分子之純化、或抗原表現細胞之調製、
- (b) 藉由將抗原注射動物，免疫後採取血液，檢定其抗體力價而決定脾臟摘出之時期後，調製抗體產生細胞的步驟、
- (c) 骨髓瘤細胞(以下稱為「骨髓瘤」)之調製、
- (d) 抗體產生細胞與骨髓瘤之細胞融合、
- (e) 產生作為目的的抗體的融合瘤群之挑選、
- (f) 對單一細胞選殖株的分割(選殖)、
- (g) 依據情形，用以大量製造單株抗體的融合瘤之培養、或移植融合瘤的動物之飼育、
- (h) 如此製造的單株抗體之生理活性、及其結合特異性之檢討、或作為標識試藥之特性之檢定等。

以下，單株抗體之製作法依上述步驟詳述，但該抗體之製作法並未限制於此，例如，亦可使用脾細胞以外之抗體產生細胞及骨髓瘤。

【0049】

### (a) 抗原之純化

就抗原而言，可使用如前述方法所調製的 TROP2 或其一部分。

又，藉由 TROP2 表現重組體細胞所調製的膜劃分、或 TROP2 表現重組體細胞本身，再者，亦可將使用本項技術領域者周知之方法而化學合成的本發明之蛋白質之部分胜肽作為抗原使用。

再者，亦可將 TROP2 表現細胞株作為抗原使用。

### 【0050】

### (b) 抗體產生細胞之調製

將步驟(a)所獲得的抗原與弗氏完全或不完全佐劑、或鉀礬(potash alum)之類的輔助劑混合，作為免疫原對實驗動物免疫。除此之外，亦有將抗原表現細胞作為免疫原對實驗動物免疫的方法。實驗動物係可無阻地使用周知融合瘤製作法所使用的動物。具體而言，例如可使用小鼠、大鼠、山羊、綿羊、牛、馬等。惟，由與摘出的抗體產生細胞融合的骨髓瘤細胞之取得容易性等之觀點，將小鼠或大鼠作為被免疫動物者為較佳。

又，實際上使用的小鼠及大鼠之品系並未別限制，於小鼠之情形，例如，各品系 A、AKR、BALB/c、BDP、BA、CE、C3H、57BL、C57BL、C57L、DBA、FL、HTH、HT1、LP、NZB、NZW、RF、R III、SJL、SWR、WB、129 等，又大鼠的情形，例如，可使用 Wistar、Low、Lewis、Sprague、Dawley、ACI、BN、Fischer 等。

此等之小鼠及大鼠係可例如獲自日本 CLEA 股份有限公司、日本 Charles River 股份有限公司等之實驗動物飼育販售業者。

就被免疫動物而言，若考慮與後述之骨髓瘤細胞之融合親和性，小鼠係 BALB/c 品系為特佳，大鼠係 Wistar 及 Low 品系為特佳。

又，考慮抗原之人類與小鼠之同源性，使用去除自體抗體的使生物機制降低的小鼠，亦即，使用自體免疫疾病小鼠為較佳。

又，此等小鼠或大鼠之免疫時之週齡係較佳為 5 至 12 週齡，更佳為 6 至 8 週齡。

藉由 TROP2 或其重組體而免疫動物時，例如，可使用 Weir, D.M., *Handbook of Experimental Immunology* Vol.I.II.III. , Blackwell Scientific Publications , Oxford(1987) ; Kabat , E.A. and Mayer , M.M. , *Experimental Immunochemistry* , Charles C Thomas Publisher Springfield , Illinois(1964) 等詳細記載的周知之方法。

此等之免疫法中，若具體呈示本發明之較佳方法，例如，如以下所示。

即，首先，將為抗原的膜蛋白質劃分、或使表現抗原的細胞投予至動物之皮內或腹腔內。惟，為了提高免疫效率，兩者之併用為較佳，前半進行皮內投予，僅後半或最終次進行腹腔內投予時，可特別地提高免疫效率。

抗原之投予時程係依被免疫動物之種類、個體差異等而異，但一般而言，抗原投予次數 3~6 次、投予間隔 2~6 週為較佳，投予次數 3~4 次、投予間隔 2~4 週為更佳。

又，抗原之投予量係依動物之種類、個體差異等而異，但一般而言，設為  $0.05\sim 5\text{mg}$ ，較佳為  $0.1\sim 0.5\text{mg}$  左右。

追加免疫係如以上之抗原投予 1~6 週後，較佳為 1~4 週後，更佳為 1~3 週後進行。免疫原為細胞的情形，使用  $1\times 10^6$  至  $1\times 10^7$  個之細胞。

又，進行追加免疫之際的抗原投予量，依動物種類、大小等而異，但一般而言，例如，小鼠的情形設為  $0.05\sim 5\text{mg}$ ，較佳為  $0.1\sim 0.5\text{mg}$ ，更佳為  $0.1\sim 0.2\text{mg}$  左右。免疫原為細胞的情形，使用  $1\times 10^6$  至  $1\times 10^7$  個之細胞。

上述追加免疫後 1~10 日後，較佳為 2~5 日後，更佳為 2~3 日後，自被免疫動物無菌地取出含抗體產生細胞的脾臟細胞或淋巴球。此時，測量抗體力價，若將抗體力價變的充分高的動物作為抗體產生細胞之供給源使用，則可提高以後操作之效率。

就於此所使用的抗體力價之測定法而言，例如，可列舉 RIA 法或 ELISA 法，但未限定於此等方法。本發明中的抗體力價之測定，例如，若依據 ELISA 法，可以藉由如以下記載的順序進行。

首先，使純化或部分純化的抗原吸附於 ELISA 用 96 孔盤等之固相表面，又將抗原未吸附的固相表面以與抗

原無關係的蛋白質覆蓋，例如，藉由牛血清白蛋白( BSA ) 覆蓋，將該表面洗淨後，使與連續稀釋的試料(例如，小鼠血清)作為一級抗體接觸，使上述抗原與試料中之抗體結合。

再者作為二級抗體，添加經酵素標識的抗小鼠抗體的抗體使其與小鼠抗體結合，洗淨後添加該酵素之基質，測定基於基質分解而顯色的吸光度變化等，藉此算出抗體力價。

由被免疫動物之脾臟細胞或淋巴球之抗體產生細胞的分離，可依據周知方法(例如，Kohler et al. , Nature(1975)256 , p.495 ; Kohler et al. , Eur.J.Immunol.(1977)6 , p.511 ; Milstein et al. , Nature(1977) , 266 , p.550 ; Walsh , Nature , (1977)266 , p.495)而進行。例如，脾臟細胞之情形，可採用將脾臟細切而將細胞以不鏽鋼篩網過濾後，使游離於伊格爾氏最低必須培養基(Eagle's minimal essential medium, MEM)等而將抗體產生細胞加以分離的一般方法。

### 【0051】

(c)骨髓瘤細胞(以下，稱為「骨髓瘤」)之調製

用於細胞融合的骨髓瘤細胞並未特別限定，可適當選擇周知之細胞株來使用。惟，考慮自融合細胞選擇融合瘤之際的便利性，較佳使用其選擇手續已確立的HGPRT(次黃嘌呤鳥糞嘌呤磷酸核糖基轉換酵素，Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase)缺損株。

即，來自小鼠之 X63-Ag8(X63)、NS1-ANS/1(NS1)、P3X63-Ag8.U1(P3U1)、X63-Ag8.653(X63.653)、SP2/0-Ag14(SP2/0)、MPC11-45.6TG1.7(45.6TG)、FO、S149/5XXO、BU.1 等、來自大鼠之 210.RSY3.Ag.1.2.3(Y3)等、來自人類之 U266AR(SKO-007)、GM1500·GTG-A12(GM1500)、UC729-6、LICR-LOW-HMy2(HMy2)、8226AR/NIP4-1(NP41)等。此等之 HGPRT 缺損株係例如，可獲自 ATCC 等。

此等之細胞株係以適當培養基，例如 8-氮鳥嘌呤培養基(於 RPMI-1640 培養基中添加麴醯胺酸、2-巯基乙醇、健他黴素(gentamycin)、及胎牛血清(以下稱為「FBS」)的培養基中添加 8-氮鳥嘌呤的培養基)、伊斯科夫氏修飾杜爾貝科氏培養基(Iscove's Modified Dulbecco's Medium；IMDM)、或杜爾貝科氏修飾弋果氏培養基(Dulbecco's Modified Eagle Medium；DMEM)繼代培養，但細胞融合之 3 至 4 日前以正常培養基(例如，含 10% FCS 的 ASF104 培養基(味之素股份有限公司製))繼代培養，融合當日確保  $2 \times 10^7$  以上之細胞數目。

### 【0052】

#### (d)細胞融合

抗體產生細胞與骨髓瘤細胞之融合係依據周知之方法(Weir, D.M., Handbook of Experimental Immunology Vol.I.II.III., Blackwell Scientific Publications, Oxford (1987); Kabat, E.A. and Mayer, M.M., Experimental Immunochemistry, Charles C Thomas Publisher Springfield,

Illinois(1964)等)，於使細胞生存率未極度降低的程度的條件下可適當實施。

就如此方法而言，例如，可使用於聚乙二醇等之高濃度聚合物溶液中將抗體產生細胞與骨髓瘤細胞混合的化學方法、利用電刺激的物理方法等。其中，若呈示上述化學方法之具體例係如以下。

即，使用聚乙二醇作為高濃度聚合物溶液的情形，於分子量 1500~6000，較佳為 2000~4000 之聚乙二醇溶液中，於 30~40°C，較佳為於 35~38°C 之溫度下，將抗體產生細胞與骨髓瘤細胞混合 1~10 分鐘，較佳為 5~8 分鐘。

### 【0053】

#### (e)融合瘤群之選擇

藉由上述細胞融合獲得的融合瘤之選擇方法並未特別限制，但通常使用 HAT(次黃嘌呤·腺基喋呤·胸腺嘧啶)選擇法(Kohler et al., Nature (1975) 256, p.495; Milstein et al., Nature (1977) 266, p.550)。

此方法係於使用於腺基喋呤中無法生存的 HGPRT 缺損株之骨髓瘤細胞而獲得融合瘤的情形為有效的。即，藉由將未融合細胞及融合瘤以 HAT 培養基培養，可選擇性僅使具有對腺基喋呤有耐性的融合瘤殘存，且可使增殖。

### 【0054】

#### (f)分割為單一細胞菌落(選殖)

就融合瘤之選殖法而言，例如，可使用甲基纖維素法、軟瓊脂糖法、臨界稀釋法等之周知方法(例如，參照 Barbara, B.M. and Stanley,M.S.:Selected Methods in Cellular Immunology, W.H.Freeman and Company,San Francisco (1980))。此等之方法中，尤其是甲基纖維素法等之三維培養法為較佳。例如，將藉由細胞融合所形成的融合瘤群懸浮於 ClonaCell-HY Selection Medium D(StemCell Technologies 公司製 #03804)等之甲基纖維素培養基而培養，藉由回收形成的融合瘤菌落，單株融合瘤之取得為可能的。培養經回收的各融合瘤菌落，將於獲得的融合瘤培養上清液中安定而被認可抗體力價者，選擇作為 TROP2 單株抗體產生融合瘤株。

**【0055】**就如此樹立的融合瘤株之例而言，可列舉 TROP2 融合瘤 TINA1。又，於本說明書中，將 TROP2 融合瘤 TINA1 所產生的抗體記載為「TINA1 抗體」或僅記載為「TINA1」。

TINA1 抗體之重鏈可變區係具有序列表之序列識別號 2 所示的胺基酸序列。又，TINA1 抗體之輕鏈可變區係具有序列表之序列識別號 4 所示的胺基酸序列。

### **【0056】**

#### (g)融合瘤之培養所致的單株抗體之調製

如此選擇的融合瘤，藉由將其培養，可有效率地獲得單株抗體，但培養之前，篩選產生目的單株抗體的融合瘤係所欲的。

此篩選係可採用本身已知之方法。

本發明中的抗體力價的測定可藉由例如，上述(b)之項目中說明的ELISA法而進行。

藉由以上之方法所獲得的融合瘤係可於液體氮中或-80°C以下之冷凍庫中以凍結狀態下保存。

完成選殖的融合瘤係將培養基由HT培養基換成正常培養基而被培養。

大量培養係以使用大型培養瓶的旋轉培養、或旋轉器(spinner)培養來進行。自此大量培養中的上清液，藉由使用膠體過濾等之本項技術領域者所周知之方法而純化，可獲得與本發明之蛋白質特異性結合的單株抗體。

又，藉由於同品系之小鼠(例如，上述之BALB/c)、或Nu/Nu小鼠之腹腔內注射融合瘤，使該融合瘤增殖，可獲得含大量本發明之單株抗體的腹水。

投予腹腔內的情形，於事前(3~7日前)，投予2,6,10,14-四甲基十五烷(2,6,10,14-tetramethylpentadecane；姥鯫烷(pristane))等之礦物油時，可獲得較多量之腹水。

例如，於與融合瘤同品系的小鼠腹腔內預先注射免疫抑制劑，使T細胞不活化後，於20日後，使 $10^6\sim 10^7$ 個之融合瘤·選殖細胞於不含血清的培養基中游離(0.5ml)而投予至腹腔內，通常於腹部膨滿、腹水累積處，自小鼠採取腹水。藉由此方法，與培養液相比，獲得約100倍以上之濃度之單株抗體。

藉由上述方法所獲得的單株抗體，可以例如，Weir, D.M.: *Handbook of Experimental Immunology*,

Vol.I , II , III , Blackwell Scientific Publications , Oxford(1978)記載的方法加以純化。

因而獲得的單株抗體係對 TROP2 具有高抗原特異性。

### 【0057】

#### (h)單株抗體之檢定

因此獲得的單株抗體之同型及亞型之決定係可如以下方式進行。

首先，可列舉歐氏雙向擴散(Ouchterlony)法、ELISA法、或RIA法作為鑑定法。

Ouchterlony 法係為簡便，但單株抗體濃度低的情形，有必要濃縮操作。

另一方面，使用 ELISA 法或 RIA 法的情形，使培養上清液直接與抗原吸附固相反應，進一步藉由使用對應各種免疫球蛋白同型、亞型的抗體作為第二次抗體，可鑑定單株抗體之同型、亞型。

又，就更簡便的方法而言，亦可利用市售之鑑定用之套組(例如，Mouse typer kit：Bio-Rad公司製)等。

再者，蛋白質之定量係可由 Folin Lowry 法及 280 nm 中的吸光度( $1.4(\text{OD}_{280}) = \text{免疫球蛋白 } 1\text{mg/ml}$ )算出的方法而進行。

再者，再次實施(2)之(a)至(h)的步驟而另外獨立取得單株抗體的情形，亦可能取得具有與 TINA1 抗體相同細胞傷害活性的抗體。就如此抗體之一例，可列舉結合於與 TINA1 抗體相同之抗原決定位的抗體。新製作的單

株抗體若與 TINA1 抗體之結合的部分勝肽或部分立體結構結合，可判定為該單株抗體結合於與 TINA1 抗體相同之抗原決定位。又，藉由確認相對於 TINA1 抗體之對 TROP2 的結合，該單株抗體係競爭(即，該單株抗體係妨礙 TINA1 抗體與 TROP2 之結合)，即使未決定具體的抗原決定位之序列或結構，亦可判定該單株抗體結合於與抗 TROP2 抗體相同之抗原決定位。抗原決定位被確認為相同的情形，該單株抗體被強烈地期待具有與 TINA1 抗體同等之抗原結合能力或生物活性。

### 【0058】

#### (3) 其他抗體

本發明之抗體，除了抗上述 TROP2 的單株抗體之外，亦包含以使對人類的異種抗原性降低等為目的而人為地改變的基因重組型抗體，例如，嵌合(Chimeric)抗體、人類化(Humanized)抗體、人類抗體等。此等之抗體可使用已知方法而製造。

就嵌合抗體而言，係抗體之可變區與恆定區彼此為異種的抗體，例如，將來自小鼠或大鼠的抗體之可變區與來自人類的恆定區接合的嵌合抗體(參照 Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.，81，6851-6855，(1984))。

就人類化抗體而言，僅將互補決定區(CDR)併入來自人類的抗體之抗體(參照 Nature(1986)321，p.522-525)、藉由 CDR 移植法而除了 CDR 之序列外將一部分之框架區胺基酸殘基亦移植於人類抗體之抗體(國際公開第 90/07861 號)。

惟，就來自 TINA1 抗體之人類化抗體而言，只要保持 TINA1 抗體之 6 種全部的 CDR 序列即可，並未限定於特定之人類化抗體。又，TINA1 抗體之重鏈可變區係保有序列表之序列識別號 23 所示的胺基酸序列所構成的 CDRH1(TAGMQ)、序列識別號 24 所示的胺基酸序列所構成的 CDRH2(WINTHSGVPKYAEDFKG)、及序列識別號 25 所示的胺基酸序列所構成的 CDRH3(SGFSSSYWYFDV)。又，TINA1 抗體之輕鏈可變區係保有序列表之序列識別號 26 所示的胺基酸序列所構成的 CDRL1(KASQDVSTAVA)、序列識別號 27 所示的胺基酸序列所構成的 CDRL2(SASYRYT)、及序列識別號 28 所示的胺基酸序列所構成的 CDRL3(QQHYITPLT)。

【0059】就小鼠抗體 TINA1 之人類化抗體之實例而言，可列舉下列重鏈及輕鏈之任意組合：包含(1)序列表之序列識別號 12、14、或 16 之第 20 至 140 個之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列；(2)相對於上述(1)之胺基酸序列具有至少 95% 以上之同源性的胺基酸序列；及(3)於上述(1)之胺基酸序列中有 1 或數個之胺基酸經刪除、取代或添加的胺基酸序列之任一者所構成的重鏈可變區的重鏈；以及包含(4)由序列識別號 18、20、或 22 之第 21 至 129 個之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列；(5)相對於上述(4)之胺基酸序列具有至少 95% 以上之同源性的胺基酸序列；及(6)於上述(4)之胺基酸序列有 1 或數個之胺基酸經刪除、取代或添加的胺基酸序列之任一者所構成的輕鏈可變區的輕鏈。

又，本說明書中的「數個」係意指 1 至 10 個、1 至 9 個、1 至 8 個、1 至 7 個、1 至 6 個、1 至 5 個、1 至 4 個、1 至 3 個、或 1 或 2 個。

**【0060】** 又，就本說明書中的胺基酸之取代而言，保存的胺基酸取代為較佳。保存的胺基酸取代係指與胺基酸側鏈有關連的胺基酸基團內產生的取代。較佳胺基酸基團係如下：酸性基團 = 天冬胺酸、麩胺酸；鹼性基團 = 離胺酸、精胺酸、組胺酸；非極性基團 = 丙胺酸、纈胺酸、白胺酸、異白胺酸、脯胺酸、苯丙胺酸、甲硫胺酸、色胺酸；非帶電極性家族 = 甘胺酸、天冬醯胺酸、麩醯胺酸、半胱胺酸、絲胺酸、蘇胺酸、酪胺酸。其他適合的胺基酸基團係如下：脂肪族羥基團 = 絲胺酸及蘇胺酸；含醯胺基的基團 = 天冬醯胺酸及麩醯胺酸；脂肪族基團 = 丙胺酸、纈胺酸、白胺酸及異白胺酸；以及芳香族基團 = 苯丙胺酸、色胺酸及酪胺酸。該胺基酸取代係於不使具有原本胺基酸序列的物質之特性降低的範圍內進行者為較佳。

**【0061】** 就上述之重鏈及輕鏈之較佳組合之抗體而言，可列舉包含具有於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈

的抗體、包含具有於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、以及包含具有於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體。

【0062】就更佳的組合之抗體而言，可列舉包含於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載目之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、以及包含

於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體。

【0063】就優異的較佳組合而言，可列舉包含具有於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、包含具有於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體、以及包含具有於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 140 記載之胺基酸序列所構成的可變區的重鏈及具有於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 129 記載之胺基酸序列所構成的可變區的輕鏈的抗體。

【0064】又，就其他適合的組合而言，可列舉包含序列識別號 12 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含序列識別號 12 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 20 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含序列識別號 12 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 22 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗

體、包含序列識別號 14 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含序列識別號 14 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 20 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含序列識別號 14 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 22 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含序列識別號 16 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含序列識別號 16 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 20 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、以包含及序列識別號 16 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 22 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體。

**【0065】**就優異的較佳組合而言，可列舉包含於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、以及包含於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 470 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體。

【0066】就更優異的較佳組合而言，可列舉包含於序列識別號 12 之胺基酸編號 20 至 469 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 469 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 18 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、包含於序列識別號 14 之胺基酸編號 20 至 469 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 20 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體、以及包含於序列識別號 16 之胺基酸編號 20 至 469 記載之胺基酸序列所構成的重鏈及於序列識別號 22 之胺基酸編號 21 至 234 記載之胺基酸序列所構成的輕鏈的抗體。

【0067】藉由組合呈現與上述之重鏈胺基酸序列及輕鏈胺基酸序列有高同源性的序列，選擇具有與上述各抗體同等生物活性的抗體係可能的。如此同源性，一般而言為 80% 以上之同源性，較佳為 90% 以上之同源性，更佳為 95% 以上之同源性，最佳為 99% 以上之同源性。又，藉由組合於重鏈或輕鏈之胺基酸序列中有 1 至數個之胺基酸殘基被取代、刪除或添加的胺基酸序列，亦可選擇具有與上述各抗體同等生物活性的抗體。

【0068】二種類之胺基酸序列間之同源性係可藉由使用 Blast algorithm 第 2.2.2 版 (Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaeffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David

J.Lipman(1997)，「Gapped BLAST and PSI-BLAST：a new generation of protein database search programs」，Nucleic Acids Res.25：3389-3402)之系統內定參數(default parameter)而決定。Blast algorithm 亦可藉由例如，訪問網際網路 [www.ncbi.nlm.nih.gov/blast](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) 而使用。

**【0069】**又，於序列表之序列識別號 12、14、或 16 所示的重鏈胺基酸序列中，第 1 至 19 號之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列係訊息序列，第 20 至 140 號之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列係可變區，第 141 至 470 號之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列係恆定區。各自將序列識別號 12 之序列記載於第 3 圖、序列識別號 14 之序列記載於第 4 圖、序列識別號 16 之序列記載於第 5 圖。

又，於序列表之序列識別號 18、20、或 22 所示的輕鏈胺基酸序列中，第 1 至 20 號之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列係訊息序列，第 21 至 129 號之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列係可變區，第 130 至 234 號之胺基酸殘基所構成的胺基酸序列係恆定區。各自將序列識別號 18 之序列記載於第 6 圖、序列識別號 20 之序列記載於第 7 圖、序列識別號 22 之序列記載於第 8 圖。

**【0070】**就本發明之抗體而言，又可列舉與 TROP2 結合的人類抗體。抗 TROP2 人類抗體係意指僅具有來自人類染色體之抗體之基因序列的人類抗體。抗 TROP2 人類抗體係藉由使用具有含人類抗體之重鏈及輕鏈之基因的人類染色體片段的人類抗體產生小鼠的方法(參照

Tomizuka , K.et al. , Nature Genetics(1997)16 , p.133-143 ; Kuroiwa , Y.et.al. , Nucl. Acids Res. (1998)26 , p.3447-3448 ; Yoshida , H.et.al. , Animal Cell Technology : Basic and Applied Aspects vol.10 , p.69-73(Kitagawa , Y. , Matsuda , T.and Iijima , S.ed.s.) , Kluwer Academic Publishers , 1999. ; Tomizuka , K.et.al. , Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A(2000)97 , p.722-727 等)而取得。

【0071】如此人類抗體產生小鼠，具體而言，內在性免疫球蛋白重鏈及輕鏈之基因座被破壞，用以代之者為以通過酵母人工染色體(Yeast artificial chromosome, YAC)載體等而導入人類免疫球蛋白重鏈及輕鏈之基因座的基因重組動物，可藉由基因剔除動物及基因轉殖動物之製作及此等動物彼此交配而作出。

又，藉由基因重組技術，各自編碼如此人類抗體之重鏈及輕鏈的 cDNA，較佳為藉由含該 cDNA 的載體將真核細胞轉形，經培養產生基因重組人類單株抗體的轉形細胞，亦可自培養上清液中獲得此抗體。

其中，作為宿主，例如，可使用真核細胞，較佳為 CHO 細胞、淋巴球或骨髓瘤等之哺乳動物細胞。

【0072】又，亦已知取得自人類抗體庫選出的來自噬菌體顯示的人類抗體的方法(參照 Wormstone , I.M.et.al. , Investigative Ophthalmology & Visual Science.(2002)43(7) , p.2301-2308 ; Carmen , S.et.al. , Briefings in Functional Genomics and Proteomics(2002) ,

1(2) , p.189-203 ; Siriwardena , D.et.al. , Ophthalmology(2002)109(3) , p.427-431 等)。

例如，可使用將人類抗體之可變區作為單鏈抗體(scFv)而使於噬菌體表面表現，而選擇與抗原結合的噬菌體的噬菌體顯示法(Nature Biotechnology(2005) , 23 , (9) , p.1105-1116)。

藉由解析與抗原結合而選擇的噬菌體之基因，可決定編碼與抗原結合的人類抗體之可變區的DNA序列。

若與抗原結合的scFv之DNA序列係清楚的，則可藉由製作具有該序列的表現載體，導入於適當宿主並使表現，而取得人類抗體(國際公開第92/01047號、國際公開第92/20791號、國際公開第93/06213號、國際公開第93/11236號、國際公開第93/19172號、國際公開第95/01438號、國際公開第95/15388號；Annu.Rev.Immunol(1994)12 , p.433-455 ; Nature Biotechnology (2005)23(9) , p.1105-1116)。

新製作的人類抗體若與TINA1抗體之結合的部分勝肽或部分立體結構結合，則可判定該人類抗體結合於與TINA1抗體相同之抗原決定位。又，藉由確認相對於TINA1抗體之對TROP2的結合，該人類抗體為競爭(即，該人類抗體會妨礙TINA1抗體與TROP2之結合)，即使具體的抗原決定位之序列或結構未被決定，可判定該人類抗體結合於與TINA1抗體相同之抗原決定位。確認抗原決定位係相同的情形，該人類抗體被強烈地期待具有與TINA1抗體同等之生物活性。

藉由以上方法所獲得的嵌合抗體、人類化抗體、或人類抗體係可藉由周知方法等而評價對抗原的結合性，而選出適合的抗體。

**【0073】**就比較抗體性質之際之其他指標之一例而言，可列舉抗體之安定性。示差掃描熱析儀(DSC)係可快速又正確地測量成為蛋白質之相對的結構安定性之良好指標的熱變性中點( $T_m$ )的裝置。使用DSC而測量 $T_m$ 值，藉由比較其值，可比較熱安定性之不同。已知抗體之保存安定性呈現與抗體之熱安定性有某程度之相關(Lori Burton, et.al., Pharmaceutical Development and Technology(2007)12, p.265-273)，將熱安定性作為指標，可選擇適合的抗體。就用以選擇抗體的其他指標而言，可列舉適當宿主細胞中的產量為高的、及水溶液中之凝集性為低的。例如，產量之最高抗體不僅呈現最高熱安定性，基於以上所述指標而綜合地判斷，有必要選出最適合對人類投予之抗體。

**【0074】**本發明之抗體亦包含抗體之修飾體。該修飾體係意指對本發明之抗體施予化學或生物學的修飾者。化學的修飾體係包含包含對胺基酸骨架之化學部分之鍵結、N-鍵結或O-鍵結碳水化物鏈之化學修飾體等。生物學的修飾體包含經轉譯後修飾(例如，對N-鍵結或O-鍵結之糖鏈附加、N末端或C末端之加工、脫醯胺化、天冬胺酸之異構物化、甲硫胺酸之氧化)者、藉由使用原核生物宿主細胞而使表現，而於N末端附加甲硫胺酸殘基者。又，為了可進行本發明之抗體或抗原之

檢測或單離而被標識者，例如，酵素標識體、螢光標識體、親和性標識體亦包含於該修飾物之意義。如此本發明之抗體之修飾物係有用於抗體之安定性及血中滯留性之改善、抗原性之減輕、抗體或抗原之檢出或單離等。

【0075】又，藉由調節與本發明之抗體結合的糖鏈修飾(糖昔基(glycosyl)化、脫岩藻糖(fucose)化等)，可增強抗體依賴性細胞傷害活性。就抗體之糖鏈修飾之調節技術而言，已知國際公開第1999/54342號、國際公開第2000/61739號、國際公開第2002/31140號等，但未限定於此等。本發明之抗體亦包含於該糖鏈修飾被調節的抗體。

一旦單離抗體基因後，導入適當宿主而製作抗體的情形，可使用適當宿主與表現載體之組合。就抗體基因之具體例而言，可列舉將編碼本說明書記載的抗體之重鏈序列的基因、及編碼輕鏈序列的基因加以組合者。將宿主細胞轉形之際，重鏈序列基因與輕鏈序列基因係可能被插入相同表現載體者，又亦可能被插入不同表現載體。

將真核細胞作為宿主使用的情形，可使用動物細胞、植物細胞、或真核微生物。尤其就動物細胞而言，可列舉哺乳類細胞，例如，為猴細胞的COS細胞(Gluzman, Y.Cell(1981)23, p.175-182、ATCC CRL-1650)、小鼠纖維母細胞NIH3T3(ATCC No.CRL-1658)或中國倉鼠卵巢細胞(CHO細胞，ATCC CCL-61)之二氫葉酸還原酵素缺損株(Urlaub, G.and Chasin, L.A.Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.(1980)77, p.4126-4220)。

使用原核細胞的情形，例如，可列舉大腸桿菌、枯草桿菌。

由轉形而於此等之細胞中導入抗體基因，藉由將經轉形的細胞於活體外培養，可獲得抗體。於該培養，依抗體之序列而有產量不同的情形，自具有同等結合活性的抗體之中，以產量作為指標而可選出容易作為醫藥生產者。據此，本發明之抗體亦包含藉由下列抗體之製造方法所獲得的抗體，該方法之特徵為包含：培養上述經轉形的宿主細胞的步驟、及自該步驟所獲得的培養物採取目的抗體或該抗體之機能性片段的步驟。

【0076】又，已知哺乳類培養細胞所生產的抗體之重鏈之羧基末端的離胺酸殘基為缺失 (Journal of Chromatography A, 705 : 129-134(1995))，又，已知相同重鏈羧基末端之甘胺酸、離胺酸之 2 個胺基酸殘基為缺失，位於新的羧基末端的脯胺酸殘基經醯胺化 (Analytical Biochemistry, 360 : 75-83(2007))。然而，此等重鏈序列之缺失及修飾對於抗體之抗原結合能力及效應子機能(補體之活性化或抗體依賴性細胞毒性作用等)並無影響。據此，本發明之抗體亦包含受該修飾的抗體及該抗體之機能性片段，亦包含於重鏈羧基末端有 1 或 2 個之胺基酸被刪除的缺失體、及經醯胺化的該欠缺體(例如，羧基末端部位之脯胺酸殘基經醯胺化的重鏈)等。惟，只要保有抗原結合能力及效應子機能，本發明之抗體之重鏈之羧基末端的欠缺體並未限於上述之種類。構成本發明之抗體的 2 股重鏈可為選自包含完全

長度及上述之缺失體之群組的重鏈之任一種，亦可組合任二種。各欠缺體之量比可受產生本發明之抗體的哺乳類培養細胞之種類及培養條件的影響，但就本發明之抗體之主成分而言，可列舉於 2 股重鏈之雙方，羧基末端之一個之胺基酸殘基有缺失的情形。

【0077】就本發明之抗體之同型而言，例如，可列舉 IgG(IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)等，但較佳可列舉 IgG1 或 IgG2。

【0078】就抗體之生物活性而言，一般可列舉抗原結合活性、藉由與抗原結合而表現該抗原的細胞中內在化的活性、中和抗原之活性的活性、增強抗原活性的活性、抗體依賴性細胞傷害(ADCC)活性、補體依賴性細胞傷害(CDC)活性及抗體依賴性細胞媒介吞噬作用(ADCP)，但本發明之抗體所具有的機能為對 TROP2 的結合活性，較佳為藉由與 TROP2 結合而於 TROP2 表現細胞中內在化的活性。再者，本發明之抗體除了細胞內在化活性之外，亦可兼具 ADCC 活性、CDC 活性及/或 ADCP 活性。

【0079】獲得的抗體可純化至均一。抗體之分離、純化只要使用通常之蛋白質所使用的分離、純化方法即可。例如，適宜選擇管柱層析、過濾器過濾、超過濾、鹽析、透析、調製用聚丙烯醯胺膠體電泳、等電點電泳等並加以組合，即可將抗體分離、純化(Strategies for Protein Purification and Characterization : A Laboratory Course Manual, Daniel R. Marshak et al. eds., Cold Spring

Harbor Laboratory Press(1996) ; Antibodies : A Laboratory Manual.Ed Harlow and David Lane,Cold Spring Harbor Laboratory(1988))，但未限定於此等。

就層析而言，可列舉親和性層析、離子交換層析、疏水性層析、膠體過濾層析、逆相層析、吸附層析等。

此等之層析係可使用 HPLC 或 FPLC 等之液相層析來進行。

就用於親和性層析所使用的管柱而言，可列舉蛋白質 A 管柱、Protein G 管柱。例如，就使用蛋白質 A 管柱的管柱而言，可列舉 Hyper D，POROS，Sephadex F.F.(Pharmacia)等。

又使用將抗原固定化的載體，利用對抗原之結合性而純化抗體亦為可能的。

### 【0080】


#### [抗腫瘤性化合物]

茲述與本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物結合的抗腫瘤性化合物。就本發明所使用的抗腫瘤性化合物而言，為具有抗腫瘤效果的化合物，只要可與連接物結構結合的取代基、具有部分結構者即可，並未特別限制。抗腫瘤性化合物係連接物之一部份或全部於腫瘤細胞內被切斷而抗腫瘤性化合物部分游離而表現抗腫瘤效果。若連接物與藥物結合部分被切斷，則抗腫瘤性化合物以未修飾的結構游離，而其本來之抗腫瘤效果被發揮。

就本發明所使用的抗腫瘤性化合物而言，較佳可使用為喜樹鹼衍生物的依喜替康((1S,9S)-1-胺基-9-乙基-

5-氟-2,3-二氫-9-羥基-4-甲基-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁唑-10,13(9H,15H)-二酮；下式：)

【0081】



【0082】此依喜替康雖係具有優異的抗腫瘤活性，但迄今尚未作為抗腫瘤藥被市售。相同化合物可以周知方法容易地取得，可適合使用作為第1位之氨基對連接物結構之結合部位。又，依喜替康亦有以連接物之一部份結合的狀態下於腫瘤細胞內游離的情形，但即使為如此結構亦為發揮優異抗腫瘤效果的優異化合物。

依喜替康因具有喜樹鹼結構的緣故，於酸性水性媒體中(例如，pH3左右)平衡偏向有內酯環形成的結構(閉環體)，另一方面，於鹼性水性媒體中(例如，pH10左右)平衡偏向內酯環為開環的結構(開環體)為已知。導入對應如此閉環結構及開環結構的依喜替康殘基的藥物結合物亦被期待有同等之抗腫瘤效果，不用說，任一者之狀態亦被包含於本發明之範圍。


【0083】就其他之抗腫瘤性化合物而言，例如，可列舉阿黴素(Doxorubicin)、柔紅黴素(Daunorubicin)、絲裂黴素C(Mitomycin C)、博來黴素(Bleomycin)、環胞昔(Cyclocytidine)、長春新鹼(Vincristine)、長春鹼(Vinblastine)、甲氨蝶呤(Methotrexate)、白金系抗腫瘤劑(順鉑(Cisplatin)或其衍生物)、塔克素(Taxol)或其衍生物、其他之喜樹鹼或其衍生物(特開平6-87746號公報記載的抗腫瘤劑)等。

【0084】於抗體-藥物結合物，對抗體1分子之藥物之結合數係影響其有效性、安全性的重要因子。抗體-藥物結合物之製造係藥物之結合數成為常數的方式，規定使反應的原料・試藥之使用量等之反應條件而實施，但低分子化合物之化學反應與抗體-藥物結合物不同，抗體-藥物結合物通常為呈相異數目的藥物結合之混合物而獲得。對抗體1分子之藥物結合數係標記平均值，即，被特定為平均藥物結合數。除非另有指定，本發明原則上，亦即，除了表示具有不同藥物結合數的抗體-藥物結合物混合物中所含之具有特定藥物結合數的抗體-藥物結合物的情形以外，藥物之結合數係意指平均值。依喜替康對抗體分子之結合數係可控制，就每1抗體之藥物平均結合數而言，可使1至10個左右的依喜替康結合，但較佳為2至8個，更佳為3至8個。又，若為本項技術領域者，由本案實施例之記載，可設計使於抗體結合必要數目的藥物的反應，可取得控制依喜替康之結合數的抗體-藥物結合物。

## 【0085】

## [連接物結構]

茲描述於本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物中，抗腫瘤性化合物與抗 TROP2 抗體結合的連接物結構。該連接物係具有下式之結構：



抗體係以  $L^1$  之末端(與  $L^2$  結合的相反側的末端)結合，抗腫瘤性化合物係於  $-L^a-(CH_2)n^2-C(=O)-$  部分之羰基加以結合。

$n^1$  表示 0 至 6 之整數，但較佳為 1 至 5 之整數，更佳為 1 至 3。


## 【0086】

1.  $L^1$

$L^1$  係  $-(\text{琥珀醯亞胺}-3-\text{基}-N)-(CH_2)n^3-C(=O)-$  之結構所示者。

其中， $n^3$  係 2 至 8 之整數，『 $-(\text{琥珀醯亞胺}-3-\text{基}-N)-$ 』係具有下式所示的結構。


## 【0087】



【0088】此部分結構中的第 3 位係對抗 TROP2 抗體之結合部位。於此第 3 位之與該抗體之結合，其特徵為形成硫醚而鍵結。此結構部分之第 1 位之氮原子係與此結構所含的連接物內存在的亞甲基之碳原子結合。即，

- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N) - (CH<sub>2</sub>)<sup>n</sup><sup>3</sup> - C(=O) - L<sup>2</sup> - 級下式所示的結構 (其中，「抗體 -S-」級來自抗體)。

【0089】



【0090】式中，n<sup>3</sup> 級 2 至 8 之整數，但較佳為 2 至 5。

【0091】就 L<sup>1</sup> 之具體例而言，可列舉

- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、
- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) -

等。

【0092】

2 . L<sup>2</sup>

L<sup>2</sup> 級 - NH - (CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O)<sup>n</sup><sup>4</sup> - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 所示的結構，但 L<sup>2</sup> 可不存在，此情形 L<sup>2</sup> 成為單鍵。又，n<sup>4</sup> 級 1 至 6 之整數，較佳為 2 至 4。L<sup>2</sup> 級以末端之胺基與 L<sup>1</sup> 結合，以相反的末端之羧基與 L<sup>P</sup> 結合。

【0093】就 L<sup>2</sup> 之具體例而言，可列舉：

- NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、
- NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、

-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、  
 -NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、  
 -NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、  
 -NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-等。

### 【0094】

3.L<sup>P</sup>

L<sup>P</sup>係以2至7個之胺基酸所構成的胜肽殘基。即，2至7個之胺基酸藉由胜肽鍵結的寡胜肽之殘基而構成。L<sup>P</sup>係於N末端與L<sup>2</sup>結合，於C末端與連接物之-NH-(CH<sub>2</sub>)<sup>n1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n2</sup>-C(=O)-部分之胺基結合。

【0095】構成L<sup>P</sup>的胺基酸並未特別限定，例如，L-或D-胺基酸，較佳為L-胺基酸。又，α-胺基酸之外，可為β-丙胺酸、ε-胺基己酸、γ-胺基丁酸等之結構之胺基酸，又例如，可為經N-甲基化的胺基酸等之非天然型之胺基酸。

L<sup>P</sup>之胺基酸序列並未特別限定，但就構成的胺基酸而言，可列舉苯丙胺酸(Phe；F)、酪胺酸(Tyr；Y)、白胺酸(Leu；L)、甘胺酸(Gly；G)、丙胺酸(Ala；A)、纈胺酸(Val；V)、離胺酸(Lys；K)、瓜胺酸(Cit)、絲胺酸(Ser；S)、麩胺酸(Glu；E)、天冬胺酸(Asp；D)等。


此等中較佳為苯丙胺酸、甘胺酸、纈胺酸、離胺酸、瓜胺酸、絲胺酸、麩胺酸、天冬胺酸。依胺基酸之種類，可控制藥物游離之樣式。胺基酸之數目可為 2 至 7 個。

【0096】就  $L^P$  之具體例而言，可列舉：

- GGF-、
- DGGF-、
- (D-)D-GGF-、
- EGGF-、
- GGFG-、
- SGGF-、
- KGGF-、
- DGFGG-、
- GGFGG-、
- DDGGFG-、
- KDGFFG-、
- GGFGGGF-。

上述之『(D-)D』係意指 D-天冬胺酸。就本發明之抗體-藥物結合物之特佳  $L^P$  而言，可列舉 -GGFG- 之四勝肽殘基。

【0097】



$L^a - (\text{CH}_2)^n - \text{C}(=\text{O}) -$  中的  $L^a$  係 -O- 之結構、或為單鍵。 $n^2$  係 0 至 5 之整數，但較佳為 0 至 3，更佳為 0 或 1。

就  $L^a-(CH_2)^n-C(=O)-$  而言，可列舉以下之結構者。

- O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-。

此等中，-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-的情形， $L^a$  為單鍵且  $n^2$  為 0 的情形較佳。

**【0098】** 就連接物之-NH-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>1</sub></sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>2</sub></sup>-C(=O)-所示的結構之具體例而言，可列舉：

- NH-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-C(=O)-、
- NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、
- NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-等。

**【0099】** 更佳為-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-C(=O)-。

【0100】連接物之-NH-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>1</sub></sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>2</sub></sup>-C(=O)-係鏈長為4至7個原子之鏈長者為較佳，但更佳為具有5或6個原子之鏈長。

【0101】一般認為本發明之抗TROP2抗體-藥物結合物係移動至腫瘤細胞內後，連接物部分被切斷，NH<sub>2</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>1</sub></sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>2</sub></sup>-C(=O)-(NH-DX)所示的結構之藥物衍生物會游離而表現抗腫瘤作用。就自本發明之抗體-藥物結合物游離而表現抗腫瘤效果的抗腫瘤性衍生物而言，可列舉具有先前舉例的連接物之-NH-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>1</sub></sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>2</sub></sup>-C(=O)-所示的結構之末端成為氨基的結構部分的抗腫瘤性衍生物，但特佳者如下列所示。

NH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 NH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 NH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 NH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

又，NH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)之情形，因於相同分子內具有的胺縮醛結構為不安定，進一步自體分解而有HO-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)游離者被確認。此等化合物亦可較佳使用作為本發明之抗體-藥物結合物之製造中間體。

【0102】於藥物作為依喜替康的本發明之抗體-藥物結合物，使下述結構之藥物-連接物結構部分[-L<sup>1</sup>-L<sup>2</sup>-L<sup>P</sup>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>1</sub></sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n<sub>2</sub></sup>-C(=O)-(NH-DX)]與抗體結合者為較佳。此等之藥物-連接物結構部分係就每1抗體之平均結合數而言，只要使1至10個結合者即可，但較佳為2至8，更佳為3至8。

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 -(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

此等中更佳為下列各者。

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 - (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 - (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 - (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 - (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 - (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

又較佳為下列各者。

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 - (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、  
 - (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

【0103】於本發明之抗體-藥物結合物中，結合抗TROP2抗體與藥物的連接物結構係以結合迄今所述的連

接物各部分中所示的較佳結構者，而可構築較佳連接物。就如此連結物結構而言，可較佳使用以下結構者。又結構之左端係與抗體之結合部位，右端為與藥物之結合部位。

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-、

- (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、  
 - (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 。

此等中更佳為下列各者。

- (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、  
 - (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、  
 - (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、  
 - (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、  
 - (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、  
 - (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - 。

再者，較佳可列舉下列各者。

- (琥珀醯亞胺 - 3 - 基 - N) - CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> - C(=O) - GGFG - NH - CH<sub>2</sub> - O - CH<sub>2</sub> - C(=O) - 、

- (琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-、  
 -(琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-。

### 【0104】

#### [製造方法]


其次，說明本發明之抗體-藥物結合物或其製造中間體之代表性製造方法。又，於以下，為了表示化合物，使用各反應式中所示的化合物之編號。即，稱為『式(1)之化合物』、『化合物(1)』等。又除此以外之編號之化合物亦同樣記載。

### 【0105】

#### 1. 製造方法 1


式(1)所示之藉由硫醚而抗體與藥物-連接物結構結合的抗體-藥物結合物係例如，可藉由下述之方法而製造。

### 【0106】




【0107】 [式中，AB 表示具有氫硫基的抗體，L<sup>1</sup>，係於 L<sup>1</sup> 所示的連接物結構，連接物末端為順丁烯二醯亞胺基(下式)的結構：

### 【0108】



【0109】(其中，氮原子成為結合部位)，具體而言，於 L<sup>1</sup> 中之 -(琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)-(CH<sub>2</sub>)<sup>n</sup>-C(=O)-，-(琥珀醯亞胺 -3- 基 -N)- 部分係表示成為順丁烯二醯亞胺基的基。又，-(NH-DX)係下式所示的結構：

【0110】



【0111】表示依喜替康之第 1 位胺基之氫原子 1 個被去除而生成的基】。

【0112】又，於上述之反應式，式(1)之化合物係可被解釋為自藥物至連接物末端之結構部分 1 個對 1 個抗體結合的結構，但此係用於方便說明的記載，實際上多為該結構部分對抗體分子 1 個係結合複數個的情形。此狀況於以下之製造方法之說明亦為相同。

【0113】藉由使經由後述方法可取得的化合物(2)與具有氫硫基的抗體(3a)反應，可製造抗體-藥物結合物(1)。

具有氫硫基的抗體(3a)係可以本項技術領域者周知之方法而獲得(Hermanson, G.T, Bioconjugate Techniques, pp.56-136, pp.456-493, Academic Press(1996))。例如，使 Traut's 試藥對抗體之胺基作用；使 N-琥珀醯亞胺基 S-乙醯基硫烷酸酯類對抗體之胺基作用後，使羥基胺作用；使 N-琥珀醯亞胺基 3-(吡啶二硫基)丙酸酯作用後，使還原劑作用；使二硫蘇糖醇、2-巯基乙醇、參(2-羧基乙基)膦鹽酸鹽(TCEP)等之還原劑對抗體作用而將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原而使氫硫基生成等之方法，但未限定於此等。

具體而言，TCEP 作為還原劑，對抗體內鉸鏈區雙硫鍵每 1 個使用 0.3 至 3 莫耳當量，於含螯合劑的緩衝液中，使與抗體反應，而可獲得抗體內鉸鏈區雙硫鍵被部分或完全還原的抗體。就螯合劑而言，例如，可列舉乙二胺四乙酸(EDTA)或二乙三胺 5 乙酸(DTPA)等。此等以 1 mM 至 20 mM 之濃度使用為宜。就緩衝液而言，可使用磷酸鈉或硼酸鈉、乙酸鈉溶液等。具體而言，抗體係於 4°C 至 37°C 使與 TCEP 反應 1 至 4 小時，而可獲得具有部分或完全被還原的氫硫基的抗體(3a)。

其中藉由實施使氫硫基附加於藥物-連接物部分的反應，可藉由硫醚鍵而使藥物-連接物部分結合。

具有氫硫基的抗體(3a)每 1 個，使用 2 至 20 莫耳當量之化合物(2)，可製造抗體每 1 個有 2 個至 8 個之藥物結合的抗體-藥物結合物(1)。具體而言，於含有具氫硫基的抗體(3a)的緩衝液中，添加使化合物(2)溶解的溶液

而使反應為宜。其中，就緩衝液而言，使用乙酸鈉溶液、磷酸鈉或硼酸鈉等為宜。反應時之 pH 係 5 至 9，更佳為於 pH 7 左右使反應為宜。就使化合物(2)溶解的溶媒而言，可使用二甲基亞礦(DMSO)、二甲基甲醯胺(DMF)、二甲基乙醯胺(DMA)、N-甲基-2-吡啶酮(NMP)等之有機溶媒。

將使化合物(2)溶解的有機溶媒溶液以 1 至 20% v/v 添加於含有具氫硫基的抗體(3a)的緩衝液中而使反應為宜。反應溫度係 0 至 37°C，較佳為 10 至 25°C，反應時間係 0.5 至 2 小時。反應係未反應之化合物(2)之反應性藉由含有硫醇的試藥而使失活，可結束反應。含有硫醇之試藥係例如，半胱氨酸或 N-乙醯基-L-半胱氨酸(NAC)。更具體而言，相對於使用的化合物(2)，添加 1 至 2 莫耳量之 NAC，並藉由於室溫培育 10 至 30 分鐘，可結束反應。

製造的抗體-藥物結合物(1)係藉由如以下之共通操作而進行濃縮、緩衝液交換、純化、抗體濃度及抗體每一分子之藥物平均結合數之測定，可進行抗體-藥物結合物(1)之鑑定。

#### 【0114】

共通操作 A：抗體或抗體-藥物結合物水溶液之濃縮

於 Amicon Ultra(50,000 MWCO，Millipore Corporation)之容器內置入抗體或抗體-藥物結合物溶液，以使用離心機(Allegra X-15R, Beckman Coulter, n.c.)的離心操作(於 2000G 至 3800G 離心 5 至 20 分鐘)，將抗體或抗體-藥物結合物溶液濃縮。

### 共通操作 B：抗體之濃度測定

使用 UV 測定器 (Nanodrop 1000, Thermo Fisher Scientific Inc.)，依據製造商規定之方法，進行抗體濃度之測定。此時，各抗體使用相異的 280 nm 吸光係數 ( $1.3 \text{ mL mg}^{-1} \text{ cm}^{-1}$  至  $1.8 \text{ mL mg}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ )。

### 共通操作 C-1：抗體之緩衝液交換

將使用 Sephadex G-25 擔體的 NAP-25 管柱 (Cat.No.17-0852-02, GE Healthcare Japan Corporation)，依據製造商規定之方法，以含氯化鈉 (137 mM) 及乙二胺四乙酸 (EDTA, 5 mM) 的磷酸緩衝液 (10 mM, pH 6.0；本說明書中稱為 PBS 6.0/EDTA) 使平衡化。對此 NAP-25 管柱每一根，放置抗體水溶液 2.5 mL 後，分取以 PBS 6.0/EDTA 3.5 mL 溶出的劃分 (3.5 mL)。此劃分藉由共通操作 A 而濃縮，使用共通操作 B 而進行抗體濃度之測定後，使用 PBS 6.0/EDTA 而調整抗體濃度為 10 mg/mL。

### 共通操作 C-2：抗體之緩衝液交換

將使用 Sephadex G-25 擔體的 NAP-25 管柱 (Cat.No.17-0852-02, GE Healthcare Japan Corporation) 依據製造商之規定，以含氯化鈉 (50 mM) 及 EDTA (2 mM) 的磷酸緩衝液 (50 mM, pH 6.5；本說明書中稱為 PBS 6.5/EDTA) 使平衡化。對此 NAP-25 管柱每一根，放置抗體水溶液 2.5 mL 後，分取以 PBS 6.5/EDTA 3.5 mL 溶出的劃分 (3.5 mL)。此劃分藉由共通操作 A 而濃縮，使用共通操作 B 而進行抗體濃度之測定後，使用 PBS 6.5/EDTA 將抗體濃度調整為 20 mg/mL。

### 共通操作 D：抗體-藥物結合物之純化

以市售之磷酸緩衝液(PBS7.4，Cat.No.10010-023，Invitrogen)、含氯化鈉(137mM)的磷酸鈉緩衝液(10mM，pH6.0；本說明書中稱為PBS6.0)或含山梨糖醇(5%)的乙酸緩衝液(10mM，pH5.5；本說明書中稱為ABS)之任一種緩衝液使NAP-25管柱平衡化。於此NAP-25管柱中置入抗體-藥物結合物反應水溶液(約1.5mL)，以製造商規定量之緩衝液使溶出，分取抗體劃分。將此分取劃分再次置入NAP-25管柱，以緩衝液使溶出的膠體過濾純化操作重複進行共計2至3次，獲得去除未結合之藥物連接物、低分子化合物(參(2-羧基乙基)膦鹽酸鹽(TCEP)、N-乙醯基-L-半胱氨酸(NAC)、二甲基亞礦)的抗體-藥物結合物。

### 共通操作 E：抗體-藥物結合物中的抗體濃度及抗體每一分子之藥物平均結合數之測定(1)

抗體-藥物結合物中的結合藥物濃度係可藉由測定抗體-藥物結合物水溶液之280nm及370nm之二波長中的UV吸光度後，進行下述之計算而算出。

因某波長中的全吸光度係相等於系統內存在的全部吸收化學物種之吸光度之和(吸光度之加成性)，故於抗體與藥物之結合前後，假設抗體及藥物之莫耳吸光係數未變化時，抗體-藥物結合物中的抗體濃度及藥物濃度係如下述之關係式所示。

$$A_{280} = A_{D,280} + A_{A,280} = \epsilon_{D,280} C_D + \epsilon_{A,280} C_A \quad \text{式(I)}$$

$$A_{370} = A_{D,370} + A_{A,370} = \epsilon_{D,370} C_D + \epsilon_{A,370} C_A \quad \text{式(II)}$$

其中， $A_{280}$  表示  $280\text{nm}$  中的抗體-藥物結合物水溶液之吸光度， $A_{370}$  表示  $370\text{nm}$  中的抗體-藥物結合物水溶液之吸光度， $A_{A,280}$  表示  $280\text{nm}$  中的抗體之吸光度， $A_{A,370}$  表示  $370\text{nm}$  中的抗體之吸光度， $A_{D,280}$  表示  $280\text{nm}$  中的結合物前驅物之吸光度， $A_{D,370}$  表示  $370\text{nm}$  中的結合物前驅物之吸光度， $\epsilon_{A,280}$  表示  $280\text{nm}$  中的抗體之莫耳吸光係數， $\epsilon_{A,370}$  表示  $370\text{nm}$  中的抗體之莫耳吸光係數， $\epsilon_{D,280}$  表示  $280\text{nm}$  中的結合物前驅物之莫耳吸光係數， $\epsilon_{D,370}$  表示  $370\text{nm}$  中的結合物前驅物之莫耳吸光係數， $C_A$  表示抗體-藥物結合物中的抗體濃度， $C_D$  表示抗體-藥物結合物中的藥物濃度。

其中， $\epsilon_{A,280}$ 、 $\epsilon_{A,370}$ 、 $\epsilon_{D,280}$ 、 $\epsilon_{D,370}$  係被用於事先準備的值(計算推定值或由化合物之 UV 測定所獲得的實測值)。例如， $\epsilon_{A,280}$  係自抗體之胺基酸序列，藉由已知之計算方法(Protein Science, 1995, vol.4, 2411-2423)可加以推定。 $\epsilon_{A,370}$  係通常為零。 $\epsilon_{D,280}$  及  $\epsilon_{D,370}$  係可藉由測定使用的結合物前驅物溶解於某莫耳濃度的溶液之吸光度，藉由朗伯-比爾定律(Lambert-Beer law)(吸光度 = 莫耳濃度  $\times$  莫耳吸光係數  $\times$  胞光徑長)而獲得。測定抗體-藥物結合物水溶液之  $A_{280}$  及  $A_{370}$ ，藉由將此等之值代入式(I)及(II)而解出連立方程式，可求得  $C_A$  及  $C_D$ 。再者，藉由以  $C_A$  除  $C_D$ ，可求得每 1 抗體之藥物平均結合數。

【0115】

共通操作 F：抗體-藥物結合物中的抗體每一分子之藥物平均結合數之測定(2)

抗體-藥物結合物中的抗體每一分子之藥物平均結合數除了前述之共通操作 E 之外，亦可藉由使用以下之方法的高速液體層析(HPLC)分析而求得。

[F-1.HPLC 分析用樣品之調製(抗體-藥物結合物之還原)]

將抗體-藥物結合物溶液(約 1 mg/mL、60 μL)與二硫蘇糖醇(DTT)水溶液(100 mM、15 μL)混合。將混合物於 37°C 培育 30 分鐘，將切斷抗體-藥物結合物之 L 鏈及 H 鏈間的雙硫鍵的樣品用於 HPLC 分析。

[F-2.HPLC 分析]

HPLC 分析以下述之測定條件進行。

HPLC 系統：Agilent 1290 HPLC 系統(Agilent Technologies)

檢測器：紫外吸光度計(測定波長：280 nm)

管柱：PLRP-S(2.1×50 mm、8 μm、1000 Å；Agilent Technologies、P/N PL1912-1802)

管柱溫度：80 °C

移動相 A：0.04%三氟乙酸(TFA)水溶液

移動相 B：含 0.04%TFA 的乙腈溶液

梯度程式：29%-36%(0 分鐘 -12.5 分鐘)、36%-42%(12.5-15 分鐘)、42%-29%(15 分鐘 -15.1 分鐘)、29%-29%(15.1 分鐘 -25 分鐘)

樣品注入量：15 μL

### [F-3. 資料解析]

[ F-3-1 ] 相對於未結合藥物之抗體之 L 鏈( $L_0$ )及 H 鏈( $H_0$ )，藥物結合的 L 鏈(藥物為一個結合的 L 鏈： $L_1$ )及 H 鏈(藥物為一個結合的 H 鏈： $H_1$ 、藥物為二個結合的 H 鏈： $H_2$ 、藥物為三個結合的 H 鏈： $H_3$ )係與結合的藥物數成比例地疏水性增加而保持時間變大，故以  $L_0$ 、 $L_1$ 、 $H_0$ 、 $H_1$ 、 $H_2$ 、 $H_3$  之順序被溶出。藉由  $L_0$  及  $H_0$  之保持時間比較，檢出波峰可被分配於  $L_0$ 、 $L_1$ 、 $H_0$ 、 $H_1$ 、 $H_2$ 、 $H_3$  之任一者。

[ F-3-2 ] 因於藥物連接物有 UV 吸收，因應藥物連接物之結合數，使用 L 鏈、H 鏈及藥物連接物之莫耳吸光係數而依據下式進行波峰面積值之補正。

#### 【 0116 】

L鏈波峰面積補正值  $(L_i)$

= 波峰面積

$$\times \frac{\text{L鏈之莫耳吸光係數}}{\text{L鏈之莫耳吸光係數} + \text{結合藥物數} \times \text{藥物連結物之莫耳吸光係數}}$$

#### 【 0117 】

H鏈波峰面積補正值  $(H_i)$

= 波峰面積

$$\times \frac{\text{H鏈之莫耳吸光係數}}{\text{H鏈之莫耳吸光係數} + \text{結合藥物數} \times \text{藥物連結物之莫耳吸光係數}}$$

【 0118 】 其中，各抗體中的 L 鏈及 H 鏈之莫耳吸光係數(280 nm)係可藉由已知之計算方法(Protein Science, 1995, vol.4, 2411-2423)，使用自各抗體之 L 鏈及 H 鏈之胺基酸序列所推定的值。hTINA 之情形，依據其胺基酸

序列，作為 L 鏰之莫耳吸光係數，使用 34690 作為推定值，作為 H 鏰之莫耳吸光係數，使用 95000 作為推定值。又，藥物連接物之莫耳吸光係數(280nm)係使用使各藥物連接物以巯基乙醇或 N-乙醯基半胱氨酸反應，將順丁烯二醯亞胺基變換為琥珀醯亞胺硫醚的化合物之實測之莫耳吸光係數(280nm)。

[ F-3-3 ] 依據下式計算相對於波峰面積補正值合計之各鏈波峰面積比(%)。

**【0119】**

$$\begin{aligned} \text{L鏈波峰面積比} &= \frac{A_{Li}}{A_{L0} + A_{L1}} \times 100 \\ \text{H鏈波峰面積比} &= \frac{A_{Hi}}{A_{H0} + A_{H1} + A_{H2} + A_{H3}} \times 100 \\ A_{Li}, A_{Hi} : L_i, H_i &\text{ 各波峰面積補正值} \end{aligned}$$

**【0120】** [ F-3-4 ] 依據下式計算抗體-藥物結合物中的抗體每一分子之藥物平均結合數。

藥物平均結合數 = (L<sub>0</sub> 波峰面積比 × 0 + L<sub>1</sub> 波峰面積比 × 1 + H<sub>0</sub> 波峰面積比 × 0 + H<sub>1</sub> 波峰面積比 × 1 + H<sub>2</sub> 波峰面積比 × 2 + H<sub>3</sub> 波峰面積比 × 3) / 100 × 2

**【0121】** 製造方法 1 中的式(2)所示的化合物係下式所示的化合物：

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-(CH<sub>2</sub>)<sup>n</sup><sup>3</sup>-C(=O)-L<sup>2</sup>-L<sup>P</sup>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sup>n</sup><sup>1</sup>-L<sup>a</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sup>n</sup><sup>2</sup>-C(=O)-(NH-DX)。

式中，

n<sup>3</sup> 表示整數之 2 至 8，

L<sup>2</sup> 表示 -NH-(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O)n<sup>4</sup>-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)- 或 單鍵，

其中， $n^4$  表示 1 至 6 之整數，

$L^P$  表示選自苯丙胺酸、甘胺酸、纈胺酸、離胺酸、瓜胺酸、絲胺酸、麩胺酸、天冬胺酸之 2 至 7 個之胺基酸所構成的胜肽殘基，


$n^1$  表示 0 至 6 之整數，

$n^2$  表示 0 至 5 之整數，

$L^a$  表示 -O- 或單鍵，


(順丁烯二醯亞胺-N-基)-係下式所示的順丁烯二醯亞胺基(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl 基)，氮原子係成為結合部位的基，

【0122】



【0123】-(NH-DX)係下式

【0124】



【0125】所示的第 1 位之胺基之氮原子成為結合部位的基。

【 0126 】  $L^2$  維 單 鍵 , 或 為  $-NH-(CH_2CH_2-O)^n$ <sup>4</sup> $-CH_2CH_2-C(=O)-$  的 情 形 ,  $n^4$  為 整 數 之 2 至 4 者 作 為 製 造 中 間 體 較 佳 。

就  $L^P$  之 胜 肽 殘 基 而 言 , 選 自 包 含 苯 丙 胺 酸 、 甘 胺 酸 、 繡 胺 酸 、 離 胺 酸 、 瓜 胺 酸 、 絲 胺 酸 、 麥 胺 酸 、 天 冬 胺 酸 之 胺 基 酸 的 胜 肽 殘 基 的 化 合 物 作 為 製 造 中 間 體 為 較 佳 。 如 此 胜 肽 殘 基 中 ,  $L^P$  維 4 個 之 胺 基 酸 所 構 成 的 胜 肽 殘 基 的 化 合 物 作 為 製 造 中 間 髐 為 較 佳 。 更 具 體 而 言 ,  $L^P$  維 -GGFG- 之 四 胜 肽 殘 基 的 化 合 物 作 為 製 造 中 間 髐 為 較 佳 。

【 0127 】 又 , 就  $-NH-(CH_2)^{n^1}-L^a-(CH_2)^{n^2}-$  而 言 ,  $-NH-CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2-O-CH_2-$  、 或  $-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-$  的 化 合 物 作 為 製 造 中 間 髐 為 較 佳 , 更 佳 為  $-NH-CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2-O-CH_2-$  、 或  $-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-$  的 化 合 物 。

【 0128 】 再 者 , 式 (2) 所 示 的 化 合 物 維  $n^3$  為 整 數 之 2 至 5 ,  $L^2$  為 單 鍵 ,  $-NH-(CH_2)^{n^1}-L^a-(CH_2)^{n^2}-$  維  $-NH-CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2-O-CH_2-$  、 或  $-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-$  的 化 合 物 作 為 製 造 中 間 髐 為 較 佳 。 更 佳 為  $-NH-(CH_2)^{n^1}-L^a-(CH_2)^{n^2}-$  為  $-NH-CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2CH_2CH_2-$  、  $-NH-CH_2-O-CH_2-$  、 或  $-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-$  的 化 合 物 。 再 者 ,  $n^3$  為 整 數 之 2 或 5 的 化 合 物 為 較 佳 。

【0129】又，式(2)所示的化合物係  $n^3$  為整數之 2 至 5， $L^2$  為  $-NH-(CH_2CH_2-O)n^4-CH_2CH_2-C(=O)-$ ， $n^4$  為整數之 2 至 4， $-NH-(CH_2)n^1-L^a-(CH_2)n^2$ -係  $-NH-CH_2CH_2-$ 、 $-NH-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-NH-CH_2CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-NH-CH_2-O-CH_2-$ 、或  $-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-$ 的化合物作為製造中間體為較佳。更佳為  $n^4$  係整數之 2 或 4 之化合物。再者， $-NH-(CH_2)n^1-L^a-(CH_2)n^2$ -係  $-NH-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-NH-CH_2-O-CH_2-$ 、或  $-NH-CH_2CH_2-O-CH_2-$ 的化合物為較佳。

【0130】就作為如此本發明化合物之製造上有用的中間體之較佳者可示例以下各者。

(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)- $CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-C(=O)-GGFG-NH-CH_2CH_2CH_2-C(=O)-(NH-DX)$ 、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。

【0131】藉由使選自上述之製造中間體化合物之群組的藥物-連接物化合物，與抗 TROP2 抗體或其反應性衍生物反應，使於抗 TROP2 抗體之鉸鏈區存在的雙硫鍵部分形成硫醚鍵，而可製造本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物。此情形，使用抗 TROP2 抗體之反應性衍生物為較佳，尤其將抗 TROP2 抗體還原處理而獲得的反應性衍生物為較佳。

【 0132 】 以 下 各 者 為 作 為 製 造 中 間 體 之 更 佳 化 合 物 。

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肼 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 、

(順 丁 烯 二 鹼 亞 肘 -N- 基 )-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX) 。

【0133】又，上述之中間體化合物群組中係下式所示的化合物為更佳化合物：

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)、或

(順丁烯二醯亞胺-N-基)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)。


【0134】又，為了確保結合物之量，將於同樣條件所製作獲得的平均藥物數為相同程度之複數個結合物(例如，±1左右)混合而可作成新的批次。此情形，平均藥物數係收在混合前之平均藥物數之間。

### 【0135】

#### 2. 製造方法 2

先前之製造方法所使用的中間體的式(2)所示的化合物及彼等之藥理上可容許的鹽，例如，可藉由下述之方法而製造。

### 【0136】



【0137】[式中， $L^1$ ，表示末端順丁烯二醯亞胺基， $P^1$ 、 $P^2$ 及 $P^3$ 表示保護基]。

【0138】將羧酸(5)誘導為活性酯、混合酸酐、或酸鹼化物等，於鹼存在下，藉由使與  $NH_2-DX(4)$  或其藥理上可容許的鹽反應，可製造化合物(6)。 $NH_2-DX(4)$ 係表示依喜替康(化學名： $(1S,9S)-1$ -氨基-9-乙基-5-氟-2,3-二氫-9-羥基-4-甲基-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]喹啉-10,13(9H,15H)-二酮)。

此反應係可適用勝肽合成通常使用的反應試藥或條件。活性酯係有各種者，例如，p-硝基酚等之酚類、N-羥基苯并三唑或 N-羥基琥珀醯亞胺等與羧酸(5)，使用  $N,N'$ -二環己基碳二亞胺或 1-乙基-3-(3-二甲基胺基丙基)碳二亞胺·鹽酸鹽等之縮合劑而使反應即可製造。又，活性酯亦可藉由下列製造：羧酸(5)與五氟苯基三氟乙酸酯等之反應；羧酸(5)與 1-苯并三唑基氧基三吡咯啶鎓六氟亞磷酸酯之反應；羧酸(5)與氰基磷酸二乙

酯之反應(鹽溶法)；羧酸(5)與三苯基膦及2,2'-二吡啶基二硫醚之反應(向山法)；羧酸(5)與4-(4,6-二甲氧基-1,3,5-三咁-2-基)-4-甲基氯化嗎福啉(DMTMM)等之三咁衍生物之反應等。又，藉由羧酸(5)於鹼存在下，經由以氯化亞硫醯、草醯氯等之酸鹵化物處理而可加以製造的酸鹵化物法等，亦可進行反應。

將如上述獲得的羧酸(5)之活性酯、混合酸酐、或酸鹵化物，於化合物(4)與適當鹼存在下，藉由使於惰性溶媒中於-78°C~150°C之反應溫度下反應，可製造化合物(6)。又，「惰性溶媒」係意指於其溶媒被採用的反應中不阻礙為實施目的的反應的溶媒。

**【0139】**就上述之各步驟所使用的具體的鹼而言，例如，可列舉碳酸鈉、碳酸鉀、乙醇鈉、丁醇鉀、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫化鈉、氫化鉀等之鹼金屬或鹼土類金屬之碳酸鹽、烷氧化物、氫氧化物、或氫化物；n-丁基鋰等之烷基鋰、或鋰二異丙基醯胺之類的二烷基氨基鋰所代表的有機金屬鹼；鋰雙(三甲基矽烷基)醯胺等之雙矽烷基胺之有機金屬鹼；又可列舉吡啶、2,6-二甲吡啶、柯林鹼(collidine)、4-二甲基胺基吡啶、三乙基胺、N-甲基嗎福啉、二異丙基乙基胺、二氮雜環[5.4.0]十一-7-烯(DBU)等之三級胺或含氮雜環化合物等之有機鹼等。

**【0140】**就本反應所使用的惰性溶媒而言，可列舉二氯甲烷、氯仿、四氯化碳等之鹵化烴系溶媒；四氫呋喃、1,2-二甲氧基乙烷、二噁烷等之醚系溶媒；苯、甲

苯等之芳香族烴系溶媒；N,N-二甲基甲醯胺、N,N-二甲基乙醯胺、N-甲基吡咯啶-2-酮等之醯胺系溶媒，除了此等之外，依情形亦可使用二甲基亞礦、環丁礦等之亞礦系溶媒；丙酮、甲基乙基酮等之酮系溶媒；甲醇、乙醇等之醇系之溶媒等。再者，亦可混合彼等而使用。

【0141】就化合物(6)之末端胺基之保護基 P<sup>1</sup> 而言，可使用三級丁基氧基羰基、9-茀基甲基氧基羰基、苄基氧基羰基等之勝肽合成通常使用的胺基之保護基。就其他胺基之保護基而言，可列舉乙醯基等之烷醯基；甲氧基羰基、乙氧基羰基等之烷氧基羰基；對甲氧基苄基氧基羰基、對(或鄰)硝基苄基氧基羰基等之芳基甲氧基羰基；苄基、三苯基甲基等之芳基甲基；苄醯基等之芳醯基；2,4-二硝基苯磺醯基、鄰硝基苯磺醯基等之芳基磺醯基。保護基 P<sup>1</sup> 可因應保護胺基的化合物之性質等而選擇為宜。

藉由使獲得的化合物(6)之末端胺基之保護基 P<sup>1</sup> 脫保護，可製造化合物(7)。此脫保護係因應其保護基而選擇試藥、條件即可。

將 N 末端以 P<sup>2</sup> 保護的勝肽羧酸(8)誘導為活性酯、混合酸酐等，藉由使與獲得的化合物(7)反應，可製造化合物(9)。形成勝肽羧酸(8)與化合物(7)之勝肽鍵的反應條件、試藥、鹼、及惰性溶媒，可適當選自化合物(6)之合成中所述者而使用即可。保護基 P<sup>2</sup> 適當選自化合物(6)之保護基所述者而使用即可，可因應保護胺基的化合物之性質等加以選擇。又，如勝肽合成上通常使

用者，重複將構成勝肽羧酸(8)的胺基酸或勝肽依序反應及脫保護而伸長，亦可製造化合物(9)。

藉由使獲得的化合物(9)之胺基之保護基 P<sup>2</sup> 脫保護，可製造化合物(10)。此脫保護可因應其保護基而選擇試藥或條件。

將羧酸(11)誘導為活性酯、混合酸酐、或酸鹵化物等，藉由使獲得的化合物(10)反應，可製造化合物(2)。形成羧酸(11)與化合物(10)之勝肽鍵的反應條件或試藥、鹼、及不活性溶媒係可由化合物(6)之合成所述者加以適宜選擇而使用。

**【0142】** 化合物(9)亦可以例如，下述之方法加以製造。

將 N 末端以 P<sup>2</sup> 保護的勝肽羧酸(8)誘導為活性酯、混合酸酐等，於鹼存在下，藉由使與羧基以 P<sup>3</sup> 保護的胺化合物(12)反應，可製造化合物(13)。形成勝肽羧酸(8)及化合物(12)之勝肽鍵的反應條件、試藥、鹼、及惰性溶媒係可由化合物(6)之合成所述者加以適宜選擇而使用。

化合物(13)之胺基之保護基 P<sup>2</sup> 可以通常使用的保護基加以保護。

具體而言，就羥基之保護基而言，可列舉甲氧基甲基等之烷氧基甲基；苄基、4-甲氧基苄基、三苯基甲基等之芳基甲基；乙醯基等之烷醯基；苄醯基等之芳醯基；三級丁基二苯基矽烷基等之矽烷基等。羧基可作為與甲基、乙基、三級丁基等之烷基、烯丙基、或苄基等

之芳基甲基之酯等而加以保護。胺基可列舉三級丁基氧基羰基、甲氧基羰基、乙氧基羰基等之烷基氧基羰基；烯丙基氧基羰基、或 9-苁基甲基氧基羰基、苄基氧基羰基、對甲氧基苄基氧基羰基、對(或鄰)硝基苄基氧基羰基等之芳基甲氧基羰基；除此之外，可列舉乙醯基等之烷醯基；苄基、三苯基甲基等之芳基甲基；苄醯基等之芳醯基；2,4-二硝基苯磺醯基、鄰硝基苯磺醯基等之芳基磺醯基等。

就羧基之保護基  $P^3$  而言，可使用於有機合成化學中，通常使用作為勝肽合成之羧基保護基的保護基，具體而言，為甲基、乙基、三級丁基等之烷基酯、烯丙基酯、苄基酯等，自上述之保護基加以適宜選擇而使用即可。於此情形，胺基之保護基與羧基之保護基以相異方法或條件可去除者為較佳。例如，可列舉  $P^2$  為三級丁基氧基羰基， $P^3$  為苄基的組合等作為代表例。彼等之保護基係可因應保護胺基及羧基的化合物之性質等而自上述者加以選擇即可，將彼等之保護基切斷之際，可選擇因應其保護基的試藥或條件。

藉由使獲得的化合物(13)之羧基之保護基  $P^3$  脫保護，可製造化合物(14)。此脫保護係選擇因應其保護基的試藥或條件即可。

藉由將獲得的化合物(14)誘導為活性酯、混合酸酐、或酸鹵化物等，於鹼存在下，使與化合物(4)反應，可製造化合物(9)。此反應依據勝肽合成通常使用的反應試藥或條件即可，反應條件、試藥、鹼、及惰性

溶媒係由化合物(6)之合成所述者加以適宜選擇而使用即可。

**【0143】** 化合物(2)亦可以例如，下述之方法而製造。

藉由使化合物(13)之胺基之保護基 P<sup>2</sup> 脫保護，可製造化合物(15)。此脫保護係可選擇因應其保護基的試藥或條件。

將羧酸衍生物(11)誘導為活性酯、混合酸酐、或酸鹵化物等，於鹼存在下，藉由使與獲得的化合物(15)反應，可製造化合物(16)。形成勝肽羧酸(11)與化合物(15)之醯胺鍵的反應條件、試藥、鹼、及惰性溶媒係可由化合物(6)之合成所述者加以適宜選擇而使用。

藉由使獲得的化合物(16)之羧基之保護基脫保護，可製造化合物(17)。此脫保護係可與化合物(14)之製造中的羧基之脫保護同樣地進行。


藉由將化合物(17)誘導為活性酯、混合酸酐、或酸鹵化物等，於鹼存在下，使與化合物(4)反應，可製造化合物(2)。此反應係可適用勝肽合成所通常使用的反應試藥、條件，反應條件、試藥、鹼、及惰性溶媒係自化合物(6)之合成所述者加以適宜選擇而使用。

**【0144】**

### 3. 製造方法 3

中間體之式(2)所示的化合物係亦可依據下述之方法而製造。

**【0145】**



【0146】[式中， $\text{L}^1$ ，係末端被變換為順丁烯二醯亞胺基的結構之 $\text{L}^1$ ， $\text{P}^4$ 表示保護基]。

【0147】藉由將化合物(11)誘導為活性酯、混合酸酐等，於鹼存在下，使與C末端經 $\text{P}^4$ 保護的勝肽羧酸(18)反應，可製造化合物(19)。形成勝肽羧酸(18)與化合物(11)之勝肽鍵的反應條件、試藥、鹼、及惰性溶媒係可由化合物(6)之合成所述者加以適宜選擇而使用。化合物(18)之羧基之保護基 $\text{P}^4$ 係可由先前所述保護基加以適宜選擇而使用。

藉由使獲得的化合物(19)之羧基之保護基加以脫保護，可製造化合物(20)。此脫保護係可以與化合物(14)之製造中的羧基之脫保護同樣地進行。


藉由將獲得的化合物(20)誘導為活性酯、或混合酸酐等，使與化合物(7)反應，可製造化合物(2)。此反應係可適用勝肽合成所通常使用的反應試藥、條件，反應條件、試藥、鹼、及惰性溶媒係可由化合物(6)之合成所述者加以適宜選擇而使用。

### 【0148】

#### 4. 製造方法 4

以下，詳述製造方法 2 記載之製造中間體(10)中， $n^1=1$ 、 $L^a=O$  之化合物(10b)之製造方法。式(10b)所示的化合物、其鹽或彼等之溶媒合物係可以例如，下述之方法加以製造。

### 【0149】



【0150】[式中， $L^P$  表示與前述相同者， $L$  表示醯基，為乙醯基等之烷醯基或苄醯基等之芳醯基，或氫原子等； $X$  及  $Y$  表示包含 1 至 3 個之胺基酸的寡勝肽， $P^5$  及  $P^7$  表示胺基之保護基， $P^6$  表示羧基之保護基]。

【0151】式(21)所示的化合物係藉由特開 2002-60351 號公報記載的手法或文獻(J. Org. Chem., 51 卷，3196 頁，1986 年)記載之方法、或應用其方法，因應必要進行保護基之去除或官能基變換，而可加以製造。此

外，藉由將末端胺基為經保護的胺基酸或胺基為經保護的寡肽之酸醯胺以醛或酮處理，可加以獲得。

將化合物(21)，於惰性溶媒中、酸或鹼存在下，於冷卻下至室溫之溫度條件下，藉由使與具有羥基的化合物(22)反應，可製造化合物(23)。

就其中可使用的酸而言，例如，可列舉氫氟酸、鹽酸、硫酸、硝酸、磷酸、硼酸等之無機酸；乙酸、檸檬酸、對甲苯磺酸、甲烷磺酸等之有機酸；四氟硼酸鹽、氯化鋅、氯化錫、氯化鋁、氯化鐵等之路易士酸等。此等中，磺酸類，尤其對甲苯磺酸為較佳。又就鹼而言，可自己述鹼中加以適宜選擇而使用，尤其三級丁醇鉀等之鹼金屬烷氧化物；氫氧化鈉、氫氧化鉀等之鹼金屬氫氧化物；氫化鈉、氫化鉀等之鹼金屬氫化物；二異丙基醯胺鋰等之二烷基氨基鋰所代表的有機金屬鹼；雙(三甲基矽烷基)醯胺鋰等之雙矽烷基胺之有機金屬鹼等為較佳。就反應所使用的溶媒而言，可使用四氫呋喃、1,4-二噁烷等之醚系溶媒；苯、甲苯等之芳香族烴系溶媒等。上述之溶媒可為與水之混合物。又，就P<sup>5</sup>所例示的胺基之保護基而言，通常，只要胺基之保護所使用的基即可，並未特別限制。作為代表性者，可列舉製造方法2所記載的胺基之保護基，但於本反應中，P<sup>5</sup>所例示的胺基之保護基有被切斷的情形。於此情形，因應必要可與適當胺基之保護試藥適宜反應而再度導入保護基。

化合物(24)係可藉由去除化合物(23)之保護基P<sup>6</sup>而加以製造。其中，就P<sup>6</sup>所例示的羧基之保護基而言，可

自製造方法 2 中已記載的代表性者中加以適宜選擇。於化合物(23)，胺基之保護基 P<sup>5</sup> 與羧基之保護基 P<sup>6</sup> 係以不同方法或條件下可去除的保護基為所欲的。例如，可列舉 P<sup>5</sup> 為 9-茀基甲基氨基羰基，P<sup>6</sup> 為苄基的組合等作為代表性者。彼等之保護基係可因應保護胺基及羧基的化合物之性質等而加以選擇，彼等之保護基之去除之際，亦可選擇因應其保護基的試藥、條件。

將羧酸(24)誘導為活性酯、混合酸酐、或酸鹵化物等，於鹼存在下，藉由使與化合物(4)或其藥理上可容許的鹽反應而製造化合物(25)，去除獲得的化合物(25)之保護基 P<sup>5</sup>，可製造化合物(26)。化合物(4)與羧酸(24)之反應及去除保護基 P<sup>6</sup> 的反應可使用與製造方法 2 所述試藥、反應條件相同者。

藉由使化合物(26)與末端胺基經保護的胺基酸或胺基經保護的寡勝肽(27)反應而製造化合物(9b)，藉由去除獲得的化合物(9b)之保護基 P<sup>7</sup>，可製造化合物(10b)。就 P<sup>7</sup> 所示的胺基之保護基而言，通常，只要為胺基之保護所使用的基即可，並未特別限制，作為代表性者可列舉製造方法 2 所記載的胺基之保護基，其去除之際，可因應保護基而選擇試藥、條件。化合物(26)與化合物(27)之反應，可適用勝肽合成上通常使用的反應試藥、條件。上述之方法所製造的化合物(10b)，可依據上述之製造方法而導向本發明化合物(1)。

**【0152】**本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物係藉由放置於大氣中、或再結晶等而純化，有吸收水分、附著

吸附水、成為水合物的情形，如此含水的化合物及鹽亦包含於本發明。

又，本發明中亦包含經各種放射性或非放射性同位素標誌的化合物。構成本發明之抗體-藥物結合物的原子之1個以上亦可含有原子同位素之非天然比率。就原子同位素而言，例如，可列舉氘(<sup>2</sup>H)、氚(<sup>3</sup>H)、碘-125(<sup>125</sup>I)或碳-14(<sup>14</sup>C)等。又，本發明化合物係例如，可以氚(<sup>3</sup>H)、碘-125(<sup>125</sup>I)或碳-14(<sup>14</sup>C)等之放射性同位素作放射性標識。經放射性標識的化合物係有用於作為治療或預防劑、研究試藥，例如，分析試藥、及診斷劑，例如，活體影像診斷劑。本發明之抗體-藥物結合物之全部之同位素變異種不論是否有放射性，皆包含於本發明之範圍。

### 【0153】

#### [醫藥]

本發明之抗TROP2抗體-藥物結合物因顯示對癌細胞的細胞傷害活性，故可作為醫藥，尤其作為抗癌的治療劑及/或預防劑使用。

即，本發明之抗TROP2抗體-藥物結合物係可選擇作為癌治療之主要治療法的化學療法用之藥劑而使用，就其結果而言，可使癌細胞之成長遲緩、抑制增殖、進而破壞癌細胞。藉由此等，於癌患者，可達成解除癌所致的症狀、QOL之改善，而達成保持癌患者之生命的治療效果。即使未達到癌細胞之破壞的情形，亦可藉由癌細胞之增殖之抑制或控制，而於癌患者達成更高QOL的同時，可達成更長期之生存。

本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物係除了以藥物單獨的使用之外，於輔助療法亦可作為與其他療法組合的藥劑而使用，可與外科手術、放射線療法、荷爾蒙療法等組合。再者，亦可作為新輔助療法 (neoadjuvant therapy) 中的藥物療法之藥劑使用。

如以上的治療性使用之外，藉由抗體之對抗原的結合性，而與微細轉移癌細胞結合，使癌細胞之增殖被抑制，進一步亦可期待有破壞的效果。即，尤其於原發性之癌細胞，TROP2 之表現被確認時，藉由投予本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物，可期待癌轉移之抑制、預防效果。例如，轉移過程中抑制、破壞體液中的癌細胞的效果、任一者之組織著床後立即對微細癌細胞的抑制、破壞等之效果可被期待。又，尤其可期待於外科的癌去除後之癌轉移的抑制、預防效果，據此可期待癌的轉移抑制效果。

本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物對於患者除了作為全身療法而全身性投予之外，可於癌組織局部投予而期待治療效果。

**【0154】**就本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物所適用的癌之種類而言，可列舉肺癌、腎癌、尿道上皮癌、大腸癌、前列腺癌、多形性神經膠質母細胞瘤、卵巢癌、胰癌、乳癌、黑色素瘤、肝癌、膀胱癌、胃癌、子宮頸癌、頭頸部癌、食道癌等，但只要於成為治療對象的癌細胞中表現抗體-藥物結合物中之抗體可辨識的蛋白質的癌細胞即可，並未限定於此等。

【0155】本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物係可適合對哺乳動物投予，但更佳為人類。

【0156】就本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物所含的醫藥組成物中使用的物質而言，在投予量或投予濃度方面，可由此領域通常使用的製劑添加物等，適宜選擇而適用。

【0157】本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物係可作為含有 1 種以上之藥學上適合性之成分的藥學組成物被投予。例如，上述藥學組成物，代表性地含有 1 種以上之藥學載劑(例如，經滅菌液體)。其中，液體含有例如，水及油(石油、動物起源、植物起源或合成起源之油)。油，例如，可為花生油、大豆油、礦物油、芝麻油等。於上述藥學組成物為經靜脈內投予的情形，水係更為代表性的載劑。食鹽水溶液、以及右旋糖水溶液及甘油水溶液亦可作為液體載劑，尤其用於注射用溶液。適當的藥學賦形劑係為本項技術領域所周知。若需要時，上述組成物亦可含有微量之潤濕劑或乳化劑、或 pH 緩衝劑。適當的藥學載劑之例係記載於 E.W.Martin 之「Remington's Pharmaceutical Sciences」。其處方係對應於投予之態樣。

【0158】各種送達系統為周知，可用於投予本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物。就導入方法而言，可列舉皮內、肌肉內、腹腔內、靜脈內、及皮下之路徑，但並未限定於此等。投予可為例如，可經由注入或團式注射(bolus injection)。於特定之較佳實施形態，上述配位

體藥物結合體之投予係經由注入。非經口的投予係較佳投予路徑。

【0159】於代表的實施形態，上述藥學組成物係呈適合對人類靜脈內投予的藥學組成物，依據常用順序而被調處。代表性地，靜脈內投予用之組成物係滅菌之等張性之水性緩衝液中的溶液。必要的情形，上述醫藥亦可含有可溶化劑及用以緩和注射部位之疼痛的局部麻醉劑(例如，利卡多因(lignocaine))。一般而言，上述成分係以下列任一者被供給，例如，密封於顯示活性劑的量的安瓿或小袋等而經密封的容器中之呈乾燥冷凍乾燥粉末或無水之濃縮物，各別、或於單位劑型中一起混合。藉由注入上述醫藥而被投予的形態的情形，其可例如，以含有滅菌之製藥等級的水或食鹽水的注入瓶被投藥。上述醫藥係藉由注射而被投予的情形，注射用滅菌水或食鹽水之安瓿係，例如，可以上述成分於投予前被混合的方式被提供。

【0160】本發明之醫藥組成物係可為僅含有本案之抗 TROP2 抗體-藥物結合物的醫藥組成物，亦可為含有抗 TROP2 抗體-藥物結合物及至少一種其他之癌治療劑的醫藥組成物。本發明之抗 TROP2 抗體-藥物結合物亦可與其他癌治療劑一起投予，據此可使抗癌效果增強。以如此目的被使用的其他抗癌劑係可與抗體-藥物結合物同時、各別、或連續地被投予至個體，亦可變換各自之投予間隔而投予。就如此癌治療劑而言，可列舉白蛋白結合行紫杉醇(abraxane)、太平洋紫杉醇

(paclitaxel)、順鉑(cisplatin)、吉西他濱(gemcitabine)、愛萊諾迪肯(irinotecan)(CPT-11)、太平洋紫杉醇(paclitaxel)、培美曲塞(pemetrexed)、蓄莎瓦(sorafenib)、長春鹼(vinblastine)或國際公開第2003/038043號記載之藥劑，再者LH-RH類似物(亮丙瑞林(leuprorelin)、戈舍瑞林(goserelin)等)、磷酸雌二醇氯芥(estramustine phosphate)、雌激素(estrogen)拮抗藥(他莫昔芬(tamoxifen)、雷洛昔芬(raloxifene)等)、芳香環轉化酵素(aromatase)阻礙劑(阿那曲唑(anastrozole)、利妥唑(letrozole)、依西美坦(exemestane)等)等，但只要具有抗腫瘤活性的藥劑即可，並未限定於此等。

**【0161】**如此醫藥組成物係可被製劑化為具有選擇的組成及必要純度的製劑、冷凍乾燥製劑或液狀製劑。製劑化為冷凍乾燥製劑之際，可為含有此領域所使用的適當製劑添加物的製劑。又於液劑亦同樣地，可製劑化為含有此領域所使用的各種製劑添加物的液狀製劑。

**【0162】**醫藥組成物之組成及濃度可依投予方法而變化，但本發明之醫藥組成物所含的抗TROP2抗體-藥物結合物，於抗體-藥物結合物之對抗原的親和性，即對抗原的解離常數( $K_d$ 值)之點，係親和性越高( $K_d$ 值越低)，即使以少量之投予量亦可使藥效發揮。據此，於抗體-藥物結合物之投予量之決定時，基於抗體-藥物結合物與抗原之親和性的狀況，亦可設定投予量。本發明之抗體-藥物結合物對人類投予之際，例如，可將約0.001~100mg/kg以1次或以1~180日1次之間隔作複數次投予。

## [實施例]

【0163】藉由以下所示實施例而具體說明本發明，但本發明並未限定於此等例。又，此等在任何的意義上皆未被限定解釋。又，於本說明書，未特別記載之試藥、溶媒及起始材料係可自市售之供給源容易地取得。

## 【0164】

### [實施例1：小鼠之免疫與融合瘤之取得]

#### 1-1) 小鼠免疫用的細胞之準備

將  $5 \times 10^6$  個之 NCI-H322 細胞(人類非小細胞肺癌細胞株、ATCC CRL-5806；ATCC：American Type Culture Collection) 以 RPMI-1640(Roswell Park Memorial Institute-1640)培養基(10ml)培養 5 日後回收，以 PBS(磷酸緩衝生理食鹽水)洗淨 2 次，並再懸浮於 PBS( $500\mu l$ )中。

## 【0165】

#### 1-2) 對小鼠之免疫

對 BALB/c 小鼠(6 週齡)，第 1 次免疫係將 NCI-H322 細胞( $1 \times 10^7$  個)對腹腔內免疫。第 2~5 次係以 1 週間隔將  $1 \times 10^6$  個之 NCI-H322 細胞對腹腔內免疫。第 6 次之最終免疫係將 NCI-H322 細胞，以  $1 \times 10^6$  細胞/ $200\mu l$  PBS，分別對尾靜脈及腹腔內免疫。脾臟細胞係最終免疫後 3 日後摘出。

## 【0166】

#### 1-3) 經免疫小鼠之脾臟細胞之準備

摘出已經免疫的小鼠脾臟，研磨而懸浮於 RPMI 1640 10%FBS(胎牛血清)(+)培養基。將細胞懸浮液通過細胞過濾器(cell strainer)(100 $\mu$ m、BD Falcon 公司)後，以 1500rpm 於室溫離心 5 分鐘而廢棄上清液。添加 Tris-NH<sub>4</sub>Cl 溶液(20mM Tris-HCl pH7.5、0.83%NH<sub>4</sub>Cl；10mL)，並於室溫處理 5 分鐘。於細胞懸浮液中添加 RPMI 1640 FBS(+)培養基(10ml)，通過細胞過濾器後，以 1500rpm 於室溫離心 5 分鐘。丟棄上清液，脾臟細胞以 RPMI 1640 FBS(-)培養基(10ml)再懸浮。

### 【0167】

#### 1-4)骨髓瘤細胞之準備

回收 P3U1 細胞(小鼠骨髓瘤細胞株)，以 1500rpm 於室溫離心 5 分鐘。於 P3U1 細胞中添加 EDTA(0.02%)溶液(10ml)，並於 37°C 處理 5 分鐘。P3U1 細胞懸浮液以 1500rpm 於室溫離心 5 分鐘。丟棄上清液，以 RPMI 1640 FBS(-)培養基(10ml)再懸浮。

### 【0168】

#### 1-5)細胞融合

將脾臟細胞及骨髓瘤細胞混合成 5：1，離心分離(1200rpm、5 分鐘)。徹底鬆動獲得的沉澱劃分之細胞群後，一邊攪拌一邊歷經約 1 分鐘緩緩添加聚乙二醇-4000(PEG-4000；1mL)。之後每分鐘於該細胞液中添加數次 RPMI 培養基(1mL)後，添加 RPMI 培養基使總量成為 50mL。將該細胞懸浮液離心分離(900rpm、5 分鐘)，將獲得的沉澱劃分的細胞緩緩鬆動後，於 HAT 培養基

(添加 10% 胎牛血清及 HAT Media Supplement 的 MI1640 培養基；100mL) 中緩緩地懸浮。將該懸浮液以 200 $\mu$ L/孔各分注於 96 孔培養用平盤，於 37°C、5%CO<sub>2</sub> 之培養箱中，培養至成為 50% 融合。

### 【0169】

#### 1-6) 以變異型腺病毒 FZ33 之融合瘤之篩選

將 NCI-H322 細胞以  $5 \times 10^3$  細胞/孔接種於 96 孔盤中，並於 37°C 培養 48 小時。細胞以 150 $\mu$ l/孔之 PBS 洗淨 2 次，對各孔添加各融合瘤培養上清液(50 $\mu$ l)並於 4°C 使反應 1 小時。以 150 $\mu$ l/孔之 PBS 洗淨 2 次，將腺病毒 Ax3CAZ3-FZ33(以與抗體結合的方式使 Z33 纖維經改變的 β-半乳糖苷酶(β-galactosidase)表現腺病毒(參照美國專利申請公開第 2012/0237518 號說明書))以 RPMI1640(-) 培養基稀釋成  $3 \times 10^6$  vp/100 $\mu$ l( $1 \times 10^3$  vp/細胞)之濃度，以 100 $\mu$ l/孔添加此稀釋溶液。於 4°C 使反應 1 小時後，以 150 $\mu$ l/孔之 PBS 洗淨 2 次。以 100 $\mu$ l/孔添加 RPMI1640 FBS(+) 培養基，並於 37°C 培養 24 小時。以使用 Galacto-Light Plus Reporter Gene Assay System(Applied Biosystems 公司)的 β-Gal 報導基因分析所處理的 NCI-H322 細胞，以 200 $\mu$ l/孔之 PBS 洗淨，以 50 $\mu$ l/孔添加 Lysis Solution 並於室溫靜置 10 分鐘。此細胞溶解液(10 $\mu$ L)以 Galacton-Plus Galacto Reaction Buffer Diluent 稀釋 100 倍，添加於 White microwell SH 96 well plate(Nunc 公司)並於室溫使反應 1 小時。以 150 $\mu$ l/孔添

加 Accelerator II，並使用 Multilabel Counter Wallac 1420ARVOsx(Perkin Elmer 公司)而測量化學發光 5 秒，每 1 秒之平均值作為 RLU(發光量)，表示對 NCI-H322 細胞之病毒感染量。於如此進行的融合瘤群之篩選，測定值 (RLU) 係群全體 (最小值 1383RLU、平均值 10914RLU、最大值 78746RLU)之中，選出 5000RLU 以上的選殖株。首先，就 1 次篩選而言，一次細胞融合所獲得的 960 孔之融合瘤孔中選出 81 孔之陽性孔。再者，就確認篩選而言，藉由與 1 次篩選相同之手法，進行雙套(duplicate)分析，將兩者之測定值為 5000RLU 以上之孔作為陽性，由 1 次篩選所獲得的 81 孔選出 52 孔之陽性孔。經選出的選殖株進行 2~4 次之次選殖，建立單株融合瘤細胞株 44 株。

### 【0170】

#### [實施例 2：自融合瘤之抗體純化]

事先將姥鯫烷(Pristane；2,6,10,14-四甲基十五烷；0.5ml)腹腔內投予並飼育 2 週的 8~10 週齡小鼠或裸鼠中，將實施例 1 所獲得的單株抗體產生融合瘤注射至腹腔內。再者，經 10~21 日使融合瘤腹水癌化後，採取腹水。將獲得的腹水離心分離而去除固體成分後，以 40~50% 硫酸銨鹽析，進行辛酸沉澱法、DEAE-Sepharose 管柱、Protein G-管柱所致的純化，收集 IgG 或 IgM 劃分，作為純化單株抗體。

### 【0171】

[實施例 3：融合瘤產生的抗體之結合的抗原的鑑定]

針對實施例 2 所調製的融合瘤之產生的抗體之一的 TINA1，進行抗原之鑑定。

**【0172】**

3-1) 使用經生物素標示的細胞表面蛋白質之 TINA1 抗體的免疫沈降

回收  $5 \times 10^6$  個之 NCI-H322 細胞，並以 PBS 洗淨 3 次。以 0.1 mg/ml 之濃度將 EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin(PIERCE 公司)懸浮於 PBS。NCI-H322 細胞於 Biotin/PBS 溶液中、室溫下旋轉 30 分鐘後，以 100 mM 甘胺酸/PBS 溶液(25 ml)洗淨 2 次，之後，以 PBS(25 ml)洗淨 3 次。將洗淨後之細胞再懸浮於溶解緩衝液(150 mM NaCl、50 mM Tris-HCl pH7.6、1% NP-40 + 蛋白酶抑制劑、完全無 EDTA(Roche 公司)1 粒 / 50 ml；2 ml)中，於 4°C 處理 30 分鐘。將 Protein G Sepharose(Protein G Sepharose 4 Fast Flow(GE Healthcare 公司))之緩衝液置換為溶解緩衝液而獲得的 Protein G Sepharose/溶解緩衝液(50% 漿液；30 μl)添加至細胞溶解液中，於 4°C 旋轉 1 小時後，於 4°C 離心 5 分鐘，並回收上清液。於此上清液中添加 TINA1 抗體(3 μg)，並於 4°C 旋轉 1 小時後，添加 Protein G Sepharose/溶解緩衝液(50% 漿液；60 μl)，並於 4°C 旋轉 2 小時。以溶解緩衝液(1 ml)將 Protein G Sepharose 洗淨 6 次後，再懸浮於 1×SDS 樣品緩衝液/5% 2-ME(2-巯基乙醇)緩衝液(62.5 mM Tris-HCl(25°C、pH6.8)、2%(w/v)SDS、10% 甘油及 0.01%(w/v)酚紅)。於

100°C 處理懸浮液 5 分鐘後，回收溶液，作為 SDS-PAGE(聚丙烯醯胺膠體電泳)用之樣品。

### 【0173】

#### 3-2) SDS-PAGE 及西方墨漬法

將 3-1) 調製的 SDS-PAGE 樣品，使用 Ready Gels J 5-20%(BioRad 公司)，以 20mA 泳動後，以  $0.1\text{mA/cm}^2$  自膠體向膜印漬。膜以 PBS-T(PBS(-)-0.05% Tween20)洗淨 5 分鐘後，進行 1 小時阻斷。膜以 PBS-T 作 5 分鐘洗淨 3 次後，使與辣根氫氧化酶標示之鏈酶親和素結合物 (Streptavidin-horseradish peroxidase conjugate)(Amersham 公司；以 PBS-T 稀釋 2000 倍來使用)反應 1 小時。膜以 PBS-T，10 分鐘洗淨 4 次後，使用 ECL 西方氏墨漬偵測試劑(Amersham 公司)及 Hyperfilm ECL(Amersham 公司)而檢測目的的帶(band)。依據實施例 3-1)之順序，將經生物素標示的 NCI-H322 細胞，已經質量分析而確認抗原為 TROP2 的 KCI7A3 抗體及 TINA1 抗體以免疫沈降而獲得的免疫沈降物，分別於未添加 DTT 或添加 DTT 下藉由 SDS-PAGE 及西方墨漬法而解析。使用 KCI7A3 抗體及 TINA1 抗體任一者的情形，未添加 DTT 者檢測出分子量 46kDa 之帶，添加 DTT 的樣品檢測出分子量 37kDa 之帶。

### 【0174】

#### 3-3) FACS 解析

因由帶的樣式可預測 TINA1 抗體之抗原為 TROP2，未進行質量分析下，進行 cDNA 之基因導入所致的強制

表現解析。FACS 解析之結果，於人類 TROP2 表現 CHOK1 細胞，因 TINA1 抗體顯示強陽性反應，顯示 TINA1 抗體之抗原為 TROP2。又，使用肺癌細胞株 PC14、肺癌細胞株 NCI-H322、肺癌細胞株 NCI-H2122、肺癌細胞株 LCAM1、肺癌細胞株 LC2/ad、胰癌細胞株 MIAPaCa2、胰癌細胞株 PK-1、前列腺癌細胞株 PC3、大腸癌細胞株 HCT116、黑色素瘤細胞株 A375、卵巢癌細胞株 SKOV3、造血系統腫瘤細胞株 RPMI8226、造血系統腫瘤細胞株 K562、PBMC(人類末梢血液單核細胞)及人類血小板而進行相同的 FACS 解析。調查的肺癌細胞株係任一者皆為 TROP2 陽性，肺癌以外之細胞株中 PC3、PK1、SKOV3 為陽性。另一方面，正常血液細胞係任一者皆為陰性。

### 【0175】

[實施例 4：抗體內在化活性之測定]

#### 4-1) 抗體內在化活性評價系統

以抗體之內在化及免疫毒素活性之測定為目的而製作重組複合蛋白質 DT3C。此 DT3C 係兼具白喉毒素(DT)之觸媒區與 Protein G 之抗體結合區 3 個的蛋白質。DT3C 係與抗體之 Fc 部分特異性結合而安定、併入細胞內時藉由抑制蛋白質合成而誘導細胞死亡。使用此系統時，可同時觀察抗體之內在化與免疫毒素所致的殺細胞效果(Yamaguchi, M., Hamada, H., et al., Biochemical and Biophysical Research Communications 454 (2014) 600-603)。

## 【 0176 】

## 4-2) DT3C 所致的內在化以及免疫毒素活性之評價

於 96 孔盤中添加  $4\mu\text{g}/\text{mL}$  之 DT3C( $25\mu\text{L}$ )，再添加實施例 1 或依據其之方法所取得的 11 種融合瘤之培養上清液( $25\mu\text{L}$ )，並於室溫培育 30 分鐘。又，預先確認產生 TINA1 抗體之融合瘤以外之融合瘤所產生的抗體之辨識抗原係 CD9、CD46、CD55、CD59、CD71、CD73、CD147、CD276、EpCAM、或 EGFR。接種  $2 \times 10^4$  個/ $\text{mL}$ ( $20\%$  Low IgG FBS 加 RPMI1640 培養基)之 NCI-H322 細胞( $50\mu\text{L}$ )，於室溫培育 30 分鐘後，於  $37^\circ\text{C}$   $\text{CO}_2$  培育箱培養 3 日。培養後去除上清液，添加  $10\% \text{WST-10\% FBS-RPMI1640}$ ( $100\mu\text{L}$ )，並於  $37^\circ\text{C}$   $\text{CO}_2$  培養箱內培育 1 小時，活細胞數以微量盤讀取機( $\text{OD}_{450} \sim \text{OD}_{640}$ 、infinite200、Tecan 股份有限公司)測定。評價的融合瘤細胞之培養上清液中，認為抗 CD59、CD71、EGFR、EpCAM、及 TROP2 的抗體為強內在化以及免疫毒素活性(第 10 圖)。

## 【 0177 】

## 4-3) 抗 CD59、CD71、EGFR、EpCAM、及 TROP2 的抗體之內在化以及免疫毒素活性之相異

於 96 孔盤中添加 DT3C( $0$ 、 $0.004$ 、 $0.04$ 、 $0.4$ 、 $4$ 、 $40\mu\text{g}/\text{mL}$ )稀釋溶液( $25\mu\text{L}$ )，並添加各抗體( $40\mu\text{g}/\text{mL}$ ； $25\mu\text{L}$ )，於室溫培育 30 分鐘。再者，接種  $2 \times 10^4$  個/ $\text{mL}$ (添加  $20\%$  Low IgG FBS 之 RPMI1640 培養基)之 NCI-H322 細胞( $50\mu\text{L}$ )，於室溫培育 30 分鐘後，於  $37^\circ\text{C}$   $\text{CO}_2$

培養箱中培養 3 日。培養後去除上清液，添加加有 10% WST-1 之 10% FBS-RPMI1640(100 μL)，於 37°C CO<sub>2</sub> 培養箱內培育 1 小時，活細胞數以平盤讀取機 (OD<sub>450</sub>~OD<sub>640</sub>)測定。評價的抗體之中，抗 TROP2 的抗體 TINA1 之內在化以及免疫毒素活性最強(第 11 圖)。

### 【0178】

4-4)抗 TROP2 抗體之各株中的內在化以及免疫毒素活性之相異

針對實施例 1 或依據其所取得的 TINA1(免疫原：肺癌株 NCI-H322)、KCL7A3、及 KCL2D6(免疫原：胰臟癌株 KCL-MOH1)、Pr1E11 及 Pr8H10(免疫原：前列腺癌株 Pc-1)、NY16 及 NY17(免疫原：胰臟癌株 PK-1)以及市售之 77220(R&D System)之各抗 TROP2 抗體之內在化以及免疫毒素活性，與實施例 4-3)同樣地評價。其結果，8 種抗 TROP2 抗體之中，TINA1 抗體具有最強活性(第 12 圖)。

### 【0179】

[實施例 5：編碼 TINA1 抗體基因之可變區的 cDNA 之核苷酸序列之決定及嵌合 TINA1(以下 cTINA1)抗體之製作]

5-1)編碼 TINA1 抗體基因之可變區的 cDNA 之核苷酸序列之決定

5-1-1)由產生 TINA1 抗體的融合瘤之 mRNA 之調製

為了增幅含 TINA1 抗體之可變區的 cDNA，由產生 TINA1 抗體之融合瘤，使用 mRNA 單離套組 (Roche applied science 公司)而調製 mRNA。

## 【 0180 】

5-1-2)cDNA(5'-RACE-Ready cDNA)之合成

cDNA(5'-RACE-Ready cDNA)之合成係使用實施例

5-1-1)所調製的 mRNA(100ng)及 SMARTer RACE cDNA 增幅套組(CLONTECH 公司)來實施。

## 【 0181 】

5-1-3)藉由 5'-RACE PCR 之含 TINA1 抗體之重鏈可變區的 cDNA 之增幅及序列之決定

作為重鏈基因之可變區之 cDNA 以 PCR 增幅用之引子，使用 UPM(Universal Primer A Mix：附屬於 SMARTer RACE cDNA 增幅套組)、及具有 5'-AGAGTTCCAGGTCAAGGTCACTGGCTCAGG-3'(序列識別號 33：引子 mG2aVR2)之序列的寡核昔酸。UPM 係使用附屬於 SMARTer RACE cDNA 增幅套組(CLONTECH 公司)者，mG2aVR2 係由資料庫之小鼠重鏈(IgG2a)之恆定區之序列而設計。

藉由此引子之組合、及以實施例 5-1-2)合成的 cDNA(5'-RACE-Ready cDNA)作為模版的 5'-RACE PCR，將含 TINA1 抗體之重鏈之可變區的 cDNA 增幅。PCR 係使用 KOD-plus(TOYOBO 公司)作為聚合酶，依據 SMARTer RACE cDNA 增幅套組(CLONTECH 公司)之手冊，以遞減 PCR(touchdown PCR)程式來實施。

將含以 5'-RACE PCR 增幅的重鏈之可變區的 cDNA，使用 MinElute PCR 純化套組(QIAGEN 公司)純化後，使用 Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kit(Invitrogen

公司)作選殖，實施含經選殖的重鏈之可變區的 cDNA 之核苷酸序列的定序解析。作為定序引子，使用自資料庫的小鼠重鏈之恆定區的序列所設計的上述引子 mG2aVR2、及 NUP(Nested Universal Primer A：附屬於 SMARTer RACE cDNA 增幅套組)。

定序解析係使用基因序列解析裝置(「 ABI PRISM 3700 DNA Analyzer」或「 Applied Biosystems 3730xl Analyzer」、Applied Biosystems 公司)來實施，定序反應係使用 Gene Amp 9700(Applied Biosystems 公司)。

將編碼經決定的 TINA1 抗體之重鏈之可變區的 cDNA 的核苷酸序列示於序列表之序列識別號 1，胺基酸序列示於序列識別號 2。

### 【 0182 】

5-1-4)5'-RACE PCR 所致之含 TINA1 抗體之輕鏈可變區的 cDNA 之增幅及序列之決定

作為 TINA1 抗體之輕鏈基因之可變區的 cDNA 以 PCR 增幅用之引子，使用 UPM(Universal Primer A Mix：附屬於 SMARTer RACE cDNA 增幅套組)及具有 5'-AGTCCAAGTGTTAGGACGCCATTGTCG-3'(序列識別號 34：引子 mKVR2)之序列的寡核苷酸。UPM 係使用附屬於 SMARTer RACE cDNA 增幅套組(CLONTECH 公司)者，mKVR2 係由資料庫之小鼠輕鏈之恆定區的序列所設計。

藉由此引子之組合、及以實施例 5-1-2)所合成的 cDNA(5'-RACE-Ready cDNA)作為模板的 5'-RACE

PCR，將含 TINA1 抗體之輕鏈之可變區的 cDNA 增幅。PCR 係使用 KOD-plus-(TOYOBO 公司)作為聚合酶，依據 SMARTer RACE cDNA 增幅套組(CLONTECH 公司)之手冊，以遞減 PCR 程式來實施。

將含以 5'-RACE PCR 增幅的輕鏈之可變區的 cDNA，使用 MinElute PCR 增幅套組(QIAGEN 公司)純化後，使用 Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kit(Invitrogen 公司)選殖，實施含經選殖的輕鏈之可變區的 cDNA 之核苷酸序列之定序解析。

作為定序引子，使用由資料庫之小鼠輕鏈之恆定區的序列所設計的上述引子 mKVR2 及 NUP。

定序解析及定序反應係使用上述裝置。

將編碼經決定的 TINA1 抗體之輕鏈之可變區的 cDNA 的核苷酸序列示於序列表之序列識別號 3，胺基酸序列示於序列識別號 4。

### 【 0183 】

#### 5-2)cTINA1 抗體之製作

##### 5-2-1)嵌合及人類化抗體輕鏈表現載體 pCMA-LK 之構築

將質體 pcDNA3.3-TOP/LacZ(Invitrogen 公司)以限制酶 XbaI 及 PmeI 消化所獲得的約 5.4 kb 之片段、及含有編碼序列識別號 5 所示人類 κ 鏈分泌訊號及人類 κ 鏈恆定區的 DNA 序列的 DNA 片段，使用 In-Fusion Advantage PCR 選殖套組(CLONTECH 公司)而結合，製作 pcDNA3.3/LK。

pCDNA3.3/LK 作為模板，以下述引子組進行 PCR，將獲得的約 3.8kb 之片段磷酸化後藉由自我連結而構築於 CMV 啟動子之下游具有訊息序列、選殖位、及人類 κ 鏈恆定區之嵌合及人類化抗體輕鏈表現載體 pCMA-LK。

#### 引子組

5'-tataccgtcgacacctctagcttagagcttggc-3'(序列識別號  
35：引子 3.3-F1)

5'-gctatggcagggcctgccgcggggacgttg-3'(序列識別號  
36：引子 3.3-R1)

#### 【0184】

5-2-2) 嵌合及人類化抗體 IgG1 型重鏈表現載體 pCMA-G1 之構築

使用 In-Fusion Advantage PCR 選殖套組 (CLONTECH 公司) 將 pCMA-LK 以 XbaI 及 PmeI 消化而去除 κ 鏈分泌訊號及人類 κ 鏈恆定區的 DNA 片段、及含有序列識別號 6 所示的編碼人類重鏈訊息序列及人類 IgG1 恒定區之胺基酸的 DNA 序列的 DNA 片段結合，構築於 CMV 啟動子之下游具有訊息序列、選殖位、人類 IgG1 重鏈恆定區的嵌合及人類化抗體 IgG1 型重鏈表現載體 pCMA-G1。

#### 【0185】

5-2-3)cTINA1 抗體重鏈表現載體之構築

將實施例 5-1-3) 所獲得的含 TINA1 抗體之重鏈之可變區的 cDNA 作為模板，以 KOD-Plus-(TOYOBO 公司)

及下述引子組增幅含有編碼重鏈之可變區的 cDNA 的 DNA 片段，使用 In-Fusion HD PCR 選殖套組 (CLONTECH 公司)，藉由插入於將嵌合及人類化 IgG1 型重鏈表現載體 pCMA-G1 以限制酶 B1pI 切斷處，構築 cTINA1 抗體重鏈表現載體。將獲得的表現載體命名「pCMA-G1/cTINA1」。將 cTINA1 抗體重鏈之核苷酸序列示於序列識別號 7，胺基酸序列示於序列識別號 8。序列識別號 7 之核苷酸序列及序列識別號 8 之胺基酸序列亦記載於第 1 圖。

#### cTINA1 抗體重鏈用引子組

5'-CCAGATGGGTGCTGAGCCAGATCCAGTTGGTGCA  
GTCTGGACCTGAG-3' (序列識別號 37：引子 TINA1H-F)

5'-CTTGGTGGAGGCTGAGCTGACGGTGACCGCGGT  
CCCTGCGCCCCAGAC-3' (序列識別號 38：引子 TINA1H-R)

#### 【0186】

#### 5-2-4)cTINA1 抗體輕鏈表現載體之構築

將實施例 5-1-4)所獲得的含 TINA1 抗體之輕鏈之可變區的 cDNA 作為模板，以 KOD-Plus-(TOYOBO 公司) 及下述之引子組，增幅含編碼輕鏈之可變區的 cDNA 的 DNA 片段，使用 In-Fusion HD PCR 選殖套組 (CLONTECH 公司)，經由插入於將嵌合及人類化抗體輕鏈表現汎用載體 pCMA-LK 以限制酶 BsiWI 切斷處，構築 cTINA1 抗體之輕鏈表現載體。將獲得的表現載體命名為「pCMA-LK/cTINA1」。cTINA1 抗體之輕鏈之核苷

酸序列示於序列表之序列識別號 9，胺基酸序列示於序列識別號 10。序列識別號 9 之核苷酸序列及序列識別號 10 之胺基酸序列亦記載於第 2 圖。

#### cTINA1 抗體輕鏈用引子組

5'-ATCTCCGGCGCGTACGGCGACATTGTGATGACC  
CAGTCTCACAAATTC-3'(序列識別號 39：引子 TINA1L-F)

5'-GGAGGGGGCGGCCACAGCCGTTTAGCTCCA  
GCTTGGTCCCAGC-3'(序列識別號 40：引子 TINA1L-R)

#### 【0187】

#### 5-2-5)cTINA1 抗體之小規模生產

FreeStyle 293F 細胞(Invitrogen 公司)係依據手冊，而實施繼代、培養。

將對數增殖期之  $1 \times 10^7$  個之 FreeStyle 293F 細胞(Invitrogen 公司)，以 FreeStyle 293 表現媒體(Invitrogen 公司)稀釋成 9.6mL 後，接種於 30mL Square Storage Bottle(Nalgene 公司)，於 37°C、8%CO<sub>2</sub> 培養箱內，以 90rpm 震盪培養一小時。將聚伸乙亞胺(Polyscience #24765；30μg)溶解於 Opti-Pro SFM(Invitrogen 公司；200μL)，接著，將使用 PureLink HiPure 質體套組(Invitrogen 公司)而調製的輕鏈表現載體(6μg)及重鏈表現載體(4μg)添加於 Opti-Pro SFM(Invitrogen 公司；200μL)。於聚伸乙亞胺/Opti-Pro SFM 混合液(200μL)中，添加表現載體/Opti-Pro SFM 混合液(200μL)並緩緩攪拌，再放置 5 分鐘後，添加於 FreeStyle 293F 細胞。

於 37°C、8%CO<sub>2</sub> 培養箱，以 90 rpm 震盪培養 7 日而獲得的培養上清液，以 Minisart-Plus 過濾器 (Sartorius 公司) 過濾而作為評價用之樣品。

將由 pCMA-G1/cTINA1 與 pCMA-LK/cTINA1 之組合而取得的人類嵌合 TINA1 抗體命名為「cTINA1 抗體」。

### 【0188】

[實施例 6：小鼠抗 TROP2 單株抗體之人類化抗體之設計]

6-1)TINA1 之人類化變型之設計

6-1-1)TINA1 之可變區之分子模擬 (molecular modeling)

TINA1 之可變區之分子模擬係藉由作為同源性模擬 (homology modeling) 之周知方法 (Methods in Enzymology, 203, 121-153(1991)) 而實行。將於蛋白質資料庫 (Protein Data Bank) (Nuc. Acid Res. 35, D301-D303(2007)) 註冊的人類免疫球蛋白之可變區之 1 次序列 (由 X 射線結晶結構衍生的三維結構係可能取得的)，與事先決定的 TINA1 之可變區作比較。結果，1ZEA 係相對於 TINA1 之重鏈之可變區，於同樣地框架區中有缺損的抗體之中，以具有最高序列同源性而被選擇。又，3IU4 係相對於 TINA1 之輕鏈之可變區，以具有最高序列同源性被選擇。框架區之三維結構係可藉由組合對應 TINA1 之重鏈及輕鏈的 1ZEA 及 3IU4 之座標而獲得「框架模型 (framework model)」而被製作。其次，於各自之 CDR 之代表的構形被併入框架模式。

最後，於能量的觀點，為了獲得有 TINA1 之可變區的可能性的分子模式，進行用以除去不利原子間接觸的能量計算。上述順序使用市售之蛋白質立體結構解析程式 Discovery Studio(Accelrys, Inc.)來進行。

### 【0189】

#### 6-1-2)抗人類化 TINA1 的胺基酸序列之設計

人類化 TINA1 抗體之構築藉由作為 CDR 接枝(Proc.Natl.Acad.Sci.USA 86, 10029-10033(1989))之周知方法而進行。受體抗體(acceptor antibody)係基於框架區內之胺基酸同源性而被選擇。將 TINA1 之框架區之序列與抗體之胺基酸序列之 Kabat 資料庫(Nuc.Acid Res.29, 205-206(2001))全部的人類框架作比較，結果，HuPR1A3 抗體起因於框架區之 74% 之序列同源性，被選擇作為受體(acceptor)。使於 HuPR1A3 之框架區之胺基酸殘基，與 TINA1 之胺基酸殘基並列，鑑定相異胺基酸被使用的位置。此等之殘基的位置係基於使用以上所構築的 TINA1 之三維模型而被分析，而且接受者上應被接枝的供體殘基係藉由 Queen 等人(Proc.Natl.Acad.Sci.USA 86, 10029-10033(1989))所給予的基準而被選擇。藉由將被選擇的幾個供體殘基移入受體抗體，如以下實施例記載的方式構築人類化 TINA1 序列。

### 【0190】

#### 6-2)TINA1 重鏈之人類化

##### 6-2-1)hTINA1-H1 型重鏈：

將伴隨序列表之序列識別號 8 所示的 TINA1 重鏈之胺基酸編號 21(異白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 28(脯胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 30(白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 35(麩胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 36(蘇胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 38(精胺酸)取代為離胺酸、胺基酸編號 39(異白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 57(麩醯胺酸)取代為精胺酸、胺基酸編號 58(離胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 59(甲硫胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 62(離胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 65(離胺酸)取代為麩胺酸、胺基酸編號 67(異白胺酸)取代為甲硫胺酸、胺基酸編號 87(苯丙胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 88(丙胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 89(苯丙胺酸)取代為異白胺酸、胺基酸編號 91(白胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 92(麩胺酸)取代為天冬胺酸、胺基酸編號 95(丙胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 102(異白胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 104(天冬醯胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 107(天冬醯胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 111(蘇胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 112(蘇胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 114(苯丙胺酸)取代為酪胺酸、胺基酸編號 132(丙胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 135(丙胺酸)取代為白胺酸的經設計的人類化 TINA1 重鏈，命名為「hTINA1-H1 型重鏈」。

hTINA1-H1 型重鏈之胺基酸序列係記載於序列表之序列識別號 12。由序列識別號 12 之胺基酸序列之第 1

至 19 號之胺基殘基所構成的序列、第 20 至 140 號之胺基酸殘基所構成的序列、第 141 至 470 號之胺基酸殘基所構成的序列係各自相當於訊息序列、重鏈可變區、重鏈恆定區。編碼序列識別號 12 之胺基酸序列的核昔酸序列係記載於序列表之序列識別號 11。序列識別號 11 之核昔酸序列之第 1 至 57 號之核昔酸所構成的序列、第 58 至 420 號之核昔酸所構成的序列、第 421 至 1410 號之核昔酸所構成的序列係各自為編碼訊息序列、重鏈可變區序列、重鏈恆定區序列。序列識別號 11 之核昔酸序列及序列識別號 12 之胺基酸序列亦記載於第 3 圖。

### 【0191】

6-2-2)hTINA1-H2 型重鏈：

將伴隨序列表之序列識別號 8 所示的 TINA1 重鏈之胺基酸編號 21(異白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 28(脯胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 30(白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 35(麩胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 36(蘇胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 38(精胺酸)取代為離胺酸、胺基酸編號 39(異白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 57(麩醯胺酸)取代為精胺酸、胺基酸編號 58(離胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 59(甲硫胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 62(離胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 65(離胺酸)取代為麩胺酸、胺基酸編號 67(異白胺酸)取代為甲硫胺酸、胺基酸編號 87(苯丙胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 88(丙胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 89(苯丙胺酸)取代為異白胺酸、胺

基酸編號 92(麩胺酸)取代為天冬胺酸、胺基酸編號 95(丙胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 102(異白胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 104(天冬醯胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 107(天冬醯胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 111(蘇胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 112(蘇胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 114(苯丙胺酸)取代為酪胺酸、胺基酸編號 132(丙胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 135(丙胺酸)取代為白胺酸所設計的人類化 TINA1 重鏈，命名為「hTINA1-H2 型重鏈」。

hTINA1-H2 型重鏈之胺基酸序列係記載於序列表之序列識別號 14。序列識別號 14 之胺基酸序列之第 1 至 19 號之胺基殘基所構成的序列、第 20 至 140 號之胺基酸殘基所構成的序列、第 141 至 470 號之胺基酸殘基所構成的序列係各自相當於訊息序列、重鏈可變區、重鏈恆定區。編碼序列識別號 14 之胺基酸序列的核苷酸序列係記載於序列表之序列識別號 13。序列識別號 13 之核苷酸序列之第 1 至 57 號之核苷酸所構成的序列、第 58 至 420 號之核苷酸所構成的序列、第 421 至 1410 號之核苷酸所構成的序列係各自編碼訊息序列、重鏈可變區序列、重鏈恆定區序列。序列識別號 13 之核苷酸序列及序列識別號 14 之胺基酸序列亦記載於第 4 圖。

### 【0192】

6-2-3)hTINA1-H3 型重鏈：

將伴隨序列表之序列識別號 8 所示的 TINA1 重鏈之胺基酸編號 28(脯胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號

30(白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 36(蘇胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 38(精胺酸)取代為離胺酸、胺基酸編號 39(異白胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 58(離胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 65(離胺酸)取代為麩胺酸、胺基酸編號 67(異白胺酸)取代為甲硫胺酸、胺基酸編號 87(苯丙胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 88(丙胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 92(麩胺酸)取代為天冬胺酸、胺基酸編號 95(丙胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 102(異白胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 104(天冬醯胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 107(天冬醯胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 111(蘇胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 112(蘇胺酸)取代為纈胺酸、胺基酸編號 114(苯丙胺酸)取代為酪胺酸、胺基酸編號 132(丙胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 135(丙胺酸)取代為白胺酸的設計的人類化 TINA1 重鏈，命名為「hTINA1-H3 型重鏈」。

hTINA1-H3 型重鏈之胺基酸序列係記載於序列表之序列識別號 16。序列識別號 16 之胺基酸序列之第 1 至 19 號之胺基殘基所構成的序列、第 20 至 140 號之胺基酸殘基所構成的序列、第 141 至 470 號之胺基酸殘基所構成的序列係各自相當於訊息序列、重鏈可變區、重鏈恆定區。編碼序列識別號 16 之胺基酸序列的核苷酸序列係記載於序列表之序列識別號 15。序列識別號 15 之核苷酸序列之第 1 至 57 號之核苷酸所構成的序列、第 58 至 420 號之核苷酸所構成的序列、第 421 至 1410 號

之核苷酸所構成的序列係各自編碼訊息序列、重鏈可變區序列、重鏈恆定區序列。序列識別號 15 之核苷酸序列及序列識別號 16 之胺基酸序列亦記載於第 5 圖。

### 【 0193 】

6-3)TINA1 輕鏈之人類化

6-3-1)hTINA1-L1 型輕鏈：

將伴隨序列表之序列識別號 10 所示的 TINA1 輕鏈之胺基酸編號 23(纈氨酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 28(組胺酸)取代為脯胺酸、胺基酸編號 29(離胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 30(苯丙胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 31(甲硫胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 33(蘇胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 40(絲胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 62(麩醯胺酸)取代為離胺酸、胺基酸編號 63(絲胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 80(天冬胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 83(蘇胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 90(丙胺酸)取代為天冬胺酸、胺基酸編號 93(苯丙胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 98(纈胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 100(丙胺酸)取代為脯胺酸、胺基酸編號 103(白胺酸)取代為苯丙胺酸、胺基酸編號 120(丙胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 126(白胺酸)取代為異白胺酸、胺基酸編號 129(丙胺酸)取代為蘇胺酸的設計的人類化 TINA1 輕鏈，命名為「 hTINA1-L1 型輕鏈」。

hTINA1-L1 型輕鏈之胺基酸序列係記載於序列表之序列識別號 18。序列識別號 18 之胺基酸序列之第 1 至

20 號之胺基殘基所構成的序列、第 21 至 129 號之胺基酸殘基所構成的序列、第 130 至 234 號之胺基酸殘基所構成的序列係各自相當於訊息序列、輕鏈可變區、輕鏈恆定區。編碼序列識別號 18 之胺基酸序列的核苷酸序列係記載於序列表之序列識別號 17。序列識別號 17 之核苷酸序列之第 1 至 60 號之核苷酸所構成的序列、第 61 至 387 號之核苷酸所構成的序列、第 388 至 702 號之核苷酸所構成的序列係各自編碼訊息序列、輕鏈可變區序列、輕鏈恆定區序列。序列識別號 17 之核苷酸序列及序列識別號 18 之胺基酸序列亦記載於第 6 圖。

#### 【0194】

6-3-2)hTINA1-L2 型輕鏈：

將伴隨序列表之序列識別號 10 所示的 TINA1 輕鏈之胺基酸編號 28(組胺酸)取代為脯胺酸、胺基酸編號 29(離胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 30(苯丙胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 31(甲硫胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 33(蘇胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 40(絲胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 62(麩醯胺酸)取代為離胺酸、胺基酸編號 63(絲胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 80(天冬胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 83(蘇胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 90(丙胺酸)取代為天冬胺酸、胺基酸編號 93(苯丙胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 98(纈胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 100(丙胺酸)取代為脯胺酸、胺基酸編號 103(白胺酸)取代為苯丙胺酸、胺基酸編號 120(丙胺酸)取代為麩醯胺

酸、胺基酸編號 126(白胺酸)取代為異白胺酸、胺基酸編號 129(丙胺酸)取代為蘇胺酸所設計的人類化 TINA1 輕鏈，命名為「hTINA1-L2 型輕鏈」。

hTINA1-L2 型輕鏈之胺基酸序列記載於序列表之序列識別號 20。序列識別號 20 之胺基酸序列之第 1 至 20 號之胺基殘基所構成的序列、第 21 至 129 號之胺基酸殘基所構成的序列、第 130 至 234 號之胺基酸殘基所構成的序列係各自相當於訊息序列、輕鏈可變區、輕鏈恆定區。編碼序列識別號 20 之胺基酸序列的核苷酸序列記載於序列表之序列識別號 19。序列識別號 19 之核苷酸序列之第 1 至 60 號之核苷酸所構成的序列、第 61 至 387 號之核苷酸所構成的序列、第 388 至 702 號之核苷酸所構成的序列係各自編碼訊息序列、輕鏈可變區序列、輕鏈恆定區序列。序列識別號 19 之核苷酸序列及序列識別號 20 之胺基酸序列亦記載於第 7 圖。

### 【0195】

6-3-3)hTINA1-L3 型輕鏈：

將伴隨序列表之序列識別號 10 所示的 TINA1 輕鏈之胺基酸編號 28(組胺酸)取代為脯胺酸、胺基酸編號 29(離胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 30(苯丙胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 31(甲硫胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 33(蘇胺酸)取代為丙胺酸、胺基酸編號 40(絲胺酸)取代為蘇胺酸、胺基酸編號 62(麩醯胺酸)取代為離胺酸、胺基酸編號 63(絲胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 80(天冬胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號

83(蘇胺酸)取代為絲胺酸、胺基酸編號 90(丙胺酸)取代為天冬胺酸、胺基酸編號 93(苯丙胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 98(纈胺酸)取代為白胺酸、胺基酸編號 100(丙胺酸)取代為脯胺酸、胺基酸編號 103(白胺酸)取代為苯丙胺酸、胺基酸編號 120(丙胺酸)取代為麩醯胺酸、胺基酸編號 126(白胺酸)取代為異白胺酸、胺基酸編號 129(丙胺酸)取代為蘇胺酸所設計的人類化 TINA1 輕鏈，命名為「hTINA1-L3 型輕鏈」。

hTINA1-L3 型輕鏈之胺基酸序列係記載於序列表之序列識別號 22。序列識別號 22 之胺基酸序列之第 1 至 20 號之胺基殘基所構成的序列、第 21 至 129 號之胺基酸殘基所構成的序列、第 130 至 234 號之胺基酸殘基所構成的序列係各自相當於訊息序列、輕鏈可變區、輕鏈恆定區。編碼序列識別號 22 之胺基酸序列的核苷酸序列記載於序列表之序列識別號 21。序列識別號 21 之核苷酸序列之第 1 至 60 號之核苷酸所構成的序列、第 61 至 387 號之核苷酸所構成的序列、第 388 至 702 號之核苷酸所構成的序列係各自編碼訊息序列、輕鏈可變區序列、輕鏈恆定區序列。序列識別號 21 之核苷酸序列及序列識別號 22 之胺基酸序列亦記載於第 8 圖。

### 【0196】

[實施例 7：hTINA1 抗體表現載體之構築及抗體之生產]

7-1) hTINA1 之重鏈表現載體之構築

7-1-1) hTINA1-H1 表現載體之構築

合成包含序列表之序列識別號 11 所示的 hTINA1-H1 之核苷酸序列之核苷酸編號 36 至 437 所示的編碼 hTINA1-H1 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段(GENEART 公司，人工基因合成服務)。將合成的 DNA 片段作為模板，以 KOD-Plus-(TOYOBO 公司)及下述之引子組，增幅含編碼 hTINA1-H1 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段，藉由使用 In-Fusion HD PCR 選殖套組(CLONTECH 公司)，插入於嵌合及人類化抗體 IgG1 型重鏈表現載體 pCMA-G1 以限制酶 B1pI 切斷處，而構築 hTINA1-H1 表現載體。將獲得的表現載體命名為「pCMA-G1/hTINA1-H1」。

#### 引子組

5'-agctcccaagatgggtgctgagc-3'(序列識別號 41：引子 EG-Inf-F)

5'-gggccttggtgaggctgagc-3'(序列識別號 42：引子 EG1-Inf-R)

#### 【0197】

#### 7-1-2)hTINA1-H2 表現載體之構築

合成含序列表之序列識別號 13 所示的 hTINA1-H2 之核苷酸序列之核苷酸編號 36 至 437 所示的編碼 hTINA1-H2 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段(GENEART 公司，人工基因合成服務)，以與實施例 7-1-1)同樣的方法構築 hTINA1-H2 表現載體。將獲得的表現載體命名為「pCMA-G1/hTINA1-H2」。

#### 【0198】

### 7-1-3) hTINA1-H3 表現載體之構築

合成含序列表之序列識別號 15 所示的 hTINA1-H3 之核苷酸序列之核苷酸編號 36 至 437 所示的編碼 hTINA1-H3 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段(GENEART 公司，人工基因合成服務)，以與實施例 7-1-1)同樣之方法而構築 hTINA1-H3 表現載體。將獲得的表現載體命名為「 pCMA-G1/hTINA1-H3 」。

#### 【 0199 】

### 7-2) hTINA1 之輕鏈表現載體之構築

#### 7-2-1) hTINA1-L1 表現載體之構築

合成含序列表之序列識別號 17 所示的 hTINA1-L1 之核苷酸序列之核苷酸編號 38 至 402 所示的編碼 hTINA1-L1 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段(GENEART 公司，人工基因合成服務)。以合成的 DNA 片段作為模板，以 KOD-Plus-(TOYOBO 公司)及下述之引子組，增幅含編碼 hTINA1-L1 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段，藉由使用 In-Fusion HD PCR 選殖套組(CLONTECH 公司)，插入於將嵌合及人類化抗體輕鏈表現載體 pCMA-LK 以限制酶 BsiWI 切斷處，而構築 hTINA1-L1 表現載體。將獲得的表現載體命名為「 pCMA-LK/hTINA1-L1 」。

#### 引子組

5'-ctgtggatctccggcgacgtacggc-3' (序列識別號 43 : 引子 CM-LKF)

5'-ggaggggcgccaccgtacg-3'(序列識別號 44：引子  
KCL-Inf-R)

### 【0200】

#### 7-2-2)hTINA1-L2 表現載體之構築

合成含序列表之序列識別號 19 所示的 hTINA1-L2 之核苷酸序列之核苷酸編號 38 至 402 所示的編碼 hTINA1-L2 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段(GENEART 公司，人工基因合成服務)，以與實施例 7-2-1)同樣之方法，構築 hTINA1-L2 表現載體。將獲得的表現載體命名為「pCMA-LK/hTINA1-L2」。

### 【0201】

#### 7-2-3)hTINA1-L3 表現載體之構築

合成含序列表之序列識別號 21 所示的 hTINA1-L3 之核苷酸序列之核苷酸編號 38 至 402 所示的編碼 hTINA1-L3 之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段(GENEART 公司，人工基因合成服務)，藉由以與實施例 7-2-1)同樣之方法，構築 hTINA1-L3 表現載體。將獲得的表現載體命名為「pCMA-LK/hTINA1-L3」。

### 【0202】

#### 7-3)hTINA1 抗體之生產及純化

##### 7-3-1)hTINA1 抗體之小規模生產

以與實施例 5-2-5)同樣的方法所生產。

將藉由 pCMA-G1/hTINA1-H1 與 pCMA-LK/hTINA1-L1 之組合而取得的 hTINA1 抗體命名為「hTINA1-H1L1」，將藉由 pCMA-G1/hTINA1-H2 與 pCMA-

LK/hTINA1-L1 之組合而取得的 hTINA1 抗體命名為「hTINA1-H2L1」，將藉由 pCMA-G1/hTINA1-H2 與 pCMA-LK/hTINA1-L2 之組合而取得的 hTINA1 抗體命名為「hTINA1-H2L2」，及將藉由 pCMA-G1/hTINA1-H3 與 pCMA-LK/hTINA1-L3 之組合而取得的 hTINA1 抗體命名為「hTINA1-H3L3」。

### 【0203】

#### 7-3-2)hTINA1 抗體之生產

hTINA1-H1L1、hTINA1-H2L1、hTINA1-H2L2、及 hTINA1-H3L3 以下列方法生產。

FreeStyle 293F 細胞(Invitrogen 公司)係依據手冊而實施繼代、培養。將對數增殖期之  $1.2 \times 10^9$  個之 FreeStyle 293F 細胞(Invitrogen 公司)接種於 3L Fernbach Erlenmeyer Flask(CORNING 公司)，以 FreeStyle 293 表現媒體(Invitrogen 公司)稀釋而調製為  $1.0 \times 10^6$  細胞/ml 後，於  $37^\circ\text{C}$ 、 $8\% \text{CO}_2$  培養箱內，以 90 rpm 震盪培養一小時。將聚伸乙亞胺(Polyscience #24765；3.6 mg)溶解於 Opti-Pro SFM(Invitrogen 公司；20 ml)，其次，使用 PureLink HiPure 質體套組(Invitrogen 公司)而將調製的輕鏈表現載體(0.8 mg)及重鏈表現載體(0.4 mg)添加於 Opti-Pro SFM(Invitrogen 公司；20 ml)。於聚伸乙亞胺/Opti-Pro SFM 混合液(20 ml)中，添加表現載體/Opti-Pro SFM 混合液(20 ml)而緩緩攪拌，再放置 5 分鐘後，添加於 FreeStyle 293F 細胞。於  $37^\circ\text{C}$ 、 $8\% \text{CO}_2$  培養箱，以 90 rpm 震盪培養 7 日，將獲得的培養上清液以拋棄式膠囊過濾器(ADVANTEC #CCS-045-E1H)過濾。

## 【0204】

## 7-3-3) hTINA1 抗體之純化

將來自上述 7-3-2) 所獲得的培養上清液的抗體，以 rProteinA 親和性層析(4-6°C)及陶瓷氫氧磷灰石(室溫)之 2 階段步驟純化。rProteinA 親和性層析純化後及陶瓷氫氧磷灰石純化後之緩衝液取代步驟係於 4-6°C 下實施。最初，培養上清液施用於經 PBS 平衡化的 MabSelectSuRe(GE Healthcare Bioscience 公司製、HiTrap 管柱)。培養上清液全部置入管柱後，以管柱容量 2 倍以上之 PBS 將管柱洗淨。其次，以 2M 精胺酸鹽酸鹽溶液(pH4.0)溶出，收集含有抗體的劃分。其劃分藉由透析(Thermo Scientific 公司，Slide-A-Lyzer Dialysis Cassette)取代為 PBS 後，將以 5mM 磷酸鈉 / 50mM MES/pH7.0 之緩衝液作 5 倍稀釋的抗體溶液，施用於經 5mM NaPi / 50mM MES / 30mM NaCl / pH7.0 之緩衝液平衡化的陶瓷氫氧磷灰石管柱(日本 Bio-Rad、Bio-Scale CHT Type-I Hydroxyapatite Column)。實施氯化鈉所致的直線濃度梯度溶出，收集含抗體之劃分。將其劃分藉由透析(Thermo Scientific 公司，Slide-A-Lyzer Dialysis Cassette)，進行向 HBSor(25mM 組胺酸 / 5% 山梨糖醇、pH6.0)之液取代。最後，以 Centrifugal UF Filter Device VIVASPIN20(分劃分子量 UF10K，Sartorius 公司，4°C)濃縮，作成 IgG 濃度調製為 20mg/ml 以上的純化樣品。

## 【0205】

**[參考例 1：hRS7 抗體表現載體之製作及抗體之生產]**

hRS7 抗體係基於國際公開第 2003/074566 號記載的輕鏈、及重鏈之胺基酸序列而製作。

**1-1)hRS7 抗體重鏈表現載體之構築**

合成含序列表之序列識別號 29 所示的 hRS7 抗體重鏈之核昔酸序列之核昔酸編號 36 至 437 所示的編碼 hRS7 抗體重鏈之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段 (GENEART 公司，人工基因合成服務)，以與實施例 7-1-1)同樣之方法，構築 hRS7 抗體重鏈表現載體。將獲得的表現載體命名為「pCMA-G1/hRS7」。hRS7 抗體重鏈之胺基酸序列示於序列表之序列識別號 30。

**【0206】**

**1-2)hRS7 抗體輕鏈表現載體之構築**

合成含序列表之序列識別號 31 所示的 hRS7 抗體輕鏈之核昔酸序列之核昔酸編號 38 至 402 所示的編碼 hRS7 抗體輕鏈之可變區的 DNA 序列的 DNA 片段 (GENEART 公司，人工基因合成服務)，藉由與實施例 7-2-1)同樣之方法構築 hRS7 抗體輕鏈表現載體。將獲得的表現載體命名為「pCMA-LK/hRS7」。將 hRS7 抗體重鏈之胺基酸序列示於序列表之序列識別號 32。

**【0207】**

**1-3)hRS7 抗體之生產及純化**

**1-3-1)hRS7 抗體之生產**

hRS7 抗體係藉由 pCMA-G1/hRS7 與 pCMA-LK/hRS7 之組合，以與實施例 7-3-2)同樣之方法生產。

## 【0208】

1-3-2) hRS7 抗體之純化

由上述 1-3-1) 所獲得的培養上清液，以與實施例 7-3-3) 同樣之方法純化。

## 【0209】

[實施例 8： hTINA1 抗體及 hRS7 抗體之抗原結合能力之測定]

8-1) 使用小規模生產之抗體(培養上清液)的抗原結合能力之測定

抗體與抗原 (Recombinant Human TROP-2 Fc chimera) 之解離常數測定係使用 Biacore 3000(GE Healthcare Bioscience(股))，對將固定化的抗人類 IgG(Fab) 抗體以抗體作為配位體而捕捉 (capture)，以將抗原作為分析物而測定的捕捉法進行。抗人類 IgG(Fab) 抗體 (Human Fab capture kit、GE Healthcare Bioscience(股)) 係對 Sensor chip CM5(BIAcore, Inc.) 以胺偶合法使共價結合約 2000RU。參考細胞亦同樣地固定化。使用作為電泳緩衝液 (running buffer) 之 HBS-EP+(10mM HEPES pH7.4、0.15M NaCl, 3mM EDTA、0.05% Surfactant P20)。於將抗人類 IgG(Fab) 抗體固定化的晶片上，將含抗體的培養上清液以約 80 秒鐘添加後，抗原之連續稀釋溶液 (1-1000nM) 以流速 30μl/分鐘於 300 秒鐘添加，接著，監測 600 秒鐘之解離相。作為再生溶液，將含 20%DMSO 的 10mM Gly-HCl pH1.5 以流速 10μl/分鐘於 60 秒鐘添加。資料之解析係使用分析

軟體(BIAevaluation software, version 4.1)之雙價結合模式(bivalent binding model)，算出結合速度常數 $k_{on}$ 、解離速度常數 $k_{off}$ 及解離常數( $K_D$ ； $K_D = k_{off}/k_{on}$ )。

### 【0210】[表 1]

	名稱	$K_D(M)$
1	hTINAI-H1LI	6.3E-08
2	hTINAI-H2LI	6.9E-08
3	hTINAI-H2L2	7.1E-08
4	hTINAI-H3L3	5.8 E -08
5	cTINAI	5.6 E -08

使用培養上清液作為抗體樣品的結合活性

### 【0211】

#### 8-2) 使用純化抗體的抗原結合能力之測定

抗體與抗原(Recombinant Human TROP-2 Fc chimera)之解離常數測定係使用Biacore 3000(GE Healthcare Bioscience(股))，而於固定化的抗人類 IgG(Fab)抗體將抗體作為配位體而捕捉(capture)，以將抗原作為分析物而測定的捕捉法進行。抗人類 IgG(Fab)抗體(Human Fab capture kit、GE Healthcare Bioscience(股))係對Sensor chip CM5(BIAcore, Inc.)以胺偶合法使共價結合約 2000RU。參考細胞亦同樣地固定化。使用作為電泳緩衝液(running buffer)之 HBS-EP+(10 mM HEPES pH7.4、0.15 M NaCl, 3 mM EDTA、0.05% Surfactant P20)。於將抗人類 IgG(Fab)抗體固定化的晶片上，以約 1 分鐘添加抗體後，抗原之稀釋系列溶液(1-1000 nM)以流速 30  $\mu$ l/分鐘於 300 秒鐘添加，接著監

測 600 秒鐘之解離相。作為再生溶液，以電泳緩衝液稀釋的 25mM NaOH，以流速 100 $\mu$ l/分鐘，於 3 秒鐘添加 2 次。資料之解析係藉由上述方法進行。

**【 0212 】 [表 2]**


	名稱	KD(M)
1	hTINA1-H1L1	2.7E-08
2	hTINA1-H2L1	3.0E-08
3	hTINA1-H2L2	2.7E-08
4	hTINA1-H3L3	1.5E-08
5	hRS7	3.0E-10

使用純化抗體作為抗體樣品的結合活性測定

**【 0213 】**

[實施例 9：hTINA1-H1L1 ADC 之製作(1)]

**【 0214 】**



【0215】步驟 1：(4-{{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁啉-1-基]胺基}-4-側氧基丁基)胺甲酸三級丁酯

將 4-(三級丁氧基羰基胺基)丁酸(0.237g、1.13mmol)溶解於二氯甲烷(10mL)，添加 N-羥基琥珀醯亞胺(0.130g、1.13mmol)、及 1-乙基-3-(3-二甲基胺基丙基)碳二亞胺鹽酸鹽(0.216g、1.13mmol)而攪拌 1 小時。滴加於添加依喜替康之甲磺酸鹽(0.500g、0.94mmol)、及三乙基胺(0.157mL、1.13mmol)的 N,N-二甲基甲醯胺溶液(10mL)，於室溫攪拌一日。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層析[氯仿~氯仿：甲醇 = 8 : 2(v/v)]純化，獲得標題化合物(0.595g、定量的)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.87(3H,t,J=7.2Hz),1.31(9H,s),1.58(1H,t,J=7.2Hz),1.66(2H,t,J=7.2Hz),1.89-1.82(2H,m),2.12-2.21(3H,m),2.39(3H,s),2.92(2H,t,J=6.5Hz),3.17(2H,s),5.16(1H,d,J=19.2Hz),5.24(1H,d,J=18.8Hz),5.42(2H,s),5.59-5.55(1H,m),6.53(1H,s),6.78(1H,t,J=6.3Hz),7.30(1H,s),7.79(1H,d,J=11.0Hz),8.40(1H,d,J=8.6Hz).

MS(APCI)m/z : 621(M+H)<sup>+</sup>.

【0216】步驟 2：4-胺基-N-[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]呡并[1,2-b]噁啉-1-基]丁醯胺三氟乙酸鹽

將上述步驟 1 獲得的化合物(0.388g、0.61mmol)溶解於二氯甲烷(9mL)。添加三氟乙酸(9mL)並攪拌 4 小時。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層析[氯仿~氯仿：甲醇：水 = 7 : 3 : 1(v/v/v)之分配有機層]純化，獲得標題化合物(0.343g、定量的)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.87(3H,t,J=7.2Hz),1.79-1.92(4H,m),2.10-2.17(2H,m),2.27(2H,t,J=7.0Hz),2.40(3H,s),2.80-2.86(2H,m),3.15-3.20(2H,m),5.15(1H,d,J=18.8Hz),5.26(1H,d,J=18.8Hz),5.42(2H,s),5.54-5.61(1H,m),6.55(1H,s),7.32(1H,s),7.72(3H,brs),7.82(1H,d,J=11.0Hz),8.54(1H,d,J=8.6Hz).

MS(APCI)m/z : 521(M+H)<sup>+</sup>.

【0217】步驟 3：N-(三級丁氧基羰基)甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-(4-{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁唑-1-基]胺基}-4-側氧基丁基)甘胺酸醯胺

將 N-(三級丁氧基羰基)甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基甘胺酸(0.081g、0.19mmol)溶解於二氯甲烷(3mL)，並添加 N-羥基琥珀醯亞胺(0.021g、0.19mol)及1-乙基-3-(3-二甲基胺基丙基)碳二亞胺鹽酸鹽(0.036g、0.19mmol)而攪拌3.5小時。將其反應溶液滴加於添加上述步驟2所獲得的化合物(0.080g、0.15mmol)的N,N-二甲基甲醯胺溶液(1.5mL)，於室溫攪拌4小時。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層析[氯仿~氯仿：甲醇=8:2(v/v)]純化，獲得標題化合物(0.106g、73%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.87(3H,t,J=7.4Hz),1.36(9H,s),1.71(2H,m),1.86(2H,t,J=7.8Hz),2.15-2.19(4H,m),2.40(3H,s),2.77(1H,dd,J=12.7,8.8Hz),3.02(1H,dd,J=14.1,4.7Hz),3.08-3.11(2H,m),3.16-3.19(2H,m),3.54(2H,d,J=5.9Hz),3.57

-3.77(4H,m),4.46-4.48(1H,m),5.16(1H,d,J=19.2Hz),5.25(1H,d,J=18.8Hz),5.42(2H,s),5.55-5.60(1H,m),6.53(1H,s),7.00(1H,t,J=6.3Hz),7.17-7.26(5H,m),7.31(1H,s),7.71(1H,t,J=5.7Hz),7.80(1H,d,J=11.0Hz),7.92(1H,t,J=5.7Hz),8.15(1H,d,J=8.2Hz),8.27(1H,t,J=5.5Hz),8.46(1H,d,J=8.2Hz).

MS(APCI)m/z : 939(M+H)<sup>+</sup>.

【0218】步驟 4：甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-(4-{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]喹啉-1-基]胺基}-4-側氧基丁基)甘胺酸醯胺三氟乙酸鹽

將上述步驟3所獲得的化合物(1.97g、2.10mmol)溶解於二氯甲烷(7mL)。添加三氟乙酸(7mL)並攪拌1小時。減壓餾除溶媒，添加甲苯而共沸，獲得的殘留物以矽膠管柱層析[氯仿~氯仿：甲醇：水=7:3:1(v/v/v)之分配有機層]純化，獲得標題化合物(1.97g、99%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.87(3H,t,J=7.4Hz),1.71-1.73(2H,m),1.82-1.90(2H,m),2.12-2.20(4H,m),2.40(3H,s),2.75(1H,dd,J=13.7,9.4Hz),3.03-3.09(3H,m),3.18-3.19(2H,m),3.58-3.60(2H,m),3.64(1H,d,J=5.9Hz),3.69(1H,d,J=5.9Hz),3.72(1H,d,J=5.5Hz),3.87(1H,dd,J=16.8,5.9Hz),4.50-4.56(1H,m),5.16(1H,d,J=19.2Hz),5.25(1H,d,J=18.8Hz),5.42(2H,s),5.55-5.60(1H,m),7.17-7.27(5H,m),7.32(1H,s),7.78-7.81(2H,m),7.95-7.97(3H,m),8.33-8.35(2H,m),8.48-8.51(2H,m).

MS(APCI)m/z : 839(M+H)<sup>+</sup>.

【0219】步驟 5：N-{3-[2-(2-{[3-(2,5-二側氧基-2,5-二氫-1H-吡咯-1-基)丙醯基]胺基}乙氧基)乙氧基]丙醯基}甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-(4-{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁唑-1-基]胺基}-4-側氧基丁基)甘胺酸醯胺

於上述步驟 4 所獲得的化合物(100 mg, 0.119 mmol)之 N,N-二甲基甲醯胺(1.20 mL)溶液中，添加二異丙基乙基胺(20.8 μL, 0.119 mmol)、3-(2-(2-(3-丁烯二醯亞胺丙醯胺)乙氧基)乙氧基)丙酸 N-琥珀醯亞胺基酯(50.7 mg, 0.119 mmol)，於室溫攪拌 1 小時。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層析 [氯仿 ~ 氯仿 : 甲醇 = 5 : 1(v/v)] 純化，獲得呈淡黃色固體之標題化合物(66.5 mg, 48%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.85(3H,t,J=7.4Hz),1.65-1.74(2H,m),1.77-1.90(2H,m),2.07-2.19(4H,m),2.30(2H,t,J=7.2Hz),2.33-2.36(2H,m),2.38(3H,s),2.76(1H,dd,J=13.7,9.8Hz),2.96-3.18(9H,m),3.42-3.44(4H,m),3.53-3.76(10H,m),4.43(1H,td,J=8.6,4.7Hz),5.14(1H,d,J=18.8Hz),5.23(1H,d,J=18.8Hz),5.38(1H,d,J=17.2Hz),5.42(1H,d,J=17.2Hz),5.52-5.58(1H,m),6.52(1H,s),6.98(2H,s),7.12-7.17(1H,m),7.18-7.25(4H,m),7.29(1H,s),7.69(1H,t,J=5.5Hz),7.78(1H,d,J=11.3Hz),7.98-8.03(2H,m),8.11(1H,d,J=7.8Hz),8.16(1H,t,J=5.7Hz),8.23(1H,t,J=5.9Hz),8.44(1H,d,J=9.0Hz).

MS(APCI)m/z:1149(M+H)<sup>+</sup>.

### 【0220】步驟 6：抗體-藥物結合物(1)

抗體之還原：將於實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(10.0 mL)採取至 50 mL 管中，添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.317 mL；相對於抗體一分子，4.6 當量)及 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.；0.500 mL)。確認本溶液之 pH 為  $7.4 \pm 0.1$  內後，藉由於 37°C 培育 1 小時，將抗體內銫鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：將上述溶液於常溫水浴中培育 10 分鐘後，添加二甲基亞礦(0.567 mL)。其次，添加於上述步驟 5 獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞礦溶液(0.635 mL；相對於抗體一分子為 9.2 當量)，使用試管混勻器(Tube Rotator)(MTR-103、AS ONE 股份有限公司)，於室溫攪拌 40 分鐘，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液(0.127 mL；相對於抗體一分子為 18.4 當量)，再於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 35.0 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E(使用  $\epsilon_{D,280} = 4964$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 18982$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.70 mg/mL，抗體產量：94.5 mg(95%)，以共通操作 E 測定的抗體每分子之藥物平均結合數(n)：6.6。

### 【0221】

[實施例 10：hTINA1-H1L1 ADC 之製作(2)]

### 【0222】



### 【0223】步驟 1：抗體-藥物結合物(2)

抗體之還原：將於實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(2.00 mL)採取至 4 mL 管，添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.0690 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)及 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.；0.100 mL)。確認本溶液之 pH 為  $7.4 \pm 0.1$  內後，藉由於 37°C 培育 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：將上述溶液於 15°C 水浴中培育 10 分鐘後，添加實施例 9 步驟 5 所獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞礦溶液 (0.127 mL；相對於抗體一分子為 9.2 當量)，於 15°C 水浴培育 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC (Sigma-Aldrich Co.LLC) 水溶液 (0.0190 mL；相對於抗體一分子為 13.8 當量)，使用試管混勻器而於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 9.00 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E (使用  $\epsilon_{D,280} = 4964$  (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 18982$  (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.08 mg/mL，抗體產量：18.7 mg (94%)，以共通操作 E 所測定的抗體每一分子之藥物平均結合數 (n)：6.1。

### 【0224】

[實施例 11：hTINA1-H1L1 ADC 之製作 (3)]

### 【0225】



### 【0226】步驟 1：抗體 - 藥物 結合物 (3)

**抗體之還原：**將於實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(5.0 mL)採取至 15 mL 容器，攪拌下添加 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.; 0.0813 mL)後，於 37°C攪拌 10 分鐘。攪拌下添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.0745 mL；相對於抗體一分子為 2.3 當量)後，確認本溶液之 pH 為  $7.0 \pm 0.1$  內，藉由於 37°C攪拌 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

**抗體與藥物連接物之結合：**上述溶液於 15°C水浴中攪拌 10 分鐘後，一邊緩緩滴加實施例 9 步驟 5 所獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞碸溶液(0.162 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)，一邊於 15°C水浴攪拌 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液(0.0418 mL；相對於

抗體一分子為 12.9 當量)，於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 21.0 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E 及 F(使用  $\epsilon_{D,280} = 4964$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 18982$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.19 mg/mL，抗體產量：46.0 mg(92%)，以共通操作 E 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：3.6；以共通操作 F 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：3.6。

### 【0227】

[實施例 12：hTINA1-H1L1 ADC 之製作(4)]

### 【0228】



【0229】步驟 1：抗體-藥物結合物(4)

抗體之還原：將於實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54) 及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10.0 mg/mL。將本溶液(5.00 mL)採取至 15 mL 容器，攪拌下添加 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.; 0.0813 mL)後，於 37°C 攪拌 10 分鐘。攪拌下添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.162 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)後，確認本溶液之 pH 為 7.0±0.1 內，藉由於 37°C 攪拌 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：上述溶液於 15°C 水浴中攪拌 10 分鐘後，一邊緩緩滴加實施例 9 步驟 5 所獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞礦溶液(0.389 mL；相對於抗體一分子為 12.0 當量)，一邊於 15°C 水浴攪拌 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液(0.0418 mL；相對於抗體一分子為 12.9 當量)，於室溫攪拌 20 分鐘，並使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 21.0 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E 及 F(使用  $\epsilon_{D,280} = 4964$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 18982$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.19 mg/mL，抗體產量：46.0 mg(92%)，以共通操作 E 所測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：7.0；以共通操作 F 所測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：7.0。

### 【0230】

[參考例 13：hRS7 ADC 之製作(5)]

### 【0231】



### 【0232】步驟 1：抗體-藥物結合物(5)

抗體之還原：將於參考例 1 製作的 hRS7，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.56)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(2.0 mL)採取至 4 mL 管，添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.0690 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)及 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.；0.100 mL)。確認本溶液之 pH 為  $7.4 \pm 0.1$  內後，藉由於 37 培育 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：上述溶液於 15°C 水浴培育 10 分鐘後，添加實施例 9 步驟 5 獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞礦溶液 (0.127 mL；相對於抗體一分子為 9.2 當量)，於 15°C 水浴培育 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC (Sigma-Aldrich Co. LLC) 水溶液 (0.0190 mL；相對於抗體一分子為 13.8 當量)，使用試管混勻器而於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 9.00 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E (使用  $\epsilon_{D,280} = 4964$  (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 18982$  (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.04 mg/mL，抗體產量：18.4 mg (92%)，共通操作 E 所測定的抗體每一分子之藥物平均結合數 (n)：6.2。

### 【0233】

[實施例 14：hTINA1-H1L1 ADC 之製作 (6)]

### 【0234】



**【 0235 】步驟 1 : ( { N-[ ( 9H- 萍 -9- 基甲氧基 ) 羰基 } 甘  
胺醯基 } 胺基 ) 甲基乙酸酯**

於由 N-9- 萍基甲氧基羰基甘胺醯基甘胺酸 (4.33g , 12.2 mmol) 、四氫呋喃 (120ml) 、及甲苯 (40.0ml) 所構成的混合物中添加吡啶 (1.16ml , 14.7mmol) 及四乙酸鉛 (6.84g , 14.7mmol) ，並加熱回流 5 小時。將反應液冷卻至室溫後，藉由矽藻土過濾將不溶物去除，減壓下濃縮。將獲得的殘留物溶解於乙酸乙酯，以水及飽和食鹽水洗淨後，有機層以無水硫酸鎂乾燥。溶媒於減壓下餾

除後，獲得的殘留物以矽膠管柱層析 [己烷：乙酸乙酯 = 9 : 1(v/v)~乙酸乙酯] 純化，獲得呈無色固體之標題化合物 (3.00 g, 67%)。

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ: 2.07 (3 H, s), 3.90 (2 H, d, J= 5.1 Hz), 4.23 (1 H, t, J= 7.0 Hz), 4.46 (2 H, d, J= 6.6 Hz), 5.26 (2 H, d, J= 7.0 Hz), 5.32 (1 H, brs), 6.96 (1 H, brs), 7.32 (2 H, t, J= 7.3 Hz), 7.41 (2 H, t, J= 7.3 Hz), 7.59 (2 H, d, J= 7.3 Hz), 7.77 (2 H, d, J= 7.3 Hz).

**【0236】步驟 2：[({N-[(9H-苁-9-基甲氧基)竣基]甘胺醯基}胺基)甲氧基]乙酸苄酯**

於上述步驟 1 獲得的化合物 (3.68 g, 10.0 mmol) 及乙醇酸苄酯 (4.99 g, 30.0 mmol) 之四氫呋喃 (40.0 mL) 溶液中，於 0°C 添加三級丁醇鉀 (2.24 g, 20.0 mmol)，並於室溫攪拌 15 分鐘。於 0°C，於反應溶液中添加乙酸乙酯、水，並以乙酸乙酯、氯仿提取，獲得的有機層以硫酸鈉乾燥，並過濾。減壓餾除溶媒，將獲得的殘留物溶解於二噁烷 (40.0 mL)、水 (10.0 mL)，添加碳酸氫鈉 (1.01 g, 12.0 mmol)、氯甲酸 9-苁基甲酯 (2.59 g, 10.0 mmol)，於室溫攪拌 2 小時。於反應溶液中添加水，並以乙酸乙酯提取，獲得的有機層以硫酸鈉乾燥，並過濾。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層析 [己烷：乙酸乙酯 = 100 : 0(v/v)~0 : 100] 純化，獲得無色油狀之標題化合物 (1.88 g, 40%)。

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ: 3.84 (2 H, d, J= 5.5 Hz), 4.24 (3 H, t, J= 6.5 Hz), 4.49 (2 H, d, J= 6.7 Hz), 4.88 (2 H, d, J= 6.7 Hz),

5.15-5.27(1H,m),5.19(2H,s),6.74(1H,brs),7.31-7.39(7H,m),7.43(2H,t,J=7.4Hz),7.61(2H,d,J=7.4Hz),7.79(2H,d,J=7.4Hz).

**【0237】步驟 3：[({N-[(9H-茀-9-基甲氧基)羰基]甘  
胺醯基}胺基)甲氧基]乙酸**

將上述步驟2獲得的化合物(1.88g、3.96mmol)溶解於乙醇(40.0mL)、乙酸乙酯(20.0mL)。添加鈀碳觸媒(376mg)，並於氫氣環境下，於室溫攪拌2小時。藉由矽藻土過濾將不溶物去除，減壓餾除溶媒，獲得呈無色固體之標題化合物(1.52g、定量的)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:3.62(2H,d,J=6.3Hz),3.97(2H,s),4.18-4.32(3H,m),4.60(2H,d,J=6.7Hz),7.29-7.46(4H,m),7.58(1H,t,J=5.9Hz),7.72(2H,d,J=7.4Hz),7.90(2H,d,J=7.4Hz),8.71(1H,t,J=6.5Hz).

**【0238】步驟 4：9H-茀-9-基甲基(2-{[(2-{[(1S,9S)-  
9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-  
2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':  
6,7]吲哚并[1,2-b]喹啉-1-基]胺基}-2-側氧基乙氧基)甲  
基]胺基}-2-側氧基乙基)胺甲酸酯**

冰冷下，於依喜替康之甲磺酸鹽(0.283g，0.533mmol)、N-羥基琥珀醯亞胺(61.4mg，0.533mmol)、及上述步驟3獲得的化合物(0.205g，0.533mmol)之N,N-二甲基甲醯胺(10.0mL)溶液中，添加N,N-二異丙基乙基胺(92.9μL，0.533mmol)及N,N'-二環己基碳二亞胺(0.143g，0.693mmol)，並於室溫攪拌3

日。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層析[氯仿~氯仿：甲醇：水 = 7 : 3 : 1(v/v/v)之分配有機層]純化，獲得呈淡茶色固體之標題化合物(0.352g，82%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.81(3H,t,J=7.4Hz),1.73-1.87(2H,m),2.06-2.20(2H,m),2.34(3H,s),3.01-3.23(2H,m),3.58(2H,d,J=6.7Hz),3.98(2H,s),4.13-4.25(3H,m),4.60(2H,d,J=6.7Hz),5.09-5.22(2H,m),5.32-5.42(2H,m),5.50-5.59(1H,m),6.49(1H,s),7.24-7.30(3H,m),7.36(2H,t,J=7.4Hz),7.53(1H,t,J=6.3Hz),7.66(2H,d,J=7.4Hz),7.75(1H,d,J=11.0Hz),7.84(2H,d,J=7.4Hz),8.47(1H,d,J=8.6Hz),8.77(1H,t,J=6.7Hz).

MS(ESI)m/z : 802(M+H)<sup>+</sup>.

**【0239】步驟 5：**N-[(2-{{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁啉-1-基]胺基}-2-側氧基乙氧基)甲基]甘胺酸醯胺

於上述步驟 4 獲得的化合物(0.881g，1.10mmol)之N,N-二甲基甲醯胺(11.0mL)溶液中，添加哌啶(1.1mL)，並於室溫攪拌2小時。減壓餾除溶媒，獲得含標題化合物的混合物。本混合物係不進行進一步的純化而使用於以下的反應。

**【0240】步驟 6：**N-[(9H-茀-9-基甲氧基)羰基]甘胺酸基甘胺酸基-L-苯基丙胺醯基-N-[(2-{{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁啉-1-基]胺基}-2-側氧基乙氧基)甲基]甘胺酸醯胺

冰冷下，於上述步驟 5 獲得的混合物 (0.439 mmol)、N-羥基琥珀醯亞胺 (0.101 g, 0.878 mmol) 及 N-[(9H-苁-9-基甲氧基)羰基]甘胺醯基甘胺醯基-L-苯丙胺酸（特開 2002-60351 號公報；0.440 g, 0.878 mmol）之 N,N-二甲基甲醯胺 (50.0 mL) 溶液中，添加 N,N'-二環己基碳二亞胺 (0.181 g, 0.878 mmol)，並於室溫攪拌 4 日。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層析 [氯仿～氯仿：甲醇 = 9 : 1 (v/v)] 純化，獲得呈淡橙色固體之標題化合物 (0.269 g, 58%)。

MS(ESI)m/z: 1063(M+H)<sup>+</sup>.

**【0241】步驟 7：**甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-[(2-{{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]喹啉-1-基}-2-側氧基乙氧基}甲基]甘胺酸醯胺

於上述步驟 6 獲得的化合物 (0.269 g, 0.253 mmol) 之 N,N-二甲基甲醯胺 (4.00 mL) 溶液中，添加哌啶 (0.251 mL, 2.53 mmol)，並於室溫攪拌 2 小時。減壓餾除溶媒，獲得含標題化合物的混合物。本混合物係不進行進一步的純化而使用於以下的反應。

**【0242】步驟 8：**N-[(2,5-二側氧基-2,5-二氫-1H-吡咯-1-基)己醯基]甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-[(2-{{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]喹啉-1-基}-2-側氧基乙

[3',4' : 6,7]呡并[1,2-b]喹啉-1-基]胺基}-2-側氧基乙  
氧基)甲基]甘胺酸醯胺

於上述步驟 7 獲得的化合物(0.253mmol)之 N,N-二  
甲基甲醯胺(10.0mL)溶液中添加 6-順丁烯二醯亞胺己烷  
酸 N-琥珀醯亞胺基酯(0.156g, 0.506mmol)，並於室溫  
攪拌 3 日。減壓餾除溶媒，獲得的殘留物以矽膠管柱層  
析 [氯仿~氯仿：甲醇 = 9 : 1(v/v)] 純化，獲得呈淡黃色  
固體之標題化合物(0.100g, 38%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.83(3H,t,J=7.2Hz),1.09  
-1.21(2H,m),1.33-1.47(4H,m),1.75-1.90(2H,m),2.00-2.23  
(4H,m),2.36(3H,s),2.69-2.81(1H,m),2.94-3.03(1H,m),3.06-  
3.22(2H,m),3.23-3.74(6H,m),3.98(2H,s),4.39-4.50(1H,m),  
4.60(2H,d,J=6.7Hz),5.17(2H,s),5.39(2H,s),5.53-5.61(1H,  
m),6.50(1H,s),6.96(2H,s),7.11-7.24(5H,m),7.28(1H,s),7.75  
(1H,d,J=11.0Hz),7.97(1H,t,J=5.7Hz),8.03(1H,t,J=5.9Hz),  
8.09(1H,d,J=7.8Hz),8.27(1H,t,J=6.5Hz),8.48(1H,d,J=9.0Hz),  
8.60(1H,t,J=6.5Hz).

MS(ESI)m/z : 1034(M+H)<sup>+</sup>.

#### 【0243】步驟 9：抗體-藥物結合物(6)

抗體之還原：使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作  
為 280nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，將於實施例 7 製  
作的 hTINA1-H1L1，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10mg/mL。  
將本溶液(10.0mL)收取至 50mL 管，添加 10mM TCEP(東  
京化成工業股份有限公司)水溶液(0.317mL；相對於抗  
體一分子為 4.6 當量)及 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai

Tesque, Inc. ; 0.500 mL)。確認本溶液之 pH 為  $7.4 \pm 0.1$  內後，藉由於 37 培育 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：上述溶液以常溫水浴培育 10 分鐘後，添加二甲基亞礦(0.567 mL)。其次，添加上述步驟 8 獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞礦溶液(0.635 mL；相對於抗體一分子為 9.2 當量)，使用試管混勻器而於室溫攪拌 40 分鐘，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液(0.127 mL；相對於抗體一分子為 18.4 當量)，再於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 35.0 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E(使用  $\epsilon_{D,280} = 5178$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 20217$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.70 mg/mL，抗體產量：94.5 mg(95%)，以共通操作 E 所測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：6.4。

#### 【0244】

[實施例 15：hTINA1-H1L1 ADC 之製作(7)]

#### 【0245】



### 【0246】步驟 1：抗體 - 藥物結合物(7)

**抗體之還原：**使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，將實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(2.0 mL)採取至 4 mL 管，添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.0690 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)及 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.；0.0299 mL)。確認本溶液之 pH 為 7.0±0.1 內後，藉由於 37°C 培育 1 小時，將抗體內銼鏈區之雙硫鍵還原。

**抗體與藥物連接物之結合：**上述溶液於 15°C 水浴培育 10 分鐘後，添加實施例 14 步驟 8 獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞礦溶液(0.127 mL；相對於抗體一分子為 9.2 當量)，於 15°C 水浴培育 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC(Sigma-Aldrich

Co.LLC)水溶液(0.0190mL；相對於抗體一分子為13.8當量)，使用試管混勻器而於室溫攪拌20分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液進行製造方法1記載的共通操作D所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液9.00mL。


特性評價：使用製造方法1記載的共通操作E(使用 $\epsilon_{D,280} = 5178$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 20217$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.04mg/mL，抗體產量：18.4mg(92%)，以共通操作E測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：5.7。

### 【0247】

[實施例16：hTINA1-H1L1 ADC之製作(8)]

### 【0248】



### 【0249】步驟 1：抗體 - 藥物結合物(8)

抗體之還原：將於實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(30.0 mL)收取至 100 mL 容器，攪拌下添加 1 M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.; 0.4875 mL)後，於 37°C 攪拌 10 分鐘。攪拌下添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.9721 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)後，確認本溶液之 pH 為  $7.0 \pm 0.1$  內，藉由於 37°C 攪拌 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：將上述溶液於 15°C 水浴攪拌 10 分鐘後，一邊緩緩滴加實施例 14 步驟 8 獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞碩溶液(2.33 mL；相對於抗體一分子為 12.0 當量)，一邊於 15°C 水浴攪拌 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液(0.251 mL；相對於抗體一分子為 12.9 當量)，於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體 - 藥物結合物的溶液 98.0 mL。之後，進行製造方法 1 記載的共通操作 A 所致的濃縮操作，獲得含有標題抗體 - 藥物結合物的溶液 17.5 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E 及 F(使用  $\epsilon_{D,280} = 5178$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 20217$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：14.6 mg/mL，抗體產量：256 mg(85%)，以共通操作 E 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：6.7；共通操作 F 所測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：7.0。

### 【0250】

[實施例 17：hTINA1-H1L1 ADC 之製作(9)]

### 【0251】



### 【0252】步驟 1：抗體-藥物結合物(9)

抗體之還原：將於實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(5.0 mL)收取至 15 mL 容器，攪拌下添加 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.；0.0813 mL)後，

於 37°C攪拌 10 分鐘。攪拌下添加 10mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.0778mL；相對於抗體一分子為 2.4 當量)後，確認本溶液之 pH 為  $7.0 \pm 0.1$  內，藉由於 37°C攪拌 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：將上述溶液於 15°C水浴攪拌 10 分鐘後，一邊緩緩滴加實施例 14 步驟 8 獲得的化合物之 10mM 二甲基亞礦溶液(0.162mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)，並於 15°C水浴攪拌 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液(0.0418mL；相對於抗體一分子為 12.9 當量)，於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 21.0mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E 及 F(使用  $\epsilon_{D,280} = 5178$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 20217$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.26mg/mL，抗體產量：47.5mg(95%)，以共通操作 E 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：3.5；以共通操作 F 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：3.6。

### 【0253】

[參考例 18：hRS7 ADC 之製作(10)]

### 【0254】



### 【0255】步驟 1：抗體-藥物結合物 (10)

抗體之還原：將以參考例 1 製作的 hRS7，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280nm 吸光係數，使用 1.56)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液 (2.0 mL)採取至 4 mL 管，添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液 (0.0690 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量) 及 1M 磷酸氫二鉀水溶液 (Nacalai Tesque, Inc.；0.0299 mL)。確認本溶液之 pH 為  $7.0 \pm 0.1$  內後，藉由於 37°C 培育 1 小時間，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：上述溶液於 15°C 水浴培育 10 分鐘後，添加實施例 14 步驟 8 獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞礦溶液 (0.1269 mL；相對於抗體一分子為 9.2 當量)，於 15°C 水浴培育 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC (Sigma-Aldrich Co. LLC) 水溶液 (0.0190 mL；相對於抗體一分子為 13.8 當量)，於 15°C 水浴培育 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。

量)，使用試管混勻器而於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 9.00 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E(使用  $\epsilon_{D,280} = 5178$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 20217$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.07 mg/mL，抗體產量：18.6 mg(93%)，以共通操作 E 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：5.6。

### 【0256】

[實施例 19：hTINA1-H1L1 ADC 之製作(11)]

### 【0257】



【0258】步驟 1 : [2-(2-{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁唑-1-基]胺基}-2-側氧基乙氧基)乙基]胺甲酸三級丁酯

將依喜替康之甲磺酸鹽(3.10 g、5.47 mol)，使用{2-[(三級丁氧基羰基)胺基]乙氧基}乙酸(J.Med.Chem.，1992年，35卷，2928頁；1.55 g，6.01 mmol)替代4-(三

級丁氧基羧基胺基)丁酸，使與實施例 1 之步驟 1 同樣地反應，獲得呈淡黃色固體之標題化合物(2.56g，73%)。

$^1\text{H-NMR}$ (400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>) $\delta$ :0.87(3H,t,J=7.3Hz),1.26(9H,s),1.81-1.91(2H,m),2.13-2.22(2H,m),2.40(3H,s),3.08-3.26(4H,m),3.43-3.53(2H,m),4.00(1H,d,J=15.1Hz),4.05(1H,d,J=15.1Hz),5.14(1H,d,J=18.7Hz),5.22(1H,d,J=18.7Hz),5.40(1H,d,J=16.6Hz),5.44(1H,d,J=16.6Hz),5.59-5.66(1H,m),6.53(1H,s),6.86(1H,t,J=5.4Hz),7.31(1H,s),7.79(1H,d,J=10.9Hz),8.49(1H,d,J=9.1Hz).

MS(APCI)m/z:637(M+H)<sup>+</sup>.

【0259】步驟 2：2-(2-胺基乙氧基)-N-[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氨基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]噁唑-1-基]乙醯胺三氟乙酸鹽

將上述步驟 1 獲得的化合物(1.50g，2.36mol)，使與實施例 1 之步驟 2 同樣地反應，獲得呈淡黃色固體之標題化合物(1.50g，定量的)。

$^1\text{H-NMR}$ (400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>) $\delta$ :0.87(3H,t,J=7.5Hz),1.81-1.92(2H,m),2.15-2.23(2H,m),2.41(3H,s),3.05(2H,t,J=5.1Hz),3.15-3.23(2H,m),3.71(2H,t,J=5.1Hz),4.10(2H,s),5.19(1H,d,J=18.7Hz),5.24(1H,d,J=18.7Hz),5.43(2H,s),5.58-5.66(1H,m),6.55(1H,s),7.33(1H,s),7.73-7.84(4H,m),8.55(1H,d,J=9.1Hz).

MS(APCI)m/z : 537(M+H)<sup>+</sup>.

【0260】步驟 3：N-(三級丁氧基羰基)甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-[2-(2-{{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲阱并[1,2-b]喹啉-1-基]胺基}-2-側氧基乙氧基)乙基]甘胺酸醯胺

將上述步驟 2 獲得的化合物(554mg, 0.85mmol), 使與實施例 1 之步驟 3 同樣地反應，獲得標題化合物(775mg, 95%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.85(3H,t,J=7.3Hz),1.36(9H,s),1.78-1.89(2H,m),2.13-2.22(2H,m),2.39(3H,s),2.71(1H,dd,J=13.4,9.8Hz),2.95(1H,dd,J=13.4,4.3Hz),3.09-3.23(1H,m),3.23-3.32(2H,m),3.40-3.62(8H,m),3.73(1H,dd,J=16.5,5.5Hz),4.03(2H,s),4.39-4.47(1H,m),5.17(1H,d,J=18.9Hz),5.25(1H,d,J=18.9Hz),5.41(1H,d,J=16.8Hz),5.45(1H,d,J=16.8Hz),5.57-5.64(1H,m),6.54(1H,s),6.99(1H,t,J=5.8Hz),7.13-7.26(5H,m),7.31(1H,s),7.76-7.82(2H,m),7.90(1H,t,J=5.2Hz),8.13(1H,d,J=7.9Hz),8.27(1H,t,J=5.8Hz),8.49(1H,d,J=8.5Hz).

MS(APCI)m/z:955(M+H)<sup>+</sup>.

【0261】步驟 4：甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-[2-(2-{{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲阱并[1,2-b]喹啉-1-基]胺基}-2-側氧基乙氧基)乙基]甘胺酸醯胺三氟乙酸鹽

將上述步驟 3 獲得的化合物(630mg, 0.659mmol), 使與實施例 1 之步驟 4 同樣地反應，獲得標題化合物(588mg, 92%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.86(3H,t,J=7.3Hz),1.79-1.90(2H,m),2.13-2.22(2H,m),2.39(3H,s),2.71(1H,dd,J=13.4,10.1Hz),2.99(1H,dd,J=13.4,4.3Hz),3.09-3.23(1H,m),3.24-3.32(3H,m),3.41-3.71(7H,m),3.86(1H,dd,J=16.8,5.8Hz),4.04(2H,s),4.52(1H,td,J=9.0,4.1Hz),5.17(1H,d,J=18.9Hz),5.25(1H,d,J=18.9Hz),5.41(1H,d,J=16.5Hz),5.45(1H,d,J=16.5Hz),5.56-5.65(1H,m),6.55(1H,s),7.13-7.26(5H,m),7.32(1H,s),7.80(1H,d,J=11.0Hz),7.87-8.01(4H,m),8.29-8.36(2H,m),8.46-8.55(2H,m).

MS(APCI)m/z:855(M+H)<sup>+</sup>.

【0262】步驟5：N-[6-(2,5-二側氧基-2,5-二氫-1H-吡咯-1-基)己醯基]甘胺醯基甘胺醯基-L-苯基丙胺醯基-N-[2-(2-{[(1S,9S)-9-乙基-5-氟-9-羥基-4-甲基-10,13-二側氧基-2,3,9,10,13,15-六氫-1H,12H-苯并[de]哌喃并[3',4':6,7]吲哚并[1,2-b]喹啉-1-基]胺基}-2-側氧基乙氧基)乙基]甘胺酸醯胺

以三乙基胺(31.4μL, 0.22mmol)替代二異丙基乙基胺, 使用6-順丁烯二醯亞胺己烷酸N-琥珀醯亞胺基(95.3mg, 0.31mmol)替代3-(2-(2-(3-丁烯二醯亞胺丙醯胺)乙氧基)乙氧基)丙酸N-琥珀醯亞胺基, 將上述步驟4獲得的化合物(240mg, 0.247mmol), 使以與實施例1之步驟5同樣地反應, 獲得標題化合物(162mg, 62%)。

<sup>1</sup>H-NMR(400MHz,DMSO-d<sub>6</sub>)δ:0.86(3H,t,J=7.6Hz),1.13-1.22(2H,m),1.40-1.51(4H,m),1.78-1.90(2H,m),2.09(2H,t,J=7.6Hz),2.14-2.21(2H,m),2.39(3H,s),2.74(1H,dd,J=13.6,

9.7 Hz), 2.96 (1H, dd, J=13.6, 4.5 Hz), 3.08 - 3.24 (1H, m), 3.24 - 3.30 (1H, m), 3.33 - 3.40 (4H, m), 3.47 - 3.68 (7H, m), 3.72 (1H, dd, J = 16.6, 5.7 Hz), 4.03 (2H, s), 4.42 (1H, td, J=8.6, 4.2 Hz), 5.17 (1H, d, J=18.7 Hz), 5.25 (1H, d, J=18.7 Hz), 5.40 (1H, d, J=17.2 Hz), 5.44 (1H, d, J=17.2 Hz), 5.57 - 5.64 (1H, m), 6.52 (1H, s), 6.99 (2H, s), 7.13 - 7.25 (5H, m), 7.31 (1H, s), 7.74 - 7.81 (2H, m), 7.99 (1H, t, J= 5.7 Hz), 8.03 - 8.11 (2H, m), 8.22 (1H, t, J=5.7 Hz), 8.47 (1H, d, J= 9.1 Hz).

MS(APCI)m/z: 1048(M+H)<sup>+</sup>.

#### 【0263】步驟 6：抗體-藥物結合物(11)

抗體之還原：將實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280 nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液(3.0 mL)收取至 15 mL 容器，攪拌下添加 1M 磷酸氫二鉀水溶液(Nacalai Tesque, Inc.; 0.0488 mL)後，於 37°C 攪拌 10 分鐘。攪拌下添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液(0.0972 mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)後，確認本溶液之 pH 為 7.0±0.1 內，藉由於 37°C 攪拌 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：將上述溶液於 15°C 水浴攪拌 10 分鐘後，一邊緩緩滴加實施例 11a 步驟 8 獲得的化合物之 10 mM 二甲基亞碩溶液(0.2333 mL；相對於抗體一分子為 12.0 當量)，一邊於 15°C 水浴攪拌 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100 mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液(0.0251 mL；相對於

抗體一分子為 12.9 當量)，於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：將上述溶液，進行製造方法 1 記載的共通操作 D 所致的純化，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 14 mL。


特性評價：使用製造方法 1 記載的共通操作 E 及 F(使用  $\epsilon_{D,280} = 5193$ (實測值)、 $\epsilon_{D,370} = 20347$ (實測值))，獲得下述之特性值。

抗體濃度：1.93 mg/mL，抗體產量：27.0 mg(90%)，以共通操作 E 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：7.1；以共通操作 F 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：7.0。

#### 【0264】

[參考例 2：hRS7-CL2A-SN38 之製作(12)]

#### 【0265】



### 【0266】步驟 1：抗體 - 藥物結合物 (12)

**抗體之還原：**將參考例 1 製作的 hRS7，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280nm 吸光係數，使用 1.54) 及 C，以 PBS 6.0/EDTA 調製為 10 mg/mL。將本溶液 (10.0 mL) 收取於 50 mL 管，添加 10 mM TCEP(東京化成工業股份有限公司)水溶液 (0.317 mL；相對於抗體一分子為 4.6 當量) 及 1 M 磷酸氫二鉀水溶液 (Nacalai Tesque, Inc.；0.500 mL)。確認本溶液之 pH 為 7.4±0.1 內後，藉由於 37 培育 1 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

**抗體與藥物連接物之結合：**上述溶液於常溫水浴培育 10 分鐘後，添加二甲基亞碸 (0.567 mL)。其次，添加

依據美國專利公開第 2011/0293513 號說明書而合成的 CL2A-SN38 之 10mM 二甲基亞礦溶液 (0.635mL；相對於抗體一分子為 9.2 當量)，使用試管混勻器，於室溫攪拌 40 分鐘，使藥物連接物與抗體結合。其次，添加 100mM NAC(Sigma-Aldrich Co.LLC)水溶液 (0.127mL；相對於抗體一分子為 18.4 當量)，再於室溫攪拌 20 分鐘，使藥物連接物之反應停止。

純化：於上述反應溶液，重複 2 次製造方法 1-共通操作 D 記載的膠體過濾純化操作，其次，以含有聚山梨醇酯 80(0.01%)的 25mM 麦芽糖(trehalose)溶液，同樣地進行 1 次 NAP-25 管柱所致的膠體過濾純化操作後，將獲得的溶出液 (35mL) 冷凍乾燥。


特性評價：針對凍結乾燥前之溶出液，使用製造方法 1 記載的共通操作 E，獲得下述之特性值。

抗體濃度：2.78mg/mL，抗體產量：97.3mg(97%)，抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：5.6

### 【0267】

[實施例 20：hTINA1-H1L1 ADC 之製作(13)]

### 【0268】



### 【0269】步驟 1：抗體-藥物結合物(13)

抗體之還原：將實施例 7 製作的 hTINA1-H1L1，使用製造方法 1 記載的共通操作 B(作為 280nm 吸光係數，使用 1.54)及 C，將媒體取代為 PBS 6.0/EDTA，調製為 10 mg/mL 之抗體濃度。將本溶液(100mL)置入聚碳酸酯製之 250mL 三角燒瓶容器，磁性攪拌子攪拌下、於室溫添加 1M 磷酸氫二鉀水溶液(1.4mL)後，添加 10 mM TCEP 水溶液(1.62mL；相對於抗體一分子為 2.5 當量)。確認本溶液之 pH 為  $7.0 \pm 0.1$  內後，停止攪拌，經由於 37°C 培育 2 小時，將抗體內鉸鏈區之雙硫鍵還原。

抗體與藥物連接物之結合：將上述溶液冷卻至 15°C 後，攪拌下，緩緩滴加 DMSO(3.24mL)。其次，緩緩滴加含實施例 14 步驟 8 之化合物 10 mM 的 DMSO 溶液(1.76mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)。將此溶液於 15°C 攪拌 1 小時，使藥物連接物與抗體結合。其次，攪拌下，添加 100 mM NAC 水溶液(0.324mL；相對於抗體一分子為 5.0 當量)，再於室溫培育 20 分鐘，使未反應之藥物連接物之反應性停止。

純化：攪拌下，於上述溶液中緩緩添加 20% 乙酸水(約 0.52mL)及 ABS(100mL)，將本溶液之 pH 作成  $5.5 \pm 0.1$ 。經由精密過濾此溶液( $0.45\mu\text{m}$ 、PVDF 膜)去除白濁物，獲得約 200mL 濾液。對此濾液，使用以超過濾過膜(Merck 股份有限公司、Pellicon XL Cassette、Ultracell 30KDa)、管泵(美國 Cole-Parmer 公司 MasterFlex Pump model 77521-40、泵壓頭 model 7518-

00) 及管子(美國 Cole-Parmer 公司 MasterFlex Tube L/S16)所構成的超過濾裝置，進行超過濾純化。即，一邊於反應液中滴加作為純化緩衝液之 ABS(計 1600 mL)，一邊進行超過濾純化下，去除未結合之藥物連接物及其他低分子量試藥的同時，將緩衝液取代為 ABS，再進行至濃縮。對獲得的純化溶液，進行精密過濾( $0.22\mu\text{m}$ 、PVDF 膜)，獲得含有標題抗體-藥物結合物的溶液 88 mL。

特性評價：使用共通操作 E 及共通操作 F(使用  $\epsilon_{D,280} = 5178$ 、 $\epsilon_{D,370} = 20217$ )，獲得下述之特性值。

抗體濃度：9.96 mg/mL，抗體產量：876 mg(88%)，共通操作 E 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：3.8；共通操作 F 測定的抗體每一分子之藥物平均結合數(n)：3.8。

### 【0270】

[實施例 21：ADC 之抗腫瘤效果之評價]

#### 21-a) ADC 之抗腫瘤效果(1)

小鼠：5-6 週齡之雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(日本 Charles River 股份有限公司)於實驗使用前，以 SPF 條件下馴化 4-7 日。對小鼠給餌經滅菌的固形飼料(FR-2，Funabashi Farms Co., Ltd)，給予經滅菌的自來水(添加 5-15 ppm 次亞氯酸鈉溶液而調製)。

測定、計算式：於全部之研究，腫瘤之長徑及短徑以電子式數位測徑器(CD-15C，Mitutoyo Corp.)於 1 週測定 2 次，計算腫瘤體積( $\text{mm}^3$ )。計算式係如以下所示。

$$\text{腫瘤體積} (\text{mm}^3) = 1/2 \times \text{長徑} (\text{mm}) \times [\text{短徑} (\text{mm})]^2$$

【0271】抗體-藥物結合物全部以生理食鹽水(大塚製藥工場股份有限公司)稀釋，將  $10\text{mL/kg}$  之液量於尾靜脈內投予。自 ATCC 購入的人類大腸癌細胞株 COLO205 懸浮於生理食鹽水的  $2 \times 10^6$  個細胞皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠之右側腹部(第 0 日)，第 7 日實施隨機分組。抗體-藥物結合物(1)、(6)、(12)於第 7、14、21 日全部以  $10\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。作為陰性對照，未結合藥物的 hTINA1-H1L1 抗體及 hRS7 抗體以  $25\text{mg/kg}$  之用量而同樣地投予。抗體-藥物結合物(1)、(6)之投予所致的腫瘤體積與抗體-藥物結合物(12)之投予相比，顯著減少，任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 13 圖)。又，圖中，橫軸表示日數，縱軸表示腫瘤體積。

### 【0272】

#### 21-b)ADC 之抗腫瘤效果(2)

將自 ATCC 購入的人類胰臟腺癌細胞株 Bx-PC3 移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠，再將固形繼代的腫瘤片皮下移植於雌 BALB/c-nu/nu 小鼠右側腹部(第 0 日)，第 16 日實施隨機分組。抗體-藥物結合物(1)、(6)、(12)於第 16、23、30 日全部以  $10\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。作為陰性對照，未結合藥物的 hTINA1-H1L1 抗體及 hRS7 抗體以  $25\text{mg/kg}$  之用量同樣地投予。抗體-藥物結合物(1)、(6)之投予所致的腫瘤體積與抗體-藥物結合物(12)之投予相比，顯著減少，任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 14 圖)。

## 【 0273 】

## 21-c)ADC 之抗腫瘤效果(3)

將自 ATCC 購入的人類胰臟腺癌細胞株 Capan-1 移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠，再將固形繼代的腫瘤片皮下移植於雌 BALB/c-nu/nu 小鼠右側腹部(第 0 日)，於第 18 日實施隨機分組。抗體-藥物結合物(1)、(6)、(12)於第 18、25、32 日全部以  $10\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。作為陰性對照，未結合藥物的 hTINA1-H1L1 抗體及 hRS7 抗體以  $25\text{mg/kg}$  之用量同樣地投予。抗體-藥物結合物(1)、(6)之投予所致的腫瘤體積與抗體-藥物結合物(12)之投予相比，顯著減少，任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 15 圖)。

## 【 0274 】

## 21-d)ADC 之抗腫瘤效果(4)

與實施例 21-a)同樣地，將 COLO205 皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，第 11 日實施隨機分組。第 11、18、25 日將抗體-藥物結合物(2)、(5)全部以  $10\text{mg/kg}$ 、抗體-藥物結合物(7)、(10)全部以  $3\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。抗體-藥物結合物(2)、(5)、(7)、(10)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 16 圖)。

## 【 0275 】

## 21-e)ADC 之抗腫瘤效果(5)

與實施例 21-b)同樣地將 Bx-PC3 皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 25 日實施隨機分組。

抗體 - 藥物結合物(2)、(5)、(7)、(10)於第 25、32 日全部以 3 mg/kg 之用量自尾靜脈內投予。抗體 - 藥物結合物(2)、(5)、(7)、(10)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 17 圖)。

### 【0276】

#### 21-f) ADC 之抗腫瘤效果(6)

與實施例 21-a) 同樣地，將 COLO205 皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 9 日實施隨機分組。第 9、16 日抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)全部以 10 mg/kg 之用量自尾靜脈內投予。抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 18 圖)。

### 【0277】

#### 21-g) ADC 之抗腫瘤效果(7)

與實施例 21-b) 同樣地，將 Bx-PC3 皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，第 21 日實施隨機分組。第 21、28 日將抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)全部以 3 mg/kg 之用量自尾靜脈內投予。抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 19 圖)。

### 【0278】

#### 21-h) ADC 之抗腫瘤效果(8)

將自 ATCC 購入的人類卵巢癌細胞株 NIH：OVCAR-3  $8 \times 10^6$  cells 懸浮於 Matrigel(Becton，Dickinson and Company)，皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，

於第 25 日實施隨機分組。第 25 日抗體-藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)全部以  $3\text{ mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。抗體-藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 20 圖)。

### 【0279】

#### 21-i)ADC 之抗腫瘤效果(9)

將自 ATCC 購入的人類胃癌細胞株 NCI-N87  $1 \times 10^7$  個細胞懸浮於生理食鹽水，皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 6 日實施隨機分組。第 6 日將抗體-藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)全部以  $3\text{ mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。抗體-藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 21 圖)。

### 【0280】

#### 21-j)ADC 之抗腫瘤效果(10)

將自 ATCC 購入的人類肺癌細胞株 NCI-H292  $5 \times 10^6$  個細胞懸浮於生理食鹽水，皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 9 日實施隨機分組。第 9 日將抗體-藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)全部以  $3\text{ mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。抗體-藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 22 圖)。

### 【0281】

#### 21-k)ADC 之抗腫瘤效果(11)

將自 ATCC 購入的人類咽頭癌細胞株 FaDu  $3 \times 10^6$  個細胞懸浮於生理食鹽水，皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 11 日實施隨機分組。第 11 日將抗

體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)全部以  $3\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 23 圖)。

### 【 0282 】

#### 21-1)ADC 之抗腫瘤效果(12)

將自 ATCC 購入的人類胰臟腺癌細胞株 CFPAC-1  $4 \times 10^6$  個細胞懸浮於生理食鹽水，皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 14 日實施隨機分組。於第 14 日將抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)全部以  $3\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。抗體 - 藥物結合物(3)、(4)、(8)、(9)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 24 圖)。

### 【 0283 】

#### 21-m)ADC 之抗腫瘤效果(13)

與實施例 21-1 同樣地，將 CFPAC-1 皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 14 日實施隨機分組。第 14 日將抗體 - 藥物結合物(8)、(13)全部以  $1\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈內投予。抗體 - 藥物結合物(8)、(13)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 25 圖)。

### 【 0284 】

#### 21-n)ADC 之抗腫瘤效果(14)

將自 ATCC 購入的人類胰臟腺癌細胞株 HPAC  $3 \times 10^6$  個細胞懸浮於生理食鹽水而皮下移植至雌 BALB/c-nu/nu 小鼠(第 0 日)，於第 12 日實施隨機分組。第 12 日將抗體 - 藥物結合物(8)、(13)全部以  $3\text{mg/kg}$  之用量自尾靜脈

內投予。抗體-藥物結合物(8)、(13)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第26圖)。

### 【0285】

21-o)ADC之抗腫瘤效果(15)

將獲自 Japan Health Sci. Foundation 的人類食道癌組織皮下移植至 NOG 小鼠(公益財團法人 實驗動物中央研究所)而使增殖獲得的腫瘤片，再皮下移植至雌 NOD-scid 小鼠(日本 Charles River 股份有限公司)(第 0 日)，於第 27 日實施隨機分組。第 27 日將抗體-藥物結合物(8)、(13)全部以 3mg/kg 之用量自尾靜脈內投予。抗體-藥物結合物(8)、(13)之投予所致任一者皆發揮腫瘤增殖抑制效果(第 27 圖)。

### 【0286】

[實施例 22：ADC 之抗細胞效果之評價]

將 TROP2 抗原陽性細胞株 BxPC3、NCI-H292、NIH：OVCAR-3、CFPAC-1、FaDu、人類肺腺癌細胞株 Calu-3(ATCC)、人類卵巢癌細胞株 CaOV3(ATCC)、及 TROP2 抗原陰性細胞株人類肺癌細胞株 Calu-6(ATCC)、人類皮膚黑色腫細胞株 A375(ATCC)各自使用於 ADC 之抗細胞效果之評價。BxPC3 及 NCI-H292 以含 10% 胎牛血清(Moregate)的 RPMI1640 Medium(Gibco)、NIH：OVCAR-3 以含 20% 胎牛血清及 0.01mg/mL 胰島素(Invitrogen)的 RPMI1640 Medium、CFPAC-1 以含 10% 胎牛血清的 Iscove's Modified Dulbecco's Medium(Gibco)、FaDu、Calu-3 及 Calu-6 以含 10% 胎牛血清的 Eagle's

Minimum Essential Medium(ATCC)、CaOV3 及 A375 以含 10% 胎牛血清的 Dulbecco's Modified Eagle Medium(Gibco)，分別調製為  $2.2 \times 10^6$  個細胞/mL，各接種 90  $\mu$ L 於 96 孔細胞培養用微量盤。再以 RPMI1640 Medium 稀釋為 100 nM、20 nM、4 nM、0.8 nM、0.16 nM、0.032 nM、0.0064 nM 的抗體-藥物結合物(4)、(8)或用以比較而將 RPMI1640 Medium 各添加 10  $\mu$ L，於 37°C、5% CO<sub>2</sub> 下培養 6 日。培養後，將微量盤自培養箱取出，於室溫靜置 30 分鐘。添加培養液與等量之 CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay(Promega)，以平盤混合物攪拌 10 分鐘而將細胞溶解後，以平盤讀取機計測發光量。

6 日培養後之細胞增殖抑制率係以下式算出。

$$\text{細胞增殖抑制率} (\%) = a \div b \times 100$$

a : 6 日培養後之檢體添加孔之平均值 - 培養開始時之檢體未添加孔之平均值

b : 6 日培養後之培養基添加孔之平均值 - 培養開始時之檢體未添加孔之平均值

又 GI<sub>50</sub> 值係以下式算出。

$$GI_{50}(\text{nM}) = \text{antilog}((50-f) \times (\text{LOG}_{10}(d) - \text{LOG}_{10}(c)) \div (f-e) + \text{LOG}_{10}(d))$$

c : 檢體濃度 c

d : 檢體濃度 d

e : 檢體濃度 c 中的細胞增殖阻礙率

f : 檢體濃度 d 中的細胞增殖阻礙率

c、d 係包夾細胞增殖阻礙率 50% 的 2 點，c > d。

【0287】抗體-藥物結合物(4)及(8)係對為 TROP2 抗原陽性細胞株的 BxPC3、NCI-H292、NIH：OVCAR-3、CFPAC-1、FaDu、Calu-3、CaOV3，呈現  $GI_{50} < 1(nM)$  之抗細胞效果。另一方面，為 TROP2 抗原陰性細胞株的 Calu-6，對 A375 未呈現抗細胞效果 ( $> 100(nM)$ )。

### 【符號說明】

#### 【0288】

無。

### [序列表之非關鍵詞文字]

#### 【0289】

序列識別號 1：編碼 TINA1 抗體之重鏈之可變區的 cDNA 之核苷酸序列

序列識別號 2：TINA1 抗體之重鏈之可變區之胺基酸序列

序列識別號 3：編碼 TINA1 抗體之輕鏈之可變區的 cDNA 之核苷酸序列

序列識別號 4：TINA1 抗體之輕鏈之可變區之胺基酸序列

序列識別號 5：編碼人類  $\kappa$  鏈分泌訊號及人類  $\kappa$  鏈恆定區的核苷酸序列

序列識別號 6：編碼人類重鏈分泌訊號及人類 IgG1 恒定區的核苷酸序列

序列識別號 7：cTINA1 抗體重鏈之核苷酸序列

序列識別號 8：cTINA1 抗體重鏈之胺基酸序列

序列識別號 9：cTINA1 抗體輕鏈之核苷酸序列

序列識別號 10 : cTINA1 抗體輕鏈之胺基酸序列

序列識別號 11 : hTINA1-H1 之核昔酸序列

序列識別號 12 : hTINA1-H1 之胺基酸序列

序列識別號 13 : hTINA1-H2 之核昔酸序列

序列識別號 14 : hTINA1-H2 之胺基酸序列

序列識別號 15 : hTINA1-H3 之核昔酸序列

序列識別號 16 : hTINA1-H3 之胺基酸序列

序列識別號 17 : hTINA1-L1 之核昔酸序列

序列識別號 18 : hTINA1-L1 之胺基酸序列

序列識別號 19 : hTINA1-L2 之核昔酸序列

序列識別號 20 : hTINA1-L2 之胺基酸序列

序列識別號 21 : hTINA1-L3 之核昔酸序列

序列識別號 22 : hTINA1-L3 之胺基酸序列

序列識別號 23 : TINA1 抗體之 CDRH1 之胺基酸序列

序列識別號 24 : TINA1 抗體之 CDRH2 之胺基酸序列

序列識別號 25 : TINA1 抗體之 CDRH3 之胺基酸序列

序列識別號 26 : TINA1 抗體之 CDRL1 之胺基酸序列

序列識別號 27 : TINA1 抗體之 CDRL2 之胺基酸序列

序列識別號 28 : TINA1 抗體之 CDRL3 之胺基酸序列

序列識別號 29 : hRS7 抗體重鏈之核昔酸序列  
序列識別號 30 : hRS7 抗體重鏈之胺基酸序列  
序列識別號 31 : hRS7 抗體輕鏈之核昔酸序列  
序列識別號 32 : hRS7 抗體輕鏈之胺基酸序列  
序列識別號 33 : 引子 mG2aVR2  
序列識別號 34 : 引子 mKVR2  
序列識別號 35 : 引子 3.3-F1  
序列識別號 36 : 引子 3.3-R1  
序列識別號 37 : 引子 TINA1H-F  
序列識別號 38 : 引子 TINA1H-R  
序列識別號 39 : 引子 TINA1L-F  
序列識別號 40 : 引子 TINA1L-R  
序列識別號 41 : 引子 EG-Inf-F  
序列識別號 42 : 引子 EG1-Inf-R  
序列識別號 43 : 引子 CM-LKF  
序列識別號 44 : 引子 KCL-Inf-R

## 序列表

<110> 第一三共股份有限公司(Daiichi Sankyo Company, Limited)  
北海道公立大學法人札幌醫科大學(Sapporo Medical University)

<120> 抗體-藥物結合物之用途

<140> TW111132669

<141> 2014-12-25

<150> JP2013-267548

<151> 2013-12-25

<160> 44

<170> PatentIn version 3.5

<210> 1

<211> 363

<212> DNA

<213> 小鼠

<400> 1

cagatccagt tggcgcgtc tggacctgag ctgaagaagc ctggagagac agtcaggatc 60

tccctgcaagg cttctggta taccttcaca actgctggaa tgcagtggtt gcaaaaatgt 120

ccaggaaagg gtttgaagt gattggctgg ataaacaccc actctggagt gccaaaatat 180

gcagaagact tcaagggacg gtttgccttc tctttggaaa cctctgccag cactgcatat 240

ttacagataa gcaacacctaa aaatgaggac acgactacgt atttctgtgc gagatcgccc 300

ttcggtagta gctactggta cttcgatgtc tggggcgcag ggaccgcgtt caccgtctcc 360

tca 363

<210> 2

<211> 121

<212> PRT

<213> 小鼠

<400> 2

Gln Ile Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Leu Lys Lys Pro Gly Glu  
1 5 10 15

Thr Val Arg Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Thr Ala  
20 25 30

Gly Met Gln Trp Val Gln Lys Met Pro Gly Lys Gly Leu Lys Trp Ile  
35 40 45

Gly Trp Ile Asn Thr His Ser Gly Val Pro Lys Tyr Ala Glu Asp Phe  
50 55 60

Lys Gly Arg Phe Ala Phe Ser Leu Glu Thr Ser Ala Ser Thr Ala Tyr  
65 70 75 80

Leu Gln Ile Ser Asn Leu Lys Asn Glu Asp Thr Thr Tyr Phe Cys  
85 90 95

Ala Arg Ser Gly Phe Gly Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp Val Trp Gly

100                    105                    110

Ala Gly Thr Ala Val Thr Val Ser Ser  
115                    120

<210> 3  
<211> 327  
<212> DNA  
<213> 小鼠

<400> 3  
gacattgtga tgacccagtc tcacaaattc atgtccacat cagtaggaga cagggtcagc         60  
atcacctgca aggccagtca ggatgtgagt actgctgtag cctggtatca acagaaaacca         120  
ggacaatctc ctaaactgtt gatttactcg gcattcctacc gctacactgg agtccctgtat         180  
cgcttcactg gcagtggatc tgggacggct ttcaactttca ccatcagcag tgtgcaggct         240  
gaagacctgg cagtttatta ctgtcagcaa cattatatta ctccgctcac gttcggtgct         300  
gggaccaagc tggagctgaa acgggct    327

<210> 4  
<211> 109  
<212> PRT  
<213> 小鼠

<400> 4

Asp Ile Val Met Thr Gln Ser His Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly  
1                    5                    10                    15

Asp Arg Val Ser Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp Val Ser Thr Ala  
20                    25                    30

Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile  
35                    40                    45

Tyr Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly  
50                    55                    60

Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Phe Thr Ile Ser Ser Val Gln Ala  
65                    70                    75                    80

Glu Asp Leu Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln His Tyr Ile Thr Pro Leu  
85                    90                    95

Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys Arg Ala  
100                    105

<210> 5  
<211> 449  
<212> DNA  
<213> 現代人種

<400> 5  
gcctccggac tctagagcca ccatggtgct gcagacccag gtgttcatct ccctgctgtat         60

gtggatctcc ggccgcgtacg gcgcatacgat gatgattaaa cgtacggtgg ccgcggccctc	120
cgtttcatc ttccccccct ccgcgcgagca gctgaagtcc ggccaccgcct ccgtgggtgt	180
cctgctaat aacttctacc ccagagaggc caaggtgcag tggaaagggtgg acaacgcct	240
gcagtcggg aactcccagg agagcgtgac cgagcaggac agcaaggaca gcacctacag	300
cctgaggcgc accctgaccc tgagcaaaggc cgactacgag aagcacaagg tgtacgcctg	360
cgaggtgacc caccaggccc tgagctcccc cgtcaccaag agcttcaaca ggggggagtg	420
tttagggccc gtttaaacgg gggaggcta	449

<210> 6  
<211> 1132  
<212> DNA  
<213> 現代人種

<400> 6 gcctccggac tctagagcca ccatgaaaca cctgtgggttc ttccctcctgc tgggtggcagc	60
tcccaagatgg gtgctgagcc aggtgcaatt gtgcaggogg tttagtcagc ctccaccaag	120
ggcccaagcg tcttccccctt ggcaccctcc tccaaaggca cctctggcgg cacagccccc	180
ctgggctgcc tggtaagga ctacttcccc gaacctgtga ccgtgagctg gaactcaggc	240
gccctgacca gcggcgtgca cacattcccc gctgtcctgc agtcctcagg actctactcc	300
ctcagcagcg tggtgaccgt gcccctccaggc agcttggcaca cccagaccta catctgcaac	360
gtgaatcaca agcccgacaa caccaagggt gacaagagag tttagcccaa atcttgtac	420
aaaactcaca catgcccacc ctgcccagca cctgaactcc tgggggacc ctcagtttc	480
ctcttccccca caaaacccaa ggacaccctc atgatctcc ggaccctga ggtcacatgc	540
gtgggtgtgg acgtgagcca cgaagaccct gaggtcaagt tcaactggta cgtggacggc	600
gtggagggtgc ataatgcca gacaaagccc cggggaggagc agtacaacag cacgtaccgg	660
gtggtcagcg tcctcacgt cctgcaccag gactggctga atggcaagga gtacaagtgc	720
aaggctccca acaaaggccc cccagccccccatcggaaaa ccacatccaa agccaaaggc	780
cagccccggg aaccacaggt gtacaccctg ccccatccc gggaggagat gaccaagaac	840
caggtcagcc tgacctgcct ggtcaaaggc ttctatccca gcgacatcgc cgtggagtgg	900
gagagcaatg gccagcccgaa gacaaactac aagaccaccc ctcccggtct ggactccgac	960
ggctccttct tcctctacag caagtcaccatgttggacaaga gcaggtggca gcagggcaac	1020
gtcttcat gctccgttat gcatgaggct ctgcacaacc actacacccca gaagaggcctc	1080
tccctgtctc cccggcaatgttggccatggggggggggta	1132

<210> 7  
<211> 1410  
<212> DNA  
<213> 人工序列

<220>  
<223> 嵌合鼠-人類TINA1抗體之重鏈之核苷酸序列

<400> 7  
atgaaacacc tgggttctt cctcctgct gtggcagtc ccagatgggt gctgagccag 60  
atccagttgg tgcagtctgg acctgagctg aagaagcctg gagagacagt caggatctcc 120  
tgcaaggcctt ctgggtatac cttcacaact gctggaatgc agtgggtgca aaagatgcca 180  
ggaaagggtt tgaagtggat tggctggata aacacccact ctggagtgcc aaaatatgca 240  
gaagacttca agggacggtt tgcctctct ttggaaacct ctgccagcac tgcatattta 300  
cagataagca acctcaaaaa tgaggacacg actacgtatt tctgtgcgag atcgggttc 360  
ggtagtagct actggtaactt cgatgtctgg ggcgcaggaa ccgcggtcac cgtcagctca 420  
gcctccacca agggcccaag cgtttcccc ctggcacccct cctccaagag cacctctggc 480  
ggcacagccg ccctgggctg cctggtaag gactacttcc ccgaacccgt gaccgtgagc 540  
tggaactcag gcgcctgac cagcggcgtg cacaccccttcc ccgcgttcgc gcagtcctca 600  
ggactctact ccctcagcag cgtggtgacc gtgcctcca gcagottggg caccagacc 660  
tacatctgca acgtgaatca caagcccagc aacaccaagg tggacaagag agttgagccc 720  
aaatottgtg acaaaaactca cacatgcccc ccctgcccag caccotaact cctgggggaa 780  
ccctcagtct tcctcttccc cccaaaaccc aaggacaccc tcatgatctc coggaccct 840  
gaggtcacat gcgtggtggt ggacgtgagc cacgaagacc ctgaggtcaa gttcaactgg 900  
tagtggacg gcgtggaggt gcataatgcc aagacaaagc cccggagga gcagtacaac 960  
agcacgttacc gggtgttcag cgtcctcacc gtccgtcacc aggactggct gaatggcaag 1020  
gagtacaagt gcaaggcttc caacaaagcc ctcccagccc ccatcgagaa aaccatctcc 1080  
aaagccaaag gccagccccg ggaaccacag gtgtacaccc tgccccatc ccggaggag 1140  
atgaccaaga accaggtcag cctgacactgc ctggtaaaag gcttcttatcc cagcgacatc 1200  
gccgtggagt gggagagcaa tggccagccc gagaacaact acaagaccac ccctccctg 1260  
ctggactccg acggctcctt cttcctctac agcaagctca ccgtggacaa gagcaggtgg 1320  
cagcaggcga acgtttctc atgctccgtg atgcatgagg ctctgcacaa ccactacacc 1380  
cagaagagcc tctccctgtc tcccgcaaa 1410

<210> 8  
<211> 470  
<212> PRT  
<213> 人工序列

<220>  
<223> 嵌合鼠-人類TINA1抗體之重鏈之胺基酸序列

<400> 8

Met	Lys	His	Leu	Trp	Phe	Phe	Leu	Leu	Leu	Val	Ala	Ala	Pro	Arg	Trp
1				5			10				15				

Val Leu Ser Gln Ile Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Leu Lys Lys

	20	25	30													
Pro	Gly	Glu	Thr	Val	Arg	Ile	Ser	Cys	Lys	Ala	Ser	Gly	Tyr	Thr	Phe	
35																45
Thr	Thr	Ala	Gly	Met	Gln	Trp	Val	Gln	Lys	Met	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	
50																60
Lys	Trp	Ile	Gly	Trp	Ile	Asn	Thr	His	Ser	Gly	Val	Pro	Lys	Tyr	Ala	
65																75
Glu	Asp	Phe	Lys	Gly	Arg	Phe	Ala	Phe	Ser	Leu	Glu	Thr	Ser	Ala	Ser	
85																95
Thr	Ala	Tyr	Leu	Gln	Ile	Ser	Asn	Leu	Lys	Asn	Glu	Asp	Thr	Thr	Thr	
100																110
Tyr	Phe	Cys	Ala	Arg	Ser	Gly	Phe	Gly	Ser	Ser	Tyr	Trp	Tyr	Phe	Asp	
115																125
Val	Trp	Gly	Ala	Gly	Thr	Ala	Val	Thr	Val	Ser	Ser	Ala	Ser	Thr	Lys	
130																140
Gly	Pro	Ser	Val	Phe	Pro	Leu	Ala	Pro	Ser	Ser	Lys	Ser	Thr	Ser	Gly	
145																155
Gly	Thr	Ala	Ala	Leu	Gly	Cys	Leu	Val	Lys	Asp	Tyr	Phe	Pro	Glu	Pro	
165																175
Val	Thr	Val	Ser	Trp	Asn	Ser	Gly	Ala	Leu	Thr	Ser	Gly	Val	His	Thr	
180																190
Phe	Pro	Ala	Val	Leu	Gln	Ser	Ser	Gly	Leu	Tyr	Ser	Leu	Ser	Ser	Val	
195																205
Val	Thr	Val	Pro	Ser	Ser	Ser	Leu	Gly	Thr	Gln	Thr	Tyr	Ile	Cys	Asn	
210																220
Val	Asn	His	Lys	Pro	Ser	Asn	Thr	Lys	Val	Asp	Lys	Arg	Val	Glu	Pro	
225																240
Lys	Ser	Cys	Asp	Lys	Thr	His	Thr	Cys	Pro	Pro	Cys	Pro	Ala	Pro	Glu	
245																255
Leu	Leu	Gly	Gly	Pro	Ser	Val	Phe	Leu	Phe	Pro	Pro	Lys	Pro	Lys	Asp	
260																270
Thr	Leu	Met	Ile	Ser	Arg	Thr	Pro	Glu	Val	Thr	Cys	Val	Val	Val	Asp	
275																285
Val	Ser	His	Glu	Asp	Pro	Glu	Val	Lys	Phe	Asn	Trp	Tyr	Val	Asp	Gly	

290	295	300
Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn		
305	310	315
Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp		
325	330	335
Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro		
340	345	350
Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu		
355	360	365
Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn		
370	375	380
Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile		
385	390	395
Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr		
405	410	415
Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys		
420	425	430
Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys		
435	440	445
Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu		
450	455	460
Ser Leu Ser Pro Gly Lys		
465	470	
<210> 9		
<211> 702		
<212> DNA		
<213> 人工序列		
<220>		
<223> 嵌合鼠-人類TINA1抗體之輕鏈之核苷酸序列		
<400> 9		
atggtgctgc agacccaggt gttcatctcc ctgctgctgt ggatctccgg cgcgtacggc		60
gacatttgta tgaccaggc tcacaattc atgtccacat cagtaggaga cagggtcagc		120
atcacctgca aggccagtca ggatgtgagt actgctgtag cctggtatca acagaaacca		180
ggacaatctc ctaaactgct gatTTactcg gcatacttacc gctacactgg agtccctgat		240
cgcttcaactg gcagtggatc tgggacggct ttcaTTtca ccatcagcag tgtgcaggct		300
gaagacctgg cagtttatta ctgtcagcaa cattatatta ctccgctcac gttcggtgt		360

gggaccaagc tggagctgaa acgggctgtg gcccgcctt ccgtttcat cttcccccc	420
tccgacgagc agctgaagtc cggcacgc tccgtggtg gcctgctgaa taacttctac	480
cccagagagg ccaaggtgca gtgaaagggtg gacaacgc tgcagtcgg gaactccag	540
gagagcgtga ccgagcagga cagcaaggac agcacctaca gcctgagcag caccctgacc	600
ctgagcaaag ccgactacga gaagcacaag gtgtacgc gcgaggtgac ccaccaggc	660
ctgagctccc cogtcaccaa gagttcaac aggggggagt gt	702

&lt;210&gt; 10

&lt;211&gt; 234

&lt;212&gt; PRT

&lt;213&gt; 人工序列

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; 嵌合鼠-人類TINA1抗體之輕鏈之胺基酸序列

&lt;400&gt; 10

Met Val Leu Gln Thr Gln Val Phe Ile Ser Leu Leu Leu Trp Ile Ser			
1	5	10	15

Gly Ala Tyr Gly Asp Ile Val Met Thr Gln Ser His Lys Phe Met Ser		
20	25	30

Thr Ser Val Gly Asp Arg Val Ser Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp		
35	40	45

Val Ser Thr Ala Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro		
50	55	60

Lys Leu Leu Ile Tyr Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr Gly Val Pro Asp			
65	70	75	80

Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ala Phe Thr Phe Thr Ile Ser		
85	90	95

Ser Val Gln Ala Glu Asp Leu Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln His Tyr		
100	105	110

Ile Thr Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys Arg		
115	120	125

Ala Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln		
130	135	140

Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr			
145	150	155	160

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser		
165	170	175

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr  
180 185 190

Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys  
195 200 205

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro  
210 215 220

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys  
225 230

<210> 11

<211> 1410

<212> DNA

<213> 人工序列

<220>

<223> 人化TINA1抗体，H1型之重鏈之核苷酸序列

<400> 11		
atgaaacacc tgggttctt cctcctgctg gtggcagotc ccagatgggt gctgaggccag	60	
gtgcagctgg tgcagtctgg cgccgaagtg aagaaaccag ggcgcacggt gaagggtgtcc	120	
tgcaggccca gcggctacac cttaaccacc gcggcatgc agtgggtgcg ccaggctct	180	
ggacaggccc tggatggat gggctggatc aacaccaca gcggcggtcc caaatacgcc	240	
gaggacttca agggcagagt gaccatcagc gcgcacacca gcacccacac agcctacctg	300	
cagctgagca gcctgaagtc cgaggacacc ggcgtgtact actgcgccag aagcggcttc	360	
ggcagcagct actggtaattt cgacgtgtgg ggccaggcca ccctcgatc cgtcagctca	420	
gcctccacca agggcccaag cgtttcccc ctggcacccct cctccaagag cacctctggc	480	
ggcacagccg ccctggctg cctggtaag gactacttcc ccgaaccgt gaccgtgagc	540	
tggacttcag gcgcctgac cagcggcgtg cacaccccttcc ccgtgtctt gcagtcctca	600	
ggactctact ccctcagcag cgtggtgacc gtgcctcca gcagttggg cacccagacc	660	
tacatctgca acgtgaatca caagccagc aacaccaagg tggacaagag agttgagccc	720	
aaatcttgc aaaaaactca cacatgcccc ccctgcccag cacctgaact cctgggggaa	780	
ccctcagtct tcctcttccc cccaaaaccc aaggacaccc tcatgatctc ccggaccct	840	
gaggtcacat gctgggtgg ggacgtgagc cacgaagacc ctgaggtaaa gttcaactgg	900	
tacgtggacg gctggaggt gcataatgcc aagacaaagc cccggagga gcagttacaac	960	
agcacgttacc ggggtggtag cgtccctacc gcctcgacc aggactggct gaatggcaag	1020	
gagttacaagt gcaaggatctc caacaaagcc ctcccagccc ccatcgagaa aaccatctcc	1080	
aaagccaaag gccagccccg ggaaccacag gtgtacaccc tgccccatc ccggaggag	1140	
atgaccaaga accaggttag cctgaccctgc ctggtaaaag gcttctatcc cagcgacatc	1200	
gcgtggagt gggagagcaa tggccagccc gagaacaact acaagaccac ccctccctg	1260	

ctggactccg acggctcctt cttccctcac agcaagctca ccgtggacaa gagcaggatgg	1320
cagcagggca acgtcttctc atgcgtccgtg atgcgttggg ctctgcacaa ccactacacc	1380
cagaagagcc tctccctgtc tccccggcaaa	1410

<210> 12  
 <211> 470  
 <212> PRT  
 <213> 人工序列

<220>  
 <223> 人化TINA1抗体，H1型之重鏈之胺基酸序列

<400> 12

Met Lys His Leu Trp Phe Phe Leu Leu Leu Val Ala Ala Pro Arg Trp			
1	5	10	15

Val Leu Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys		
20	25	30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe		
35	40	45

Thr Thr Ala Gly Met Gln Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu		
50	55	60

Glu Trp Met Gly Trp Ile Asn Thr His Ser Gly Val Pro Lys Tyr Ala			
65	70	75	80

Glu Asp Phe Lys Gly Arg Val Thr Ile Ser Ala Asp Thr Ser Thr Ser		
85	90	95

Thr Ala Tyr Leu Gln Leu Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Val		
100	105	110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Ser Gly Phe Gly Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp		
115	120	125

Val Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys		
130	135	140

Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly			
145	150	155	160

Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro		
165	170	175

Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr		
180	185	190

Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val

195

200

205

Val Thr Val Pro Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn  
 210 215 220

Val Asn His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro  
 225 230 235 240

Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu  
 245 250 255

Leu Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp  
 260 265 270

Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp  
 275 280 285

Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly  
 290 295 300

Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn  
 305 310 315 320

Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp  
 325 330 335

Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro  
 340 345 350

Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu  
 355 360 365

Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn  
 370 375 380

Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile  
 385 390 395 400

Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr  
 405 410 415

Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys  
 420 425 430

Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys  
 435 440 445

Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu  
 450 455 460

Ser Leu Ser Pro Gly Lys

465

470

<210> 13  
 <211> 1410  
 <212> DNA  
 <213> 人工序列

<220>  
 <223> 人化TINA1抗体，H2型之重鏈之核苷酸序列

<400> 13		
atgaaacacc tgggttctt ctcctgctg gtggcagctc ccagatgggt gctgagccag	60	
gtgcagctgg tgcagtctgg cgccgaagtg aagaaaccag gcgcgcacgt gaaggtgtcc	120	
tgcaaggcca goggctacac cttaaccacc gcggcatgc agtgggtgcg ccaggctct	180	
ggacaggccc tggaatggat gggctggatc aacacccaca gcggcggtgcc caaatacgcc	240	
gaggacttca agggcagagt gaccatcagc ctggacacca gcacacctcac cgcctacact	300	
cagctgagca gcctgaagtc cgaggacacc gcgcgtgtact actgogccag aagcggcttc	360	
ggcagcagct actggtaactt cgacgtgtgg ggccaggcgc ccctcgatc cgtcagctca	420	
gcctccacca agggcccaag cgtttcccc ctggcacccct cctccaagag cacctctggc	480	
ggcacagccg ccctggctg cctggtaag gactacttcc cogaacccgt gaccgtgagc	540	
tggaaactcag gcgcctgac cagcggcgtg cacaccccttcc ccgcgtgtcc gcagtcctca	600	
ggactctact ccctcagcag cgtgtgacc gtgcctccca gcagcttggg caccagacc	660	
tacatctgca acgtgaatca caagccacg aacaccaagg tggacaagag agttgagccc	720	
aaatcttgtg acaaaaactca cacatccccca ccctgcccac cacctgaact cctgggggga	780	
ccctcagtct tcctttccc cccaaaaccc aaggacaccc tcatgatctc ccggaccct	840	
gaggtcacat gogtggttgtt ggacgtgagc cacgaagacc ctgaggtcaa gttcaactgg	900	
tacggtggacg gcgtggaggt gcataatgcc aagacaaagc cccgggagga gcagtacaac	960	
agcacgtacc ggggtggcag cgtcctcacc gtcctgcacc aggactggct gaatggcaag	1020	
gagttacaagt gcaaggcttc caacaaagcc ctcccagccc ccatcgagaa aaccatctcc	1080	
aaagccaaag gccagccccg ggaaccacag gtgtacaccc tgccccatc ccggggaggag	1140	
atgaccaaga accaggttag cctgaccctgc ctggtaaag gcttctatcc cagcgacatc	1200	
gccgtggagt gggagagcaa tggccagccc gagaacaact acaagaccac ccctccctg	1260	
ctggactccg acggctcctt cttctctac agcaagctca ccgtggacaa gagcaggtgg	1320	
cagcaggcga acgttcttcc atgctccgtg atgcatgagg ctctgcacaa ccactacacc	1380	
cagaagagcc tctccctgtc tcccgcaaa	1410	

<210> 14  
 <211> 470  
 <212> PRT  
 <213> 人工序列

&lt;220&gt;

<223> 人化TINA1抗體，H2型之重鏈之胺基酸序列

<400> 14

Met Lys His Leu Trp Phe Phe Leu Leu Leu Val Ala Ala Pro Arg Trp  
1 5 10 15

Val Leu Ser Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys  
20 25 30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe  
35 40 45

Thr Thr Ala Gly Met Gln Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu  
50 55 60

Glu Trp Met Gly Trp Ile Asn Thr His Ser Gly Val Pro Lys Tyr Ala  
65 70 75 80

Glu Asp Phe Lys Gly Arg Val Thr Ile Ser Leu Asp Thr Ser Thr Ser  
85 90 95

Thr Ala Tyr Leu Gln Leu Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Val  
100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Ser Gly Phe Gly Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp  
115 120 125

Val Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys  
130 135 140

Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly  
145 150 155 160

Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro  
165 170 175

Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr  
180 185 190

Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val  
195 200 205

Val Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn  
210 215 220

Val Asn His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro  
225 230 235 240

Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu  
245 250 255

Leu Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp  
260 265 270

Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp  
275 280 285

Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly  
290 295 300

Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn  
305 310 315 320

Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp  
325 330 335

Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro  
340 345 350

Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu  
355 360 365

Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn  
370 375 380

Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile  
385 390 395 400

Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr  
405 410 415

Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys  
420 425 430

Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys  
435 440 445

Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu  
450 455 460

Ser Leu Ser Pro Gly Lys  
465 470

<210> 15

<211> 1410

<212> DNA

<213> 人工序列

<220>

<223> 人化TINA1抗体，H3型之重鏈之核苷酸序列

<400> 15

atgaaacacc tgggttctt ctcctgctg gtggcagctc ccagatgggt gctgagccag

60

atccagctgg tcgcgtctgg cgccgaaagt aagaaaaccccg gcgagagcgt gaaggtgtcc 120  
tgcaggccca gcggtcacac ctttaccacc gcggcatgc agtgggtgca gcagatgcct 180  
ggcaaggccc tggaatggat gggctggatc aacacccaca gcggcgtgcc caaatacgcc 240  
gaggacttca agggcagagt gacccttcagc ctggacaccca gcacccacac cgccctacctg 300  
cagctgagca gcctgaagtc cgaggacacc gcctgtact actgcgccag aagcggcttc 360  
ggcagcagct actggtaattt cgacgtgtgg gcgcaggca ccctcggtac cgtcagctca 420  
gcctccacca agggccaaag cgtctcccc ctggcacccct cctccaagag cacctctggc 480  
ggcacagccg ccctgggctg cctggtaag gactacttcc cccaaacccgt gaccgtgagc 540  
tggaactcag gcgcctgtac cagcggcgtg cacaccccttcc cccgtgtccct gcagtcctca 600  
ggactctact ccctcagcag cgtggtgacc gtgcctcca gcagcttggg cacccagacc 660  
tacatctgca acgtaatca caagcccagc aacaccaagg tggacaagag agttgagccc 720  
aaatcttgc acaaaaactca cacatgccc ccctgcccag cacctgaact cctgggggaa 780  
ccctcagtct tcctttccc cccaaaaccc aaggacacccc tcatgatctc ccggacccct 840  
gaggtcacat gcgtgggtt ggacgtgagc cacgaagacc ctgaggtcaa gttcaactgg 900  
tacgtggacg gcgtggaggt gcataatgcc aagacaaagc cccggggagga gcagtacaac 960  
agcacgttacc gggtggtcag cgtcctcacc gtcctgcacc aggactggct gaatggcaag 1020  
gagtacaagt gcaaggcttc caacaaagcc cttccagccccccatc ccatcgagaa aaccatctcc 1080  
aaagccaaag gccagccccc ggaaccacag gtgtacaccc tgccccatc cccggggag 1140  
atgaccaaga accaggttcag cctgacacctc ctggtaaaag gcttctatcc cagcgacatc 1200  
gcgtggagt gggagagcaa tggccagccc gagaacaact acaagaccac ccctcccggt 1260  
ctggactccg acggctccctt cttcccttac agcaagctca ccgtggacaa gagcagggtgg 1320  
cagcaggcca acgtttctc atgctccgt atgcatgagg ctctgcacaa ccactacacc 1380  
cagaagagcc tctccctgtc tcccgccaaaa 1410

<210> 16  
<211> 470  
<212> PRT  
<213> 人工序列

人化TINA1抗體，H3型之重鏈之胺基酸序列

<400> 16

Met Lys His Leu Trp Phe Phe Leu Leu Leu Val Ala Ala Pro Arg Trp  
1 5 10 15

Val Leu Ser Gln Ile Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys  
20 25 30

Pro Gly Glu Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe

35

40

45

Thr Thr Ala Gly Met Gln Trp Val Gln Gln Met Pro Gly Lys Gly Leu  
 50 55 60

Glu Trp Met Gly Trp Ile Asn Thr His Ser Gly Val Pro Lys Tyr Ala  
 65 70 75 80

Glu Asp Phe Lys Gly Arg Val Thr Phe Ser Leu Asp Thr Ser Thr Ser  
 85 90 95

Thr Ala Tyr Leu Gln Leu Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Val  
 100 105 110

Tyr Tyr Cys Ala Arg Ser Gly Phe Gly Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp  
 115 120 125

Val Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys  
 130 135 140

Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly  
 145 150 155 160

Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro  
 165 170 175

Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr  
 180 185 190

Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val  
 195 200 205

Val Thr Val Pro Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn  
 210 215 220

Val Asn His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro  
 225 230 235 240

Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu  
 245 250 255

Leu Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp  
 260 265 270

Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp  
 275 280 285

Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly  
 290 295 300

Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn

305	310	315	320
Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp			
325		330	335
Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro			
340	345	350	
Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu			
355	360	365	
Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn			
370	375	380	
Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile			
385	390	395	400
Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr			
405	410	415	
Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys			
420	425	430	
Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys			
435	440	445	
Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu			
450	455	460	
Ser Leu Ser Pro Gly Lys			
465	470		
<210> 17			
<211> 702			
<212> DNA			
<213> 人工序列			
<220>			
<223> 人化TINA1抗體，L1型之輕鏈之核苷酸序列			
<400> 17			
atggtgctgc agacccaggt gttcatctcc ctgctgctgt ggatctccgg cgcgtaacggc		60	
gacatccaga tgacccagag cccttagcagc ctgagccca gcgtggcga cagagtgacc		120	
atcacatgca aggccagcca ggacgtgtcc acagccgtgg cctggtatca gcagaaggct		180	
ggcaaggccc ccaagctgt gatctacagc gccagctacc ggtacaccgg cgtccccagc		240	
agattttctg gcagcggctc cggcaccgac ttcaccctga caatcagcag cctgcagccc		300	
gaggacttcg ccgtgtacta ctgccagcag cactacatca ccccccgtac cttggccag		360	
ggcaccaagc tgaaatcaa gcgtacggtg gcccggccct ccgtgttcat cttccccccc		420	
tccgacgagc agctgaagtc cggcacccgc tccgtggtgt gcctgctgaa taacttctac		480	

cccagagagg ccaaggtgca gtggaaagg tgacaaacgcgg tgcagtccgg gaactcccag 540  
 gagagcgtga ccgagcagga cagcaaggac agcacctaca gcctgagcag caccctgacc 600  
 ctgagcaaag ccgactacga gaagcacaag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccaggc 660  
 ctgagctccc ccgtcaccaa gagttcaac aggggggagt gt 702

<210> 18  
 <211> 234  
 <212> PRT  
 <213> 人工序列

<220>  
 <223> 人化TINA1抗體，L1型之輕鏈之胺基酸序列

<400> 18

Met Val Leu Gln Thr Gln Val Phe Ile Ser Leu Leu Leu Trp Ile Ser  
 1 5 10 15

Gly Ala Tyr Gly Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser  
 20 25 30

Ala Ser Val Gly Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp  
 35 40 45

Val Ser Thr Ala Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro  
 50 55 60

Lys Leu Leu Ile Tyr Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr Gly Val Pro Ser  
 65 70 75 80

Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser  
 85 90 95

Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln His Tyr  
 100 105 110

Ile Thr Pro Leu Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg  
 115 120 125

Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln  
 130 135 140

Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr  
 145 150 155 160

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser  
 165 170 175

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr  
 180 185 190

Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys  
195 200 205

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro  
210 215 220

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys  
225 230

<210> 19  
<211> 702  
<212> DNA  
<213> 人工序列

<220>  
<223> 人化TINA1抗體，L2型之輕鏈之核苷酸序列

<400> 19  
atggtgctgc agaccagggt gttcatctcc ctgctgtgtt ggatctccgg cgcgtaacggc 60  
gacatcgta tgacccagag cccttagcaggc ctgagcgcca gcgtggcga cagagtgacc 120  
atcacatgca aggccagcca ggacgtgtcc acagccgtgg cctggtatca gcagaaggct 180  
ggcaaggccc ccaagctgtt gatctacagc gocagctacc ggtacacccgg cgtgcccagc 240  
agatttctg gcagcggctc cggcaccgac ttcaccctga caatcagcag cctgcagccc 300  
gaggacttcg ccgtgtacta ctgccagcag cactacatca ccccccgtac ctttggccag 360  
ggcaccaagc tggaaatcaa gcgtacggtg gcccgcctt ccgtgttcat cttccccccc 420  
tccgacgagc agctgaagtc cggcaccgac tccgtgggt gcctgctgaa taacttctac 480  
cccagagagg ccaaggtgca gtggaaagggtg gacaacgccc tgcagtcgg gaactcccag 540  
gagagcgtga cccggcagga cagcaaggac agcacctaca gcctgagcag caccctgacc 600  
ctgagcaaag ccgactacga gaagcacaag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccaggc 660  
ctgagctccc ccgtcaccaa gagctcaac aggggggagt gt 702

<210> 20  
<211> 234  
<212> PRT  
<213> 人工序列

<220>  
<223> 人化TINA1抗體，L2型之輕鏈之胺基酸序列

<400> 20

Met Val Leu Gln Thr Gln Val Phe Ile Ser Leu Leu Leu Trp Ile Ser  
1 5 10 15

Gly Ala Tyr Gly Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser  
20 25 30

Ala Ser Val Gly Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp

35

40

45

Val Ser Thr Ala Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro  
 50 55 60

Lys Leu Leu Ile Tyr Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr Gly Val Pro Ser  
 65 70 75 80

Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser  
 85 90 95

Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln His Tyr  
 100 105 110

Ile Thr Pro Leu Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg  
 115 120 125

Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln  
 130 135 140

Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr  
 145 150 155 160

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser  
 165 170 175

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr  
 180 185 190

Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys  
 195 200 205

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro  
 210 215 220

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys  
 225 230

<210> 21

<211> 702

<212> DNA

<213> 人工序列

<220>

<223> 人化TINA1抗体，L3型之輕鏈之核苷酸序列

<400> 21

atgggtctgc agacccaggt gttcatctcc ctgctgtgt ggatctccgg cgcgtacggc 60

gacatcgta tgacccagag cccttagcagc ctgagcgcca gcgtggcga cagagtgacc 120

atcacatgca aggccagcca ggacgtgtcc acagccgtgg cctggtatca gcagaagccc 180

ggcaaggcgc ccaagctgtt gatctacagc gccagctacc ggtacaccgg cgtgccccagc 240

agatttctg	gcagcggctc	cggcaccgac	ttcaccccta	caatcagcag	cctgcagccc	300
gaggacttcg	ccgtgtacta	ctgccagcag	cactacatca	ccccccctgac	cttggccag	360
ggcaccaagc	tggaaatcaa	gcgtacggtg	gcccgcct	ccgtgttcat	cttccccccc	420
tccgacgagc	agctgaagtc	cggcaccgccc	tccgtggtgt	gcctgtgaa	taacttctac	480
cccagagagg	ccaaggtgca	gtggaaggtg	gacaacgccc	tgcagtcgg	gaactcccag	540
gagagogtga	cogagcagga	cagcaaggac	agcacctaca	gcctgagcag	caccctgacc	600
ctgagcaaag	ccgactacga	gaagcacaag	gtgtacgcot	gcgaggtgac	ccaccaggc	660
ctgagctccc	ccgtcaccaa	gagctcaac	aggggggagt	gt		702

&lt;210&gt; 22

&lt;211&gt; 234

&lt;212&gt; PRT

&lt;213&gt; 人工序列

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; 人化TINA1抗體，L3型之輕鏈之胺基酸序列

&lt;400&gt; 22

Met	Val	Leu	Gln	Thr	Gln	Val	Phe	Ile	Ser	Leu	Leu	Leu	Trp	Ile	Ser
1						5							15		

Gly	Ala	Tyr	Gly	Asp	Ile	Val	Met	Thr	Gln	Ser	Pro	Ser	Ser	Leu	Ser
						20							30		

Ala	Ser	Val	Gly	Asp	Arg	Val	Thr	Ile	Thr	Cys	Lys	Ala	Ser	Gln	Asp
						35						40			45

Val	Ser	Thr	Ala	Val	Ala	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Gly	Lys	Gln	Pro
						50					55				60

Lys	Leu	Leu	Ile	Tyr	Ser	Ala	Ser	Tyr	Arg	Tyr	Thr	Gly	Val	Pro	Ser
						65			70		75				80

Arg	Phe	Ser	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Leu	Thr	Ile	Ser
									85			90			95

Ser	Leu	Gln	Pro	Glu	Asp	Phe	Ala	Val	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Gln	His	Tyr
								100				105			110

Ile	Thr	Pro	Leu	Thr	Phe	Gly	Gln	Gly	Thr	Lys	Leu	Glu	Ile	Lys	Arg
						115					120				125

Thr	Val	Ala	Ala	Pro	Ser	Val	Phe	Ile	Phe	Pro	Pro	Ser	Asp	Glu	Gln
								130			135				140

Leu	Lys	Ser	Gly	Thr	Ala	Ser	Val	Val	Cys	Leu	Leu	Asn	Asn	Phe	Tyr
								145			150				160

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser  
165 170 175

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr  
180 185 190

Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys  
195 200 205

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro  
210 215 220

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys  
225 230

<210> 23

<211> 5

<212> PRT

<213> 小鼠

<400> 23

Thr Ala Gly Met Gln  
1 5

<210> 24

<211> 17

<212> PRT

<213> 小鼠

<400> 24

Trp Ile Asn Thr His Ser Gly Val Pro Lys Tyr Ala Glu Asp Phe Lys  
1 5 10 15

Gly

<210> 25

<211> 12

<212> PRT

<213> 小鼠

<400> 25

Ser Gly Phe Gly Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp Val  
1 5 10

<210> 26

<211> 11

<212> PRT

<213> 小鼠

<400> 26

Lys Ala Ser Gln Asp Val Ser Thr Ala Val Ala  
1 5 10

<210> 27  
 <211> 7  
 <212> PRT  
 <213> 小鼠

<400> 27

Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr  
 1 5

<210> 28  
 <211> 9  
 <212> PRT  
 <213> 小鼠

<400> 28

Gln Gln His Tyr Ile Thr Pro Leu Thr  
 1 5

<210> 29  
 <211> 1410  
 <212> DNA  
 <213> 現代人種

<400> 29  
 atgaaacacc tgggttctt cctctgctg gtggcagtc ccagatgggt gctgagccag 60  
 gtgcagctgc agcagagcgg cagcgagctg aagaagcctg gcgcacgcgt caagggtgtcc 120  
 tgcaaggcca gcccgtacac cttcaccaac tacggcatga actgggtgaa gcaggcccc 180  
 ggccagggcc tgaagtggat gggctggatc aacacctaca ccggogagcc cacctacacc 240  
 gacgacttca agggccgggtt cgcottcagc ctggacacca gcgtgagcac cgcctacctg 300  
 cagatcagca gcctgaaggc cgacgatacc gccgtgtact tctgcgccag aggccgttc 360  
 ggcagcagct actggtaatt cgacgtgtgg ggccaggcga gcctggtgac cgtgagctca 420  
 gcctccacca agggcccaag cgtttcccc ctggcacccct cctccaagag cacctctggc 480  
 ggcacagccg ccctgggctg cctggtaag gactacttcc ccgaaccctg gaccgtgagc 540  
 tggaactcag gcccctgac cagcggcgtg cacaccccttcc ccgcgttcgc gcaactc 600  
 ggactctact ccctcagcag cgtggtgacc gtgcctccca gcagcttggg cacccagacc 660  
 tacatctgca acgtgaatca caagcccagc aacaccaagg tggacaagag agttgagccc 720  
 aaatcttgtc acaaaaactca cacatgcccc ccctgcccag cacctgaact cctgggggga 780  
 ccctcagtct tcctttccc cccaaaaccc aaggacaccc tcatgatctc ccggaccct 840  
 gaggtcacat gcgtgggtt ggacgtgagc cacgaagacc ctgaggtaa gttcaactgg 900  
 tacgtggacg gcgtggaggt gcataatgcc aagacaaagc cccgggagga gcagtacaac 960  
 agcacgtacc gggtggtcag cgtcctcacc gtcctgcacc aggactggct gaatggcaag 1020  
 gagtacaagt gcaagggttc caacaaagcc ctcccagccc ccatcgagaa aaccatctcc 1080  
 aaagccaaag gccagcccg ggaaccacag gtgtacaccc tgcccccattc ccggaggag 1140  
 atgaccaaga accaggtcag cctgacactgc ctggtaaag gcttctatcc cagcgacatc 1200

gccgtggagt gggagagcaa tggccagccc gagaacaact acaagaccac ccctccccgtg	1260
ctggactccg acggctcctt cttccctctac agcaagctca ccgtggacaa gagcaggatgg	1320
cagcaggcga acgtcttctc atgctccgtg atgcatgagg ctctgcacaa ccactacacc	1380
cagaagagcc tctccctgtc tcccgcaaa	1410

<210> 30  
 <211> 470  
 <212> PRT  
 <213> 現代人種

<400> 30

Met Lys His Leu Trp Phe Phe Leu Leu Leu Val Ala Ala Pro Arg Trp			
1	5	10	15

Val Leu Ser Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Ser Glu Leu Lys Lys		
20	25	30

Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe		
35	40	45

Thr Asn Tyr Gly Met Asn Trp Val Lys Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu		
50	55	60

Lys Trp Met Gly Trp Ile Asn Thr Tyr Thr Gly Glu Pro Thr Tyr Thr			
65	70	75	80

Asp Asp Phe Lys Gly Arg Phe Ala Phe Ser Leu Asp Thr Ser Val Ser		
85	90	95

Thr Ala Tyr Leu Gln Ile Ser Ser Leu Lys Ala Asp Asp Thr Ala Val		
100	105	110

Tyr Phe Cys Ala Arg Gly Gly Phe Gly Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp		
115	120	125

Val Trp Gly Gln Gly Ser Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys		
130	135	140

Gly Pro Ser Val Phe Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly			
145	150	155	160

Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro		
165	170	175

Val Thr Val Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr		
180	185	190

Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val		
195	200	205

Val Thr Val Pro Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn  
 210 215 220

Val Asn His Lys Pro Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Arg Val Glu Pro  
 225 230 235 240

Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu  
 245 250 255

Leu Leu Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp  
 260 265 270

Thr Leu Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp  
 275 280 285

Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly  
 290 295 300

Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn  
 305 310 315 320

Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp  
 325 330 335

Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro  
 340 345 350

Ala Pro Ile Glu Lys Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu  
 355 360 365

Pro Gln Val Tyr Thr Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn  
 370 375 380

Gln Val Ser Leu Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile  
 385 390 395 400

Ala Val Glu Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr  
 405 410 415

Thr Pro Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys  
 420 425 430

Leu Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys  
 435 440 445

Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu  
 450 455 460

Ser Leu Ser Pro Gly Lys  
 465 470

<210> 31  
 <211> 702  
 <212> DNA  
 <213> 現代人種

<400> 31  
 atggtgctgc agacccaggt gttcatctcc ctgctgctgt ggatctccgg cgctacggc 60  
 gatatccagc tgacccagag ccccacgcgc ctgagcgcca gcgtggcga cagagtgtcc 120  
 atcacatgca aggccagcca ggacgtgtcc attgccgtgg cctggtatca gcagaagccc 180  
 ggcaaggccc ccaagctgt gatctacagc gcacgttacc ggtacaccgg cgtccccgac 240  
 agattcagcg gcagcggctc cggcacccgac ttcaccctga ccatcagcag cctgcagccc 300  
 gaggacttcg ccgtgtacta ctgccagcag cactacatca ccccoctgac cttcgagcc 360  
 ggcaccaagg tgaaatcaa gcgtacggtg gcccggccct ccgtgttcat cttccccccc 420  
 tccgacgagc agctgaagtc cggcacccgccc tccgtggtgt gcctgctgaa taacttctac 480  
 cccagagagg ccaaggtgca gtggaaggtg gacaacgccc tgcaagccgg gaactcccg 540  
 gagagcgtga ccgagcagga cagcaaggac agcacctaca gcctgagcag caccctgacc 600  
 ctgagcaaag ccgactacga gaagcacaag gtgtacgcct gcgaggtgac ccaccaggc 660  
 ctgagctccc cogtcaccaa gagttcaac agggggggagt gt 702

<210> 32  
 <211> 234  
 <212> PRT  
 <213> 現代人種

<400> 32

Met Val Leu Gln Thr Gln Val Phe Ile Ser Leu Leu Leu Trp Ile Ser  
 1 5 10 15

Gly Ala Tyr Gly Asp Ile Gln Leu Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser  
 20 25 30

Ala Ser Val Gly Asp Arg Val Ser Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp  
 35 40 45

Val Ser Ile Ala Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro  
 50 55 60

Lys Leu Leu Ile Tyr Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr Gly Val Pro Asp  
 65 70 75 80

Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser  
 85 90 95

Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln His Tyr  
 100 105 110

Ile Thr Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg

115

120

125

Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu Gln  
 130 135 140

Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr  
 145 150 155 160

Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln Ser  
 165 170 175

Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr  
 180 185 190

Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu Lys  
 195 200 205

His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser Pro  
 210 215 220

Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys  
 225 230

&lt;210&gt; 33

&lt;211&gt; 30

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; 人工序列

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; 引子mG2aVR2之核苷酸序列

&lt;400&gt; 33

agagttccag gtcaaggcgtca ctggctcagg 30

&lt;210&gt; 34

&lt;211&gt; 30

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; 人工序列

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; 引子mKVR2之核苷酸序列

&lt;400&gt; 34

agtccaaactg ttcaggacgc cattttgtcg 30

&lt;210&gt; 35

&lt;211&gt; 30

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; 人工序列

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; 引子3.3-F1之核苷酸序列

&lt;400&gt; 35

tataccgtcg acctctagct agagcttggc 30

&lt;210&gt; 36

<211> 30		
<212> DNA		
<213> 人工序列		
<220>		
<223> 引子3. 3-R1之核苷酸序列		
<400> 36		30
gctatggcag ggcctgcgc cccgacgttg		
<210> 37		
<211> 47		
<212> DNA		
<213> 人工序列		
<220>		
<223> 引子TINA1H-F之核苷酸序列		
<400> 37		47
ccagatgggt gctgagccag atccagttgg tgcagtctgg acctgag		
<210> 38		
<211> 48		
<212> DNA		
<213> 人工序列		
<220>		
<223> 引子TINA1H-R之核苷酸序列		
<400> 38		48
cttggtgag gctgagctga cggtgaccgc ggtccctgcg ccccagac		
<210> 39		
<211> 48		
<212> DNA		
<213> 人工序列		
<220>		
<223> 引子TINA1L-F之核苷酸序列		
<400> 39		48
atctcoggcg cgtacggcga cattgtgatg acccagtc acaaattc		
<210> 40		
<211> 45		
<212> DNA		
<213> 人工序列		
<220>		
<223> 引子TINA1L-R之核苷酸序列		
<400> 40		45
ggagggggcg gccacagccc gtttcagctc cagcttggtc ccagc		
<210> 41		
<211> 22		
<212> DNA		
<213> 人工序列		
<220>		
<223> 引子EG-Inf-F之核苷酸序列		
<400> 41		

agctccccaga tgggtgctga gc 22

<210> 42  
 <211> 22  
 <212> DNA  
 <213> 人工序列

<220>  
 <223> 引子EG1-Inf-R之核苷酸序列

<400> 42  
 gggcccttgg tggaggctga gc 22

<210> 43  
 <211> 24  
 <212> DNA  
 <213> 人工序列

<220>  
 <223> 引子CM-LKF之核苷酸序列

<400> 43  
 ctgtggatct ccggcgcgta cggc 24

<210> 44  
 <211> 21  
 <212> DNA  
 <213> 人工序列

<220>  
 <223> 引子KCL-Inf-R之核苷酸序列

<400> 44  
 ggagggggcg gccaccgtac g 21


## 【發明申請專利範圍】

【請求項 1】一種抗體-藥物結合物用於製造治療乳癌之藥劑的用途，其中該抗體-藥物結合物為下式所示包含連接物及藥物的抗體-藥物結合物且與抗 TROP2 抗體連接，

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-C(=O)-GGFG-NH-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-C(=O)-(NH-DX)


其中

-(琥珀醯亞胺-3-基-N)-具有下式所示的結構：



在其第 3 位經由硫醚鍵與抗 TROP2 抗體結合，於第 1 位之氮原子上與含其之連接物結構內的亞甲基結合；

-(NH-DX)係表示下式基團：



，其中在第 1 位之胺基的氮原子為結合部位；

-GGFG-表示-Gly-Gly-Phe-Gly-之四勝肽殘基；

其中該抗 TROP2 抗體包含：於其重鏈可變區之序列識別號 23 之胺基酸序列所構成的 CDRH1、序列識別號 24 之胺基酸序列所構成的 CDRH2 及序列識別號 25 之胺基酸序列所構成的 CDRH3；及於其輕鏈可變區之序列識別號 26 之胺基酸序列所構成的 CDRL1、序列識別號 27 之胺基酸序列所構成的 CDRL2 及序列識別號 28 之胺基酸序列所構成的 CDRL3。

**【請求項 2】**如請求項 1 之用途，其中該抗 TROP2 抗體包含選自下列群組之重鏈可變區及輕鏈可變區：

序列識別號 12 之位置 20 至 140 的胺基酸序列所構成的重鏈可變區及序列識別號 18 之位置 21 至 129 的胺基酸序列所構成的輕鏈可變區；

序列識別號 14 之位置 20 至 140 的胺基酸序列所構成的重鏈可變區及序列識別號 18 之位置 21 至 129 的胺基酸序列所構成的輕鏈可變區；

序列識別號 14 之位置 20 至 140 的胺基酸序列所構成的重鏈可變區及序列識別號 20 之位置 21 至 129 的胺基酸序列所構成的輕鏈可變區；及

序列識別號 16 之位置 20 至 140 的胺基酸序列所構成的重鏈可變區及序列識別號 22 之位置 21 至 129 的胺基酸序列所構成的輕鏈可變區。

**【請求項 3】**如請求項 1 之用途，其中該抗 TROP2 抗體包含選自下列群組的重鏈及輕鏈：

序列識別號 12 之位置 20 至 470 的胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 之位置 21 至 234 的胺基酸序列所構成的輕鏈；

序列識別號 14 之位置 20 至 470 的胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 之位置 21 至 234 的胺基酸序列所構成的輕鏈；

序列識別號 14 之位置 20 至 470 的胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 20 之位置 21 至 234 的胺基酸序列所構成的輕鏈；及

序列識別號 16 之位置 20 至 470 的胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 22 之位置 21 至 234 的胺基酸序列所構成的輕鏈。

【請求項 4】如請求項 1 之用途，其中該抗 TROP2 抗體包含序列識別號 12 之位置 20 至 140 的胺基酸序列所構成的重鏈可變區及序列識別號 18 之位置 21 至 129 的胺基酸序列所構成的輕鏈可變區。

【請求項 5】如請求項 1 之用途，其中該抗 TROP2 抗體包含序列識別號 12 之位置 20 至 470 的胺基酸序列所構成的重鏈及序列識別號 18 之位置 21 至 234 的胺基酸序列所構成的輕鏈。

【請求項 6】如請求項 3 之用途，其中該抗 TROP2 抗體於重鏈之羧基末端缺少離胺酸殘基。

【請求項 7】如請求項 5 之用途，其中該抗 TROP2 抗體於重鏈之羧基末端缺少離胺酸殘基。

【請求項 8】如請求項 1 至 7 中任一項之用途，其中每個抗體結合的藥物-連接物結構的平均單元數在 2 至 8 之範圍。

【請求項 9】如請求項 1 至 7 中任一項之用途，其中每個抗體結合的藥物-連接物結構的平均單元數在 3 至 8 之範圍。

## 【發明圖式】

序列識別號 7 : c T I N A 1 抗體重鏈之核苷酸序列

```

atgaaacacacctgtggttttccctcctgtggcagctcccagatgggtgctgagccagatccag
ttgggtcagtcgtggacactgagctgaagaaggcctggagagacagtcaaggatctctgcaaggcttct
gggtataccttcacaactgtggaatgcagtgggtgcaaaaagatgccaggaaagggttgaagtgg
attggctggataaacaccccactctggagtgcacaaatatgcagaagacttcaagggacggtttgcc
ttctctttggaaacacctctgcagcactgcataattacagataagcaacctcaaaaatgaggacacg
actacgtatttctgtcgagatcggggttcggtagtagctactgttacttcgtatgtctggggcgca
gggaccgcggtcaccgtcagctcagcctccaccaaggccccaaagcgtttccccctggcacccctcc
tccaagagcacctctggccgcacagccgcctggctgcgtcaaggactacttccccgaaccc
gtgaccgtgagctggaactcaggcgccctgaccagcggcgtgcacacctccccgtgtcctgcag
tcctcaggactctactccctcagcagcgtggtagccctccagcagctggcacccagacc
tacatctgcaacgtgaatcacaagccagcaacaccaagggtggacaagagagatgtgagcccaaatct
tgtgacaaaactcacatgcccaccctgcccagcacctgaactcctggggggaccctcagtcttc
ctcttcccccaaaacccaaggacaccctcatgatctccggaccctgaggtcacatgcgtgg
gtggacgtgagccacgaagaccctgaggtcaagttcaactggtagcgtggacggcgtggaggtgcac
aatgccaagacaaagccccggaggaggcagttacaacacagcacgtaccgggtggtagcgtcctcacc
gtcctgcaccaggactggctgaatggcaaggaggactacaagggtctccaacaaagccctccca
ccccccatcgagaaaaccatctccaaagccaaaggccagccccgggaaccacaggtgtacaccctg
ccccccatcccggaggagatgaccaagaaccaggcgtaccctgacctgcctggtaaaggcttctat
cccagcgcacatcgccgtggagtgggagagcaatggccagccccgagaacaactacaagaccaccct
cccgtgctggactccgacggctcccttctctacagcaagctcaccgtggacaagagcaggcgtgg
cagcagggcaacgtttctcatgctccgtatgcgtgcatgaggctctgcacaaccactacacccagaag
agcctctccctgtctccggcaaa

```

訊息序列(1-57)、可變區(58-420)、恒定區(421-1410)

序列識別號 8 : c T I N A 1 抗體重鏈之胺基酸序列

```

MKHLWFFLLVAAAPRWVLSQIQLVQSGPELKKPGETVRISCKASGYTFTTAGMQWVQKMPGKGLKWIGWINT
HSGVPKYAEDFKGRFAFSLETSASTAYLQISNLKNEDTTTYFCARSGFGSSYWYFDVWGAGTAVTVSSASTK
GPSVFPLAPSSKSTGGTAALGCLVKDYFPEPVTVWSNSGALTSGVHTFPAPLQSSGLYSISSLSSVVTVPSSSL
GTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDLMISRTPEVTCVVVD
VSHEDEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIKTIS
KAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTPPVLDSDGSFFLYSK
LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

```

訊息序列(1-19)、可變區(20-140)、恒定區(141-470)

## 【第 1 圖】

## 序列識別號 9 : c T I N A 1 抗體輕鏈之核苷酸序列

atggtgctgcagacccagggtttcatctccctgctgtggatctccggcgcgtacggcgacatt  
 gtatgacccagtctcacaaattcatgtccacatcagtaggagacagggtcagcatcacctgcaag  
 gccagtcaaggatgtgagtaactgctgttagcctgttatcaacagaaaaccaggacaatctcctaaactg  
 ctgatttactcggcatcctacccgtacactggagtccctgatcgcttactggcagtgatctgg  
 acggcttcactttcaccatcagcagtgtcaggctgaagacctggcagtttattactgtcagcaa  
 cattataattactccgctcacgttcgggtctgggacccaagctggagctgaaacgggctgtggccgccc  
 ccctccgtgttcatctccccccctccgacgacgactgaagtccggcaccgcctccgtgggtgc  
 ctgctgaataacttctaccccaagagaggccaaggtgcagtggaaagggtggacaacgcctgcagtcc  
 gggactcccaggagagcgtgaccgagcaggacagcacccctacgcctgagcaggcacc  
 ctgaccctgagcaaagccgactacgagaagcacaagggttacgcctgcgaggtgaccaccaggc  
 ctgagctccccgtcaccaagagcttcaacaggggggaggtgt

訊息序列(1-60)、可變區(61-387)、恒定區(388-702)

## 序列識別號 10 : c T I N A 1 抗體輕鏈之核苷酸序列

MVLQTQVFISSLWISGAYGDIVMTQSHKFMSTVGDRVSITCKASQDVSTAVAWYQQKPGQSPKLLIYSAS  
 YRYTGVPDFRTGSGSGTAFTFTISSLVQAEDLAVYYCQQHYITPLTFGAGTKLELKRAVAAPSVFIFPPSDEQ  
 LKSGTASVVCLNNFPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTTLSKADYEKHKVYACEV  
 THQGLSSPVTKSFNRGEC

訊息序列(1-20)、可變區(21-129)、恒定區(130-234)

## 【第 2 圖】

## 序列識別號 1 1 : h T I N A 1 - H 1 之核苷酸序列

atgaaaacacctgtggttcttccctctgtggcagctccagatgggtgctgagccaggtgcagctggtg  
 cagtctggcgccgaagtgaagaaaccaggcgccagcgtgaaggtgtccctgcaaggccagcggctacaccctt  
 accaccgcggcatgcagtgggtgcgccaggctcggacagggcctggaatggatggatggatcaacacc  
 cacagcggcgtgcccataacgccgaggactcaagggcagagtgaccatcagcgcgcacaccagcaccc  
 acagcctacctgcagctgagcagcctgaagtccgaggacaccgcgtgtactactgcgccagaagcggcttc  
 ggcagcagactggtaacttcgacgtgtggggcaggcaccctcgtgaccgtcagctcagcctccaccaag  
 ggcccaagcgtctccccctggcaccctcccaagagcacctctggcggcacagccgcctggctgcctg  
 gtcaaggactacttccccgaacccgtgaccgtgagctggaaactcaggcgcctgaccagcggcgtgcacacc  
 ttccccgtgtcctgcagtcctcaggactctactccctcagcagcgtggtaaccgtgcctccagcagcttgc  
 ggcacccagacacctacatctgcaacgtgaatcacaagcccagcaacaccaaggtggacaagagagttgagccc  
 aaatcttgtgacaaaactcacacatgcccaccctgcccagcacctgaactcctggggggaccctcagtc  
 ctcttccccccaaaacccaaggacaccctcatgatctccggaccctgaggtcacatgcgtgggtggac  
 gtgagccacgaagacccctgaggtcaagttcaactggtaacgtggacggcgtggaggtgcataatgccaagaca  
 aagcccccgggaggagcagtacaacacagcacgttaccgggtggtcagcgtcctcaccgtcctgcaccaggactgg  
 ctgaatggcaaggagactacaagtgcaggtctcaacaaaggcctccagccccatccgggaggagatgaccaagaac  
 caggtcagcctgacctgcctggtaaaggcttatcccagcgcacatcgcgtggagtgaaatggc  
 cagcccgagaacaactacaagaccaccctccgtgtggactccgcacggctcttcctctacagcaag  
 ctcaccgtggacaagagcaggtggcagcagggcaacgttctcatgctccgtatgcacatgaggctctgcac  
 aaccactacacccagaagacccctccctgtctccggcaaa

訊息序列(1-57)、可變區(58-420)、恒定區(421-1410)

## 序列識別號 1 2 : h T I N A 1 - H 1 之胺基酸序列

MKHLWFFLLLVAAPRWVLSQVQLVQSGAEVKPGASVKVSCKASGYTFTAGMQWVRQAPGQGLEWMGWINT  
 HSGVPKYAEDFKGRVTISADTSTSTAYLQLSSLKSEDTAVYYCARSGFGSSYWYFDVWGQGTIVTVSSASTK  
 GPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPALQSSGLYSLSVVTVPSSSL  
 GTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDLMISRTPEVTCVVVD  
 VSHEDEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTS  
 KAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSK  
 LTVDKSRWQQGNVFCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

訊息序列(1-19)、可變區(20-140)、恒定區(141-470)

## 【第 3 圖】

## 序列識別號 1 3 : h T I N A 1 – H 2 之核苷酸序列

atgaaaacacctgtggttctccctcctgtggcagctcccagatgggtgctgagccaggcagctgg  
 cagtctggcgccgaagtgaagaaaccaggcgccagcgtgaaggtgtcctgcaagggcagcgctacaccc  
 accaccgcggcatgcagtgggtgcgcaggctcctggacaggccctggaatggatggctgatcaacacc  
 cacagcggcgtgccccaaatacgcggaggacttcaaggcagagtgaccatcagcctggacaccagcaccc  
 accgcctacctgcagctgagcgcctgaagtccgaggacaccgcgtgtactactgcgcagaagcggctc  
 ggcagcagactggtaacttcgacgtgtggggccaggcaccctcgtgaccgtcagctcagcctccaccaag  
 ggcccaagcgtcttccccctggcaccctcctccaagagcacctctggcggcacagccgcctggctgcctg  
 gtcaaggactacttccccgaacccgtgaccgtgagctggaaactcaggcgcctgaccagcggcgtgcacacc  
 ttccccgtgtcctgcagtcctcaggactctactccctcagcagcgtggtaaccgtgcctccagcagcttgc  
 ggcacccagacctacatctgcaacgtgaatcacaagcccagcaacaccaaggtgtggacaagagagttgagccc  
 aaatcttgacaaaactcacacatgcccaccctgcccagcacctgaactcctgggggaccctcagtcttc  
 ctcttcccccaaaacccaaggacaccctcatgatctccggaccctgaggtcacatgcgtgggtggac  
 gtgagccacgaagacccctgaggtcaagttcaactggtaactggacggcgtggaggtgcataatgccaagaca  
 aagccccggaggagcagtacaacacgcacgttaccgggtggtcagcgtcctcaccgtcctgcaccaggactgg  
 ctgaatggcaaggagtacaagtgcaggtctccaacaaagccctcccagccccatcgagaaaaccatctcc  
 aaagccaaaggccagccccgggaaccacacagggtgtacaccctgccccatcccggaggagatgaccaagaac  
 caggtcagcctgacctgcctggtcaaaggcttatcccagcgcacatcgcgtggaggtggagagatggc  
 cagcccgagaacaactacaagaccacccctcccgtgctggactccgcacggctccttcctctacagcaag  
 ctcaccgtggacaagagcaggtggcagcaggcaacgtttcatgcctcgatgcattgaggctctgcac  
 aaccactacacccagaagagcctctccctgtctccggcaaa

訊息序列(1-57)、可變區(58-420)、恒定區(421-1410)

## 序列識別號 1 4 : h T I N A 1 – H 2 之胺基酸序列

MKHLWFFLLLVAAPRWVLSQVQLVQSGAEVKPGASVKVSCKASGYTFTTAGMQWVRQAPGQGLEWMGWINT  
 HSGVPKYAEDFKGRVTISLDTSTSTAYLQLSSLKSEDTAVYYCARSGFGSSYWYFDVWGQGTIVTVSSASTK  
 GPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTWSWNSGALTSGVHTFPALQSSGLYSLSSVVTVPSSSL  
 GTQTYICNVNHKPSNTKVDRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPPKDLMISRTPEVTCVVVD  
 VSHEDEPVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIKTIS  
 KAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTPPVLDSDGSFFLYSK  
 LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPKG

訊息序列(1-19)、可變區(20-140)、恒定區(141-470)

【第 4 圖】

## 序列識別號 15 : h T I N A 1-H 3 之核苷酸序列

atgaaaacacctgtggttctccctgtggcagtcggcagatgggtgtgagccagatccagctggtg  
 cagtctggcgccgaagtgaagaaaccggcgagagcgtgaagggtgcctgcaaggccagcggctacaccc  
 accaccggccggcatgcagtgggtgcagcagatgcctggcaagggcctggaatggatggatggatcaacacc  
 cacagcggcgtgcccatacgccgaggacttcaagggcagagtgcacccctcagcctggacaccagcaccc  
 accgcctacactgcagctgagcgcctgaagtccgaggacaccgcgtgtactactgcgcagaagcggctc  
 ggcagcagctactggtaacttcgacgtgtggccagggcaccctcgtgaccgtcagctcagcctccaccaag  
 ggcccaagcgtcttccccctggcaccctccaaagagcacctctggcggcacagccgcctggctgcctg  
 gtcaaggactacttccccgaaccctgaccgtgagctggaaactcaggccctgaccagcggcgtgcacacc  
 ttccccctgtcctgcagtcctcaggactctactccctcagcagcgtgtgaccgtgcctccagcagcttgc  
 ggcacccagacctacatctgcaacgtgaatcacaagcccagcaacaccaaggtggacaagagagttgagccc  
 aaatcttgtgacaaaactcacacatgccaccctgcccagcacctgaactcctggggggaccctcagtc  
 ctcttcccccaaaacccaaggacaccctcatgatctccggaccctgaggtcacatgcgtgggtggac  
 gtgagccacgaagacccctgaggtcaagttcaactggtacgtggacggcgtggaggtgcataatgccaagaca  
 aagccccgggaggagcagtacaacacgcacgttaccgggtggcagcgtccctcaccgtcctgcaccaggactgg  
 ctgaatggcaaggagtacaagtgcaggtctccaacaaagccctcccagccccatcgagaaaaccatctcc  
 aaagccaaaggccagccccgggaaccacaggtgtacaccctgccccatccccggaggagatgaccaagaac  
 caggtcagcctgacctgcctggcaaaggcttatcccagcgcacatgcgtggaggtggagagcaatggc  
 cagccccgagaacaactacaagaccaccctccctgtgtggactccgcacggctccttcctctacagcaag  
 ctcaccgtggacaagagcaggtggcagcaggcaacgtttcatgcgtccgtatgcacgaggcttcac  
 aaccactacacccagaagagcctctccctgtctccggcaaa

訊息序列(1-57)、可變區(58-420)、恒定區(421-1410)

## 序列識別號 16 : h T I N A 1-H 3 之胺基酸序列

MKHLWFFLLVAAPRWVLSQIQLVQSGAEVKKPGESVKVSCKASGYTFTAGMQWVQQMPGKGLEWMGWINT  
 HSGVPKYAEDFKGRVTFSLDTSTSTAYLQLSSLKSEDTAVYYCARSGFGSSYWYFDVWGQGTLTVSSASTK  
 GPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTWSWNSGALTSGVHTFPALQSSGLYSLSVVTVPSSSL  
 GTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHCPGPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD  
 VSHEDEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIKTIS  
 KAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTPPVLDSDGSFFLYSK  
 LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

訊息序列(1-19)、可變區(20-140)、恒定區(141-470)

## 【第 5 圖】

## 序列識別號 17 : hTINA1-L1 之核苷酸序列

atggtgctcagaccagggtttcatctccctgctgtggatctccggcgacatccagatg  
 acccagagccctagcgcctgagcgccagcgtggcgacagagtgaccatcacatgcaaggccaggac  
 gtgtccacagccgtggcctggtatcagcagaagcctggcaaggcccccaagctgtatctacagcgccagc  
 taccggtaacccggcgtgcccagcagatttctggcagcggctccggcaccgacttcaccctgacaatcagc  
 agcctgcagcccgaggacttcgcgtgtactactgccagcagcactacatccccctgacctttggccag  
 ggcaccaagctggaaatcaagcgtacggtgccgccccctccgtgttcatcttccccccctccgacgacag  
 ctgaagtccggcaccgcctccgtggtgtgcctgctaataacttctaccccaagagaggccaaggtgcagtgg  
 aaggtggacaacgcctgcagtcgggaactcccaggagagcgtgaccgagcaggacagcaaggacagcacc  
 tacagcctgagcagcaccctgaccctgagcaaagccgactacgagaagcacaagggtgtacgcctgcgaggtg  
 acccaccaggcctgagctccccgtcaccaagagcttcaacagggggaggtgt

訊息序列(1-60)、可變區(61-387)、恒定區(388-702)

## 序列識別號 18 : hTINA1-L1 之胺基酸序列

MVLQTQVFISLLLWISGAYGDIQMTQSPSSLASVGDRVITCKASQDVSTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSAS  
 YRYTGVPSRSGSGTDFTLTISLQPEDFAVYYCQQHYITPLTFQGQTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQ  
 LKSGTASVVCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSTTLSKADYEKHKVYACEV  
 THQGLSSPVTKSFNRGEC

訊息序列(1-20)、可變區(21-129)、恒定區(130-234)

## 【第 6 圖】

## 序列識別號 19 : hTINA1-L2 之核苷酸序列

atggtgctcagaccagggtttcatctccctgctgtggatctccggcgacatcgtatg  
 acccagagccctagcgcctgagcgccagcgtggcgacagagtgaccatcacatgcaaggccaggac  
 gtgtccacagccgtggcctggtatcagcagaagcctggcaaggcccccaagctgtatctacagcgccagc  
 taccggtaacccggcgtgcccagcagatttctggcagcggctccggcaccgacttcaccctgacaatcagc  
 agcctgcagcccgaggacttcgcgtgtactactgccagcagcactacatccccctgacctttggccag  
 ggcaccaagctggaaatcaagcgtacggtgccgccccctccgtgttcatcttccccccctccgacgacag  
 ctgaagtccggcaccgcctccgtggtgtgcctgctaataacttctaccccaagagaggccaaggtgcagtgg  
 aaggtggacaacgcctgcagtcgggaactcccaggagagcgtgaccgagcaggacagcaaggacagcacc  
 tacagcctgagcagcaccctgaccctgagcaaagccgactacgagaagcacaagggtgtacgcctgcgaggtg  
 acccaccaggcctgagctccccgtcaccaagagcttcaacagggggaggtgt

訊息序列(1-60)、可變區(61-387)、恒定區(388-702)

## 序列識別號 20 : hTINA1-L2 之胺基酸序列

MVLQTQVFISLLLWISGAYGDIVMTQSPSSLASVGDRVITCKASQDVSTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSAS  
 YRYTGVPSRSGSGTDFTLTISLQPEDFAVYYCQQHYITPLTFQGQTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQ  
 LKSGTASVVCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSTTLSKADYEKHKVYACEV  
 THQGLSSPVTKSFNRGEC

訊息序列(1-20)、可變區(21-129)、恒定區(130-234)

## 【第 7 圖】

## 序列識別號 2 1 : h T I N A 1 - L 3 之核苷酸序列

atggtgctgcagaccagggttcatctccctgctgtggatctccggcgacatcgatg  
 acccagagccctagcagcctgagcgccagcgtggcgacagagtgaccatcacatgcaaggccaggac  
 gtgtccacagccgtggctggatcagcagaagccggcaagcagccaaagctgtatctacagcgccagc  
 taccggtaacccggcgtgcccagcagatttctggcagcggctccggcaccgacttcaccctgacaatcagc  
 agcctgcagcccgaggacttcggcgttactactgccagcagcactacatcacccctgaccttggccag  
 ggcacccaagctggaaatcaagcgtacggtgccggccccctccgtgttcatctccccccctccgacgacg  
 ctgaagtccggcaccgcctccgtggtgtgcctgctgaataacttctaccccagagaggcaaggtgcagtgg  
 aaggtggacaacgcctgcagtcgggaactcccaggagagcgtgaccgagcaggacagcaaggacacc  
 tacagcctgagcagcaccctgaccctgagcaaagccactacgagaaggcatacgccctgcgagggt  
 acccaccaggccctgagctcccccgtcaccaagagcttcaacaggggggaggtgt

訊息序列(1-60)、可變區(61-387)、恒定區(388-702)

## 序列識別號 2 2 : h T I N A 1 - L 3 之胺基酸序列

MVLQTQVFISLLWISGAYGDIVMTQSPSSLASAVGDRVITCKASQDVSTAVAWYQQKPGKQP  
 KLIYSAS YRYTGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFAVYYCQQHYITPLTFGQGTKLEIKRTVA  
 APSVIFPPSDEQLKSGTASVVCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLS  
 TL SKADYEKHKVYACEV THQGLSSPVTKSFNRGEC

訊息序列(1-20)、可變區(21-129)、恒定區(130-234)

## 【第 8 圖】

## 序列識別號 2 3 : T I N A 1 抗體之 C D R H 1 之胺基酸序列

TAGMQ

## 序列識別號 2 4 : T I N A 1 抗體之 C D R H 2 之胺基酸序列

WINTHSGVPKYAEDFKG

## 序列識別號 2 5 : T I N A 1 抗體之 C D R H 3 之胺基酸序列

SGFGSSYWYFDV

## 序列識別號 2 6 : T I N A 1 抗體之 C D R L 1 之胺基酸序列

KASQDVSTAVA


## 序列識別號 2 7 : T I N A 1 抗體之 C D R L 2 之胺基酸序列

SASYRYT


## 序列識別號 2 8 : T I N A 1 抗體之 C D R L 3 之胺基酸序列

QQHYITPLT



## 【第 9 圖】




【第 10 圖】




【第 11 圖】




【第 13 圖】




【第 14 圖】




【第 15 圖】




【第 16 圖】




【第 17 圖】




【第 18 圖】




【第 19 圖】




【第 20 圖】




【第 21 圖】




【第 22 圖】




【第 23 圖】




【第 24 圖】



【第 25 圖】



【第 26 圖】



【第 27 圖】