(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 600 38 748 T2 2009.07.02**

(12) **Übersetzung der europäischen Patentschrift**

(97) **EP 1 477 557 B1**

(21) Deutsches Aktenzeichen: **600 38 748.8**

(96) Europäisches Aktenzeichen: **04 016 329.7**

(96) Europäischer Anmeldetag: **29.03.2000**

(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: **17.11.2004**

(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: **30.04.2008**

(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: **02.07.2009**

(51) Int Cl.⁸: **C12N 9/10 (2006.01)**

C12N 15/54 (2006.01)

C12N 15/29 (2006.01)

C12N 15/82 (2006.01)

C12N 15/63 (2006.01)

C12N 5/04 (2006.01)

A01H 5/00 (2006.01)

(30) Unionspriorität:

282995 31.03.1999 US

502852 11.02.2000 US

(73) Patentinhaber:

Syngenta Participations AG, Basel, CH

(74) Vertreter:

HOFFMANN & EITL, 81925 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
LI, LU, MC, NL, PT, SE**

(72) Erfinder:

**Hohn, Thomas M., Research Triangle Park N.
Carolina 27709, US; Peters, Cheryl, Research
Triangle Park N. Carolina 27709, US; Salmeron,
John Manuel, Research Triangle Park N. Carolina
27709, US; Reed, Janet N., Research Triangle Park
N. Carolina 27709, US; Dawson, John Luther,
Research Triangle Park N. Carolina 27709, US**

(54) Bezeichnung: **Mykotoxin-resistente transgene Pflanze und Verfahren zur Herstellung und Verwendung derselben**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft transgene Wirte, insbesondere transgene Pflanzen, Pflanzengewebe, Samen und Zellen, die Trichothecenresistent sind, und Verfahren zur Herstellung und Verwendung derselben. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner Verfahren zur Prävention und/oder Reduzierung von Pilzwachstum auf einer Pflanze, einem Pflanzengewebe, einem Samen oder einer Pflanzenzelle. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die Prävention und/oder Reduzierung von Mykotoxin-Kontamination einer Pflanze, eines Pflanzengewebes oder eines Samens. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die Verwendung von Trichothecene als selektive Mittel in Transformationsprotokollen.

[0002] Zahlreiche Pilze sind ernsthafte Schädlinge von wirtschaftlich bedeutenden landwirtschaftlichen Anbauten. Ferner ist die Kulturpflanzenkontamination durch pilzliche Toxine ein Hauptproblem für die Landwirtschaft in der Welt. Mykotoxine sind toxische pilzliche Metaboliten, die häufig in landwirtschaftlichen Produkten gefunden werden und durch ihre Fähigkeit gekennzeichnet sind, Gesundheitsprobleme für Wirbeltiere zu verursachen. Trichothecene sind Sesquiterpenepoxid-Mykotoxine, die durch Arten von *Fusarium*, *Trichothecium* und *Myrothecium* erzeugt werden und als wirksame Inhibitoren der eukaryontischen Proteinsynthese wirken. *Fusarium*-Arten, die solche Trichothecene erzeugen, schließen *F. acuminatum*, *F. crookwellense*, *F. culmorum*, *F. equiseti*, *F. graminearum* (*Gibberella zeae*), *F. lateritium*, *F. pose*, *F. sambucinum* (*G. pulicaris*) und *F. sporotrichioides* ein (Marasas, W. F. O., Nelson, P. E. und Toussoun, T. A. 1984).

[0003] Wie zuvor beschrieben (A. E. Desjardins und T. M. Hohn, *Mycotoxins in plant pathogenesis*. *Mol. Plant-Microbe Interact.* 10 (2): 147–152, 1997), werden sowohl akute als auch chronische Mykotoxikosen in landwirtschaftlichen Nutztieren und in Menschen mit dem Verzehr von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Reis und Mais in Verbindung gebracht, die mit *Fusarium*-Arten kontaminiert sind, die Trichothecen-Mykotoxine erzeugen. Experimente mit chemisch reinen Trichothecenen in niedrigen Dosierungen haben viele der Merkmale reproduziert, die bei Schimmeln-Toxikosen in Tieren beobachtet werden, einschließlich Anämie und Immunsuppression, Blutung, Erbrechen und Futterverweigerung. Historische und epidemiologische Daten aus menschlichen Populationen zeigen eine Verbindung zwischen bestimmten Krankheitsepidemien und dem Verzehr von Getreide, das mit *Fusarium*-Arten infiziert ist, die Trichothecene erzeugen. Insbesondere werden Ausbrüche einer tödlichen, als alimentäre toxische Aleukie bekannten Krankheit, die in Russland seitdem 19. Jahrhundert auftritt, mit dem Verzehr von überwintertem Getreide in Verbindung gebracht, das mit *Fusarium*-Arten verunreinigt ist, die das Trichothecen T-2-Toxin erzeugen. In Japan werden Ausbrüche einer ähnlichen Krankheit, die als akakabi-byo oder Rotschimmelerkrankung bezeichnet wird, mit Getreide in Verbindung gebracht, das mit *Fusarium*-Arten infiziert ist, die das Trichothecen, Desoxynivalenol (nachfolgend "DON") erzeugen. Trichothecene wurden in toxischen Getreideproben detektiert, die für kürzliche menschliche Krankheitsausbrüche in Indien und Japan verantwortlich waren. Es besteht deshalb ein Bedarf an landwirtschaftlichen Verfahren zur Prävention von Mykotoxin-Kontamination und Anbauten mit reduzierten Mengen einer solchen Kontamination von.

[0004] Ferner sind Trichothecen-erzeugende *Fusarium*-Arten destruktive Pathogene und greifen einen weiten Bereich von Pflanzenarten an. Die akute Phytotoxizität von Trichothecenen und ihr Auftreten in Pflanzengewebe legen ebenfalls nahe, daß diese Mykotoxine eine Rolle in der Pathogenese von *Fusarium* auf Pflanzen spielen. Dies impliziert, daß Mykotoxine eine Rolle in der Krankheit spielen, und deshalb kann die Reduzierung ihrer Toxizität für die Pflanze auch die Krankheit in der Pflanze verhindern oder reduzieren. Ferner kann die Reduktion der Erkrankungsstärke den zusätzlichen Nutzen der Reduzierung der Mykotoxin-Kontamination auf der Pflanze und insbesondere in Getreide haben, wenn die Pflanze eine Getreidepflanze ist.

[0005] Verschiedene Verfahren zur Bekämpfung von Krankheiten in Pflanzen wie Maiskolbenfäule, Stengel-fäule oder Weizen-Weißährigkeit wurden mit verschiedenen Erfolgsgraden verwendet. Ein Verfahren zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheit besteht im Ausbringen einer antimikrobiellen Chemikalie auf die Kulturpflanzen. Dieses Verfahren hat zahlreiche fachlich anerkannte Probleme. Alternativ beinhaltet ein neueres Verfahren die Verwendung von biologischen Kontrollorganismen ("biologische Bekämpfung"), die natürliche Konkurrenten oder Inhibitoren des Schädlingsorganismus sind. Es ist jedoch schwierig, biologische Bekämpfung auf großen Flächen anzuwenden, und noch schwieriger, diese lebenden Organismen dazu zu bringen, in der behandelten Fläche für einen ausgedehnten Zeitraum zu verbleiben. In neuerer Zeit haben Techniken der rekombinanten DNA die Möglichkeit bereitgestellt, in Pflanzenzellen klonierte Gene zu inserieren, die antimikrobielle Verbindungen exprimieren. Jedoch hat diese Technologie zu Bedenken über eine eventuelle mikrobielle Resistenz gegen wohlbekanntes, natürlich vorkommende Antimikrobiotika geführt. Deshalb besteht ein fortgesetzter Bedarf an der Identifizierung von natürlich vorkommenden antimikrobiellen Mitteln wie Proteinen, die durch Pflanzenzellen direkt durch Translation eines einzelnen Gens gebildet werden können.

[0006] Eine Trichothecen-3-O-acetyltransferase, die die Acetylierung einer Anzahl unterschiedlicher Fusarium-Trichothecene, einschließlich DON, an der C3-Hydroxyl-Gruppe katalysiert, wurde in *Fusarium sporotrichioides* identifiziert (S. P. McCormick, N. J. Alexander, S. C. Trapp und T. M. Hohn. Disruption of TRI101, the gene encoding trichothecene 3-O-acetyltransferase, from *Fusarium sporotrichioides*. *Applied. Environ. Microbiol.* 65 (12): 5252–5256, 1999). Die Acetylierung von Trichothecenen am C3-OH reduziert ihre Toxizität in Wirbeltieren und Pflanzen signifikant und führt zum Reaktionsprodukt 3-Acetyldeoxynivalenol (nachfolgend "3ADON"). Siehe Kimura et al. unten.

[0007] Die Sequenz von strukturellen Genen, die Trichothecen-3-O-acetyltransferase codieren, aus *Fusarium graminearum*, *Fusarium sporotrichioides* sowie Sequenzen anderer Orthologe wurden veröffentlicht. Siehe z. B. Kimura et al., *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, 62 (5) 1033–1036 (1998) und Kimura et al., *FEBS Letters*, 435, 163–168 (1998). Ferner wurde spekuliert, daß das Gen aus *Fusarium sporotrichioides*, das eine Trichothecen-3-O-acetyltransferase codiert, nützlich in der Entwicklung von Pflanzensorten mit erhöhter Resistenz gegen *Fusarium* sein kann. Siehe z. B. Hohn, T. M. et al. *Molecular Genetics of Host-Specific Toxins in Plant Disease*, 17–24 (1998) und Kimura et al. *J. Biological Chemistry*, 273 (3) 1654–1661 (1998).

[0008] Vor der vorliegenden Erfindung machten es jedoch viele Unsicherheiten bei weitem nicht naheliegend, ob die Expression von Trichothecen-3-O-acetyltransferasen in einer Pflanze tatsächlich zu Trichothecen-resistenten Pflanzen führen würde. Zum Beispiel ist die durch die *Fusarium sporotrichioides* Trichothecen-3-O-acetyltransferase katalysierte Reaktion reversibel und könnte deshalb im Schützen von Pflanzenzellen vor Trichothecenen wie DON versagt haben. Es war ebenfalls unsicher, ob es vielleicht Esterasen in Pflanzenzellen geben könnte, die mit den 3-O-Acetyltransferase-Aktivitäten zur Erzeugung von toxischem DON aus 3ADON konkurrieren würden. Es war ebenfalls unsicher, wie der Metabolismus des Reaktionsprodukts 3ADON die Pflanze beeinflussen könnte, z. B. ob die Einführung der Trichothecen-3-O-acetyltransferase das Pflanzenwachstum und die Entwicklung in Weisen verändern würde, die einen etwaigen positiven Beitrag der Acetyltransferase ins Negative umkehren würden, z. B. durch Wechselwirkung mit den natürlichen Krankheitsresistenzmechanismen der Pflanze. Es war ebenfalls unsicher, ob 3ADON durch die Pflanze unter Bildung eines neuen sekundären Metaboliten mit toxischen Wirkungen metabolisiert werden konnte. Es war ebenfalls unsicher, selbst falls das durch einen eindringenden Pilz erzeugte DON wirksam zu 3ADON umgewandelt würde, ob diese Umwandlung der Pflanze eine gesteigerte Pathogenresistenz verleihen würde. Die obigen sind nur einige der Unsicherheiten auf diesem Gebiet vor dem Zeitpunkt der vorliegenden Erfindung.

[0009] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Pflanzenzelle oder -zellen bereitzustellen, die ein heterologes Polynukleotid umfaßt, das ein Genprodukt codiert, das in der Pflanzenzelle exprimiert wird, worin das Genprodukt Trichothecen-Resistenzaktivität umfaßt.

[0010] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze bereitzustellen, die die vorstehend beschriebene Pflanzenzelle umfaßt, worin die Pflanze resistent gegen ein Trichothecen ist.

[0011] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, die resistent gegen ein Trichothecen ist, wobei das Trichothecen eine C-3-Hydroxyl-Gruppe umfaßt.

[0012] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, die resistent gegen einen Pilz ist, der ein Trichothecen erzeugt, vorzugsweise ein Trichothecen, das eine C-3-Hydroxyl-Gruppe umfaßt.

[0013] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, die resistent gegen *Fusarium*, *Trichothecium* oder *Myrothecium* ist.

[0014] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, die resistent gegen *Fusarium* ist, insbesondere, jedoch nicht einschränkend, gegen *Fusarium graminearum*, *Fusarium culmorum*, *Fusarium sporotrichioides*, *Fusarium pose*, *Fusarium sambucinum*, *Fusarium equiseti*, *Fusarium acuminatum*, *Fusarium lateritium* und *Fusarium pseudograminearum*.

[0015] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, worin die Pflanze resistent gegen *Fusarium graminearum* ist.

[0016] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, die ein heterologes Polynukleotid umfaßt, das ein Genprodukt codiert, das in der Pflanzenzelle exprimiert wird, worin das Genprodukt Trichothecen-Resistenzaktivität umfaßt, worin das heterologe Polynukleotid ein mikrobielles Poly-

nukleotid ist, vorzugsweise eine Polynukleotid aus Hefe oder Pilz.

[0017] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, worin das Polynukleotid aus Pilz ein Fusarium-Polynukleotid ist, vorzugsweise ein Polynukleotid aus *Fusarium graminearum* oder *Fusarium sporotrichioides*.

[0018] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, worin das heterologe Polynukleotid eine Sequenz umfaßt, die im wesentlichen gleich zur Nukleinsäuresequenz der SEQ ID NOs: 1, 5 oder 7 ist.

[0019] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, worin das heterologe Polynukleotid die Nukleinsäuresequenz des SEQ ID NO: 1, 5 oder 7 oder Homologe davon umfaßt.

[0020] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanzen der Erfindung bereitzustellen, die ein heterologes Polynukleotid umfaßt, das einen fortlaufenden Teil von wenigstens 80 Basenpaaren umfaßt, der identisch in der Sequenz zu einem fortlaufenden Teil von 80 Basenpaaren ist, der in SEQ ID NO: 1, 5 oder 7 dargelegt ist, vorzugsweise ein fortlaufender Teil von wenigstens 50 Basenpaaren, der identisch in der Sequenz zu einem fortlaufenden Teil von 50 Basenpaaren ist, der in SEQ ID NO: 1, 5 oder 7 dargelegt ist, und besonders bevorzugt ein fortlaufender Teil von wenigstens 21 Basenpaaren, der identisch in Sequenz zu einem fortlaufenden Teil von 21 Basenpaaren ist, der in SEQ ID NO: 1, 5 oder 7 dargelegt ist, und am meisten bevorzugt ein fortlaufender Teil von 18 Basenpaaren, der identisch in Sequenz zu einem fortlaufenden Teil von 18 Basenpaaren ist, der in SEQ ID NO: 1, 5 oder 7 dargelegt ist.

[0021] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze bereitzustellen, die gegen ein Trichotheceen resistent ist, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus T-2-Toxin, HT-2-Toxin, Isotrichodermol, 4,15-Diacetoxyscirpenol (nachstehend "DAS"), 3-Deacetylcalonectrin, 3,15-Dideacetylcalonectrin, Scirpentriol, Neosolaniol; Typ B: 15-Acetyldeoxynivalenol, Nivalenol, 4-Acetylivalenol (Fusarenon-X), 4,15-Diacetylivalenol, 4,7,15-Acetylivalenol und DON besteht.

[0022] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, die gegen DAS oder DON resistent ist.

[0023] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze bereitzustellen, worin das Genprodukt durch ein erfindungsgemäßes Polynukleotid codiert wird.

[0024] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, worin das Genprodukt eine 3-O-Acetyltransferase ist.

[0025] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pflanze der Erfindung bereitzustellen, worin das Genprodukt ein Polypeptid ist, das eine Sequenz umfaßt, die im wesentlichen ähnlich zu der SEQ ID NO: 2, 6 oder 8 ist.

[0026] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Saatgut jeder der erfindungsgemäßen Pflanzen bereitzustellen.

[0027] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, jede der zuvor beschriebenen Pflanzen bereitzustellen, worin die Pflanze eine Weizen-, Mais-, Gerste- oder Reis-pflanze ist.

[0028] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Erzeugen einer Trichotheceen-resistenten Pflanze bereitzustellen, das die folgenden Schritte umfaßt:

- (a) Transformieren einer Pflanzenzelle mit einem heterologen Gen, das ein Genprodukt codiert, worin das Genprodukt die Resistenz gegen ein Trichotheceen erhöht; und
- (b) exprimieren des Genprodukts auf einem biologisch signifikanten Niveau;
- (c) Regenerieren der Pflanzenzelle zu einer Pflanze; und
- (d) Selektieren einer Pflanzen mit erhöhter Resistenz gegen ein Trichotheceen.

[0029] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein wie vorstehend beschriebenes Verfahren bereitzustellen, das ferner den Schritt des Selektierens einer Pflanze umfaßt, auf der ein reduziertes Wachstum eines Pilzes vorliegt, wobei der Pilz ein Trichotheceen erzeugt.

[0030] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein wie vorstehend beschriebenes Verfahren bereitzustellen, worin der Pilz aus der Gattung *Fusarium* ist.

[0031] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Trichothece-resistente Pflanze bereitzustellen, die gemäß den vorstehend beschriebenen Verfahren erhältlich ist.

[0032] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Saatgut bereitzustellen, das durch Selbsten oder Auskreuzen einer Pflanze der Erfindung, wie vorstehend beschrieben, erzeugt wird, worin eine aus dem Saatgut kultivierte Pflanze eine erhöhte Resistenz gegen Trichothece aufweist.

[0033] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Prävention von Mycotoxin-Kontamination einer Pflanze, einschließlich eines Pflanzensaatguts, bereitzustellen, das das Kultivieren einer Pflanze der Erfindung, wie vorstehend beschrieben, umfaßt, vorzugsweise in einem Gebiet mit moderatem bis schwerem Pilzbefall, worin die Pflanze vorzugsweise eine Kulturpflanze ist.

[0034] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Prävention von Pilzwachstum auf einer Pflanze bereitzustellen, bevorzugt das Wachstum eines Pilzes der Gattung *Fusarium*, das das Kultivieren einer Pflanze der Erfindung umfaßt, der ein Trichothece erzeugt, vorzugsweise ein Trichothece, das wie vorstehend beschrieben eine C-3-Hydroxyl-Gruppe umfaßt, vorzugsweise in einem Gebiet mit moderatem bis schwerem Pilzbefall, worin die Pflanze vorzugsweise eine Kulturpflanze ist.

[0035] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Erzeugen einer Pilz-resistenten Pflanze bereitzustellen, das folgendes umfaßt:

- (a) Transformieren einer Pflanzenzelle mit einem heterologen Gen, das ein Genprodukt codiert, worin das Genprodukt die Resistenz gegen ein Trichothece erhöht;
- (b) Exprimieren des Genprodukts auf einem biologisch signifikanten Niveau;
- (c) Regenerieren der Pflanzenzelle zu einer Pflanze; und
- (d) Selektieren einer Pflanze mit erhöhter Resistenz gegen ein Trichothece; und
- (e) optionales Selbsten oder Auskreuzen der in Schritt (d) erhaltenen Pflanze.

[0036] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren bereitzustellen, worin der Pilz aus der Gattung *Fusarium* ist.

[0037] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Erzeugen eines Saatguts bereitzustellen, worin die Pflanze, die aus dem Saatgut kultiviert wird, Pilz-resistent ist, wobei das Verfahren das Selbsten oder Auskreuzen der Pflanze der Erfindung umfaßt.

[0038] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, das vorstehende Verfahren bereitzustellen, worin das Saatgut resistent gegen einen Pilz aus der Gattung *Fusarium* ist.

[0039] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Selektion von transformierten Wirtszellen bereitzustellen, wobei das Verfahren folgendes umfaßt:

Transformieren einer Wirtszelle mit einem Nukleinsäurekonstrukt, das eine Trichothece-3-O-acetyltransferase codiert, und

Kultivieren der transformierten Wirtszelle in Gegenwart eines Trichothece-selektiven Mittels.

[0040] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Selektieren von transformierten Wirtszellen bereitzustellen, worin die Wirtszellen Pflanzenzellen oder mikrobielle Zellen sind, insbesondere worin die mikrobiellen Zellen Pilzzellen sind.

[0041] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Selektieren von transformierten Wirtszellen, wie vorstehend beschrieben, bereitzustellen, worin die Wirtszelle ferner mit einem zweiten Polynukleotid von Interesse transformiert ist.

[0042] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Selektieren von transformierten Wirtszellen bereitzustellen, worin das Trichothece aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus T-2-Toxin, HT-2-Toxin, Isotrichodermol, DAS, 3-Desacetylcalonectrin, 3,15-Didesacetylcalonectrin, Scirpentriol, Neosolaniol; Typ B: 15-Acetyl-desoxynivalenol, Nivalenol, 4-Acetyl-nivalenol (*Fusarenon-X*), 4,15-Diacetyl-nivalenol, 4,7,15-Acetyl-nivalenol und DON besteht.

[0043] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Trichothecenresistente Pflanze bereitzustellen, die durch das Verfahren der Erfindung erhalten wird.

[0044] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pilz-resistente Pflanze bereitzustellen, die durch das Verfahren der Erfindung erhalten wird.

[0045] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Pflanzensaatgut bereitzustellen, das durch das Verfahren der Erfindung erhalten wird.

[0046] Zur Klarheit werden bestimmte, in der Beschreibung verwendete Begriffe wie folgt definiert und dargestellt:

"Expression" bezeichnet die Transkription und/oder Translation eines endogenen Gens oder eines Transgens in Pflanzen. Im Falle von antisense-Konstrukten kann Expression z. B. allein die Transkription der Antisense-DNA bezeichnen.

[0047] "Funktionsfähig verbunden/assoziiert" bei Bezugnahme auf eine regulatorische DNA-Sequenz, die "funktionsfähig verbunden ist mit" oder "assoziiert ist mit" einer DNA-Sequenz, die für eine RNA oder ein Protein codiert, bezeichnet die zwei Sequenzen, die so lokalisiert sind, daß die regulatorische DNA-Sequenz die Expression der codierenden DNA-Sequenz beeinflusst.

[0048] Der Begriff "heterologes Polynukleotid" oder "heterologe DNA", wie hier verwendet, bezeichnet jeweils ein Nukleinsäuremolekül, das nicht natürlich mit einer Wirtszelle assoziiert ist, in die es eingeführt wird, einschließlich genetischer Konstrukte, nicht-natürlich vorkommender multipler Kopien eines natürlich vorkommenden Nukleinsäuremoleküls; und eines ansonsten homologen Nukleinsäuremoleküls, das funktionsfähig mit einem nicht-nativen Nukleinsäuremolekül verbunden ist. Somit schließt ein heterologes Gen in einer Wirtszelle ein Gen ein, das endogen für die besondere Wirtszelle ist, aber durch z. B. Verwendung von DNA-Shuffling modifiziert wurde. Somit umfassen die Begriffe ein DNA-Segment, das fremd oder heterolog für die Zelle ist oder homolog für die Zelle ist, aber in einer Position innerhalb der Wirtszell-Nukleinsäure ist, in der das Element nicht gewöhnlich gefunden wird.

[0049] Die Begriffe "Nukleinsäure" oder "Polynukleotid" bezeichnen Desoxyribonukleotide oder Ribonukleotide und Polymere davon in entweder einzel- oder doppelsträngiger Form. Wenn nicht spezifisch darauf beschränkt, umfaßt der Begriff Nukleinsäuren, die bekannte Analoga von natürlichen Nukleotiden enthalten, die ähnliche Bindungseigenschaften wie die Referenz-Nukleinsäure haben und in einer Weise metabolisiert werden, die ähnlich den natürlich vorkommenden Nukleotiden ist. Wenn nicht anders angegeben, umfaßt eine besondere Nukleinsäuresequenz auch implizit konservativ modifizierte Varianten davon (z. B. degenerierte Codon-Substitutionen) und komplementäre Sequenzen sowie die explizit angegebene Sequenz. Spezifisch können degenerierte Codon-Substitutionen durch Erzeugung von Sequenzen erreicht werden, in den die dritte Position eines oder mehrerer ausgewählter (oder aller) Codonen mit gemischten Basen- und/oder Desoxyinosin-Resten substituiert ist (Batzner et al., *Nucleic Acid Res.* 19: 5081 (1991); Ohtsuka et al., *J. Biol. Chem.* 260: 2605–2608 (1985); Rossolini et al., *Mol. Cell. Probes* 8: 91–98 (1994)). Die Begriffe "Nukleinsäure" oder "Nukleinsäuresequenz" oder "Polynukleotid" können auch austauschbar mit Gen, cDNA und mRNA, die durch ein Gen codiert wird, verwendet werden.

[0050] In seinem breitesten Sinn bedeutet der Begriff "im wesentlichen ähnlich", wenn hier in Bezug auf ein Nukleinsäuremolekül verwendet, ein Nukleinsäuremolekül, das einer Referenz-Nukleotidsequenz entspricht, worin das entsprechende Nukleinsäuremolekül ein Polypeptid mit im wesentlichen der gleichen Struktur und Funktion wie das durch die Referenz-Nukleotidsequenz codierte Polypeptid codiert, z. B. wenn nur Veränderungen in Aminosäuren, die nicht die Polypeptidfunktion beeinflussen, auftreten. Wünschenswert codiert das im wesentlichen ähnliche Nukleinsäuremolekül das durch die Referenz-Nukleotidsequenz codierte Polypeptid. Der Begriff "im wesentlichen ähnlich" soll spezifisch Nukleinsäuremoleküle einschließen, in denen die Sequenz modifiziert wurde, um die Expression in besonderen Zellen, z. B. in Pflanzenzellen, zu optimieren. Der Prozentwert der Identität zwischen dem im wesentlichen ähnlichen Nukleinsäuremolekül und der Referenz-Nukleotidsequenz ist wünschenswert wenigstens 45%, besonders wünschenswert wenigstens 65%, besonders wünschenswert wenigstens 75%, vorzugsweise wenigstens 85%, besonders bevorzugt wenigstens 90%, noch mehr bevorzugt wenigstens 95%, noch mehr bevorzugt wenigstens 99%. Bevorzugt existiert der Prozentwert der Identität über eine Region der Sequenzen, die wenigstens ca. 50 Reste lang ist, besonders bevorzugt über eine Region von wenigstens ca. 100 Resten, und am meisten bevorzugt sind die Sequenzen im wesentlichen ähnlich über wenigstens ca. 150 Reste. In einer am meisten bevorzugten Ausführungsform sind die Sequenzen im wesentlichen ähnlich über die gesamte Länge der codierenden Regionen. Sequenzvergleiche können

unter Verwendung eines Smith-Waterman-Sequenzangleichungsalgorithmus und wie nachfolgend in größerem Detail beschrieben durchgeführt werden (siehe z. B. M. S. Waterman, *Introduction to Computational Biology: Maps, sequences and genomes*. Chapman & Hall. London: 1995. ISBN 0-412-99391-0, oder in <http://www-hto.usc.edu/software/seqaln/index.html>). Das lokale S-Programm, Version 1.16, wird mit den folgenden Parametern verwendet: Übereinstimmung: 1, Fehlübereinstimmungsstrafe: 0,33, offene Lückenstrafe: 2, ausgedehnte Lückenstrafe: 2.

[0051] Ein anderer Hinweis, daß eine Nukleinsäuresequenz eine im wesentlichen ähnliche Nukleinsäure der Erfindung ist, besteht darin, daß sie mit einem Nukleinsäuremolekül der Erfindung unter stringenten Bedingungen hybridisiert. Der Begriff "spezifisch hybridisierend mit" bezeichnet die Bindung, Duplexierung oder Hybridisierung eines Moleküls nur mit einer besonderen Nukleotidsequenz unter stringenten Bedingungen, wenn diese Sequenz in einer komplexen Mischung aus (z. B. vollzellulärer) DNA oder RNA vorhanden ist. "Bindet im wesentlichen" bezeichnet die komplementäre Hybridisierung zwischen einer Sonden-Nukleinsäure und einer Ziel-Nukleinsäure und umfaßt geringfügige Fehlübereinstimmungen, die durch Reduzierung der Stringenz der Hybridisierungsmedien berücksichtigt werden können, um die gewünschte Detektion der Ziel-Nukleinsäuresequenz zu erreichen.

[0052] "Stringente Hybridisierungsbedingungen" und "stringente Hybridisierungs-Spülbedingungen" im Zusammenhang von Nukleinsäure-Hybridisierungsexperimenten wie Southern- und Northern-Hybridisierungen sind sequenzabhängig und sind unter unterschiedlichen Umweltparametern verschieden. Längere Sequenzen hybridisieren spezifisch bei höheren Temperaturen. Ein umfassender Leitfaden für die Hybridisierung von Nukleinsäuren wird gefunden in Tijssen (1993) *Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology – Hybridization with Nucleic Acid Probes*, Teil I, Kapitel 2 "Overview of principles of hybridization and the strategy of nucleic acid probe assays" Elsevier, New York. Allgemein werden hochstringente Hybridisierungs- und Spülbedingungen ausgewählt, um ca. 5°C niedriger als der thermische Schmelzpunkt (T_m) für die spezifische Sequenz bei einer definierten Ionenstärke und einem definierten pH zu sein. Typischerweise wird eine Sonde unter "stringenten Bedingungen" mit ihrer Ziel-Untersequenz hybridisieren, aber nicht mit anderen Sequenzen.

[0053] T_m ist die Temperatur (unter definierter Ionenstärke und definiertem pH), bei der 50% der Zielsequenz mit einer perfekt übereinstimmenden Sonde hybridisieren. Sehr stringente Bedingungen werden ausgewählt, um gleich dem T_m für eine besonders Sonde zu sein. Ein Beispiel für stringente Hybridisierungsbedingungen zur Hybridisierung von komplementären Nukleinsäuren, die mehr als 100 komplementäre Reste haben, auf einem Filter in einem Southern- oder Northern-Blot sind 50% Formamid mit 1 mg Heparin bei 42°C, wobei die Hybridisierung über Nacht durchgeführt wird. Ein Beispiel für hochstringente Spülbedingungen sind 0,15 M NaCl bei 72°C für ca. 15 Minuten. Ein Beispiel für stringente Spülbedingungen sind eine 0,2 × SSC-Spülung bei 65°C für 15 Minuten (siehe Sambrook, unten, für eine Beschreibung von SSC-Puffer). Häufig geht einer Spülung mit hoher Stringenz eine Spülung mit geringer Stringenz voraus, um Hintergrund-Sondensignal zu entfernen. Eine exemplarische mittlere Stringenzspülung für einen Duplex von z. B. mehr als 100 Nukleotiden ist 1 × SSC bei 45°C für 15 Minuten. Eine exemplarische geringe Stringenzspülung für einen Duplex von z. B. mehr als 100 Nukleotiden ist 4–6 × SSC bei 40°C für 15 Minuten. Für kurze Sonden (z. B. ca. 10 bis 50 Nukleotide) beinhalten stringente Bedingungen typischerweise Salzkonzentrationen von weniger als ca. 1,0 M Na-Ionen, typischerweise ca. 0,01 bis 1,0 M Na-Ionenkonzentration (oder andere Salze) bei pH 7,0 bis 8,3, und die Temperatur ist typischerweise wenigstens ca. 30°C. Stringente Bedingungen können auch mit der Zugabe von destabilisierenden Mitteln wie Formamid erreicht werden. Allgemein zeigt ein Signal-Rausch-Verhältnis vom 2-fachen (oder höher) desjenigen, das für eine nicht verwandte Sonde im besonderen Hybridisierungstest beobachtet wird, die Detektion einer spezifischen Hybridisierung an. Nukleinsäuren, die nicht miteinander unter stringenten Bedingungen hybridisieren, sind noch im wesentlichen ähnlich, falls die Proteine, die sie codieren, im wesentlichen ähnlich sind. Dies tritt z. B. auf, wenn eine Kopie einer Nukleinsäure unter Verwendung der maximalen Codon-Degeneriertheit geschaffen wird, die durch den genetischen Code erlaubt wird.

[0054] Nachfolgend sind Beispiele für Sätze von Hybridisierungs-/Spülbedingungen aufgeführt, die zur Identifizierung von homologen Nukleotidsequenzen verwendet werden können, die im wesentlichen ähnlich mit Referenz-Nukleotidsequenzen der vorliegenden Erfindung sind: eine Testsequenz, die mit der Referenz-Nukleotidsequenz in 7% Natriumdodecylsulfat (SDS), 0,5 M NaPO₄, 1 mM EDTA bei 50°C unter Spülen in 2 × SSC, 0,1% SDS bei 50°C, besonders wünschenswert in 7% Natriumdodecylsulfat (SDS), 0,5 M NaPO₄, 1 mM EDTA bei 50°C unter Spülen in 1 × SSC, 0,1% SDS bei 50°C, noch mehr wünschenswert in 7% Natriumdodecylsulfat (SDS), 0,5 M NaPO₄, 1 mM EDTA bei 50°C unter Spülen in 0,5 × SSC, 0,1% SDS bei 50°C, vorzugsweise in 7% Natriumdodecylsulfat (SDS), 0,5 M NaPO₄, 1 mM EDTA bei 50°C unter Spülen in 0,1 × SSC, 0,1% SDS bei 50°C, besonders bevorzugt in 7% Natriumdodecylphosphat (SDS), 0,5 M NaPO₄, 1 mM EDTA bei 50°C unter Spülen in 0,1 × SSC, 0,1% SDS bei 65°C hybridisiert. Das Polynukleotid der Erfindung, das unter den

obigen Bedingungen hybridisiert, umfaßt vorzugsweise wenigstens 80 Basenpaare, besonders bevorzugt wenigstens 50 Basenpaare und insbesondere wenigstens 21 und ganz besonders 18 Basenpaare. Bevorzugte Homologe zur Verwendung in der Erfindung schließen Nukleinsäuremoleküle ein, die eine Aminosäuresequenz codieren, die zu wenigstens 45% identisch mit SEQ ID NO: 2, 6 oder 8 gemäß Messung unter Verwendung der nachfolgend beschriebenen Parameter ist, worin die durch das Homolog codierte Aminosäuresequenz Trichothecenresistenzaktivität besitzt, z. B. 3-O-Acetyltransferase-Aktivität.

[0055] Der Begriff "im wesentlichen ähnlich", wenn er hier in Bezug auf ein Protein verwendet wird, bedeutet ein Protein, das einem Referenzprotein entspricht, worin das Protein im wesentlichen die gleiche Struktur und Funktion wie das Referenzprotein hat, z. B. wenn nur Veränderungen in der Aminosäuresequenz erfolgen, die nicht die Polypeptidfunktion beeinflussen. Bei Verwendung für ein Protein oder eine Aminosäuresequenz ist der Prozentwert der Identität zwischen dem im wesentlichen ähnlichen und dem Referenzprotein oder der Referenz-Aminosäuresequenz wünschenswert wenigstens 45% Identität, besonders wünschenswert wenigstens 65%, noch wünschenswerter wenigstens 75%, bevorzugt wenigstens 85%, besonders bevorzugt wenigstens 90%, noch mehr bevorzugt wenigstens 95%, noch mehr bevorzugt wenigstens 99%, unter Verwendung von standardmäßigen BLAST-Analyseparametern und wie in größerem Detail nachfolgend beschrieben.

[0056] Bevorzugte Homologe des Polypeptids zur Verwendung in der Erfindung umfassen diejenigen mit Aminosäuresequenzen, die wenigstens zu 45% identisch mit SEQ ID NO: 2, 6 oder 8 sind, worin die durch das Homolog codierte Aminosäuresequenz Trichothecenresistenzaktivität besitzt, z. B. 3-O-Acetyltransferase-Aktivität.

[0057] Eine optimale Angleichung der Nukleinsäure- oder Proteinsequenzen zum Vergleich kann wie oben beschrieben und z. B. durch den lokalen Homologiealgorithmus von Smith & Waterman, Adv. Appl. Math. 2: 482 (1981), durch den Homologie-Angleichungsalgorithmus von Needleman & Wunsch, J. Mol. Biol. 48: 443 (1970), durch das Verfahren der Suche nach Ähnlichkeit von Pearson & Lipman, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85: 2444 (1988), durch computerisierte Implementationen dieser Algorithmen (GAP, BESTFIT, FASIA und TFasta im Wisconsin Genetics Softwarepaket, Genetics Computer Group, 575 Science Dr., Madison, WI) oder durch visuelle Inspektion (siehe allgemein Ausubel et al., unten) durchgeführt werden.

[0058] Ein Beispiel für einen Algorithmus, der geeignet zur Bestimmung der prozentualen Sequenzidentität und Sequenzähnlichkeit ist, ist der BLAST-Algorithmus, der beschrieben wird in Altschul et al., J. Mol. Biol. 215: 403–410 (1990). Software zur Durchführung von BLAST-Analysen ist öffentlich erhältlich durch das National Center for Biotechnology Information (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>). Dieser Algorithmus beinhaltet zuerst die Identifizierung von Sequenzpaaren mit hoher Bewertung ("high scoring sequence pairs", HSPs) durch Identifizieren von kurzen Worten der Länge W in der Suchsequenz, die entweder eine Grenzwertbewertung T mit positivem Wert erfüllen oder ihr genügen, bei Angleichung mit einem Wort der gleichen Länge in einer Datenbanksequenz. T wird als Nachbarschaftswort-Bewertungsgrenzwert bezeichnet (Altschul et al., 1990). Diese anfänglichen Nachbarschafts-Worttreffer wirken als Keime zum Einleiten von Recherchen, um längere HSPs zu finden, die sie enthalten. Die Worttreffer werden dann in beiden Richtungen entlang jeder Sequenz so weit erweitert, wie die kumulative Angleichungsbewertung erhöht werden kann. Kumulative Bewertungen werden für Nukleotidsequenzen unter Verwendung der Parameter M (Belohnungsbewertung für ein Paar von übereinstimmenden Resten; immer > 0) und N (Bestrafungsbewertung für fehlübereinstimmende Reste; immer < 0) berechnet. Für Aminosäuresequenzen wird eine Bewertungsmatrix durch Berechnung der kumulativen Bewertung verwendet. Die Ausdehnung der Worttreffer in jede Richtung wird angehalten, wenn die kumulative Angleichungsbewertung um die Größe X von ihrem maximal erreichten Wert abfällt, die kumulative Bewertung auf null oder darunter aufgrund der Ansammlung einer oder mehrerer Resteangleichungen mit negativer Bewertung fällt oder das Ende einer Sequenz erreicht ist. Die BLAST-Algorithmusparameter W , T und X bestimmen die Empfindlichkeit und Geschwindigkeit der Angleichung. Das BLASTN-Programm (für Nukleotidsequenzen) verwendet als Standardeinstellungen eine Wortlänge (W) von 11, eine Erwartung (E) von 10, einen Grenzwert von 100, $M = 5$, $N = -4$ und einen Vergleich beider Stränge. Für Aminosäuresequenzen verwendet das BLASTP-Programm als Standardeinstellungen eine Wortlänge (W) von 3, eine Erwartung (E) von 10 und die BLOSUM62-Bewertungsmatrix (siehe Henikoff & Henikoff, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: 10915 (1989)).

[0059] Zusätzlich zur Berechnung der prozentualen Sequenzidentität führt der BLAST-Algorithmus auch eine statistische Analyse der Ähnlichkeit zwischen zwei Sequenzen durch (siehe z. B. Karlin & Altschul, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 5873–5787 (1993)). Ein Maß für die Ähnlichkeit, das durch den BLAST-Algorithmus bereitgestellt wird, ist die kleinste Summenwahrscheinlichkeit ($P(N)$), die eine Angabe für die Wahrscheinlichkeit liefert, mit der eine Übereinstimmung zwischen zwei Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen zufällig auftreten würde. Zum Beispiel wird eine Test-Nukleinsäuresequenz als mit einer Referenzsequenz ähnlich betrachtet,

falls die kleinste Summenwahrscheinlichkeit in einem Vergleich der Test-Nukleinsäuresequenz mit der Referenz-Nukleinsäure weniger als ca. 0,1 ist, besonders bevorzugt weniger als ca. 0,01 und am meisten bevorzugt weniger als ca. 0,001.

[0060] Ein weiterer Hinweis, daß zwei Nukleinsäuresequenzen oder Proteine im wesentlichen ähnlich sind, ist derjenige, daß das durch die erste Nukleinsäure codierte Protein immunologisch kreuzreaktiv mit dem durch die zweite Nukleinsäure codierten Protein ist oder spezifisch daran bindet. So ist ein Protein typischerweise im wesentlichen ähnlich mit einem zweiten Protein, wenn beispielsweise die zwei Proteine sich nur durch konservative Substitutionen unterscheiden.

[0061] Der Begriff "bindet spezifisch (oder selektiv) an einen Antikörper" oder "spezifisch (oder selektiv) immunreaktiv mit" bei Bezugnahme auf ein Protein oder Peptid bezeichnet eine Bindungsreaktion, die bestimmend für die Gegenwart des Proteins in Gegenwart einer heterogenen Population von Proteinen und anderen biologischen Stoffen ist. So binden unter angegebenen Immuntestbedingungen die angegebenen Antikörper an ein besonderes Protein und binden nicht in einer signifikanten Menge an andere in der Probe vorhandene Proteine. Die spezifische Bindung an einen Antikörper unter solchen Bedingungen kann einen Antikörper erfordern, der auf seine Spezifität für ein besonderes Protein ausgewählt wird. Zum Beispiel können Antikörper, die gegen das Protein mit der Aminosäuresequenz erzeugt werden, die durch eine der Nukleinsäuresequenzen der Erfindung codiert wird, ausgewählt werden, um Antikörper zu erhalten, die spezifisch immunreaktiv mit dem Protein und nicht mit anderen Proteinen sind, ausgenommen polymorphen Varianten. Eine Vielzahl von Immuntestformaten kann zur Auswahl von Antikörpern verwendet werden, die spezifisch immunreaktiv mit einem besonderen Protein sind. Zum Beispiel werden Festphasen-ELISA-Immuntests, Western-Blots oder Immunohistochemie routinemäßig zur Auswahl monoklonaler Antikörper verwendet, die spezifisch immunreaktiv mit einem Protein sind. Siehe Harlow und Lane (1988) *Antibodies, A Laboratory Manual*, Cold Spring Harbor Publications, New York ("Harlow and Lane") für eine Beschreibung von Immuntestformaten und die Bedingungen, die zur Bestimmung von spezifischer Immunreaktivität verwendet werden können. Typischerweise wird eine spezifische oder selektive Reaktion wenigstens zweimal das Hintergrundsignal oder Rauschen und besonders typisch mehr als 10- bis 100-mal der Hintergrund sein.

[0062] "Konservativ modifizierte Variationen" einer besonderen Nukleinsäuresequenz bezeichnet diejenigen Nukleinsäuresequenzen, die identische oder im wesentlichen identische Aminosäuresequenzen codieren, oder wenn die Nukleinsäuresequenz keine Aminosäuresequenz codiert, im wesentlichen identische Sequenzen. Wegen der Entartung des genetischen Codes codiert eine große Anzahl funktionell identischer Nukleinsäuren jedes gegebene Polypeptid. Zum Beispiel codieren die Codonen CGT, CGC, CGA, CGG, AGA und AGG alle die Aminosäure Arginin. So kann das Codon in jeder Position, in der ein Arginin durch ein Codon angegeben wird, zu jedem der entsprechenden beschriebenen Codonen verändert werden, ohne das codierte Protein zu verändern. Solche Nukleinsäure-Variationen sind "stumme Variationen", die eine Art von "konservativ modifizierten Variationen" sind. Jede hier beschriebene Nukleinsäuresequenz, die ein Protein codiert, beschreibt auch jede mögliche stumme Variation, ausgenommen wenn ansonsten angegeben. Ein Fachmann wird erkennen, daß jedes Codon in einer Nukleinsäure (ausgenommen ATG, das gewöhnlich das einzige Codon für Methionin ist) zur Lieferung eines funktionell identischen Moleküls durch Standardtechniken modifiziert werden kann. Entsprechend ist jede "stumme Variation" eine Nukleinsäure, die ein Protein codiert, implizit ähnlich jeder beschriebenen Sequenz.

[0063] Außerdem wird ein Fachmann erkennen, daß individuelle Substitutionen, Deletionen oder Additionen, die eine einzelne Aminosäure oder einen kleinen Prozentanteil von Aminosäuren (typischerweise weniger als 5%, besonders typisch weniger als 1%) in einer codierten Sequenz verändern, addieren oder deletieren, "konservativ modifizierte Variationen" sind, wenn die Veränderungen zur Substitution einer Aminosäure durch eine chemisch ähnliche Aminosäure führen. Konservative Substitutionstabellen, die funktionell ähnliche Aminosäuren liefern, sind allgemein fachbekannt. Die folgenden fünf Gruppen enthalten jeweils Aminosäuren, die konservative Substitutionen für einander sind: aliphatisch: Glycin (G), Alanin (A), Valin (V), Leucin (L), Isoleucin (I); aromatisch: Phenylalanin (F), Tyrosin (Y), Tryptophan (W); schwefelhaltig: Methionin (M), Cystein (C); basisch: Arginin (R), Lysin (K), Histidin (H); sauer: Asparaginsäure (D), Glutaminsäure (E), Asparagin (N), Glutamin (Q). Siehe auch Creighton (1984) *Proteins*, W. H. Freeman and Company. Zusätzlich sind individuelle Substitutionen, Deletionen oder Additionen, die eine einzelne Aminosäure oder einen geringen Prozentanteil von Aminosäuren in einer codierten Sequenz verändern, addieren oder deletieren, auch "konservativ modifizierte Variationen".

[0064] Eine "Untersequenz" bezeichnet eine Sequenz von Nukleinsäuren oder Aminosäuren, die einen Teil einer längeren Sequenz von Nukleinsäuren bzw. Aminosäuren (z. B. Protein) umfaßt.

[0065] Nucleinsäuren sind "verlängert", wenn zusätzliche Nucleotide (oder andere analoge Moleküle) in der Nucleinsäure aufgenommen sind. Am häufigsten wird dies mit einer Polymerase (z. B. einer DNA-Polymerase) durchgeführt, z. B. mit einer Polymerase, die Sequenzen am 3'-Terminus der Nucleinsäure addiert.

[0066] Zwei Nucleinsäuren sind "rekombiniert", wenn Sequenzen aus jeder der zwei Nucleinsäuren in einer Nachkommenschaft-Nucleinsäure kombiniert sind. Zwei Sequenzen sind "direkt" rekombiniert, wenn beide Nucleinsäuren Substrate zur Rekombination sind. Zwei Sequenzen sind "indirekt rekombiniert", wenn die Sequenzen unter Verwendung einer Zwischenstufe, wie z. B. mit einem Cross-Over-Oligonucleotid, rekombiniert werden. Zur indirekten Rekombination ist nicht mehr als eine der Sequenzen ein tatsächliches Substrat zur Rekombination, und in manchen Fällen ist keine Sequenz ein Substrat zur Rekombination.

[0067] Eine "spezifische Bindungsaffinität" zwischen zwei Molekülen, z. B. einem Ligand und einem Rezeptor, bedeutet eine bevorzugte Bindung eines Moleküls für ein anderes in einer Mischung von Molekülen. Die Bindung der Moleküle kann als spezifisch betrachtet werden, falls die Bindungsaffinität ca. $1 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$ bis ca. $1 \times 10^6 \text{ M}^{-1}$ oder größer ist.

[0068] Substrat: Ein Substrat ist das Molekül, das ein Enzym natürlich erkennt und zu einem Produkt im biochemischen Reaktionsweg umwandelt, in dem das Enzym natürlich seine Funktion durchführt, oder ist eine modifizierte Version des Moleküls, die auch durch das Enzym erkannt wird und durch das Enzym zu einem Produkt in einer enzymatischen Reaktion umgewandelt wird, die ähnlich der natürlich vorkommenden Reaktion ist.

[0069] Transformation: Ein Prozess zur Einführung heterologer DNA in eine Zelle, ein Gewebe oder ein Insekt. Transformierte Zellen, Gewebe oder Insekten werden so verstanden, daß sie nicht nur das Endprodukt eines Transformationsprozesses umfassen, sondern auch transgene Nachkommenschaft davon.

[0070] "Transformiert", "transgen" und "rekombinant" bezeichnen einen Wirtsorganismus wie ein Bakterium oder eine Pflanze, in das/die ein heterologes Nucleinsäuremolekül eingeführt wurde. Das Nucleinsäuremolekül kann stabil in das Genom des Wirtes integriert sein, oder das Nucleinsäuremolekül kann auch als extrachromosomales Molekül vorhanden sein. Ein solches extrachromosomales Molekül kann selbst-vervielfältigend sein. Transformierte Zellen, Gewebe oder Pflanzen werden so verstanden, daß sie nicht nur das Endprodukt eines Transformationsprozesses umfassen, sondern auch transgene Nachkommenschaft davon. Ein "nicht-transformierter", "nicht-transgener" oder "nicht-rekombinanter" Wirt bezeichnet einen Organismus vom Wildtyp, z. B. ein Bakterium oder eine Pflanze, der nicht das heterologe Nucleinsäuremolekül enthält.

[0071] Die vorliegende Erfindung betrifft transgene Wirte, insbesondere transgene Pflanzen, Pflanzengewebe, Pflanzensamen und Pflanzenzellen, die ein heterologes Polynucleotid umfassen, das ein Genprodukt codiert, worin das Genprodukt Trichotheceen-Resistenzaktivität umfaßt, und Verfahren zur Herstellung und Verwendung derselben. Trichotheceen-Resistenzaktivität, wie hier verwendet, bezeichnet eine Aktivität, die die Phytotoxizität eines Trichotheceens, insbesondere gegen einen Pilz und/oder eine Pflanze, reduziert oder inhibiert, in einer besonderen Ausführungsform der Erfindung betrifft Trichotheceen-Resistenzaktivität eine Aktivität, die ein Acetat auf die C-3-Position eines Trichotheceens überträgt.

[0072] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung transgene Wirte, insbesondere transgene Pflanzen, Pflanzengewebe, Pflanzensamen und Pflanzenzellen, die ein heterologes Polynucleotid exprimieren, das ein Genprodukt codiert, wobei das Genprodukt Trichotheceen-Resistenzaktivität aufweist, insbesondere ein Acetyltransferase-Genprodukt, insbesondere ein 3-O-Acetyltransferase-Genprodukt, ganz besonders ein Trichotheceen-3-O-acetyltransferase-Genprodukt, und Verfahren zur Herstellung und Verwendung derselben. Die Expression des heterologen Polynucleotids der Erfindung umfaßt die Synthese von RNA und kann durch Northern-Blot-Analyse detektiert werden. Insbesondere kann die Expression des heterologen Polynucleotids detektiert werden, wenn eine markierte Sonde, die aus dem heterologen Nucleotid abstammt, insbesondere aus SEQ ID NOs: 1, 5 oder 7, mit RNA hybridisiert, die aus einer transgenen Pflanze der Erfindung isoliert ist, in 7% Natriumdodecylsulfat (SDS), 0,5 M Natriumphosphat, pH 7,0, 1 mM EDTA, 10 mg/ml BSA bei 65°C unter Spülen in 0,5% BSA (Fraktion V), 5% SDS, 40 mM Natriumphosphat, pH 7,0, 1 mM EDTA, 0,25 M Natriumchlorid bei 65°C, bevorzugt in 1% SDS, 40 mM Natriumphosphat, pH 7,0, 1 mM EDTA, 0,125 M Natriumchlorid bei 65°C und vorzugsweise in 1% SDS, 40 mM Natriumphosphat, pH 7,0, 1 mM EDTA bei 65°C.

[0073] Ferner betrifft die Erfindung transgene Pflanzen, Pflanzengewebe, Pflanzensamen und Pflanzenzellen, die ein heterologes Polynucleotid exprimieren, worin die Pflanze, Pflanzenzelle, das Pflanzengewebe oder der Pflanzensamen trichotheceenresistent ist. Trichotheceenresistente Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewe-

be und Pflanzensamen, wie hier verwendet, sind diejenigen, die zum Stoffwechsel in Gegenwart eines Trichothecens fähig sind, was, wie im nachfolgenden Beispiel 7 beschrieben, bestimmt werden kann. In einer besonderen Ausführungsform haben trichothecenresistente Pflanzen, Pflanzengewebe, Pflanzenzellen und Pflanzensamen eine spezifische Enzymaktivität von wenigstens 10 nmol Triacetoxyscirpenol (hier nachfolgend "TAS")/Mikrogramm Protein/15 min Inkubation bei Sättigungssubstratspiegeln, insbesondere bei wenigstens 5 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min, insbesondere wenigstens 1 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min, insbesondere wenigstens 0,8 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min, insbesondere wenigstens 0,5 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min, insbesondere eine spezifische Aktivität von 0,25 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min, insbesondere eine spezifische Aktivität von 0,1 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min, insbesondere eine spezifische Aktivität von 0,05 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min und ganz besonders eine spezifische Aktivität von 0,01 nmol TAS/Mikrogramm Protein/15 min oberhalb Hintergrundspiegeln der Aktivität, die in einer Kontrolle vom Wildtyp natürlich vorkommen, insbesondere gemäß Bestimmung in einem Test wie im nachfolgenden Beispiel 6 beschrieben.

[0074] Trichothecenresistente Pflanzen der Erfindung umfassen diejenigen mit einem größeren Prozentwert der Sattgutkeimung und Bildung von Wurzeln in Gegenwart eines Trichothecens als das Saatgut aus einer Kontrolle vom Wildtyp, worin das Trichothecen in einer Konzentration von wenigstens 5 Mikrogramm/ml vorhanden ist, besonders bevorzugt wenigstens 10 Mikrogramm/ml, besonders bevorzugt wenigstens 15 Mikrogramm/ml, besonders bevorzugt wenigstens 20 Mikrogramm/ml und besonders bevorzugt wenigstens 25 Mikrogramm/ml. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfassen trichothecenresistente Pflanzen der Erfindung diejenigen, von denen wenigstens 10% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 20% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 30% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 40% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 50% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 60% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 70% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 80% mehr Saatgut und besonders bevorzugt wenigstens 90% mehr Saatgut keimen und Wurzeln bilden in Gegenwart eines Trichothecens als das Saatgut einer Kontrolle vom Wildtyp.

[0075] Trichothecene werden häufig in mehrere unterschiedliche Struktur-Gruppen unterteilt. Eine besondere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf Trichothecene der Gruppe A und B. Gruppen A und B umfassen die Fusarium-Trichothecene und werden primär durch die Abwesenheit (Gruppe A) oder Gegenwart (Gruppe B) einer funktionellen Carbonyl-Gruppe in Position C-8 differenziert. Das Trichothecen der Gruppe B, DON, umfaßt entsprechend eine Carbonyl-Gruppe in der Position C-8.

[0076] Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere auf die Resistenz gegen Trichothecene beschrieben, die ein C-3-Hydroxyl enthalten. Solche Trichothecene schließen T-2-Toxin, HT-2-Toxin, Isotrichodermol, DAS, 3-Desacetylcalonectrin, 3,15-Didesacetylcalonectrin, Scirpentriol, Neosolaniol; 15-Acetyldesoxynivalenol, Nivalenol, 4-Acetylivalenol (Fusarenon-X), 4,15-Diacetylivalenol, 4,7,15-Acetylivalenol und DON und ihre verschiedenen acetylierten Derivate ein.

[0077] In einer besonderen Ausführungsform ist die/das trichothecenresistente Pflanze, Zelle, Gewebe oder Saatgut davon resistent gegen einen Trichothecen-erzeugenden Pilz, insbesondere einen Pilz der Gattung Fusarium. Pilzresistenz, wie hier verwendet, bezeichnet keine Einleitung der Infektion nach Pilzbeimpfung oder reduzierte Ausbreitung der Infektion nach Pilzbeimpfung im Vergleich mit einer Kontrolle vom Wildtyp.

[0078] In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine pilzresistente transgene Pflanze der Erfindung eine Getreidepflanze und umfaßt unter Pilzkontakt weniger infizierte Körner oder Samen im Vergleich mit einer Kontrolle vom Wildtyp, bevorzugt wenigstens eine 10%ige Abnahme von infizierten Körnern oder Samen im Vergleich mit der gleichen Anzahl von Körnern oder Samen, die in einer Kontrolle vom Wildtyp ausgewertet werden, besonders bevorzugt wenigstens eine 20%ige Abnahme, besonders bevorzugt wenigstens eine 40%ige Abnahme und besonders bevorzugt wenigstens eine 50%ige Abnahme der infizierten Körner im Vergleich mit der gleichen Anzahl von Körnern oder Samen in einer Kontrolle vom Wildtyp. Die pilzresistenten transgenen Getreidepflanzen der Erfindung umfassen ohne Beschränkung Mais, Weizen, Gerste, Reis und Hafer.

[0079] In Weizen kann die Pilzausbreitung in der Ähre, wie im nachfolgenden Beispiel 9 beschrieben, ausgewertet werden, indem die Anzahl von symptomatischen und asymptomatischen Ährchen an jeder beimpften Ähre gezählt und der Prozentwert der Ährchen an jeder Ähre, die symptomatisch sind, berechnet wird. In einer bevorzugten Ausführungsform umfaßt der pilzresistente Weizen der Erfindung unter Pilzkontakt weniger infizierte Ährchen als die Kontrolle vom Wildtyp, bevorzugt wenigstens eine 10%ige Abnahme an infizierten Ährchen im Vergleich mit der gleichen Anzahl von Ährchen, die in einer Kontrolle vom Wildtyp ausgewertet werden, besonders bevorzugt wenigstens eine 20%ige Abnahme, besonders bevorzugt wenigstens eine 40%ige

Abnahme und besonders bevorzugt wenigstens eine 50%ige Abnahme an infizierten Ährchen im Vergleich mit der gleichen Anzahl von Ährchen in einer Kontrolle vom Wildtyp.

[0080] In Mais kann die Pilzausbreitung im Kolben durch visuelle Abschätzung des Prozentwertes der infizierten Körner, wie weiter im nachfolgenden Beispiel 9 beschrieben, ausgewertet werden. In einer bevorzugten Ausführungsform umfaßt der pilzresistente Mais der Erfindung unter Pilzkontakt weniger infizierte Körner als die Kontrolle vom Wildtyp, bevorzugt wenigstens eine 10%ige Abnahme an infizierten Körnern im Vergleich mit der Anzahl von infizierten Körnern in der gleichen Anzahl von Kolben, sichtbar abgeschätzt in einer Kontrolle vom Wildtyp, besonders bevorzugt wenigstens eine 20%ige Abnahme, besonders bevorzugt wenigstens eine 30%ige Abnahme, besonders bevorzugt wenigstens eine 40%ige Abnahme und besonders bevorzugt wenigstens eine 50%ige Abnahme an infizierten Körnern im Vergleich mit der gleichen Anzahl von Kolben, sichtbar abgeschätzt in einer Kontrolle vom Wildtyp. In Mais kann die interne Pilzausbreitung im Stengel visuell durch Aufspalten des Stengels und Bewerten der Verfärbungsmenge ausgewertet werden. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfaßt der transgene Mais der Erfindung weniger interne und/oder externe Verfärbung des Stengels im Vergleich mit einer Kontrolle vom Wildtyp.

[0081] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform umfassen pilzresistente Pflanzen der Erfindung diejenigen, von denen ein größerer Prozentwert des Saatguts in Gegenwart von Pilzkontakt keimt, als er in der Kontrolle vom Wildtyp keimt. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfassen pilzresistente Pflanzen der Erfindung diejenigen, von denen wenigstens 10% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 20% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 30% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 40% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 50% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 60% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 70% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 80% mehr Saatgut und besonders bevorzugt wenigstens 90% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 100% mehr Saatgut, besonders bevorzugt wenigstens 150% mehr Saatgut in Gegenwart von *Fusarium* keimt als Saatgut aus der Kontrolle vom Wildtyp.

[0082] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform werden pilzresistente transgene Pflanzen, die Saatgut oder Körner mit weniger Mykotoxin, z. B. Trichothecen-Kontamination, als das Saatgut einer Kontrolle vom Wildtyp erzeugen, bereitgestellt.

[0083] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform werden Kulturpflanzen und insbesondere Getreidepflanzen, die Saatgut mit wenigstens 10% weniger Trichothecen, besonders bevorzugt wenigstens 20% weniger Trichothecen, besonders bevorzugt wenigstens 30% weniger Trichothecen, besonders bevorzugt wenigstens 40% weniger Trichothecen, besonders bevorzugt wenigstens 50% weniger Trichothecen, besonders bevorzugt wenigstens 60% weniger Trichothecen, besonders bevorzugt wenigstens 70% weniger Trichothecen und besonders bevorzugt wenigstens 80% weniger Trichothecen-Termination als eine Kontrolle vom Wildtyp erzeugen, bereitgestellt. Trichothecen-Kontamination kann wie im nachfolgenden Beispiel 10 beschrieben bestimmt werden.

[0084] Die Polynukleotide zur Verwendung in der Erfindung schließen heterologe Polynukleotide ein, die Acetyltransferasen codieren, insbesondere diejenigen, die Acetyltransferasen codieren, die Trichothecenresistenz verleihen können, insbesondere diejenigen, die Trichothecen-3-O-acetyltransferasen codieren. In einer besonderen Ausführungsform können die heterologen Polynukleotide ohne Beschränkung aus pilzlichem Ursprung stammen, insbesondere aus *Fusarium*-, *Trichothecium*- und *Myrothecium*-Ursprung, insbesondere aus einer *Fusarium*-Art wie *F. acuminatum*, *F. crookwellense*, *F. culmorum*, *F. equiseti*, *F. graminearum* (*Giberella zeae*), *F. lateritium*, *F. pose*, *F. sambucinum* (*G. pilicaris*) und *F. sporotrichioides*. Heterologe Polynukleotide zur Verwendung in der Erfindung schließen SEQ ID NO: 1, 5 und/oder 7 und zu SEQ ID NO: 1, 5 und/oder 7 im wesentlichen ähnliche Sequenzen ein.

[0085] Ein Polynukleotid zur Verwendung in der Erfindung kann in Wirtszellen wie Pflanzen-, Pilz- oder bakteriellen Zellen unter Verwendung herkömmlicher rekombinanter DNA-Technik aufgenommen werden. Allgemein beinhaltet dies das Inserieren des Polynukleotids in ein Expressionssystem, für das das Polynukleotid heterolog ist, unter Verwendung von fachbekannten Standard-Klonierungsverfahren. Der Vektor enthält die notwendigen Elemente für die Transkription und Translation des Polynukleotids zur Verwendung in der Erfindung in einer Wirtszelle, die den Vektor enthält. Eine große Anzahl von fachbekannten Vektorsystemen wie Plasmide, Bakteriophagenviren und andere modifizierte Viren kann verwendet werden. Die Komponenten des Expressionssystems können auch zur Erhöhung der Expression modifiziert werden. Zum Beispiel können trunke Sequenzen, Nukleotid-Substitutionen, Nukleotid-Optimierung oder andere Modifikationen eingesetzt werden. Fachbekannte Expressionssysteme können zur Transformation praktisch jeder Kulturpflanzenzelle

unter geeigneten Bedingungen verwendet werden. Ein heterologes Polynukleotid der Erfindung wird bevorzugt stabil transformiert und in das Genom der Wirtszellen integriert. In einer anderen bevorzugten Ausführungsform befindet sich das heterologe Polynukleotid der Erfindung auf einem selbst-vervielfältigenden Vektor. Beispiele für selbst-vervielfältigende Vektoren sind Viren, insbesondere Gemini-Viren. Transformierte Zellen können zu ganzen Pflanzen regeneriert werden, so daß die gewählte Form des Polynukleotids Trichothecenresistenz in den transgenen Pflanzen verleiht.

[0086] Ein zur Expression in transgenen Pflanzen gedachtes Polynukleotid der Erfindung wird zuerst in einer Expressionskassette hinter einem geeigneten Promotor, der in Pflanzen exprimierbar ist, zusammengebaut. Die Expressionskassetten können auch etwaige weitere Sequenzen umfassen, die für die Expression des heterologen Polynukleotids der Erfindung erforderlich oder ausgewählt sind. Solche Sequenzen schließen ohne Beschränkung Transkriptionsterminatoren, Fremdsequenzen zur Steigerung der Expression wie Introns, vitale Sequenzen und zur Ausrichtung des Genprodukts auf spezifische Organellen und Zellkompartimente gedachte Sequenzen ein. Diese Expressionskassetten können dann leicht auf die unten beschriebenen Pflanzentransformationsvektoren übertragen werden. Es folgt eine Beschreibung verschiedener Komponenten typischer Expressionskassetten.

[0087] Die Auswahl des in den Expressionskassetten verwendeten Promotors wird das räumliche und zeitliche Expressionsmuster des heterologen Polynukleotids der Erfindung in der transformierten Pflanze bestimmen. Ausgewählte Promotoren werden heterologe Polynukleotide der Erfindung in spezifischen Zelltypen (wie Blattepidermiszellen, Mesophyllzellen, Wurzelkortexzellen) oder in spezifischen Geweben oder Organen (Wurzeln, Blätter oder Blüten beispielsweise) exprimieren, und die Auswahl wird den gewünschten Ort der Anreicherung des Genprodukts widerspiegeln. Alternativ kann der ausgewählte Promotor die Expression des Gens unter verschiedenen induzierenden Bedingungen antreiben. Promotoren variieren in ihrer Stärke, d. h. in ihrer Fähigkeit zur Förderung der Transkription. In Abhängigkeit vom verwendeten Wirtszellsystem kann jeder aus einer Anzahl geeigneter fachbekannter Promotoren verwendet werden. Zum Beispiel kann zur konstitutiven Expression der CaMV 35S-Promotor, der Reis-Actin-Promotor oder der Ubiquitin-Promotor verwendet werden. Zur regulierbaren Expression kann der chemisch induzierbare PR-1-Promotor aus Tabak oder Arabidopsis verwendet werden (siehe z. B. US-PS 5,689,044).

[0088] Eine Vielzahl von Transkriptionsterminatoren sind zur Verwendung in Expressionskassetten verfügbar. Diese sind verantwortlich für die Termination der Transkription über das heterologe Polynukleotid der Erfindung hinaus und seine korrekte Polyadenylierung. Geeignete Transkriptionsterminatoren sind diejenigen, die dafür bekannt sind, in Pflanzen zu funktionieren, und schließen den CaMV 35S-Terminator, den tml-Terminator, den Nopalinsynthase-Terminator und den rbcS E9-Terminator aus Erbse ein. Diese können in sowohl einkeimblättrigen als auch zweikeimblättrigen Pflanzen verwendet werden.

[0089] Es wurde festgestellt, daß zahlreiche Sequenzen die Genexpression aus der Transkriptionseinheit heraus steigern, und diese Sequenzen können in Verbindung mit den Polynukleotiden dieser Erfindung zur Steigerung ihrer Expression in transgenen Pflanzen verwendet werden. Zum Beispiel wurde gezeigt, daß verschiedene Intronsequenzen wie Introns des Mais-Adhl-Gens die Expression steigern, insbesondere in einkeimblättrigen Zellen. Zusätzlich sind eine Reihe von nicht-translatierten Leitsequenzen, die aus Viren stammen, ebenfalls dafür bekannt, die Expression zu steigern, und diese sind besonders wirksam in zweikeimblättrigen Zellen.

[0090] Die codierende Sequenz des ausgewählten Gens wird gegebenenfalls gentechnisch durch Veränderung der codierenden Sequenz zur optimalen Expression in der Kulturpflanzenart von Interesse manipuliert. Verfahren zur Modifizierung von codierenden Sequenzen zum Erreichen einer optimalen Expression in einer besonderen Kulturpflanzenart sind wohlbekannt (siehe z. B. Perlak et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: 3324 (1991); und Koziel et al., Bio/technol. 11: 194 (1993); Fennoy und Bailey-Serres. Nucl. Acids Res. 21: 5294–5300 (1993)). Verfahren zur Modifizierung von codierenden Sequenzen durch Berücksichtigung der Codonenverwendung in Pflanzengenen und in höheren Pflanzen, Grünalgen und Cyanobakterien sind wohlbekannt (siehe Tabelle 4 in: Murray et al. Nucl. Acids Res. 17: 477–498 (1989); Campbell und Gowri Plant Physiol. 92: 1–11 (1990)).

[0091] Von verschiedenen Mechanismen zur Ausrichtung von Genprodukten ist bekannt, daß sie in Pflanzen existieren, und die Sequenzen, die das Funktionieren dieser Mechanismen kontrollieren, wurden in einem gewissen Detail charakterisiert. Zum Beispiel wird die Ausrichtung der Genprodukte auf den Chloroplasten durch eine Signalsequenz kontrolliert, die am Aminoterminalen Ende verschiedener Proteine gefunden wird, die während des Chloroplastenimports abgespalten wird, um das reife Protein zu liefern (z. B. Comai et al. J. Biol.

Chem. 263: 15104–15109 (1988)). Andere Genprodukte befinden sich in anderen Organellen wie dem Mitochondrium und dem Peroxisom (z. B. Unger et al. *Plant Molec. Biol.* 13: 411–418 (1989)). Die cDNAs, die diese Produkte codieren, können auch manipuliert werden, um die Ausrichtung von heterologen Produkten, die durch DNA-Sequenzen codiert werden, auf diese Organellen zu bewirken. Zusätzlich wurden Sequenzen charakterisiert, die die Ausrichtung von Produkten, die durch DNA-Sequenzen codiert werden, auf andere Zellkompartimente verursachen. Amino-terminale Sequenzen sind verantwortlich für die Ausrichtung auf das endoplasmatische Retikulum, den Apoplast und die extrazelluläre Sekretion aus Aleuronzellen (Koehler & Ho, *Plant Cell* 2: 769–783 (1990)). Zusätzlich sind Amino-terminale Sequenzen in Verbindung mit Carboxy-terminalen Sequenzen verantwortlich zur vakuolaren Ausrichtung von Genprodukten (Shinshi et al. *Plant Molec. Biol.* 14: 357–368 (1990)). Durch die Fusion der oben beschriebenen geeigneten Ausrichtungssequenzen mit einem heterologen Polynukleotid der Erfindung ist es möglich, ein resultierendes Produkt auf jede Organelle oder jedes Zellkompartiment auszurichten.

[0092] Zahlreiche Transformationsvektoren, die zur Pflanzentransformation verfügbar sind, sind dem Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Pflanzentransformation bekannt, und die für diese Erfindung relevanten Polynukleotide können in Verbindung mit allen solchen Vektoren verwendet werden. Die Auswahl des Vektors wird von der bevorzugten Transformationstechnik und der Zielart zur Transformation abhängen. Für bestimmte Zielarten können unterschiedliche Selektionsmarker bevorzugt sein. Selektionsmarker, die routinemäßig in der Transformation verwendet werden, schließen das nptII-Gen ein, das Resistenz gegen Kanamycin und verwandte Antibiotika verleiht (Messing & Vierra. *Gene* 19: 259–268 (1982); Bevan et al., *Nature* 304: 184–187 (1983)), das bar-Gen, das Resistenz gegen das Herbizid Phosphinothricin verleiht (White et al., *Nucl. Acids Res.* 18: 1062 (1990), Spencer et al. *Theor. Appl. Genet.* 79: 625–631 (1990)), das hph-Gen, das Resistenz gegen das Antibiotikum Hygromycin verleiht (Blochinger & Diggelmann, *Mol. Cell Biol.* 4: 2929–2931), und das dhfr-Gen, das Resistenz gegen Methotrexat verleiht (Bourouis et al., *EMBO J.* 2(7): 1099–1104 (1983)), und das EPSPS-Gen, das Resistenz gegen Glyphosat verleiht (US-PSen 4,940,935 und 5,188,642), das Phosphomannoseisomerase-Gen, manA, das einen selektiven Stoffwechsellvorteil in Gegenwart von Mannose verleiht (US-Patentanmeldung Nr. 5,767,378 und Miles & Guest, *GENE*, 32: 41–48 (1984)). PAT-selektierbare Marker, die Resistenz gegen BASTA verleihen (Sung H. Park et al., *In Vitro Cell. Dev. Biol.-Plant*, 34: 117–121 (1998)).

[0093] Viele Vektoren sind zur Transformation unter Verwendung von *Agrobacterium tumefaciens* verfügbar. Diese tragen typischerweise wenigstens eine t-DNA-Randsequenz und schließen Vektoren wie pBIN19 ein (Bevan, *Nucl. Acids Res.* (1984)). Typische Vektoren, die zur *Agrobacterium*-Transformation geeignet sind, schließen die binären Vektoren pCIB200 und pCIB2001 sowie den binären Vektor pCIB10 und Hygromycin-Selektionsderivate davon ein (siehe z. B. US-PS 5,639,949).

[0094] Die Transformation ohne die Verwendung von *Agrobacterium tumefaciens* umgeht das Erfordernis für T-DNA-Sequenzen im gewählten Transformationsvektor, und entsprechend können Vektoren, denen diese Sequenzen fehlen, zusätzlich zu Vektoren wie den oben beschriebenen verwendet werden, die T-DNA-Sequenzen enthalten. Transformationstechniken, die nicht auf *Agrobacterium* beruhen, schließen die Transformation über Partikelbombardierung, Protoplastenaufnahme (z. B. PEG und Elektroporation) und Mikroinjektion ein. Die Wahl des Vektors hängt weitgehend von der bevorzugten Selektion der zu transformierenden Art ab. Typische Vektoren, die zur Nicht-*Agrobacterium*-Transformation geeignet sind, schließen pCIB3064, pSOG19 und pSOG35 ein. (Siehe z. B. US-PS 5,369,949).

[0095] Sobald das Polynukleotid von Interesse in ein Expressionssystem kloniert wurde, wird es in eine Pflanzenzelle transformiert. Verfahren zur Transformation und Regeneration von Pflanzen sind allgemein fachbekannt. Zum Beispiel wurden Ti-Plasmidvektoren zur Übertragung von Fremd-DNA sowie die direkte DNA-Aufnahme, Liposomen, Elektroporation, Mikroinjektion und Mikroprojekteile verwendet. Zusätzlich können Bakterien aus der Gattung *Agrobacterium* zur Transformation von Pflanzenzellen verwendet werden.

[0096] Transformationstechniken für zweikeimblättrige Pflanzen sind allgemein fachbekannt und schließen *Agrobacterium*-basierte Technik und Techniken ein, die kein *Agrobacterium* erfordern. Nicht-*Agrobacterium*-Techniken beinhalten die Aufnahme von exogenem genetischem Material direkt durch Protoplasten oder Zellen. Dies kann durch PEG- oder Elektroporationvermittelte Aufnahme, Partikelbombardierung-vermittelte Übertragung oder Mikroinjektion erreicht werden. In jedem Fall werden die transformierten Zellen zu ganzen Pflanzen unter Verwendung von fachbekannten Standardtechniken regeneriert.

[0097] Die Transformation der meisten einkeimblättrigen Arten ist jetzt Routine geworden. Bevorzugte Techniken schließen den direkten Gentransfer in Protoplasten unter Verwendung von PEG- oder Elektroporationstechniken, die Partikelbombardierung in Callusgewebe sowie die *Agrobacterium*-vermittelte Transformati-

on ein Zielgewebe können aus solchen Quellen wie Weizen Sorte UC703 oder Mais Genotyp CG000526 abgeleitet werden. Zum Beispiel kann die Agrobacterium-vermittelte Transformation von Mais wie in US-Patentanmeldung 09/089,111 beschrieben durchgeführt werden, das entsprechend als WO 98/54961 veröffentlicht wurde, und die von Gerste kann durchgeführt werden wie beschrieben von: M. Cho, J. Wong, C. Marx, W. Jiang, P. Lemaux und B. Buchanan (1999), Overexpression of thioredoxin h leads to enhanced activity of starch debranching enzyme (pullulanase) in barley grain. PNAS 96: 14641–14646; S. Zhang, M. Cho, T. Koprek, R. Yun, P. Bregitzer und P. Lemaux (1999). Genetic transformation of commercial cultivars of oat (*Avena sativa* L.) and barley (*Hordeum vulgare* L.) using in vitro shoot meristematic cultures derived from germinated seedlings. Plant Cell Rep. 18: 959–966; P. Bregitzer, S. Harlbert und P. Lemaux (1998). Somaclonal variation in the progeny of transgenic barley. TAG 96: 421–425; M. Cho, W. Jiang und P. Lemaux (1998). Transformation of recalcitrant barley cultivars through improvement of regenerability and decreased albinism. Plant Sci. 138: 229–244; P. Lemaux, M. Cho, S. Zang und P. Bregitzer (1998). Transgenic cereals: *Hordeum vulgare* L. – current status and future prospects. In: Vasil I., Phillips R (Hrsg) Molecular Improvement of Cereal Crops, Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Niederlande, Seiten 255–316; S. Zhang, R. Williams-Carrier, D. Jackson und P. Lemaux (1998). Expression of CDC2Zm and KNOTTED1 during in vitro auxillary shoot meristem proliferation and adventitious shoot meristem formation in maize (*Zea mays* L.) and barley (*Hordeum vulgare* L.). Planta 204: 542–549; D. McElroy, J. Louwse, S. McElroy und P. Lemaux (1997). Development of a simple transient assay for Ac/Ds activity in cells of intact barley tissue. Plant J. 11: 157–165; S. Tingay, D. McElroy, R. Kalla, S. Fieg, M. Wang, S. Thornton und R. Brettell (1997). Agrobacterium tumefaciens-mediated barley transformation. The Plant J. 11: 1369–1376; J. Qureshi, Z. Basri, R. Singh, R. Burton, M. Dalton, J. Kollmorgen und G. Fincher. 1988. Agrobacterium-mediated transformation of two varieties of barley (*Hordeum vulgare* L.) Proc. 42nd. Conference of Australian Society for Biochemistry and Molecular Biology, 28. September bis 1. Oktober 1998, Adelaide, Australien; J. Qureshi, R. Singh, Z. Basri, R. Stewart, R. Burton, J. Kollmorgen und G. Fincher (1997). Strategies for genetic transformation of elite Australian barley varieties. Proc. 8th. Aust. Barley Technical Symp. Gold Coast, Queensland, 7. bis 12. September 1997. 2: 8.9–11; P. Lemaux, M. Cho, J. Louwse, R. Williams und Y. Wan (1996). Bombardment-mediated transformation methods for barley. Bio-Rad US/EG Bull 2007: 1–6; T. Koprek, R. Hansch, A. Nerlich, R. Mendel und J. Schulze (1996). Fertile transgenic barley of different cultivars obtained by adjustment of bombardment conditions to tissue response. Plant Sci. 119: 79–91; T. Hagio, T. Hirabayashi, H. Machii und H. Tomutsune (1995). Production of fertile transgenic barley (*Hordeum vulgare* L.) plants using the hygromycinresistance marker. Plant Cell Rep. 14: 329–334; H. Funatsuki, H. Kuroda, M. Kihara, P. Lazzeri, E. Muller, H. Lorz und I. Kishinami (1995). Fertile transgenic barley regenerated by direct DNA transfer to protoplasts. TAG 91: 707–712; A. Jahne, D. Becker, R. Brettschneider und H. Lorz (1994). Regeneration of transgenic, microspore-derived, fertile barley. TAG 89: 525–533; Y. Wan und P. Lemaux (1994). Generation of large numbers of independently transformed fertile barley plants. Plant Physiol. 104: 37–48.

[0098] Die Polynukleotide der Erfindung können zum Verleihen von Trichotheceenresistenz auf eine große Vielzahl von Pflanzenzellen, einschließlich derjenigen von Nacktsamern, Einkeimblättrigen und Zweikeimblättrigen, verwendet werden. Obwohl das heterologe Polynukleotid der Erfindung in jede Pflanzenzelle inseriert, z. B. transformiert, werden kann, die in diese breiten Klassen fällt, ist es besonders nützlich in Kulturpflanzenzellen wie Reis, Weizen, Gerste, Roggen, Mais, Hafer, Kartoffel, Süßkartoffel, Rübe, Kürbis ("squash"), Kürbis ("pumpkin"), Zucchini, Melone, Sojabohne und Sorghum. Die Polynukleotide zur Verwendung in der Erfindung, die eine Pflanze trichotheceenresistent machen, können in Kombination mit anderen Eigenschaften verwendet werden, die wichtig für Produktion und Qualität sind. Die Polynukleotide der Erfindung können in Pflanzenlinien durch Züchtungsansätze und fachbekannte Techniken eingefügt werden.

[0099] Wenn ein trichotheceenresistentes Gen-Allel durch Transformation in eine Kulturpflanze oder Pflanzenzellkultur, aus der eine Kulturpflanze regeneriert werden kann, erhalten wird, wird es in kommerzielle Sorten unter Verwendung herkömmlicher Züchtungstechniken bewegt, um einen trichotheceenresistenten Anbau ohne die Notwendigkeit zur gentechnischen Manipulation des Allels und Transformation in die Pflanze zu entwickeln.

[0100] Die verschiedenen Züchtungsschritte sind durch einen wohldefinierten menschlichen Eingriff wie die Selektion der zu kreuzenden Linien, die Ausrichtung der Bestäubung der Elternlinien oder die Selektion geeigneter Nachkommenschaftspflanzen gekennzeichnet. In Abhängigkeit von den gewünschten Eigenschaften werden unterschiedliche Züchtungsmaßnahmen ergriffen. Die relevanten Techniken sind allgemein fachbekannt und schließen ohne Beschränkung Hybridisierung, Inzucht, Rückkreuzungszüchtung, Multilinienzüchtung, Sortenmischung, Interartenhybridisierung, aneuploide Techniken etc. ein. Hybridisierungstechniken schließen auch die Sterilisation von Pflanzen ein, um männlich- oder weiblich-sterile Pflanzen durch mechanische, chemische oder biochemische Mittel zu erzielen. Die Kreuzbestäubung einer männlich-sterilen Pflanze mit Pollen einer unterschiedlichen Linie stellt sicher, daß das Genom der männlich-sterilen, aber weib-

lich-fruchtbaren Pflanze gleichförmig Eigenschaften beider Elternlinien erhalten wird. So können die erfindungsgemäßen transgenen Samen und Pflanzen zur Züchtung von verbesserten Pflanzenlinien verwendet werden, die kein oder ein reduziertes Pilzwachstum auf der Pflanze, dem Pflanzengewebe oder Saatgut aufweisen, wodurch die Mykotoxin-Kontamination der Pflanze, des Pflanzengewebes oder Saatguts verhindert und/oder reduziert wird.

[0101] Die in die oben erwähnten transgenen Samen und Pflanzen manipulierte Trichothecenresistenz wird durch geschlechtliche Vermehrung oder vegetatives Wachstum weitergeführt und kann somit in Nachkommenpflanzungen aufrechterhalten und vermehrt werden. Allgemein machen die Aufrechterhaltung und Vermehrung Gebrauch von bekannten landwirtschaftlichen Verfahren, die entwickelt wurden, um für spezifische Zwecke wie die Bodenbearbeitung, das Aussäen oder Ernten zu passen. Da der wachsende Anbau anfällig für Befall und Schädigungen ist, die durch Insekten oder Infektionen verursacht werden, werden Maßnahmen ergriffen, um Pflanzenkrankheiten, Insekten, Nematoden und andere nachteilige Bedingungen zur Verbesserung des Ertrags zu bekämpfen. Diese schließen mechanische Maßnahmen wie die Bodenbearbeitung oder die Entfernung von infizierten Pflanzen sowie die Ausbringung von Agrochemikalien wie Fungiziden, Gametoziden, Nematoziden, Wachstumsregulatoren, Reifungsmitteln und Insektiziden ein.

[0102] In der Saatgutproduktion sind die Keimungsqualität und Gleichförmigkeit von Samen wesentliche Produkteigenschaften, wohingegen die Keimungsqualität und Gleichförmigkeit von Samen, die geerntet und vom Landwirt verkauft werden, nicht wichtig sind. Da es schwierig ist, einen Anbau frei von anderen Anbau- und Unkrautsamen zu halten, sautgutbürtige Krankheiten zu bekämpfen und Saatgut mit guter Keimung zu erzeugen, wurden relativ umfangreiche und wohldefinierte Saatgutproduktionspraktiken von den Saatgutherstellern entwickelt, die erfahren auf dem Gebiet der Kultivierung, Konditionierung und Vermarktung von reinem Saatgut sind. So ist es übliche Praxis für den Landwirt, zertifiziertes Saatgut zu kaufen, das spezifische Qualitätsstandards erfüllt, anstelle Saatgut zu verwenden, das von seinem eigenen Anbau geerntet wurde. Fortpflanzungsmaterial zur Verwendung als Samen wird üblicherweise mit einem Schutzüberzug behandelt, der Herbizide, Insektizide, Fungizide, Bakterizide, Nematozide, Molluskizide oder Mischungen daraus umfaßt. üblicherweise verwendete Schutzüberzüge umfassen Verbindungen wie Captan, Carboxin, Thiram (TMTD[®]), Methalaxyl (Apron[®]) und Pirimiphos-methyl (Actillic[®]). Nach Wunsch werden diese Verbindungen zusammen mit weiteren Trägern, Tensiden oder die Ausbringung unterstützenden Hilfsstoffen formuliert, die herkömmlich auf dem Gebiet der Formulierung eingesetzt werden, um Schutz gegen Schädigung bereitzustellen, die durch bakterielle, pilzliche oder tierische Schädlinge verursacht wird. Die Schutzüberzüge können durch Imprägnieren von Fortpflanzungsmaterial mit einer flüssigen Formulierung oder durch Überziehen mit einer kombinierten nassen oder trockenen Formulierung aufgetragen werden. Andere Auftragsverfahren sind ebenfalls möglich, wie z. B. die auf die Knospen oder Frucht gerichtete Behandlung.

[0103] Es ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung neue landwirtschaftliche Verfahren wie die oben exemplarisch dargestellten Verfahren, die durch die Verwendung von transgenen Pflanzen, transgenem Pflanzenmaterial oder transgenem Saatgut gemäß der vorliegenden Erfindung gekennzeichnet sind, bereitzustellen.

[0104] In einer anderen Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung ein(e) transgene(s) Pflanzenzelle, Gewebe, Organ, Saatgut oder Pflanzenteile, die aus der transgenen Pflanze erhalten werden. Ebenfalls eingeschlossen innerhalb der Erfindung sind transgene Nachfahren der Pflanze sowie transgene Pflanzenzellen, Gewebe, Organe, Samen und Pflanzenteile, die aus den Nachkommen erhalten werden.

[0105] In einer anderen Ausführungsform kann das heterologe Polynukleotid zur Verwendung in der Erfindung auch als selektierbarer Marker in Transformationsverfahren verwendet werden. In diesem Aspekt wird die Wirtszelle mit einem zweiten heterologen Polynukleotid von Interesse sowie einem heterologen Polynukleotid der Erfindung, das ein Genprodukt codiert, das Trichothecenresistenzaktivität umfaßt, unter Verwendung von Expressionskassetten und Transformationstechniken transformiert, die oben exemplarisch dargestellt wurden und fachbekannt sind. Nach der Transformation werden die transformierten Zellen auf ihre Fähigkeit zum Überleben bei Kontakt mit einem Trichothecen, insbesondere DAS oder DON oder T-2-Toxin, selektiert. Die Wirtszelle kann eine eukaryontische oder prokaryontische Wirtszelle unter Verwendung von fachbekannten Transformations- und Expressionssystemen sein. Die Wirtszelle kann eine Pflanzenzelle, eine Pilzzelle, eine bakterielle Zelle, eine Hefezelle, eine tierische Zelle oder eine Insektenzelle sein.

[0106] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird ein Polynukleotid, das ein Genprodukt codiert, das Trichothecenresistenzaktivität umfaßt, als selektierbarer Marker in Pflanzenzelltransformationsverfahren verwendet. Zum Beispiel können Pflanzen, Pflanzengewebe, Pflanzensamen oder Pflan-

zenzellen, die wenigstens eine zweite heterologe DNA-Sequenz von Interesse exprimieren, auch zur Expression einer Sequenz transformiert werden, die ein Polypeptid codiert, das eine Sequenz umfaßt, die im wesentlichen ähnlich derjenigen von SEQ ID NO: 2, 6 oder 8 ist. Die transformierten Zellen werden auf ein Medium überführt, das ein phytotoxisches Trichothecen enthält, insbesondere DAS und/oder DON und/oder T-2-Toxin, in einer Menge, die ausreichend zur Inhibierung des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit von Pflanzenzellen ist, die nicht das Polypeptid exprimieren, das im wesentlichen ähnlich demjenigen mit der Aminosäuresequenz von SEQ ID NO: 2, 6 oder 8 ist, worin nur die transformierten Zellen wachsen werden oder unverkrüppelt sein werden. Konzentrationen von Trichothecenen, die nützlich zur Selektion von Pflanzen sind, die das Polypeptid exprimieren, das im wesentlichen ähnlich demjenigen mit der Aminosäuresequenz von SEQ ID NO: 2, 6 oder 8 ist, reichen von 1 bis 90 µg/ml. Das Verfahren ist anwendbar für jede Pflanzenzelle, die ein Polynukleotid exprimieren kann, das eine Nukleotidsequenz umfaßt, die im wesentlichen ähnlich derjenigen von SEQ ID NO: 1, 5 oder 7 ist, und kann mit jeder heterologen DNA-Sequenz von Interesse verwendet werden. Die Expression der zweiten heterologen DNA-Sequenz und des heterologen Polynukleotids der Erfindung und wie hier beschrieben kann durch den gleichen Promotor angetrieben werden, der in Pflanzenzellen funktionell ist, oder durch separate Promotoren.

Beschreibung der Sequenzen:

SEQ ID NO: 1 ist eine cDNA-Sequenz aus *Fusarium sporotrichioides*, die ein Polypeptid der Erfindung mit Trichothecenresistenzaktivität codiert.
 SEQ ID NO: 2 ist das Polypeptid mit Trichothecenresistenzaktivität, das durch SEQ ID NO: 1 codiert wird.
 SEQ ID NO: 3 ist ein DNA-Primer.
 SEQ ID NO: 4 ist ein DNA-Primer.
 SEQ ID NO: 5 ist eine DNA-Sequenz aus *Fusarium graminearum*, die ein Polypeptid der Erfindung mit Trichothecenresistenzaktivität codiert.
 SEQ ID NO: 6 ist das Polypeptid mit Trichothecenresistenzaktivität, das durch SEQ ID NO: 3 codiert wird.
 SEQ ID NO: 7 ist eine DNA-Sequenz aus *Saccharomyces cerevisiae*, die ein Polypeptid der Erfindung mit Trichothecenresistenzaktivität codiert.
 SEQ ID NO: 8 ist das Polypeptid mit Trichothecenresistenzaktivität, das durch SEQ ID NO: 5 codiert wird.
 SEQ ID NO: 9 ist die DNA-Sequenz von pCIB9818.
 SEQ ID NO: 10 ist die DNA-Sequenz von pAgroTR1r.
 SEQ ID NO: 11 ist die DNA-Sequenz von pNOV1704.

Beispiele

[0107] Die folgenden Beispiele beschreiben ferner die Materialien und Methoden, die bei der Durchführung der Erfindung und in den anschließenden Ergebnissen verwendet wurden. Sie werden zur Veranschaulichung angeboten, und ihre Aufführung sollte nicht als Beschränkung der beanspruchten Erfindung betrachtet werden.

Beispiel 1: Zusammensetzung von pNOV1700, pCIB9818, pAgroTR1r und pNov1704

1. pNOV1700:

[0108] pNOV1700 wurde unter den Bedingungen des Budapester Vertrages am 19. März 1999 bei dem Agricultural Research Service, Patent Culture Collection (NRRL), Northern Regional Research Center, 1815 Northern University Street, Peoria, Illinois 61604, USA hinterlegt und der Eingangsnummer NRRL B-30117 zugewiesen.

[0109] Entsprechend umfaßt pNOV1700 SEQ ID NO: 1, funktionsfähig verbunden mit dem *Z. mays* Ubiquitin-Promotor, einschließlich eines Teils des Exons und Introns, und mit dem Nopalinsynthase-Polyadenylierungssignal.

2. pCIB9818

[0110] Plasmid pCIB9818 ist ein ringförmiges Plasmid mit 6111 Basenpaaren mit einer DNA-Sequenz gemäß SEQ ID NO: 9. Der *Z. mays* Ubiquitin-Promotor, Basen 12 bis 1993 von SEQ ID NO: 9, einschließlich eines Teils des Exons, Basen 896 bis 1011, und das Intron, Basen 1047 bis 1993, ist funktionsfähig mit dem selektierbaren Phosphatmannoseisomerase-Marker, Basenpaare 2090 bis 3193, dem invertierten PEPC-Intron #9 von Base 3248 bis 3355 und der Terminationssequenz des CaMV 35S-Gens, Basen 3357 bis 3434, verbunden.

3. pAgroTRlr

[0111] Plasmid pAgroTRlr ist ein ringförmiger binärer Vektor mit 13.737 Basenpaaren mit einer DNA-Sequenz gemäß SEQ ID NO: 10. Entsprechend umfaßt pAgroTRlr einen selektierbaren Marker, der funktionsfähig mit einem Promotor und einer Terminationssequenz verbunden ist, und die Polynukleotidregion von SEQ ID NO: 1 hinter und im Raster mit dem Arabidopsis thaliana UBI 3-Promotor (S. Norris, S. Meyer und J. Callus, Plant Molecular Biology 22: 895–906, (1993)) und vor und im Raster mit dem nos-Polyadenylierungssignal.

4. pNov1704

[0112] Plasmid pNOV1704 ist ein ringförmiger binärer Vektor mit 12949 Basenpaaren mit einer DNA-Sequenz gemäß SEQ ID NO: 11. Der Z. mays Ubiquitin-Promotor, Basen 11 bis 1992 von SEQ ID NO: 11 (einschließlich Exon 1: 895 bis 1010 und Intron 1: 1046 bis 1992), ist funktionsfähig mit der selektierbaren Phosphatmannoseisomerase-Markersequenz, Basen 2089 bis 3192, und der Nopalinsynthase-Terminationssequenz, Basen 3557 bis 3688, verbunden. pNOV1704 umfaßt ferner den Z. mays Ubiquitin-Promotor, Basen 9218 bis 11218 (einschließlich Exon 1:10110 bis 10224 und Intron 1:10225 bis 11218), funktionsfähig verbunden mit der Trichothecen-3-O-acetyltransferase-Sequenz von SEQ ID NO: 1 bei Base 11234 bis 12662 und der nos-Terminationssequenz 12667 bis 12935.

Beispiel 2: Weizentransformation, -selektion und -regeneration Transformation

[0113] Unreife zygotische Embryos (0,75–1,25 mm) werden von oberflächensterilisierten Weizenkaryopsen (10% Chlorox × 10 Minuten) seziiert, dann mit dem Scutellum nach oben auf ein MS-basiertes Medium ausplattiert (Murashige und Skoog, (1962) Physiol. Plant 15: 473–439), das mit 3% Saccharose, 3 mg/l 2,4-D (Dichlorophenoxyessigsäure), 150 mg/l Glutamin und 75 mg/l Asparagin ergänzt und mit 0,7% Phytagar verfestigt ist (3MS3S-Medium). Die Embryos werden in der Dunkelheit bei 28°C für 5–10 Tage vor der Bombardierung inkubiert. Die optimale Zeit für die Bombardierung ist 6–7 Tage nach dem Ausplattieren. 4 Stunden vor der Bombardierung werden die Embryos auf ein Plasmolysemedium gesetzt (das gleiche Medium wie oben beschrieben, aber mit 15% Maltose versetzt, anstelle der Saccharose) und in einem Kreis mit 2,5 cm Durchmesser mit dem Scutellum nach oben angeordnet.

[0114] pNOV1700, oben beschrieben in Beispiel 1, wird mit PvuII und XmnI verdaut, und ein 4117 bp Fragment, das eine Polynukleotidregion mit einer Sequenz gemäß SEQ ID NO: 1 sowie den Ubiquitin-Promotor und NOS-Polyadenylierungssignal umfaßt, wird isoliert. pCIB9818, ebenfalls oben in Beispiel 1 beschrieben, wird mit AscI verdaut, und das 4246 bp Fragment wird isoliert, das den UBI-Maispromotor, einen selektierbaren Marker und eine CaMV 35S-Terminationssequenz umfaßt.

[0115] Die isolierten DNA-Fragmente werden auf 0,3 µm Goldpartikel unter Verwendung des standardmäßigen Stanford-Verfahrens präzipitiert. Unter kontinuierlichem Verwirbeln werden 5 µg der isolierten Fragment-DNA pro Konstrukt, 50 µl 2,5 M CaCl₂ und 20 µl 0,1 M Spermidin zu einem Eppendorf-Röhrchen hinzugegeben, das 50 µl 50%iges Glycerin und 3 mg Gold enthält. Die DNA/Gold-Mischung wird zweimal mit Ethanol gespült. Nach Verwerfen des Überstands aus der letzten Spülung wird Ethanol auf ein Endvolumen von 70 µl hinzugegeben. Dies liefert sechs Schüsse pro Röhrchen mit Gold/DNA. Die Zielplatten werden zweimal beschossen, so daß es eine Übertragung von ca. 3 µg DNA (falls 5 µg jedes der zwei Konstrukte verwendet werden, was gewöhnlich der Fall ist) und 1,0 mg Gold pro Zielplatte ergibt. Der verwendete Berstdruck beträgt 7,584 MPa (1100 psi). Nach der Bombardierung werden die Zielplatten über Nacht in die Dunkelheit zurückgebracht. Nach ca. 24 Stunden Plasmolyse werden die Embryos auf 3MS3S entfernt und für 3 Wochen zur Callus-Einleitung in die Dunkelheit zurückgebracht. Keine Subkultivierung erfolgt während dieses Zeitraums.

Selektion/Regeneration

[0116] Das embryogene Gewebe, das sich während des 3-wöchigen Einleitungszeitraums entwickelt, wird vom nicht-embryogenen Gewebe wegseziiert und auf ein Regenerations-/Selektionsmedium plaziert. Das grundsätzliche Regenerationsmedium ist 3MS3S ohne 2,4-D, aber mit stattdessen hinzugegebenem 1 mg/l GA3 (Gibberellin A₃), NAA (1-Naphthalinessigsäure) und NAA (als NG-Medium bezeichnet). 10 g/l Mannose und 5 g/l Saccharose werden hinzugegeben (NG1M.5S). Das Gewebe wird dieser Anfangsphase der Regeneration und Selektion für 2 Wochen unterworfen. Für den Großteil des 2-wöchigen Zeitraums befindet sich das Gewebe im hellen Raum. Die Schösslings- und Wurzelentwicklung beginnt während dieser Phase, und nach 2 Wochen wird das gesamte Gewebe in die nächste Stufe überführt.

[0117] Für die zweite Phase der Regeneration und Selektion mit Mannose-Selektion wird Mannose auf 5 g/l verringert und die Saccharose auf 20 g/l erhöht (MS2S.5M). Das Gewebe bleibt normalerweise auf diesen Medien für ca. 4 Wochen, wobei eine weitere Schösslings- und Wurzelentwicklung erfolgt.

[0118] Kräftig wachsende Pflänzchen mit guter Farbe und Wurzel- und Schösslingsentwicklung werden von den Platten entfernt und in größere, als GA7 bezeichnete Behälter plaziert. Dies ist die Endstufe der Selektion und Regeneration. Das Medium enthält nur 1/2 MS-Salze und 15 g/l Mannose. Der beste Indikator, daß eine Pflanze transformiert werden kann, ist die Beobachtung von aktivem Wurzelwachstum in das Medium. Blattgewebe aus aktiv wachsenden Pflänzchen wird gesammelt, und eine PCR-Reaktion wird für entweder das Gen von Interesse oder den selektierbaren Marker vor der Überführung in das Gewächshaus durchgeführt.

Beispiel 3: Arabidopsis-Transformation

[0119] Das vorstehend in Beispiel 1 beschriebene binäre Vektorkonstrukt pAgroTRlr wird in dem Agrobacterium tumefaciens-Stamm GV3101 (N. Bechtold et al., CR Acad. Sci. Paris, Science de la vie, 316; 1194–1199 (1993)) durch Elektroporation (W. J. Dower, Mol. Biol. Rep. 1: 5 (1987)) transformiert. Eine 25 ml-Kultur einer einzelnen Kolonie des GV3101-Agrobacteriums, enthaltend pAgroTRlr-Plasmide, in YEB + Rifampicin 100 und Kanamycin 100, wird bei 30°C über Nacht inkubiert. Größere Kulturen werden durch Animpfen von 500 ml des gleichen Mediums mit 5 ml der kleinen Kultur gestartet und über Nacht bei 30°C inkubiert. Die Kultur-OD bei 600 nm wird bestimmt und die Kulturen werden dann bei 5 K im GSA-Rotor für 15 Minuten abzentrifugiert. Die Zellen werden in "IM-modifizierten Infiltrationsmedium" resuspendiert, um eine End-OD bei 600 nm von 0,08 zu erreichen. 200 Mikroliter an Silwet pro Liter suspendierter Zellen wird zugesetzt. Drei Gefäße von vorzeitig Samen-bildender Arabidopsis var Columbia-Pflanzen, ungefähr 4 Pflanzen pro Gefäß, werden in etwa 500 ml einer Zellsuspension invertiert. Die Blüten werden in der Zellsuspension geschüttelt, um die Luftblasen zu entfernen, und die Pflanzen werden in der Zellsuspension für 15 Minuten inkubiert. Eine Haube wird auf das Tablett gesetzt, um die Pflanzen über Nacht unter Feuchtigkeit zu belassen.

[0120] Den Pflanzen wird ermöglicht etwa 3 bis 4 Wochen zu wachsen, wobei die Pflanzen danach für bis zu 1 Woche nicht gewässert werden. Samenhülsen werden gesammelt und in einem Trockenraum für etwa 1 1/2 Wochen getrocknet. Die Samen werden gepflanzt und es ihnen ermöglicht für etwa 2 Wochen zu wachsen. Die Pflanzen werden mit dem Selektionsmittel besprüht und erneut 2 und 4 Tage später besprüht. Nach etwa 3 Tagen können die überlebenden Pflanzen in neue Töpfe umgesetzt werden.

Beispiel 4: Biolistische Maistransformation

[0121] Embryonale Kallus-Kulturen vom Typ I (Green et al. 1983, Somatic cell genetic systems in corn. A. Fazelahmad, K. Downey, J. Schultz, R. W. Voellmy, Hrsg. Advances in Gene Technology: Molecular Genetics of Plants and Animals. Miami Winter Symposium Series, Bd. 20, Academic Press, NY) werden aus unreifen Mais-Embryonen initiiert, die 1,5 bis 2,0 mm in Länge sind, von im Gewächshaus gewachsenen Material. Die Embryos werden aseptisch aus den Oberflächen-sterilisierten Kolben ungefähr 14 Tage nach Bestäubung herausgeschnitten. Die Embryos werden auf D-Kallus-Initiationsmedium (Duncan et al. (1985), Plants 165: S. 322–332) mit 2% Saccharose und 5 mg/l Chloramben gesetzt. Die Embryos und embryogenen Kulturen werden anschließend im Dunkeln kultiviert. Die embryogenen Reaktionen werden von den Explantaten nach etwa 14 Tagen herausgeschnitten. Die Reaktionen werden auf D-Kallus-Beibehaltungsmedium mit 2% Saccharose und 0,5 mg/l 2,4-D gesetzt. Nach etwa 6 Wochen einer wöchentlichen selektiven Subkultur in frisches Beibehaltungsmedium werden hochqualitative kompakte embryogene Kulturen gebildet. Aktiv wachsende embryogene Kallus-Stücke werden als Zielgewebe für die Genübertragung ausgewählt. Die Kallus-Stücke werden auf Zielplatten, enthaltend Beibehaltungsmedium mit 12% Saccharose, ca. 4 Stunden vor der Genübertragung gesetzt.

[0122] Die Kallus-Stücke werden in Kreisen angeordnet, mit Durchmessern von 8 und 10 mm ausgehend vom Zentrum der Zielplatte.

[0123] pNOV1700, vorstehend in Beispiel 1 beschrieben, wird mit PvuII und XmnI verdaut und ein Fragment von 4117 bp, umfassend eine Polynukleotidregion mit einer Sequenz gemäß der SEQ ID NO: 1 sowie einen Promotor und ein Polyadenylierungssignal, wird isoliert. pCIB9818, ebenfalls vorstehend in Beispiel 1 beschrieben, wird mit AscI verdaut und das Fragment von 4246 bp, umfassend das Marker-Gen, den Promotor und das Terminationssignal, wird isoliert. Die isolierten DNA-Fragmente werden auf einen Gold-Mikroträger, wie in dem Biolistics-Handbuch von DuPont beschrieben, präzipitiert. 2 bis 3 µg jedes Plasmidkonstrukts wird in jeder der 6 Schußmikroträger ("shot microcarrier")-Zubereitungen verwendet. Die Polynukleotide der Erfin-

ung werden unter Verwendung der PDS-1000He-Biolistic-Vorrichtung in die Ziel-Gewebezelle übertragen. Die Einstellungen der Biolistic-Vorrichtungen sind wie folgt: 8 mm zwischen der Berstscheibe und dem Makroträger, 10 mm zwischen dem Makroträger und dem Sperrfilter und 7 cm zwischen dem Sperrfilter und dem Ziel. Jede Zielplatte wird zweimal unter Verwendung von Berstscheiben bei 4,482 mPa (650 psi) beschossen. Ein 200 × 200-Siebgewebe aus rostfreiem Stahl (McMaster-Carr, New Brunswick, NJ) wird zwischen den Sperrfilter und dem Zielgewebe plziert. 7 Tage nach der Genübertragung werden die Zielgewebestücke aus dem hochosmotischen Medium in ein Selektionsmedium überführt.

[0124] Das Zielgewebe wird auf ein Beibehaltungsmedium gesetzt, das keine Saccharose und 1% Mannose enthält. Nach 3 bis 5 Wochen werden die wachsenden Kallus-Stücke zum Beibehaltungsmedium subkultiviert, das keine Saccharose und 1,5% Mannose enthält. Der embryogene Kallus, der auf dem Selektionsmedium wächst, wird alle zwei Wochen für 6 bis 10 Wochen subkultiviert, bis genug Kallus produziert wird, um 10 bis 20 Pflanzen zu erzeugen. Gewebe, das ausgehend vom ursprünglichen Zielgewebestück die Selektion überlebt, wird als eine Einzelkolonie subkultiviert und als ein unabhängiges Transformationsereignis bestimmt. Kolonien werden in ein modifiziertes MS-Medium (Murashige und Skoog, 1962 (1962), A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant* 15: 473–497) überführt, das 2% Saccharose und 1% Mannose (MS2S + 1M) mit 0,25 mg/l Ancyimidol und 0,5 mg/l Kinetin enthält. Nach 2 Wochen werden die regenerierten Kolonien dann in MS2S + 1M ohne Hormone überführt. Die regenerierten Sprößlinge mit oder ohne Wurzeln aller Kolonien werden in Magentakisten überführt, die MS3S-Medium enthalten, und kleine Pflanzen mit Wurzeln werden gewonnen und in Erdboden im Gewächshaus überführt.

Beispiel 5: Analysen der transgenen Pflanzenexpression

[0125] Gewebe aus transformierten Pflanzen wird auf Gegenwart eines Polynukleotids analysiert, das die Sequenz von SEQ ID NO: 1 umfaßt. DNA wird aus transformierten Pflanzen extrahiert, und PCR-Analysen werden gemäß Standardprotokollen durchgeführt. Die für die Amplifikation der Genkonstrukte verwendeten Primer sind (5'-acgaatcattcaccgaggag-3') (SEQ ID NO: 3) und (5'-ctcacactctcaggcttacc-3') (SEQ ID NO: 4). Ein 650 nt-Fragment innerhalb der Sequenz von SEQ ID NO: 1 in Weizen, erhalten gemäß dem obigen Beispiel 2, wird detektiert.

b. Northern-Analyse

[0126] Transformierte Pflanzen werden auf Gegenwart von RNA durch Northern-Blot-Hybridisierung analysiert. Für die Northern-Blot-Analyse wird aus Pflanzengewebe extrahierte RNA nach Größe getrennt und auf eine Nylon-Membran getüpfelt. Diese Membran wird anschließend mit einer radioaktiven Sonde hybridisiert, die aus dem 429 nt Styl-Fragment des Polynukleotids gemäß SEQ ID NO: 1 abgeleitet ist. RNA wird in Weizenpflanzen und Arabidopsis-Pflanzen detektiert, die gemäß den obigen Beispielen 2 und 3 transformiert wurden.

Beispiel 6: Enzymatischer Test auf Trichothecen-3-O-acetyltransferase-Aktivität.

(a) Extraktion von Pflanzengewebe für Enzymtests:

[0127] Drei Blattstücke mit 1 × 3,175 mm (1/8 in) (ca. 50 mg) aus transgenen Pflanzen der Erfindung und wie hier beschrieben, einschließlich derjenigen, die gemäß den obigen Beispielen 2–4 transformiert und regeneriert wurden, werden ausgewählt.

(b) Glasperlenmühle:

[0128] Gewebe wird in ein rundbödiges 2 ml-Reagenzglas gegeben und der Deckel geschlossen. Das Reagenzglas wird in flüssigen Stickstoff getaucht und über Nacht bei –80°C inkubiert. Das Reagenzglas wird auf Saws-all 24 Sekunden geschüttelt, und 0,4 ml Natriumphosphatpuffer werden hinzugegeben. Das Reagenzglas wird für ca. 10 Sekunden verwirbelt und auf Eis gestellt. Das Reagenzglas wird für weitere 5 Minuten verwirbelt und dann mit 14.000 U/min in einer Eppendorf-Zentrifuge für 5 min zentrifugiert. Der Überstand wird entfernt und in ein sauberes Reagenzglas gegeben.

[0129] Die folgenden Komponenten werden vermischt:

Trichothecensubstrat, 2 µl DAS (20% Aceton in 50 mM Natriumphosphatpuffer pH 7,0). DON kann auch verwendet werden.

Acetyl-CoA-Substrat, 2 µl [¹⁴C]-Acetyl-CoA, NEN-Katalog # NEC313 (60 mCi/mmol und 0,02 mCi/ml)

Puffer auf ein Endvolumen von 50 µl mit Natriumphosphatpuffer, pH 7,0.

Der Test wird durch Zugabe der folgenden Enzymzubereitung eingeleitet und bei 30°C für 15 Minuten inkubiert. Enzymzubereitung, 10 µl Pflanzenextrakt in Natriumphosphatpuffer, pH 7.0.

[0130] Nach 15 Minuten werden 100 µl Ethylacetat hinzugegeben, und das Reagenzglas wird zweimal für mehrere Sekunden verwirbelt. Das Reagenzglas wird für 2 Minuten bei 14.000 U/min in einer Eppendorf-Zentrifuge zentrifugiert. 50 µl der Ethylacetatphase werden entfernt und in ein Fläschchen gegeben, das eine Szintillationsmischung enthält. Das Reagenzglas wird für 2 min unter Verwendung eines Szintillationszählers gezählt.

[0131] Zwanzig separate Weizenpflanzen, erhalten gemäß dem obigen Beispiel 2 und mit spezifischen Aktivitäten von 0,60 bis 13,4 nmol acetyliertes Produkt/µg Protein/15 min, werden identifiziert. Die spezifischen Aktivitäten in den transformierten Weizenpflanzen sind signifikant größer als die Negativkontrolle. Die Negativkontrolle ist eine nicht-transformierte Weizensorte, die eine spezifische Aktivität von 0,1 bis 0,2 nmol acetyliertes Produkt/µg Protein/15 min hat.

[0132] Fünf separate Arabidopsis-Pflanzen, erhalten gemäß dem obigen Beispiel 2 und mit spezifischen Aktivitäten von 3,8 bis 28 nmol acetyliertes Produkt/µg Protein/15 min, werden identifiziert. Die spezifischen Aktivitäten in den transformierten Pflanzen sind signifikant größer als die Negativkontrolle. Die Negativkontrolle ist eine Arabidopsis thaliana var Colubia, die mit einem Nukleinsäurekonstrukt für die Expression des selektierbaren Markers transformiert ist, die eine spezifische Aktivität von weniger als 0,1 nmol acetyliertes Produkt/µg Protein/15 min hat.

[0133] Maispflanzen von wenigstens zwei unterschiedlichen Transformaten, erhalten gemäß dem obigen Beispiel 4 und mit spezifischen Aktivitäten von 11,1 bis 17,9 nmol acetyliertes Produkt/µg Protein/15 min, werden identifiziert. Die spezifischen Aktivitäten in den transformierten Pflanzen sind signifikant größer als die Negativkontrolle. Die Negativkontrolle ist eine nicht-transformierte Maissorte, die eine spezifische Aktivität von weniger als 0,2 nmol acetyliertes Produkt/µg Protein/15 min hat.

[0134] Maispflanzen von wenigstens 16 verschiedenen Transformanten, erhalten durch Verwendung einer Agrobacterium-vermittelten Transformation von pNOV1704, mit spezifischen Aktivitäten im Bereich von 17 bis 183 µmol/µg/15 min werden identifiziert.

Beispiel 7: Biotest auf Trichotheceenresistenz in transgenen Pflanzen

[0135] 250 ml CPR-Medium mit den folgenden Komponenten wird hergestellt und der pH auf 6,5 mit KOH eingestellt.

1/2 MS-Salze 0,54 g

1/2 MS-Vitamine 1,25 ml

Saccharose 1% (optional) 2,50 g

[0136] Agarose wird zum obigen Medium auf eine Konzentration von 1% hinzugegeben (2,50 g), und das Medium wird autoklaviert. 25 ml von 50 mg/ml Chlorphenolrot werden zum Medium hinzugegeben.

[0137] Während das Medium auf 55°C gehalten wird, wird DAS oder DON in Aceton mit verschiedenen Konzentrationen hinzugegeben (d. h. DON mit 4, 8 oder 16 µl von 10 mg/ml oder DAS mit 2, 4 oder 6 µl von 50 mg/ml DAS auf 1,7 ml). Ca. 0,5 ml Medium werden in jede Vertiefung einer Mikrotiterplatte mit 48 Vertiefungen abgeteilt.

[0138] Stücke von transformiertem Blattgewebe mit 8,467 mm × 3,175 mm (1/3 × 1/8 Zoll) werden zu den Vertiefungen der Mikrotiterplatte sowie Kontrollgewebe aus untransformierten Kontrollen vom Wildtyp gegeben. Man lässt die Blattstücke in eine Petrischale fallen und drückt sie mit Pinzetten in das Medium in den Vertiefungen in der Mikrotiterplatte. Die Mikrotiterplatten werden für 2 bis 4 Tage bei 20°C unter Licht inkubiert. Der Blattstückstoffwechsel führt zu einer Farbveränderung (Abfall des pH) von Rot nach Gelb. Trichotheceenresistenzaktivität oder eine reduzierte Empfindlichkeit für Trichotheceen durch die Transformanten führt zu gelb gefärbten Vertiefungen in Gegenwart von DAS oder DON.

[0139] Eine Farbveränderung von Rot nach Gelb im Vergleich mit der Kontrolle, die rot bleibt, wird in Weizenpflanzen der Erfindung und wie hier beschrieben beobachtet. Außerdem besitzen die individuellen Blattstücke eine signifikant geringere Chlorose als die entsprechende Kontrolle.

Beispiel 8: Keimungstest

A. Trichothecenresistenz-Keimungstest

[0140] Saatgut aus transgenen Pflanzen der Erfindung wird unter Selektionsdruck aus dem Selektionsmittel kultiviert, und die resultierenden Pflanzen werden geselbstet. Das resultierende Saatgut wird auf MS3S-Medium (MS-Salze 4,3 g/l, MS-Vitamine 100X, Saccharose 30 g/l und Phytagar 8 g/l) ausplattiert und mit entweder DAS oder DON (mit 20 mg/ml) in einer Dichte von 1.000 bis 1.200 Samen/Petrischale (100 mm Durchmesser) ergänzt. Nach Inkubation im Licht für 4 Tage werden die Platten auf Sämlingswachstum untersucht.

[0141] Arabidopsis-Saatgut aus Pflanzen, erhalten gemäß dem obigen Beispiel 3 und kultiviert in Medium, das DAS umfaßt, weist zahlreiche Pflanzen auf, mit sowohl Wurzel- als auch Sprößlingsentwicklung. Während Kontrollsaatgut (parentale Arabidopsis-Linie, var. Colubia) schwach keimt und keine Wurzel ausbildet, wenn in DAS-ergänzten Medium kultiviert. Es werden keine Unterschiede zwischen transformierten und Kontrollsaatgut beobachtet, die im gleichen Medium ohne DAS kultiviert werden.

B. Pilzresistenz-Keimungstest zur Detektion von Resistenz gegen Streifenkrankheit ("Seedling Blight")

1. Pilzresistenz-Keimungstest für Weizen:

[0142] Pilzresistenz-Keimungstests in Weizen werden im wesentlichen wie von R. H. Proctor, T. M. Hohn und S. P. McCormick beschrieben durchgeführt (Reduced virulence of *Gibberella zaea* caused by disruption of a trichothecene toxin biosynthetic gene. *Mol. Plant-Microbe Interact.* 8(4): 593–601, 1995).

[0143] Inokulum besteht aus Makrokonidien of *F. graminearum*, verdünnt in Wasser auf 1×10^6 Konidien pro ml. Inokulum wird durch Spülen der Makrokonidien aus V-8-Juice-Agar-Kulturen hergestellt, die unter weißem und nahem UV-Fluoreszenzlicht für 7–10 Tage kultiviert wurden. In Sämlingstests werden Samen aus zwei unterschiedlichen transgenen Weizenereignissen aus dem obigen Beispiel 2 und der Kontrolle vom Wildtyp durch Spülen in einer Lösung mit 10% Bleiche und 0,05% Tween für ca. 15 min oberflächensterilisiert und fünfmal mit sterilem destilliertem Wasser gespült. Die Samen werden in einer Suspension der Makrokonidien für ca. 10 min getränkt und dann in Vermiculit ausgesät, das in 10 cm-Plastiktöpfen enthalten ist (20 Samen pro Topf). Vor dem Aussäen werden die Töpfe zu ca. 3/4 mit Vermiculit gefüllt und in 2–4 cm Wasser gestellt, bis die Oberseite des Vermiculits nass ist. Nach dem Aussäen werden die Samen mit zusätzlichen 1–2 cm Vermiculit bedeckt, und die Töpfe werden individuell in Kunststoffbeutel gestellt und in einer Wachstumskammer bei 22°C mit 16 h Licht und 8 h Dunkelheit für 1 Woche inkubiert. Nach etwa 1 Woche werden die Töpfe aus den Beuteln entfernt, und nach 2 Wochen wird die Krankheit durch Zellen der Anzahl der Sämlinge ausgewertet, die in jedem Topf aufgehen. Kontrollen werden wie oben beschrieben behandelt, außer daß die Samen in sterilem Wasser getränkt werden und 40 Samen verwendet werden.

[0144] 50% und 43% des Saatguts aus den zwei unterschiedlichen transgenen Pflanzenereignissen keimen im Vergleich mit dem gleichen transgenen Saatgut, das mit Wasser behandelt wurde, wohingegen 17% der Kontrolle vom Wildtyp im Vergleich mit dem gleichen Saatgut keimen, das mit Wasser behandelt wurde.

2. Pilzresistenz-Keimungstest für Mais:

[0145] Ein Inokulum wird aus *F. graminearum*-Kulturen, kultiviert auf Mung-Bohnen-Agar (hergestellt aus Flüssigkeit von gekochten Mung-Bohnen) unter über 12 h wechselnden Licht- und Dunkelheits-Zyklen bei 25°C, hergestellt. Sporen werden zunächst durch Überschwemmen der Platte mit sterilem Wasser und dann durch Schaben der Platte unter Verwendung eines Glasstabs geerntet. Die Lösung wird gesammelt und die Sporenkonzentration auf 1×10^6 Sporen/ml mit 2-fach destilliertem sterilem Wasser ab dem Tag der Animpfung eingestellt.

[0146] Erdboden, bestehend aus einem sterilisierten Gemisch aus Erdboden, Torf und Vermikulit, wird mit 1 ml an Spurenlösung pro Liter Erdboden in 5 l-Sandbänke angeimpft, und der angeimpfte Erdboden wird in einem Zementmischer für 2 Minuten pro Ladung gemischt. Die Kontrollbehandlungen bestehen aus nicht-befallenem Erdboden. Die Sandbänke werden jeweils mit 30 Körnern des erfindungsgemäßen transgenen Saatguts oder mit Wildtypkontrolle bepflanzt und in Gewächskammern inkubiert, gehalten unter halbgesättigten Erdbodenbedingungen bei 12,8°C (55°F) für bis zu 4 Wochen. Die Lichtmengen sind unter 24 Stunden Dunkelheit für 14 Tage nach Pflanzung und 12 Stunden Licht 15 bis 24 Tage nach Pflanzung. Markierte Stangen werden zu den Sandbänken gegeben, und die Sandbänke werden in die Gewächskammer umgesetzt und randomi-

siert.

[0147] Die Pflanzenzählungen werden intiiert sobald das Hervortreten beginnt und werden täglich oder alle zwei Tage durchgeführt, bis es keine weitere Änderung im Pflanzenhervortreten gibt.

[0148] Symptome von visueller Verfärbung und Umfallkrankheit (damping-off) des Keimlingauswuchses werden bestimmt und zum Charakterisieren des Grads der Pflanzenresistenz im Vergleich zu den Wildtypkontrollen verwendet. Pflanzen mit weniger visueller Verfärbung und/oder Umfallkrankheit des Keimlingauswuchses als die Wildtypkontrolle werden ausgewählt.

Beispiel 9: Pilzresistenztest

A. Untersuchung von transgenen Weizenpflanzen

[0149] Weizen-Weißährigkeit ("head blight", "head scab") wird durch *Fusarium graminearum* verursacht (Teleomorph: *Gibberella zeae*). *F. graminearum*-Kulturen werden auf V-8-Agar-Medium, hergestellt mit V-8-Juice) oder auf Mungbohnenagar (hergestellt mit Flüssigkeit aus gekochten Mungbohnen) unter 12-stündigen abwechselnden Hell-/Dunkel-Zyklen bei 25°C kultiviert. Sporen werden geerntet, indem zuerst die Platte mit sterilem Wasser geflutet und dann die Platte unter Verwendung eines Glasstabs abgeschabt wird. Die Lösung wird aufgefangen und die Sporenkonzentration auf 5×10^4 Sporen/ml mit doppelt destilliertem, sterilem Wasser am Tag der Inkubation eingestellt.

[0150] Transgene Pflanzen werden wie im obigen Beispiel 2 beschrieben erhalten, und Kontrollpflanzen können im Gewächshaus bis zur Blütezeit oder Ährenbildung kultiviert werden. Ähren werden durch Injizieren von ca. 20 µl (ca. 1.000 Sporen) Inokulum zwischen das Lemma und die Palea einer Blüte nahe der Mitte der Ähre beimpft. Einige Ähren werden unbeimpft belassen oder werden mit sterilem Wasser als Kontrollen beimpft. Die Pflanzen werden dann in eine Wachstumskammer gebracht und unter hoher Feuchtigkeit für bis zu 21 Tage inkubiert, oder Pflanzen werden zuerst in einer Nebelkammer für 72 h bei 18,3 bis 21,1°C (65 bis 70°F) inkubiert und dann im Gewächshaus für weitere 18 Tage inkubiert.

[0151] Transgene Pflanzen der Erfindung und wie hier beschrieben und Kontrollpflanzen können auch auf dem Feld kultiviert werden, wo die Ähren durch Besprühen beimpft werden.

[0152] Die Krankheit wird durch Zählen der Anzahl von symptomatischen und asymptomatischen Ährchen auf jeder beimpften Ähre auf einer repräsentativen Anzahl von transgenen Ähren und Kontrollähren vom Wildtyp und daraus durch Berechnung des Prozentanteils von Ährchen auf jeder Ähre, die symptomatisch sind, ausgewertet. Symptome bestehend aus einem verfrühten Weißwerden im Vergleich mit den Kontrollpflanzen und in manchen Fällen in der Nekrose von Ährchen. Pflanzen mit weniger symptomatischen Ährchen als die Kontrolle vom Wildtyp werden selektiert.

[0153] Sechs unterschiedliche transgene Pflanzen mit unterschiedlichen Kopiezahlen von SEQ ID NO: 1 und unterschiedlichen Zahlen von Insertionsorten gemäß Southern-Daten haben einen durchschnittlichen Prozentwert von symptomatischen Ährchen pro Ähre im Bereich von 10,40% bis 31,20% im Vergleich mit 44,75% für die Kontrolle vom Wildtyp, wenn die transgenen Pflanzen und Kontrollen im Gewächshaus, wie oben beschrieben, inkubiert werden. Die gleichen transgenen Pflanzen haben enzymatische Aktivitäten, gemessen wie im obigen Beispiel 6 beschrieben, im Bereich von 0,874 bis 29,1 nmol/µg/15 min.

B. Testen der transgenen Maispflanzen

Test auf Maisährenverwesung

[0154] Getreideährenverwesung wird durch *Fusarium graminearum* (teleomorph: *Gibberella zeae*) verursacht. *F. graminearum*-Kulturen werden auf V-8-Agarmedium (hergestellt mit V-8-Saft) unter 12-stündigem Wechsel von Licht- und Dunkelheitszyklen bei 25°C kultiviert. Sporen werden zunächst durch Überschwemmen der Platten mit sterilem Wasser und dann durch Schaben der Platten mit einem Glasstab geerntet. Die Lösung wird gesammelt und die Sporenkonzentration auf 5×10^5 Sporen/ml mit zweifach destilliertem sterilem Wasser am Tag der Animpfung eingestellt. Die transgenen Pflanzen und Kontrollpflanzen werden im Gewächshaus oder auf dem Feld gezüchtet. Bei Züchtung im Gewächshaus verbleiben die transgenen und Kontrollpflanzen im Gewächshaus 4 bis 7 Tage nach Seidenauswuchs, wenn eine 2 ml-Sporensuspension in den Seidenkanal (innerhalb der Schotenhülle und oberhalb des Kolbens) eingeführt wird. Dies wird unter Verwendung

einer hyperdermischen 18-Gauge-Nadel aus rostfreiem Stahl, die mit einer großen Spritze verbunden ist, erreicht. Zusätzlich zur Seidenkanalanimpfung wird das Kornanimpfungsverfahren verwendet, um Krankheitsresistenz zu testen. Die Kornanimpfung beinhaltet das Einführen der Sporensuspension (ca. 0,4 ml) in einer Gruppe von vier Körnern durch mehrfache Injektion mit einer 18-Gaugenadel, die mit einer Spritze verbunden ist. Die Erkrankung wird durch visuelle Inspektion der Ähren, die 5 bis 7 Wochen nach Animpfung geerntet werden, auf sichtlich infizierte Körner beurteilt. Die Beurteilungsskala der Krankheit für Ähren mit einer Hülse basiert auf einer visuellen Schätzung des Prozentsatzes an sichtlich infizierten Körnern auf einer Ähre wie folgt: 1 ist 0%; 2 ist 1 bis 3%; 3 ist 4 bis 10%, 4 ist 11 bis 25%; 5 ist 26 bis 50%, 6 ist 51 bis 75%; 7 ist 76 bis 100%. Maispflanzen werden ausgewählt, die einen niedrigen Prozentsatz an sichtlich infizierten Körnern aufweisen im Vergleich zur Wildtypkontrolle.

Beispiel 10: Mykotoxin-Kontaminationstest

[0155] Proben werden zur Mykotoxin-Konzentrationsanalyse wie folgt hergestellt. Saatgut wird aus transgenen Pflanzen der Erfindung und wie hier beschrieben gesammelt, gewogen und vereinigt. Wenn Weizensaatgut getestet wird, wird Weizensaatgut aus den Ähren der gleichen transgenen Pflanzen der Erfindung und wie hier beschrieben gesammelt und gewogen und vereinigt. Wenn transgener Mais untersucht wird, werden Maiskolben auf ein niedriges Feuchtigkeitsniveau getrocknet, die von Hand geschält und die Körner von den Kolben der gleichen transgenen Pflanze gewonnen und zusammengegeben. Jede Saatgut- oder Körnerprobe wird sorgfältig zur Unterstützung einer zufälligen Verteilung des Saatguts vermischt. Eine Saatgut- oder Körnerprobe von 50 g wird zu einem feinen Pulver in einer Mühle gemahlen (z. B. Retsch Ultrazentrifugenmühle, Typ ZM1, Brinkman Instruments, Inc., Rexdale, Ontario, Romer Series II Mill, Union, Missouri, USA). Die Konzentration des Mykotoxins von Interesse, wie z. B. DON, wird dann unter Verwendung der handelsüblichen Tests, wie DONtest TAG™ Mykotoxin-Testsystem (VICAM, LP, 313 Pleasant Street, Watertown, MA 02472), bestimmt oder durch eine kommerzielle Analysenfirma analysiert (z. B. Romer Labs, Inc., Union, Missouri, USA oder Trilogy Analytical Laboratory, Inc., Beaufort, Missouri, USA). Die Herstelleranleitungen werden für alle Aspekte der Analyse befolgt. Für das DONtest TAG™ Mykotoxin-Testsystem wird eine letzte fluorometrische Messung für DON durchgeführt. Pflanzen, die Saatgut mit weniger Mykotoxin, wie DON, als die Kontrolle vom Wildtyp erzeugen, werden selektiert.

Beispiel 11: Verwendung eines Polynukleotids gemäß SEQ ID.NO: 1 als einen selektierbarer Marker

A. Selektierbarer Marker in Pilzzellen

[0156] *Ashbya gossypi* wird unter Verwendung von Standard-Pilztransformationstechniken mit einem DNA-Konstrukt, das ein Polynukleotid mit der Sequenz SEQ ID NO: 1 funktionsfähig verbunden mit dem Galactosidase-Promotor umfaßt, transformiert. Transformierte Zellen wachsen in einem Medium, das DAS bei einer Konzentration im Bereich von 1,56 ng/ml bis 196 pg/ml umfaßt, während die untransformierten Wildtyp-Pilzzellen dies nicht tun.

Selektierbarer Marker in Pflanzenzellen

[0157] Saatgut von Arabidopsis-Pflanzen, die gemäß dem obigen Beispiel 3 transformiert sind, jedoch noch nicht einer Selektion unterzogen wurden, werden in einem 0,1%igen Agarosemedium, enthaltend 0, 5 oder 10 µg/ml DAS, ausplattiert. Nach Inkubation in einem Gewächshaus bei 22°C mit 16 h Licht und 8 h Dunkelheit für 2 Wochen werden die größeren nicht verstümmelten Pflanzen von einer DAS-Platte und eine entsprechende Anzahl wird von der Kontrollplatte verpflanzt.

[0158] Blätter der Arabidopsis-Pflanzen, die von der 5 µg/ml-Platte verpflanzt werden, werden auf enzymatische Aktivität nach einem zweiwöchigen Wachstumszeitraum untersucht, und es ist gezeigt, daß 11 von 11 unverstümmelten Pflanzen enzymatisch aktiv waren, wie durch Beispiel 6 gemessen, während 9 von 10 Pflanzen, die nicht durch DAS selektiert waren, negativ im gleichen Test waren. Die eine nicht-selektierte Pflanze, die enzymatisch aktiv war, war weitaus weniger aktiv als jede der DAS-selektierten getesteten Pflanzen.

[0159] Die oben offenbarten Ausführungsformen sind illustrativ.

SEQUENZPROTOKOLL

<110> Hohn, T.
 Salmeron, J.
 Peters, C.
 Kendra, D.
 Reinders, J.
 Kuznia, R.
 Dill-Mackey, R.

<120> Transgene Pflanze und Verfahren

<130> Sequenzliste

<140>
 <141>

<160> 11

<170> PatentIn Vers. 2.0

<210> 1
 <211> 1403
 <212> DNA
 <213> Fusarium sporotrichioides

<400> 1

```

atcaaaatgg ccgcaacaag cagcacaage agccagtctt ttgacataga gctcgcacatc 60
atcggccagc aaccgcctct tctttcaatc tacaccagcaga tcagtctcgt ttaccccgcgc 120
tctgatccct cccagtatcc caccatcgtc agcacccttg aggaaggcct aaaacgcctc 180
tctcaaacct tcccattgggt cgcggggccag gtcaagaccg agggcatcag cgaaggaaac 240
acaggaactt ccaagatcat tccatattgag gagacacccc gtcttctgtgtt gaaagacctc 300
cgtgatgatt cctcagcgc cccatattgag ggggttgagaa aggcggggtt ccccttagag 360
atgtttgacg agaacgtcgt cgtcccgagg aagacattag ctatcggacc tggcaatggc 420
cccaacgacc cgaagcctgt gttgctattg cagctcaact tcattaaggg cggactcatt 480
ctcaccgtca acggacaaca tgggtctatg gacatgacag gacaagatgc aattattcgt 540
cttctctcca aggcgtgccc caacgaatca ttcaccgagg aggaaatctc ggccatgaac 600
ctcgatcgca agacggtagt ccctctcctt gaaaactaca aagttgggtc tgagctagac 660
caccagatcg ccaaacctgc gcctgctggc gacgctccac cgcaccggc caaggcaagc 720
tgggcgttct tttcattcac tcccaggcc ctctcggagc tgaaagacgc agccacaaag 780
actcttgacg cgtcgtccaa gtttgtgtca actgatgatg ctctttcggc gtttatctgg 840
caatcaacct cgcgcgtacg tctcgcaaga ttggatgctt ccacacctac tgaattctgc 900
cgcgctgtcg acatgcgggg cccaatgggc gtatcaagca cataccagc ccttcttcaa 960
aacatgacct accatgactc gaccgtcgcc gaaatcgcca acgaaccact tggcgcaaca 1020
gcatcacgcc tgcgctcgga actcaacagt gatcgtttgc gcagacgaac acaagctttg 1080
gcgacgtaca tgcattggcct gcctgacaag tcgagcgtct ccctgaccgc cgatgcgaat 1140
ccgtcaagca gcatcatgct gagttcctgg gccaaagggtg gatgctggga gtatgacttt 1200
ggggtttggac tgggtaagcc tgagagtgtg agaagacctc gctttgaacc ttttgagagt 1260
ttgatgtact ttatgccccaa gaagcctgat ggggagttta cggcgtecat ttctctgagg 1320
gatgaggata tggagagact aaaggcggat gaggagtggg caaagtacgc aaagtatatt 1380
gggtagatag tttactagac tac 1403

```

<210> 2
 <211> 459
 <212> PRT
 <213> *Fusarium sporotrichioides*

<400> 2

Met Ala Ala Thr Ser Ser Thr Ser Ser Gln Ser Phe Asp Ile Glu Leu
 1 5 10 15
 Asp Ile Ile Gly Gln Gln Pro Pro Leu Leu Ser Ile Tyr Thr Gln Ile
 20 25 30
 Ser Leu Val Tyr Pro Val Ser Asp Pro Ser Gln Tyr Pro Thr Ile Val
 35 40 45
 Ser Thr Leu Glu Glu Gly Leu Lys Arg Leu Ser Gln Thr Phe Pro Trp
 50 55 60
 Val Ala Gly Gln Val Lys Thr Glu Gly Ile Ser Glu Gly Asn Thr Gly
 65 70 75 80
 Thr Ser Lys Ile Ile Pro Tyr Glu Glu Thr Pro Arg Leu Val Val Lys
 85 90 95
 Asp Leu Arg Asp Asp Ser Ser Ala Pro Thr Ile Glu Gly Leu Arg Lys
 100 105 110
 Ala Gly Phe Pro Leu Glu Met Phe Asp Glu Asn Val Val Ala Pro Arg
 115 120 125
 Lys Thr Leu Ala Ile Gly Pro Gly Asn Gly Pro Asn Asp Pro Lys Pro
 130 135 140
 Val Leu Leu Leu Gln Leu Asn Phe Ile Lys Gly Gly Leu Ile Leu Thr
 145 150 155 160
 Val Asn Gly Gln His Gly Ala Met Asp Met Thr Gly Gln Asp Ala Ile
 165 170 175
 Ile Arg Leu Leu Ser Lys Ala Cys Arg Asn Glu Ser Phe Thr Glu Glu
 180 185 190
 Glu Ile Ser Ala Met Asn Leu Asp Arg Lys Thr Val Val Pro Leu Leu
 195 200 205
 Glu Asn Tyr Lys Val Gly Pro Glu Leu Asp His Gln Ile Ala Lys Pro
 210 215 220
 Ala Pro Ala Gly Asp Ala Pro Pro Ala Pro Ala Lys Ala Ser Trp Ala
 225 230 235 240
 Phe Phe Ser Phe Thr Pro Lys Ala Leu Ser Glu Leu Lys Asp Ala Ala
 245 250 255
 Thr Lys Thr Leu Asp Ala Ser Ser Lys Phe Val Ser Thr Asp Asp Ala
 260 265 270

Leu Ser Ala Phe Ile Trp Gln Ser Thr Ser Arg Val Arg Leu Ala Arg
 275 280 285
 Leu Asp Ala Ser Thr Pro Thr Glu Phe Cys Arg Ala Val Asp Met Arg
 290 300
 Gly Pro Met Gly Val Ser Ser Thr Tyr Pro Gly Leu Leu Gln Asn Met
 305 310 315 320
 Thr Tyr His Asp Ser Thr Val Ala Glu Ile Ala Asn Glu Pro Leu Gly
 325 330 335
 Ala Thr Ala Ser Arg Leu Arg Ser Glu Leu Asn Ser Asp Arg Leu Arg
 340 345 350
 Arg Arg Thr Gln Ala Leu Ala Thr Tyr Met His Gly Leu Pro Asp Lys
 355 360 365
 Ser Ser Val Ser Leu Thr Ala Asp Ala Asn Pro Ser Ser Ser Ile Met
 370 375 380
 Leu Ser Ser Trp Ala Lys Val Gly Cys Trp Glu Tyr Asp Phe Gly Phe
 385 390 395 400
 Gly Leu Gly Lys Pro Glu Ser Val Arg Arg Pro Arg Phe Glu Pro Phe
 405 410 415
 Glu Ser Leu Met Tyr Phe Met Pro Lys Lys Pro Asp Gly Glu Phe Thr
 420 425 430
 Ala Ser Ile Ser Leu Arg Asp Glu Asp Met Glu Arg Leu Lys Ala Asp
 435 440 445
 Glu Glu Trp Thr Lys Tyr Ala Lys Tyr Ile Gly
 450 455

<210> 3
 <211> 20
 <212> DNA
 <213> Künstliche Sequenz

<220>
 <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: DNA-Primer
 <400> 3
 acgaatcatt caccgaggag

20

<210> 4
 <211> 20
 <212> DNA
 <213> Künstliche Sequenz

<220>
 <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: DNA-Primer
 <400> 4
 ctcacactct caggcttacc

20

<210> 5
 <211> 1356
 <212> DNA
 <213> Fusarium graminearum

<400> 5

```

atggctttca agatacagct cgacaccctc ggccagctac caggcctcct ttgatctac 60
accCAAatca gtctecteta ccccgTctct gattcctctc aatatccac tattgtcagc 120
accttcgagc aaggTcttaa gcgcttctcc gaagccgtcc catgggtcgc aggccaggtc 180
aaagccgagg gcattagcga gggaaacaca ggaacttctt ttatcgtccc ttttgaggac 240
gttctctcgtg ttgtagttaa agacctccgc gatgatcctt cagcgccac gatcgagggt 300
atgagaaagg cgggataccg tatggcgatg ttgacgaga acatcatcgc gccaaggaag 360
acgttaccta ttggacctgg tactggTccc gacgacccaa agcctgtaat tctattgcag 420
ctcaacttca tcaagggcgg actcatcctc actgtcaacg gacagcacgg tgctatggat 480
atggtagggc aagatgcggt gatccgtcta ctctccaagg cgtgccgtaa cgacccattc 540
accgaagagg aaatgacggc catgaacctc gatcgcaaga cgatagtcc ttacctgaa 600
aactatacga ttggccccga ggtagatcat cagattgtca aagctgatgt agctggTggt 660
gacgctgttc tcacgccggt cagtgaacg tgggcgttct tcacattcag cccaaggcc 720
atgtcagagc tcaaggatgc tgctaccaag actcttgacg catcaacaaa gtTcgtgtcg 780
actgacgatg ctctttcggc gtTcatctgg aaatcggcct ctcgcgTgcg tctcgaaaga 840
atcgatggct ctgcacctac cgagTtctgc cgtgctgTtg atgctcgacc ggcaatgggt 900
gtctcgaaca actaccagg ccttcttcaa aacatgacct accacaactc gaccatcggc 960
gaaatcgcca acgagTcact cggcgcaaca gcatcacgcc ttcgttcaga actcgaccc 1020
tccagcatgc gccagcgaac aagaggTctc gcgacgtacc tgcacaacaa ccccgacaag 1080
tccaacgtat ccctgacggc tgatgcggac ccatctacca gcgtcatgct gagTtctTtg 1140
gccaagTgg gactctggga ttacgacttt gggctcggac tgggtaagcc cgagactgtg 1200
agacggccaa tctttgagcc tgttgagagc ttgatgtact ttatgcccaa gaagcctgat 1260
ggcgagTtct gtgcggcgct ttctctgagg gatgaggata tggaccgatt gaaggcggat 1320
aaggagtgga ccaagtatgc gcagtacgtt ggTtag 1356

```

<210> 6

<211> 451

<212> PRT

<213> *Fusarium graminearum*

<400> 6

```

Met Ala Phe Lys Ile Gln Leu Asp Thr Leu Gly Gln Leu Pro Gly Leu
 1                    5                    10                    15

Leu Ser Ile Tyr Thr Gln Ile Ser Leu Leu Tyr Pro Val Ser Asp Ser
                20                    25                    30

Ser Gln Tyr Pro Thr Ile Val Ser Thr Phe Glu Gln Gly Leu Lys Arg
                35                    40                    45

Phe Ser Glu Ala Val Pro Trp Val Ala Gly Gln Val Lys Ala Glu Gly
 50                    55                    60

Ile Ser Glu Gly Asn Thr Gly Thr Ser Phe Ile Val Pro Phe Glu Asp
 65                    70                    75                    80

Val Pro Arg Val Val Val Lys Asp Leu Arg Asp Asp Pro Ser Ala Pro
                85                    90                    95

```

Thr Ile Glu Gly Met Arg Lys Ala Gly Tyr Pro Met Ala Met Phe Asp
 100 105 110
 Glu Asn Ile Ile Ala Pro Arg Lys Thr Leu Pro Ile Gly Pro Gly Thr
 115 120 125
 Gly Pro Asp Asp Pro Lys Pro Val Ile Leu Leu Gln Leu Asn Phe Ile
 130 135 140
 Lys Gly Gly Leu Ile Leu Thr Val Asn Gly Gln His Gly Ala Met Asp
 145 150 155 160
 Met Val Gly Gln Asp Ala Val Ile Arg Leu Leu Ser Lys Ala Cys Arg
 165 170 175
 Asn Asp Pro Phe Thr Glu Glu Glu Met Thr Ala Met Asn Leu Asp Arg
 180 185 190
 Lys Thr Ile Val Pro Tyr Leu Glu Asn Tyr Thr Ile Gly Pro Glu Val
 195 200 205
 Asp His Gln Ile Val Lys Ala Asp Val Ala Gly Gly Asp Ala Val Leu
 210 215 220
 Thr Pro Val Ser Ala Ser Trp Ala Phe Phe Thr Phe Ser Pro Lys Ala
 225 230 235 240
 Met Ser Glu Leu Lys Asp Ala Ala Thr Lys Thr Leu Asp Ala Ser Thr
 245 250 255
 Lys Phe Val Ser Thr Asp Asp Ala Leu Ser Ala Phe Ile Trp Lys Ser
 260 265 270
 Ala Ser Arg Val Arg Leu Glu Arg Ile Asp Gly Ser Ala Pro Thr Glu
 275 280 285
 Phe Cys Arg Ala Val Asp Ala Arg Pro Ala Met Gly Val Ser Asn Asn
 290 295 300
 Tyr Pro Gly Leu Leu Gln Asn Met Thr Tyr His Asn Ser Thr Ile Gly
 305 310 315 320
 Glu Ile Ala Asn Glu Ser Leu Gly Ala Thr Ala Ser Arg Leu Arg Ser
 325 330 335
 Glu Leu Asp Pro Ala Ser Met Arg Gln Arg Thr Arg Gly Leu Ala Thr
 340 345 350
 Tyr Leu His Asn Asn Pro Asp Lys Ser Asn Val Ser Leu Thr Ala Asp
 355 360 365
 Ala Asp Pro Ser Thr Ser Val Met Leu Ser Ser Trp Ala Lys Val Gly
 370 375 380
 Leu Trp Asp Tyr Asp Phe Gly Leu Gly Leu Gly Lys Pro Glu Thr Val
 385 390 395 400
 Arg Arg Pro Ile Phe Glu Pro Val Glu Ser Leu Met Tyr Phe Met Pro
 405 410 415
 Lys Lys Pro Asp Gly Glu Phe Cys Ala Ala Leu Ser Leu Arg Asp Glu
 420 425 430
 Asp Met Asp Arg Leu Lys Ala Asp Lys Glu Trp Thr Lys Tyr Ala Gln
 435 440 445
 Tyr Val Gly
 450

<210> 7
 <211> 1425
 <212> DNA
 <213> Saccharomyces cerevisiae
 <400> 7

```

atgttttagag tcaagatcat ctctcagaaa cgtacaaaaa gtgtacagat gctagaaaaac 60
gatcaacttg atatthtggg acaacaacct tgcctataca aactatacac tcaaatatgc 120
tctatctacc gtgtaccaga tcttctgct catgaccata tcgtaaatac cttacaaga 180
ggacttgaaa cattggctaa aaatttccag tggctagcag gaaatgtcgt aaatgaaggt 240
gctgacgaag gtaacactgg tacctacaga attgtcccgt cagacaaaat tccacttate 300
gtccaagatc ttcgagaaga tctgtctgcc ccaacaatgg attegcttga aaaagctgac 360
tttcctatct acatgttaga cgaaaagact tttgcgctt gcatgactat caatccacct 420

ggaaacacta taggtatggc cgccaagagt gggcctgtat ttgcagttca agcaaacttt 480
atctccggcg gcctcgtctt aactattgtc gggcagcaca atattatgga tataacagga 540
caggaaagta tcatcaactt gctcaataaa tcttgccacc aaaaaccttt ctctgatgaa 600
gaactgctca ttggaaatat agataaaagc aaatctatc ctttgtttga tgaacttgg 660
gaaccgcaca ccacgctagt tcatgaaata gtggaaacct ctagaatac aagtggagag 720
gaaaaggaac agtcttgttc ttcgaactct acttgggctt atgttgaatt ttctgctatc 780
tcattgcaga atctgaggat tttggcaatg cagacatgta cttctggcac aaaatttgtc 840
tccactgatg atatcgtcac tgctttcatc tggaaatcag tttctcgagc ccgtttatct 900
cgacttaaac cagaaacgaa atcaaattta gggcgtgctg tggatgtag aaaacggcta 960
ggactccccg aaacgtatcc agggttatta gtcaacatga ctttaatac aggttccctg 1020
aaaagcttgg atcataaaag tttgggctt cttgcatcac agattcgcag gaagctagac 1080
cctaaagtct tcgatttggc ctataataca tgcgcacttg ctacgctcct tagccgatgc 1140
ccggacaaga ctaaggttcc tataacctca ccaattgata ctttatctgg aattatggtc 1200
agttcgtggg caaaagtcag cctgtatgac gttgatttca atctagggct tgggaagccc 1260
aagagtgtac gacggccgag cttcatttcc cttgagagcc taatatattt tatgcctaga 1320
tctccagag gtgaaatggt ggttgctctt tgccttagag ataaagattg ggagtgcctg 1380
aatgcggata aagaatggac aaattatgct acacatatag gatga 1425

```

<210> 8
 <211> 474
 <212> PRT
 <213> Saccharomyces cerevisiae

<400> 8

```

Met Phe Arg Val Lys Ile Ile Ser Gln Lys Arg Thr Lys Ser Val Gln
  1           5           10          15

Met Leu Glu Asn Asp Gln Leu Asp Ile Leu Gly Gln Gln Pro Ser Leu
  20          25          30

Tyr Lys Leu Tyr Thr Gln Ile Cys Ser Ile Tyr Arg Val Pro Asp Pro
  35          40          45

Ser Ala His Asp His Ile Val Asn Thr Leu Thr Arg Gly Leu Glu Thr
  50          55          60

Leu Ala Lys Asn Phe Gln Trp Leu Ala Gly Asn Val Val Asn Glu Gly
  65          70          75          80

Ala Asp Glu Gly Asn Thr Gly Thr Tyr Arg Ile Val Pro Ser Asp Lys
  85          90          95

Ile Pro Leu Ile Val Gln Asp Leu Arg Glu Asp Leu Ser Ala Pro Thr
  100         105         110

Met Asp Ser Leu Glu Lys Ala Asp Phe Pro Ile Tyr Met Leu Asp Glu
  115         120         125

```

Lys Thr Phe Ala Pro Cys Met Thr Ile Asn Pro Pro Gly Asn Thr Ile
 130 135 140
 Gly Met Ala Ala Lys Ser Gly Pro Val Phe Ala Val Gln Ala Asn Phe
 145 150 155 160
 Ile Ser Gly Gly Leu Val Leu Thr Ile Val Gly Gln His Asn Ile Met
 165 170 175
 Asp Ile Thr Gly Gln Glu Ser Ile Ile Asn Leu Leu Asn Lys Ser Cys
 180 185 190
 His Gln Lys Pro Phe Ser Asp Glu Glu Leu Leu Ile Gly Asn Ile Asp
 195 200 205
 Lys Ser Lys Ser Ile Pro Leu Phe Asp Glu Thr Trp Glu Pro Asp Thr
 210 215 220
 Thr Leu Val His Glu Ile Val Glu Thr Ser Arg Asn Thr Ser Gly Glu
 225 230 235 240
 Glu Lys Glu Gln Ser Cys Ser Ser Asn Ser Thr Trp Ala Tyr Val Glu
 245 250 255
 Phe Ser Ala Ile Ser Leu Gln Asn Leu Arg Ile Leu Ala Met Gln Thr
 260 265 270
 Cys Thr Ser Gly Thr Lys Phe Val Ser Thr Asp Asp Ile Val Thr Ala
 275 280 285
 Phe Ile Trp Lys Ser Val Ser Arg Ala Arg Leu Ser Arg Leu Lys Pro
 290 295 300
 Glu Thr Lys Ser Asn Leu Gly Arg Ala Val Asp Val Arg Lys Arg Leu
 305 310 315 320
 Gly Leu Pro Glu Thr Tyr Pro Gly Leu Leu Val Asn Met Thr Phe Asn
 325 330 335
 Thr Gly Ser Leu Lys Ser Leu Asp His Lys Ser Leu Gly Val Leu Ala
 340 345 350
 Ser Gln Ile Arg Arg Lys Leu Asp Pro Lys Val Phe Asp Leu Ala Tyr
 355 360 365
 Asn Thr Cys Ala Leu Ala Thr Leu Leu Ser Arg Cys Pro Asp Lys Thr
 370 375 380
 Lys Val Ser Ile Pro Gln Pro Ile Asp Thr Leu Ser Gly Ile Met Val
 385 390 395 400
 Ser Ser Trp Ala Lys Val Ser Leu Tyr Asp Val Asp Phe Asn Leu Gly
 405 410 415
 Leu Gly Lys Pro Lys Ser Val Arg Arg Pro Arg Phe Ile Ser Leu Glu
 420 425 430
 Ser Leu Ile Tyr Phe Met Pro Arg Ser Ser Arg Gly Glu Met Val Val
 435 440 445

Ala Leu Cys Leu Arg Asp Lys Asp Trp Glu Cys Leu Asn Ala Asp Lys
 450 455 460

Glu Trp Thr Asn Tyr Ala Thr His Ile Gly
 465 470

<210> 9
 <211> 6111
 <212> DNA

<400> 9
 aagcttgcat gcctgcagtg cagcgtgacc cggctcgtgcc cctctctaga gataatgagc 60
 attgcatgtc taagttataa aaaattacca catatTTTTT ttgtcacact tgTTTgaagt 120
 gcagtttatc tatctttata catatatTTT aactttactc tacgaataat ataatctata 180
 gtactacaat aatatacagtg ttttagagaa tcatataaat gaacagttag acatggctca 240
 aaggacaatt gagtattttg acaacaggac tctacagttt tatcttttta gtgtgcatgt 300
 gttctccttt ttttttgcaa atagcttcac ctatataata ctccatccat tttattagta 360
 catccattta gggtttaggg ttaatggttt ttatagacta attttttttag tacatctatt 420
 ttattctatt tttagcctcta aattaagaaa actaaaactc tatttttagtt tttttattta 480
 ataatttaga tataaaatag aataaaataa agtgactaaa aattaaacaa atacccttta 540
 agaaattaaa aaaactaagg aaacatTTTT ctgtttcga gtagataatg ccagcctggt 600
 aaacgcgctc gacgagtcta acggacacca accagcgaac cagcagcgtc gcgtcgggcc 660
 aagcgaagca gacggcacgg catctctgtc gctgcctctg gacctctc gagagttccg 720
 ctccaccggt ggacttgctc cgctgtcggc atccagaaat tgcgtggcgg agcggcagac 780
 gtgagccggc acggcaggcg gcctcctcct cctctcacgg caccggcagc tacgggggat 840
 tectttccca ccgctccttc gctttccctt cctcgcctgc cgtaataaat agacaccccc 900
 tccacacctt ctttcccaaa cctcgtgttg ttoggagcgc acacacacac aaccagatct 960
 cccccaaatc caccctcggc cacctcctct tcaaggtagc ccgctcgtcc tcccccccc 1020
 cccctcteta ccttctctag atcggcgttc cggctccatgg ttaggggccg gtagttctac 1080
 ttctgttcat gtttggtgta gatccgtgtt tgtgttagat ccgtgctgct agcgttcgta 1140
 cacggatgcg acctgtacgt cagacacggt ctgattgcta acttgccagt gtttctcttt 1200
 ggggaatcct gggatggctc tagccgttcc gcagacggga tcgatttcat gatttttttt 1260
 gtttcgttgc atagggtttg gtttgccctt ttcctttatt tcaatatatg ccgtgcactt 1320
 gtttgcgggg tcactctttc atgctttttt ttgtcttggg tgtgatgatg tggctcgggt 1380
 gggcggctcg tctagatcgg agtagaattc tgtttcaaac tacctggtgg atttattaat 1440
 tttggatctg tatgtgtgtg ccatacatat tcatagttac gaattgaaga tgatggatgg 1500
 aaatatcgat ctaggatagg tatacatggt gatgcgggtt ttactgatgc atatacagag 1560
 atgctttttg ttcgcttggg tgtgatgatg tgggtgtggt gggcggctcg tcatcctgctc 1620
 tagatcggag tagaatactg tttcaaacct cctgggtgat ttattaattt tggaaactgta 1680
 tgtgtgtgtc atacatcttc atagttacga gtttaaatg gatggaaata tcgatctagg 1740
 ataggtatac atgttgatgt gggttttact gatgcatata catgatggca tatgcagcat 1800
 ctattcatat gctctaacct tgagtacct tctattataa taacaagta tgttttataa 1860
 ttattttgat cttgatatac ttggatgatg gcatatgcag cagctatatg tggatttttt 1920
 tagccctgcc ttcatacgtc atttatttgc ttggactctg ttcttttgtc gatgctcacc 1980
 ctgttgtttg gtgttacttc tgcagggatc cccgatcatg caaaaactca ttaactcagt 2040
 gcaaaaactat gcctggggca gcaaaaacggc gttgactgaa ctttatggta tggaaaatcc 2100
 gtccagccag ccgatggccg agctgtggat gggcgacat ccgaaaagca gttcacgagt 2160
 gcagaatgcc gccggagata tcgtttactc gcgtgatgtg attgagagtg ataaatcgac 2220
 tctgctcgga gaggccgttg ccaaacgctt tggcgaactg cctttcctgt tcaaagtatt 2280
 atgcgcagca cagccactct ccattcagggt tcatccaaac aaacacaatt ctgaaatcgg 2340
 ttttgccaaa gaaaatgccg caggtatccc gatggatgcc gccgagcgtg actataaaga 2400
 tcctaaccac aagccggagc tggtttttgc cctgacgcct ttccttgca tgaacgcgtt 2460
 tcgtgaattt tccgagattg tctccctact ccagccggtc gcaggtgcac atccggcgat 2520
 tgctcacttt ttacaacagc ctgatgccga acgtttaagc gaactgttcg ccagcctggt 2580
 gaatatcgag ggtgaagaaa aatcccgcgc gctggcgatt ttaaaatcgg ccctcgatag 2640
 ccagcagggg gaaccgtggc aaacgattcg ttaatttct gaattttacc cggaagacag 2700
 cggctctgtc tccccgctat tgcgtaatgt ggtgaaattg aaccctggcg aagcagatgt 2760
 cctgttcgct gaaacaccgc acgcttacct gcaagggcgtg gcgctggaag tgatggcaaa 2820
 ctccgataac gtgctgcgtg cgggtctgac gcctaaatac attgatattc cggaactggt 2880
 tgccaatgty aaattcgaag ccaaaccggc taaccagttg ttgaccacgc cgggtgaaca 2940

```

aggtgcagaa ctggacttcc cgattccagt ggatgatttt gccttctcgc tgcattgacct 3000
tagtgataaa gaaaccacca ttagccagca gagtgccgcc attttgttct gcgtcgaagg 3060
cgatgcaacg ttgtggaaag gttctcagca gttacagctt aaaccgggtg aatcagcgtt 3120
tattgcccgc aacgaatcac cggtgactgt caaaggccac ggccgtttag cgcgtgttta 3180
caacaagctg taagagctta ctgaaaaaat taacatctct tgctaagctg ggagctctag 3240
atctgttctg cacaaagtgg agtagtcagt catcgatcag gaaccagaca ccagactttt 3300
attcatacag tgaagtgaag tgaagtgcag tgcagtgagt tgctggtttt tgtacaactt 3360
agtatgtatt tgtatttcta aaatacttct atcaataaaa tttctaattc ctaaaaccaa 3420
aatccagtgg gtaccgaatt cactggccgt cgttttacia cgtcgtgact gggaaaaccc 3480
tggcgttacc caacttaatc gccttgtagc acateccccct ttcgccagct ggcgtaatag 3540
cgaagaggcc cgcaccgacg gcccttccca acagttgcgc agcctgaatg gcgaatggcg 3600
cctgatgcgg tattttctcc ttacgcatct gtgcgggtatt tcacaccgca tatgggtcac 3660
tctcagtaca atctgctctg atgccgcata gttaagccag ccccgacacc cgccaacacc 3720

cgctgacgcg ccctgacggg cttgtctgct cccggcatcc gcttacagac aagctgtgac 3780
cgtctccggg agctgcatgt gtcagagggt ttcaccgtca tcaccgaaac gcgcgagacg 3840
aaagggcctc gtgatacgcc tatttttata ggtaaatgtc atgataataa tggtttctta 3900
gacgtcaggt ggcacttttc ggggaaatgt gcgcggaacc cctatattgt tatttttcta 3960
aatacatcca aatatgtatc cgctcatgag acaataaccc tgataaatgc ttcaatggcg 4020
cgccgcggcc gcttaagaat attgaaaaag gaagagtatg agtattcaac atttccgtgt 4080
cgcccttatt cccttttttg cggcattttg ccttctctgt tttgctcacc cagaaacgct 4140
ggtgaaagta aaagatgctg aagatcagtt ggggtcacga gtgggttaca tcgaactgga 4200
tctcaacagc ggtaagatcc ttgagagttt tcgccccgaa gaacgttttc caatgatgag 4260
cacttttaaa gttctgctat gtggcgcggt attatcccgt attgacgccg ggcaagagca 4320
actcggtcgc cgcatacact attctcagaa tgacttggtt gagtactcac cagtcacaga 4380
aaagcatctt acggatggca tgacagtaag agaattatgc agtgctgcca taaccatgag 4440
tgataacact gcggccaact tacttctgac aacgatcggg ggaccgaagg agctaaccgc 4500
ttttttgcac aacatggggg atcatgtaac tcgccttgat cgttgggaaac cggagctgaa 4560
tgaagccata ccaaacgacg agcgtgacac cacgatgcct gtagcaatgg caacaacgct 4620
gcgcaaaacta ttaactggcg aactacttac tctagcttcc cggcaacaat taatagactg 4680
gatggaggcg gataaagtgt caggaccact tctgcgctcg gcccttccgg ctggctggtt 4740
tattgctgat aaatctggag ccggtgagcg tgggtctcgc ggtatcattg cagcactggg 4800
gccagatggt aagccctccc gtatcgtagt tatctacacg acggggagtc aggcaactat 4860
ggatgaacga aatagacaga tcgctgagat aggtgcctca ctgattaagc attggtaact 4920
gtcagaccaa gtttactcat atatacttta gattgattta aaacttcatt ttaatttaa 4980
aaggatctag gtgaagatcc tttttgataa tctcatgacc aaaatccctt aacgtgagtt 5040
ttcgttccac tgagcgtcag accccgtaga aaagatcaaa ggatcttctt gagatccttt 5100
ttttctgcgc gtaatctgct gcttgcaaac aaaaaaacca ccgctaccag cggtggtttg 5160
tttgccggat caagagctac caactctttt tccgaaggta actggcttca gcagagcgca 5220
gataccaaat actgtccttc tagttagacc gtagttaggc caccacttca agaactctgt 5280
agcaccgcct acatacctcg ctctgctaat cctgttacca gtggctgctg ccagtggcga 5340
taagtctgtt cttaccgggt tggactcaag acgatagtta ccggataagg cgcagcggtc 5400
gggctgaacg gggggttcgt gcacacagcc cagcttgagc cgaacgacct acaccgaact 5460
gagataccta cagcgtgagc tatgagaaag cgccacgctt cccgaaggga gaaaggcggg 5520
caggatcccg gtaagcggca gggtcggaac aggagagcgc acgagggagc ttccaggggg 5580
aaacgcctgg tatctttata gtctgtcggg gtttcgccac ctctgacttg agcgtcgatt 5640
tttgatgagc tcgtcagggg ggcggagcct atggaaaaac gccagcaacg cggccttttt 5700
acggttcctg gccttttgct ggccctttgc tcacatgttc tttcctgcgt tatccccga 5760
ttctgtggat aaccgtatta cgccttttga gtgagctgat accgctcgcc gcagccgaac 5820
gaccgagcgc agcagctcag tgagcggagg agcggaaagag cttaaagcggc cgcggcgcgc 5880
cgcccaatac gcaaacgcgc tctccccgcg cgttgggcga ttcattaatg cagctggcac 5940
gacaggtttc ccgactggaa agcgggcagt gagcgcacac caattaatgt gagttagctc 6000
actcattagg caccacggc tttacacttt atgcttccgg ctctgatgtt gtgtggaatt 6060
gtgagcggat aacaatttca cacaggaaac agctatgacc atgattacgc c 6111

```

```

<210> 10
<211> 13737
<212> DNA
<213> Plasmid

```

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: Plasmid

<400> 10

```

gatccagaat tegtgatcaa atggccgcaa caagcagcac aagcagccag tcttttgaca 60
tagagctcga catcatcggc cagcaaccgc ctcttcttctc aatctacacc cagatcagtc 120
tcgtttacc cgtctctgat ccctcccagt atcccaccat cgtcagcacc cttgaggaag 180
gcctaaaacg cctctctcaa accttcccat gggtcgctgg ccaggtcaag accgagggca 240
tcagcgaagg aaacacagga acttccaaga tcattccata tgaggagaca ccccgctctg 300
tggtgaaaga cctccgtgat gattcctcag cgccaacgat cgaggggttg agaaaggcgg 360
gtttcccctt agagatgttt gacgagaacg tcgtcgtctc gaggaagaca ttagctatcg 420
gacctggcaa tggccccaac gaccggaagc ctgtgttgct attgcagctc aacttcatta 480
agggcggact cattctcacc gtcaacggac aacatgggtc tatggacatg acaggacaag 540
atgcaattat tcgtcttctc tccaaggcgt gccgcaacga atcattcacc gaggaggaaa 600
tctcggccat gaacctcgat cgcaagacgg tagtccctct ccttgaaaac taaaaagttg 660
gtcctgagct agaccaccag atcgccaaac ctgcgcctgc tggcgacgct ccaccgcac 720
cggccaaggc aagctggggc ttcttttcat tcaactccaa ggccctctcg gagtgaaag 780
accgagccac aaagactctt gacgcgtcgt ccaagtttgt gtcaactgat gatgctctt 840
cggcgtttat ctggcaatca acctcgcgct taegtctcgc aagattggat gcttccacac 900
ctactgaatt ctggcgcgct gtcgacatgc ggggcccatt gggcgtatca agcacatacc 960
caggccttct tcaaaacatg acctaccatg actcgaccgt cgccgaaatc gccaacgaac 1020
cacttgcgct aacagcatca cgctcgcgct cggaactcaa cagtgatcgt ttgcgcagac 1080
gaacacaagc tttggcgagc tacatgcatg gcctgcctga caagtcgagc gtctccctga 1140
ccgccgatgc gaatccgtca agcagcatca tgctgagttc ctgggccaag gtgggatgct 1200
gggagtatga ctttgggttt ggactgggta agcctgagag tgtgagaaga cctcgctttg 1260
aaccttttga gagtttgatg tactttatgc ccaagaagcc tgatggggag tttacggcgt 1320
ccatttctct gagggatgag gatattggaga gactaaagcc ggatgaggag tggacaaagt 1380
acgaaaagta tattgggtag atagtttact agactactgc agggatatcg tggatcccc 1440
aattdtcccc gatggttcaa acatttggca ataaagtttc ttaagattga atcctgttgc 1500
cggctcttgcg atgattatca tctaatttct gttgaattac gttaagcatg taataattaa 1560
catgtaatgc atgacgttat ttatgagatg ggtttttatg attagagtcc cgcaattata 1620
catttaatac gcgatagaaa acaaaatata gcgcgcaaac taggataaat tatcgcgcgc 1680
gggtgcatct atgttactag atccgggaat tcggcgcgcc caattgattt aatggccgc 1740
tgccggccat tcctgcagcg ttgcccgttct gtcagttcca aacgtaaaac ggcttgtccc 1800
gcgtcatcgg cgggggtcat aacgtgactc cettaattct ccgctcatga tcagattgtc 1860
gtttcccgcc ttcagtttaa actatcagtg tttgacagga tataattggcg ggtaaacct 1920
agagaaaaga gcgtttatta gaataatcgg atatttaaaa gggcgtgaaa aggtttatcc 1980
gttcgtccat ttgtatgtgc atgccaacca cagggttccc cagatctggc gccccagcag 2040
gagacgagca agattggccg ccgcccgaaa cgatccgaca gcgcgccag cacaggtgcg 2100
caggcaaatt gcaccaacgc atacagcgcc agcagaatgc catagtgggc ggtgacgtcg 2160
ttcgagtga ccagatcgcg caggaggccc ggcagaccg gcataatcag gccgatgccg 2220
acagcgtcga gcgcgacagt gctcagaatt acgatcaggg gtatgttggg tttcacgtct 2280
ggcctccgga ccagcctccg ctgggtccgat tgaacgcgcy gatctttat cactgataag 2340
ttggtggaca tattatgttt atcagtgata aagtgtcaag catgacaaaag ttgcagccga 2400
atacagtgat ccgtgcccgc ctggacctgt tgaacgaggt cggcgtagac ggtctgacga 2460
cacgcaaact ggcggaacgg ttgggggttc agcagccggc gctttactgg cacttcagga 2520
acaagcgggc gctgctegac gcaactggccg aagccatgct ggcggagaat catacgcat 2580
cggtgccgag agccgacgac gactggcgct catttctgat cgggaatgcc cgcagcttca 2640
ggcaggcgct gctcgcctac cgcgatggcg cgcgcatcca tgccggcacg cgaccgggcy 2700
caccgcagat ggaacggcc gacgcgcagc ttcgcttctc ctgcgagggc ggtttttcgg 2760
ccggggacgc cgtcaatgcy ctgatgacaa tcagctactt cactgttggg gccgtgctt 2820
aggagcagge cggcgacagc gatgccggcg agcgcggcgg caccgttgaa caggctccgc 2880
tctcgcgct gttgcccggc gcgatagacg ccttcgacga agccggctcc gacgcagct 2940
tcgagcaggg actcgcggtg attgtcgatg gattggcgaa aaggaggctc gttgtcagga 3000
acgttgaagg accgagaaag ggtgacgatt gatcaggacc gctgccggag cgcaaccac 3060
tactacagc agagccatgt agacaacatc cctccccct tccaccgcy tcagacgcc 3120
gtagcagccc gctacgggct ttttcatgcc ctgcccagc gtccaagcct cacggccgcy 3180
ctcggcctct ctggcggcct tctggcgctc ttcgcttcc tcgctcactg actcgtcgc 3240
ctcggtcggt cggctgcggc gacgggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc 3300
cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag 3360
gaaccgtaaa aaggccgctt tgctggcggt tttccatagg ctccgcccc ctgacgagca 3420

```

tcacaaaaat	cgacgetcaa	gtcagaggtg	gcgaaacccg	acaggactat	aaagatacca	3480
ggcgtttccc	ectggaaget	ccctcgtgcg	ctctcctggt	ccgaccctgc	cgcttaccgg	3540
atacctgtcc	gcctttctcc	cttcgggaag	cgtaggcgctt	ttccgctgca	taaccctgct	3600
tcgggggtcat	tatagcgatt	ttttcggtat	atccatcctt	tttcgcacga	tatacaggat	3660
tttgccaaag	ggttcgtgta	gactttcctt	ggtgatatcca	acggcgtcag	ccgggcagga	3720
taggtgaagt	aggcccaccc	gcgagcgggt	gttccttctt	cactgtccct	tattcgcacc	3780
tggcggtgct	caacgggaat	cctgctctgc	gaggctggcc	ggctaccgcc	ggcgtaacag	3840
atgagggcaa	gcggatggct	gatgaaacca	agccaaccag	gaagggcagc	ccacctatca	3900
agggtgactg	ccttcagac	gaacgaagag	cgattgagga	aaaggcggcg	gcggccggca	3960
tgagcctgtc	ggcctacctg	ctggccgctg	gccagggcta	caaaatcacg	ggcgtcgtgg	4020
actatgagca	cgtcgcgag	ctggcccgca	tcaatggcga	cctgggcccg	ctgggcggcc	4080
tgctgaaact	ctggctcacc	gacgacccgc	gcacggcgcg	gttcgggtgat	gccacgatcc	4140
tcgccctgct	ggcgaagatc	gaagagaagc	aggacgagct	tggcaaggtc	atgatgggcy	4200
tggtcgcgcc	gagggcagag	ccatgacttt	tttagccgct	aaaacggccg	gggggtgcy	4260
gtgattgcca	agcacgtccc	catgctctcc	atcaagaaga	gcgacttcgc	ggagctggty	4320
aagtacatca	ccgacgagca	aggcaagacc	gagcgccttt	gcgacgctca	ccgggctggt	4380
tgccctcgcc	gctgggctgy	cggccgtcta	tggccctgca	aacgcgccag	aaacgcctgc	4440
gaagccgtgt	gcgagacacc	gcgccggccc	ggggccgttg	tggatacctc	gcggaaaact	4500
tggccctcac	tgacagatga	ggggcggacg	ttgacacttg	aggggcccgc	tcacccggcg	4560
cgcgcttgac	agatgagggg	caggctcgat	ttcggccggc	gacgtggagc	tggccagcct	4620
cgcaaatcgy	cgaaaacgcc	tgattttacg	cgagtttccc	acagatgatg	tggacaagcc	4680
tggggataag	tgccctgcyg	tattgacact	tgaggggcyg	gactactgac	agatgagggg	4740
cgcgatcctt	gacacttgag	gggcagagtg	ctgacagatg	aggggcgcac	ctattgacat	4800
ttgaggggct	gtccacaggc	agaaaatcca	gcatttgcaa	gggtttccgc	ccgtttttcg	4860
gccaccgcta	acctgtcttt	taacctgctt	ttaaaccaat	atttataaac	cttgttttta	4920
accagggctg	cgccctgtgc	gcgtgaccgc	gcacgccgaa	ggggggtgcc	cccccttctc	4980
gaaccctccc	ggcccgttaa	cgcgggcctc	ccatcccccc	aggggctgcy	ccctcggcc	5040
gcgaaacggc	tcaccccaaa	aatggcagcg	ctggcagtc	ttgccattgc	cgggatcggg	5100
gcagtaacgg	gatgggcat	cagcccagc	gcgagccccg	gaagcattga	cgtgcccgag	5160
gtgctggcat	cgacattcag	cgaccaggtg	ccgggcagtg	agggcggcgg	cctgggtggc	5220
ggctgcccct	tcacttcggc	cgtcggggca	ttcacggact	tcattggcggg	gccggcaatt	5280
tttaccttgg	gcattcttgg	catagtggtc	gcgggtgccg	tgctcgtggt	cgggggtgcy	5340
ataaaccag	cgaaccattt	gaggtgatag	gtaagattat	accgaggtat	gaaaacgaga	5400
attggacctt	tacagaatta	ctctatgaag	cgccatattt	aaaaagctac	caagacgaag	5460
aggatgaaga	ggatgaggag	gcagattgcc	ttgaatata	tgacaatact	gataagataa	5520
tatatctttt	atatagaaga	tatcgccgta	tgtaaggatt	tcagggggca	aggcataggc	5580
agcgcgctta	tcaatata	tatagaatgg	gcaaagcata	aaaacttgca	tggactaatg	5640
cttgaaaccc	aggacaataa	ccttatagct	tgtaaattct	atcataattg	ggtaatgact	5700
ccaacttatt	gatagtgttt	tatgttcaga	taatgcccga	tgactttgtc	atgcagctcc	5760
accgattttg	agaacgacag	cgacttcctg	cccagccgty	ccaggtgctg	cctcagattc	5820
aggttatggc	gctcaattcg	ctgcgtatat	cgcttgctga	ttacgtgcag	ctttcccttc	5880
aggcgggatt	catacagcgg	ccagccatcc	gtcatccata	tcaccacgtc	aaagggtgac	5940
agcaggctca	taagacgccc	cagcgtcgcc	atagtgcgct	caccgaatac	gtgcgcaaca	6000
accgtcttcc	ggagactgtc	atacgcgtaa	aacagcccagc	gctggcgcga	tttagccccg	6060
acatagcccc	actgttcgtc	catttccgcy	cagacgatga	cgtcactgcc	cggctgtatg	6120
cgcgaggtta	ccgactgcyg	cctgagtttt	ttaagtgacg	taaaatcgtg	ttgaggccaa	6180
cgcccataat	gcgggctggt	gcccggcatc	caacgccatt	catggccata	tcaatgattt	6240
tctggtgcyt	accgggttga	gaagcgggtg	aagtgaactg	cagttgccat	gttttacggc	6300
agtgagagca	gagatagcgc	tgatgtccgg	cggtgctttt	gccgttacgc	accaccccgt	6360
cagtagctga	acaggagggg	cagctgatag	acacagaagc	cactggagca	cctcaaaaac	6420
accatcatac	actaaatcag	taagttggca	gcatcaccca	taattgtggt	ttcaaaatcg	6480
gctatggctg	gaaggaaagc	tgccgttcc	aaaggctctg	cactttgaac	ggcatgatgg	6900
ctggagcaat	ctgctcatga	gtgaggccga	tggcgtcctt	tgctcggaag	agtatgaaga	6960
tgaacaaagc	cctgaaaaga	ttatcgagct	gtatgcggag	tgcatcaggc	tctttcactc	7020
catcgacata	tcggattgtc	cctatacgaa	tagcttagac	agccgcttag	ccgaattgga	7080
ttacttactg	aataacgatc	tggccgatgt	ggattgcgaa	aactgggaag	aagacactcc	7140
atttaaagat	ccgcgcgagc	tgatgattt	tttaaagacg	gaaaagcccc	aagaggaact	7200
tgtcttttcc	caeggcgacc	tgggagacag	caacatcttt	gtgaaagatg	gcaaagtaag	7260
tggctttatt	gatcttggga	gaagcggcag	ggcggacaag	tggtatgaca	ttgccttctg	7320
cgtcgggtcg	atcagggagg	atatcgggga	agaacagtat	gtcggagctat	tttttgactt	7380

actggggatc	aagcctgatt	gggagaaaat	aaaatattat	atcttactgg	atgaattggt	7440
ttagtaccta	gatgtggcgc	aacgatgccg	gcgacaagca	ggagcgcacc	gacttcttcc	7500
gcatcaagtg	ttttggctct	caggccgagg	cccacggcaa	gtatttgggc	aaggggtcgc	7560
tggtattcgt	gcagggcaag	attcgggaata	ccaagtacga	gaaggacggc	cagacggtct	7620
acgggaccca	cttcattgcc	gataaggtgg	attatctgga	caccaaggca	ccaggcgggt	7680
caaatcagga	ataagggcac	attgccccgg	cgtgagtcgg	ggcaatcccc	caaggagggt	7740
gaatgaatcg	gacgtttgac	cggaaggcat	acaggcaaga	actgatcgac	gcggggtttt	7800
ccgccgagga	tgccgaaacc	atcgcaagcc	gcaccgtcat	gcggtgcgcc	cgcgaaacct	7860
tccagtcctg	cggctcgatg	gtccagcaag	ctacggccaa	gatecgagcgc	gacagcgtgc	7920
aactggctcc	ccctgccctg	cccgcgccat	cggccgcctg	ggagcgttcg	cgctcgtctcg	7980
aacaggaggc	ggcaggtttg	gcgaagtcca	tgaccatcga	cacgcgagga	actatgacga	8040
ccaagaagcg	aaaaaccgcc	ggcgaggacc	tggcaaaaaca	ggtcagcgcg	gccaagcagg	8100
ccgcgcttgc	gaaacacacg	aagcagcaga	tcaaggaaat	gcagctttcc	ttgttcgata	8160
ttgcgcccgt	gcccggacacg	atgcgagcga	tgccaacgca	cacggcccgc	tctgccctgt	8220
tcaccacggc	caacaagaaa	atccccgcgc	agggcctgca	aaacaaggtc	atcttccacg	8280
tcaacaagga	cgtgaagatc	acctacaccg	gcgtcgagct	gcggggccgac	gatgacgaac	8340
tggtgtggca	gcaggtgttg	gagtacgcga	agcgcacccc	tatcggcgag	ccgatcacct	8400
tcacgttcta	cgagctttgc	caggacctgg	gctggctgat	caatggcccg	tattacacga	8460
aggccgagga	atgcctgtcg	cgcctacagg	cgacggcgat	gggcttcacg	tccgaccgcg	8520
ttgggacact	ggaatcgggtg	tcgctgctgc	accgcttccg	cgctcctggac	cgtaggcaaga	8580
aaacgtcccc	ttgccaggtc	ctgatcgacg	aggaaatcgt	cgtagctggtt	gctggcgacc	8640
actacacgaa	attcatatgg	gagaagtacc	gcaagctgtc	gccgacggcc	cgacggatgt	8700
tcgactattt	cagctcgcac	cgggagccgt	accgcctcaa	gctggaaacc	ttccgcctca	8760
tgtgcccgatc	ggattcccac	cgcgtgaaga	agtggcgcga	gcaggtcggc	gaagcctgcg	8820
aagagtgtcg	agggcagcgc	ctggtggaac	acgcctgggt	caatgatgac	ctgggtgcat	8880
gcaaacgcta	gggccttgtg	gggtcagttc	cggctggggg	ttcagcagcc	agcgttttac	8940
tggcatttca	ggaacaagcg	ggcactgctc	gacgcacttg	cttcgctcag	tatcgctcgg	9000
gacgcacggc	gcgctctacg	aactgccgat	aaacagagga	ttaaaattga	caattgtgat	9060
taaggctcag	attcgacggc	ttggagcggc	cgacgtgcag	gatttcccg	agatccgatt	9120
gtcggccctg	aagaaaagctc	cagagatggt	cgggtcccgtt	tacgagcacg	aggagaaaaa	9180
gccatggag	gcgttcgctg	aacggttgcg	agatgccgtg	gcattcggcg	cctacatcga	9240
cggcgagatc	attgggctgt	cggtcttcaa	acaggaggac	ggccccaagg	acgtccaaa	9300
ggcgcatctg	tccggcgttt	tcgtggagcc	cgaaacgcga	ggccgagggg	tcgcccgtat	9360
gctgctgcgg	gcgttgccgg	cgggtttatt	gctcgtgatg	atcgtccgac	agattccaac	9420
gggaatctgg	tggatgcgca	tcttcatect	cggcgcactt	aatatttcgc	tattctggag	9480
cttgttgttt	atttcgggtct	accgcctgcc	gggcggggtc	gcggcgacgg	taggcgctgt	9540
gcagccgctg	atggctcgtg	tcactctctgc	cgctctgcta	ggtagcccga	tacgattgat	9600
ggcggctcctg	ggggctatatt	geggaaactgc	gggcgtggcg	ctggtggtgt	tgacaccaa	9660
cgcagcgccta	gatcctgtcg	gcgtcgcagc	gggcctggcg	ggggcgggtt	ccatggcgtt	9720
cggaaccgctg	ctgaccgcga	agtggcaacc	tcccgtccct	ctgctcacct	ttaccgcctg	9780
gcaactggcg	ccgggaggac	ttctgctcgt	tccagtagct	ttagtgtttg	atccgccaat	9840
cccgatgcct	acaggaacca	atgttctcgg	cctggcgtgg	ctcggcctga	tcggagcggg	9900
tttaacctac	ttcctttggt	tccgggggat	ctcgcgactc	gaacctacag	ttgtttcctt	9960
actgggcttt	ctcagcccca	gatctgggggt	cgatcagccg	gggatgcac	aggccgacag	10020
tcggaacttc	gggtccccga	cctgtaccat	tcggtgagca	atggataggg	gagttgatat	10080
cgtcaacggt	cacttctaaa	gaaatagegc	cactcagctt	cctcagcggc	tttatccagc	10140
gatttcttat	tatgtcggca	tagttctcaa	gatcgacagc	ctgtcacgggt	taagcgagaa	10200
atgaataaga	aggctgataa	ttcggatctc	tgcgagggag	atgatatttg	atcacaggca	10260
gcaacgctct	gtcatcgtta	caatcaacat	gctaccctcc	gcgagatcat	ccgtgtttca	10320
aaccggcag	cttagttgcc	gttcttccga	atagcatcgg	taacatgagc	aaagtctgcc	10380
gccttacaac	ggctctcccg	ctgacgccgt	cccggactga	tgggctgcct	gtagcagtg	10440
gtgattttgt	gcccagctgc	cggctcgggga	gctgttggct	ggctgggtggc	aggatatatt	10500
gtggtgtaaa	caaattgacg	cttagacaac	ttaataaacac	attgcggacg	tttttaatgt	10560
actgcccgtac	ggccatgctg	gccgcccggg	caccggtaaa	tttctcgcag	ggctagcgaa	10620
ttcgagctcg	gtaccctcgg	atcttgggtt	taggaattag	attattgata	gaagtatctt	10680
acaaatacaa	atacatacta	agggttctct	atatgctcaa	cacatgagcg	aaaccctata	10740
agaaccctaa	tctccctatc	tgggaactac	tcacacatta	ttatagagag	agatagattt	10800
gtagagagag	actgggtgatt	tcagcgggca	tgctgcaggg	tcgactcaga	tctgggtaac	10860
tggcctaact	ggccttggag	gagctggcaa	ctcaaaatcc	ctttgccaaa	aaccaacatc	10920
atgccatcca	ccatgcttgt	atccagctgc	gcgcaatgta	ccccgggctg	tgtatcccaa	10980

```

agcctcatgc aacctaacag atggatcgtt tgggaaggcct ataacagcaa ccacagactt 11040
aaaaccttgc gcctccatag acttaagcaa atgtgtgtac aatgtggatc ctaggcccaa 11100
cctttgatgc ctatgtgaca cgtaaacagt actctcaact gtccaatcgt aagcgttcct 11160
agccttccag ggcccagcgt aagcaatacc agccacaaca ccctcaacct cagcaaccaa 11220
ccaaggggat ctatcttgca acctctctag atcatcaatc cactcttgtg gtgtttgtgg 11280
ctctgtccta aagttcactg tagacgtctc aatgtaatgg ttaacgatat cacaaccgc 11340
ggccatatca gctgctgtag ctggccta atctcaactgggt ctccctctccg gagacatgtc 11400
gactctagag gatccccggg taccctgtcc tctccaaatg aatgaactt ccttatatag 11460
aggaagggtc ttgcgaagga tagtgggatt gtgcgatcct ccttacgtca gtggagatat 11520
cacatcaatc cacttgettt gaagacgtgg ttggaacgct ttctttttcc acgatgtctc 11580
tcgtgggtgg gggtecatct ttgggaccac tgtcggcaga ggcattctca acgatggcct 11640

```

```

ttcctttatc gcaatgatgg catttgtagg agccaccttc cttttccact atcttcacaa 11700
taaagtgaca gatagctggg caatggaate cgaggagggt tccgatattt accctttggt 11760
gaaaagtctc aattgccctt tggctctctg agactgtatc tttgatattt ttggagtaga 11820
caagcgtgtc gtgctccacc atgttgacga agatattctt cttgtcattg agtcgtaaga 11880
gactctgtat gaactgttcg ccagctctta cggcgagttc tgttggctct ctatttgaat 11940
ctttgactcc atgggaattg agatctctcg aggtttaa acggccacgcc tgcggccgcc 12000
tcgaggtacc ggatttggag ccaagtctca taaacgccat tgtggaagaa agtcttgagt 12060
tgggtgtaat gtaacagagt agtaagaaca gagaagagag agagtgtgag atacatgaat 12120
tgtcggggcaa caaaaatcct gaacatctta ttttagcaa gagaaagagt tccgagtctg 12180
tagcagaaga gtgaggagaa atttaagctc ttggacttgt gaattgttcc gcctctttaa 12240
tacttcttca atcctcatat attcttcttc tatgttacct gaaaaccggc atttaatctc 12300
gcggggttat tccggttcaa cttttttttt gttttgagtt attatctggg ctttaataacg 12360
caggcctgaa ataaattcaa ggcccaactg tttttttttt taagaagttg ctgttaaaaa 12420
aaaaaaaaag gaattaacaa caacaacaaa aaaagataaa gaaaataata acaattactt 12480
taattgtaga ctaaaaaaac atagatttta tcatgaaaaa aagagaaaag aaataaaaaac 12540
ttggatcaaa aaaaaaaaaa tacagatctt ctaattatta acttttctta aaaattaggt 12600
cctttttccc aacaattagg tttagagttt tgggaattaaa ccaaaaagat tgttctaaaa 12660
aatactcaaa tttggtagat aagtttctct attttaatta gtcaatggta gatacttttt 12720
tttcttttct ttattagagt agattagaat cttttatgcc aagttttgat aaattaaatc 12780
aagaagataa actatcataa tcaacatgaa attaaaagaa aaatctcata tatagtatta 12840
gtattctcta tatatattat gattgcttat tcttaatggg ttgggttaac caagacatag 12900
tcttaatgga aagaatcttt tttgaacttt tctcttatgt attaaattct tctatagaaa 12960
agaaagaaat tatttgagga aaagtatata caaaaagaaa aatagaaaaa tgtcagtgaa 13020
gcagatgtaa tggatgacct aatccaacca ccaccatagg atgtttctac ttgagtcggt 13080
cttttaaaaa cgcacggtgg aaaatatgac acgtatcata tgattccttc cttagtcttc 13140
gtgataataa tectcaactg atatcttctt ttttttgttt tggctaaaga tattttatc 13200
tcattaatag aaaagacggt tttgggcttt tggtttgcca tataaagaag accttcgtgt 13260
ggaagataat aattcatcct ttcgtctttt tctgactctt caatctctcc caaagcctaa 13320
agcgatctct gcaaactctt cgcgactctc tctttcaagg tatattttct gattcttttt 13380
gtttttgatt cgtatctgat ctccaatttt tgttatgtgg attattgaat cttttgtata 13440
aattgctttt gacaatattg ttcgtttcgt caatccagct tctaaatttt gtcctgatta 13500
ctaagatata gattcgtagt gtttacatct gtgtaatttc ttgcttgatt gtgaaattag 13560
gattttcaag gacgatctat tcaatttttg tgttttcttt gttcgattct ctctgtttta 13620
ggtttcttat gtttagatcc gtttctcttt ggtgtgttt tgatttctct tacggctttt 13680
gatttgggat atgttcgctg atttggttctt acttgttcta ttgttttatt tcagggtg 13737

```

```

<210> 11
<211> 12949
<212> DNA
<213> Plasmid

```

<400> 11

```

agcttgcatg cctgcagtc agcgtgaccc ggtcgtgcc ctctctagag ataatgagca 60
ttgcatgtct aagttataaa aaattaccac atattttttt tgtcacactt gtttgaagtg 120
cagtttatct atctttatac atatatthaa actttactct acgaataata taatctatag 180
tactacaata atatcagtggt tttagagaat catataaatg aacagttaga catgggtctaa 240
aggacaattg agtattttga caacaggact ctacagtttt atcttttttag tgtgcatgtg 300
ttctcctttt tttttgcaaa tagcttcacc tatataatac ttcattccatt ttattagtac 360
atccatttag ggtttagggg taatggtttt tatagactaa tttttttagt acatctatct 420
tattctatct tagcctctaa attaagaaaa ctaaaaactct atttttagttt ttttatttaa 480
taatttagat ataaaataga ataaaataaa gtgactaaaa attaaacaaa taccctttaa 540
gaaattaaaa aaactaagga aacatttttc ttgtttcgag tagataatgc cagcctgtta 600
aacgccgtcg acgagtctaa cggacaccaa ccagcgaacc agcagcgtcg cgtcgggcca 660
agcgaagcag acggcacggc atctctgtcg ctgcctctgg acccctctcg agagtccgc 720
tccaccgttg gacttgctcc gctgtcggca tccagaaatt gcgtggcggg cggcgagacg 780
tgagccggca cggcagggcg cctcctcctc ctctcacggc accggcagct acgggggatt 840
cctttcccac cgctccttcg ctttcccttc ctgcgccgcc gtaataaata gacacccct 900
ccacaccctc tttcccacac ctctgtgtgt tctggagcga cacacacaca accagatctc 960
ccccaaatcc acccgtcggc acctccgctt caaggtagcg cgtcgtcct ccccccccc 1020
cctctctac cttctctaga tctggcttcc ggtccatggt tagggcccgg tagttctact 1080
ctgtttcat tttgtgttag atccgtgttt gtgttagatc cgtgctgcta gcttctgtac 1140
acggatgcga cctgtacgtc agacacgttc agacacgttc ctgttgctaa cttgccagtg tttctctttg 1200
gggaatcctg ggatggctct agccgttccg cagacgggat cgatttcatg attttttttg 1260
tttctgtgca tagggtttgg tttgcccttt tcttttattt caatatatgc cgtgcacttg 1320
tttctcgggt catcttttca tgcctttttt tgtcttgggt gtgatgatgt ggtctggttg 1380
ggcggtcggt ctagatcggg gtagaattct gtttcaaact acctggtgga tttattaatt 1440
ttggatctgt atgtgtgtgc catacatatt catagttacg aattgaagat gatggatgga 1500
aatatcgatc taggataggt atacatgttg atgcgggttt tactgatgca tatacagaga 1560
tgccttttgt tgccttgggt gtgatgatgt ggtgtggttg ggcggtcggt cattcgttct 1620
agatcggagt agaatactgt ttcaaactac ctggtgtatt tattaatttt ggaactgtat 1680
gtgtgtgtca tacatcttca tagttacgag ttttaagatg atggaaatat cgatctagga 1740
taggtatata tgtttagatg ggttttactg atgcataac atgatggcat atgcagcatc 1800
tattcatatg ctctaacctt gagtacctat ctattataat aaacaagtat gttttataat 1860
tattttgatc ttgatatact tggatgatgg catatgcagc agctatatgt ggattttttt 1920
agccctgctt tcatacgtca tttatttgct tggtagtgtt tcttttctcg atgctcacc 1980
tgttgtttgg tgttacttct gcagggatcc ccgatcatgc aaaaactcat taactcagtg 2040
caaaactatg cctggggcag caaaacggcg ttgactgaac tttatggtat ggaaaatccg 2100
tccagccagc cgatggccga gctgtggatg ggcgcacatc cgaaaagcag ttcacgagtg 2160
cagaatgccg ccggagatat cgtttctact cgtgatgtga ttgagagtga taaatcgact 2220
ctgctcggag aggccgttgc caaacgcttt ggccaactgc ctttctctgtt caaagtatta 2280
tgcgcagcac agccactctc cattcaggtt catccaaaca aacacaattc tgaaaatcgg 2340
tttgccaaag aaaatgccgc aggtatcccc atggatgccg ccgagcgtaa ctataaagat 2400
cctaaccaca agccggagct ggtttttgct ctgagcctt tctttgctat gaacgcgtt 2460
cgtgaatttt ccgagattgt ctccctactc cagccggtcg caggtgcaca tccggcgatt 2520
gctcactttt tacaacagcc tgatgccgaa cgtttaaagc aactgttctc cagcctgttg 2580
aatatgcagg gtgaagaaaa atcccgcgcg ctggcgattt taaaatcggc cctcgatagc 2640
cagcaggggt aaccgtggca aacgatctgt ttaatttctg aattttacc ggaagacagc 2700
ggtctgttct ccccgtatt gctgaatgtg gtgaaattga accctggcga agegatgttc 2760
ctgttcgctg aaacaccgca cgcttacctg caaggcgtgg cgctggaagt gatggcaaac 2820
tccgataacg tgcctgcgtg gggctctgac ctaaaataca ttgatattcc ggaactgggt 2880
gccaatgtga aattcgaagc caaaccggct aaccagttgt tgaccagcc ggtgaaacaa 2940
ggtgcagaac tggacttccc gattccagtg atgattttg cettctcgt gcatgacct 3000
agtgataaag aaaccacct tagccagcag agtgccgcca tttgttctg cgtcgaaggc 3060
gatgcaacgt tgtgaaagg ttctcagcag ttacagctta aaccgggtga atcagcgttt 3120
attgccgcca acgaatcacc ggtgactgtc aaaggccacg gccgttttag gcgtgtttac 3180
aacaagctgt aagagcttac tgaaaaaatt aacatctctt gctaagctgg gagctcgatc 3240
cgtcgacctg cagatcgttc aaacatttgg caataaagtt tcttaagatt gaatcctgtt 3300
gccggtcttg cgatgattat catataatct ctgttgaatt acgttaagca tgtaataatt 3360
aacatgtaat gcatgacgtt atttatgaga tgggttttta tgattagagt cccgcaatta 3420
tacatttaat acgcgataga aaacaaaata tagcgcgcaa actaggataa attatcgcgc 3480
gcggtgtcat ctatgttact agatctgcta gccctgcagg aaatttaccg gtgcccgggc 3540

```

ggccagcatg	gccgtatccg	caatgtgtta	ttaagttgtc	taagcgtcaa	tttgtttaca	3600
ccacaatata	tcctgccacc	agccagccaa	cagctccccg	accggcagct	eggcaaaaa	3660
tcaccactcg	atacaggcag	cccatacagaa	ttaatttctca	tgtttgacag	cttatcatcg	3720
actgcacggg	gcaccaatgc	ttctggcgctc	aggcagccat	cggaaactgt	ggtaggctg	3780
tgcaggctcg	aaatcactgc	ataattcgtg	tcgctcaagg	cgcactcccg	ttctgggata	3840
tgttttttgc	gccgacatca	taacggttct	ggcaaatatt	ctgaaatgag	ctggtgacaa	3900
ttaatcatcc	ggctcgtata	atgtgtggaa	ttgtgagcgg	ataacaattt	cacacaggaa	3960
acagaccatg	agggaaagcgt	tgatcgccga	agtatcgact	caactatcag	aggtagttgg	4020
cgtcatcgag	cgccatctcg	aaccgacggt	gctggccgta	catttgtagc	gctccgcagt	4080
ggatggcggc	ctgaagccac	acagtgatat	tgat ttgctg	gttacgggtga	ccgtaaggct	4140
tgatgaaaca	acgcggcgag	ctttgatcaa	cgaccttttg	gaaacttcgg	cttcccctgg	4200
agagagcgag	attctccgcg	ctgtagaagt	caccattggt	gtgcacgacg	acatcattcc	4260
gtggcgttat	ccagctaagc	gcgaactgca	at ttggagaa	tggcagcgca	atgacattct	4320
tgcaggatc	ttcgagccag	ccacgatcga	cattgatctg	gctatcttgc	tgacaaaaag	4380
aagagaacat	agcgttgccct	tggtaggctcc	agcggcggag	gaactcttgc	atccggttcc	4440
tgaacaggat	ctatttgagg	cgctaaatga	aaccttaacg	ctatggaact	cgccgcccga	4500
ctgggctggc	gatgagcgaa	atgtagtgtc	tacgttgctc	cgcatttggt	acagcgcagt	4560
aaccggcaaa	atcgcgccga	aggatgtcgc	tgccgactgg	gcaatggagc	gcttgcgggc	4620
ccagtatcag	ccgctcatac	ttgaagctag	gcaggcttat	cttgacaag	aagatcgctt	4680
ggcctcgcgc	gcagatcagt	tggaagaatt	tgttcactac	gtgaaaggcg	agatcaccaa	4740
agtagtcggc	aaataaagct	ctagtggatc	tccgtacccc	cgggggatct	ggctcgcggc	4800

ggacgcacga	cgccggggcg	agaccatagg	cgatctccta	aatcaatagt	agctgtaacc	4860
tcgaagcgtt	tcacttghtaa	caacgattga	gaatttttgt	cataaaattg	aaataacttg	4920
ttcgcatttt	tgctatecgc	ggtcagccgc	aattctgacg	aactgcccat	ttagctggag	4980
atgattgtac	atccttcacg	tgaaaatttc	tcaagcgctg	tgaacaaggg	ttcagatttt	5040
agattgaaag	gtgagccggt	gaaacacggt	cttcttgctg	atgacgacgt	cgctatgcgg	5100
catcttatta	ttgaatacct	tacgatccac	gccttcaaag	tgaccgcggt	agccgacagc	5160
accagttca	caagagtact	ctcttccgcg	acggctgatg	tcgtggttgt	tgatctaaat	5220
ttaggtcgtg	aagatgggct	cgagatcggt	cgtaatctgg	cggcaaagtc	tgatattcca	5280
atcataatta	tcagtggcga	ccgccttgag	gagacggata	aagttgttgc	actcgagcta	5340
ggagcaagtg	at tttatcgc	taagccgttc	agtatcagag	agtttctagc	acgcattcgg	5400
gttgccttgc	gcgtgcgcc	caacgttgct	cgctccaaag	accgacggtc	tttttgttt	5460
actgactgga	cacttaatct	caggcaacgt	cgcttgatgt	ccgaagctgg	cggtgaggtg	5520
aaacttacgg	caggtgagtt	caatcttctc	ctcgcgtttt	tagagaaacc	ccgcgacggt	5580
ctatcgcgcg	agcaacttct	cattgccagt	cgagtacgcg	acgaggaggt	ttatgacagc	5640
agtatagatg	ttctcatttt	gaggctcgcg	cgaaaacttg	aggcagatcc	gtcaagccct	5700
caactagata	aaacagcaag	agggtccggg	tatttcttgg	acgcggacgt	gcaggtttcg	5760
cacgggggga	agatggcagc	ctgagccaat	tcccagatcc	ccgaggaatc	ggcgtgagcg	5820
gtcgcaaac	atccggcccc	gtacaaatcg	gcgcggcgct	gggtgatgac	ctggtggaga	5880
agttgaaggc	cgcgagggcc	gcccagcggc	aacgcacgga	ggcagaagca	cgccccggtg	5940
aatcgtggca	agcggccgct	gatcgaatcc	gcaaagaatc	ccggcaaccg	ccggcagccg	6000
gtgcgccgct	gattaggaag	ccgcccagg	gcgacgagca	accagatttt	ttcgttccga	6060
tgctctatga	cggtggcacc	cgcgatagtc	gcagcatcat	ggacgtggcc	gttttccgct	6120
tgtegaagcg	tgaccgacga	gctggcgagg	tgatccgcta	cgagcttcca	gacggggcagc	6180
tagaggttcc	cgcagggccc	gccggcatgg	ccagtgtgtg	ggattacgac	ctggtactga	6240
tgccgggttcc	ccatctaacc	gaatccatga	accgataccg	ggaagggaag	ggagacaagc	6300
ccggccgctg	gttccgtcca	cacgttgccg	acgtactcaa	gttctgcccg	cgagccgatg	6360
gcggaaagca	gaaagacgac	ctggtagaaa	cctgcattcg	gttaaacacc	acgcacgttg	6420
ccatgcagcg	tacgaagaag	gccaaagaacg	gccgcctggt	gacggtatcc	gaggggtgaag	6480
ccttgattag	ccgctacaag	atcgtaaaga	gcgaaaccgg	gcggccggag	acatcagaga	6540
tcgagctagc	tgattggatg	taccgcgaga	tcacagaagg	caagaaccgg	gacgtgctga	6600
cggttcacc	cgattacttt	ttgatcgatc	ccggcatcgg	ccgttttctc	taccgcctgg	6660
cacgccgcgc	cgcaggcaag	gcagaagcca	gatggttggt	caagacgatc	tacgaacgca	6720
gtggcagcgc	cggagagttc	aagaagttct	gtttcaccgt	gcgcaagctg	atcgggtcaa	6780
atgacctgcc	ggagtacgat	ttgaaggagg	aggcggggca	ggctggcccg	atcctagtca	6840
tgctcactcg	caacctgatc	gagggcgaag	cacccggcgg	ttcctaattg	acggagcaga	6900
tgctagggca	aattgcccta	gcaggggaaa	aaggtcgaag	aggtctcttt	cctgtggata	6960
gcacgtacat	tgggaaccca	aagccgtaca	ttgggaaccg	gaacccttac	attgggaacc	7020
caaagccgta	cattgggaac	cggtcacaca	tgtaagtgtc	tgatataaaa	gagaaaaaag	7080
gcgatttttc	cgcttaaaac	tctttaaaac	ttattaaaac	tcttaaaacc	cgctcggcct	7140

gtgcataact	gtctggccag	cgcacagccg	aagagctgca	aaaagcgcct	acccttcggt	7200
cgctgcgctc	cctacgcccc	gocgcttcgc	gtcggcctat	cgcggccgct	ggccgctcaa	7260
aaatggctgg	cctacggcca	ggcaatctac	cagggcgcgg	acaagccgcg	ccgtcgccac	7320
tcgaccgccc	gcgctgaggt	ctgcctcgtg	aagaaggtgt	tgctgactca	taccaggcct	7380
gaatcgcccc	atcaaccagc	cagaaagtga	gggagccacg	gttgatgaga	gctttgttgt	7440
aggtaggacca	gttgggtgatt	ttgaactttt	gctttgccac	ggaacggtct	gcgttgtcgg	7500
gaagatgcgt	gatctgatcc	ttcaactcag	caaaagttcg	atattatcaa	caaagccgcc	7560
gtccccgtaa	gtcagcgtaa	tgetctgcc	gtgttacaac	caattaacca	attctgatta	7620
gaaaaactca	tcgagcatca	aatgaaactg	caattttattc	atatacaggat	tatcaatacc	7680
atatttttga	aaaagccggt	tctgtaatga	aggagaaaac	tcaccgaggc	agttccatag	7740
gatggcaaga	tcctgggtatc	ggtctgcat	tcgactcgt	ccaacatcaa	tacaacctat	7800
taatttcccc	tcgtcaaaaa	taaggttatc	aagtgagaaa	tcaccatgag	tgacgactga	7860
atccgggtgag	aatggcaaaa	gctctgcatt	aatgaatcgg	ccaacgcgcg	gggagaggcg	7920
gtttgcgtat	tgggcgctct	tccgcttctc	cgctcactga	ctcgctgcgc	tcggtcgttc	7980
ggctgcggcg	agcggtatca	gctcactcaa	agcgggtaat	acggttatcc	acagaatcag	8040
gggataacgc	aggaaagaac	atgtgagcaa	aaggccagca	aaaggccagg	aaccgtaaaa	8100
aggccgcggt	gctggcggtt	ttccatagcc	tccgcccccc	tgacgagcat	cacaaaaatc	8160
gacgctcaag	tcagaggtgg	cgaaacccga	caggactata	aagataccag	gcgtttcccc	8220
ctggaagctc	cctcgtgcgc	tctcctgttc	cgaccctgcc	gcttaccgga	tacctgtccg	8280
cctttctccc	ttcgggaagc	gtggcgcttt	ctcatagctc	acgctgtagg	tatctcagtt	8340
cggtgtaggt	cgttcgctcc	aagctgggct	gtgtgcacga	accccccggt	cagccccgacc	8400
gctgcgcctt	atccggtaac	tatcgtcttg	agtccaaccc	ggtaagacac	gacttatcgc	8460
cactggcagc	agccactggt	aacaggatta	gcagagcgag	gtatgtaggc	ggtgctacag	8520
agttcttgaa	gtggtggcct	aactacggct	acactagaag	aacagtattt	ggtatctcgg	8580
ctctgctgaa	gccagttacc	ttcggaaaaa	gagttggtag	ctcttgatcc	ggcaaacaaa	8640
ccaccgctgg	tagcgggtgt	ttttttgttt	gcaagcagca	gattacgcgc	agaaaaaaaag	8700
catctcaaga	agatcctttg	atcttttcta	cggggtctga	cgctcagtg	aacgaaaact	8760
cacgttaagg	gattttggtc	atgagattat	caaaaaggat	cttcacctag	atccttttga	8820
tccggaatta	attcctgtgg	ttggcatgca	catacaaatg	gacgaacgga	taaacctttt	8880
cacgcccttt	taaatatccg	attattctaa	taaacgctct	tttctcttag	gtttaccg	8940
caatataatc	tgtcaaacac	tgatagtta	aactgaaggc	gggaaacgac	aatctgatca	9000
tgagcggaga	attaagggag	tcacgttatg	acccccgcgg	atgacgcggg	acaagccggt	9060
ttacgtttgg	aactgacaga	accgcaacgc	tgacaggaat	ggcccgcagc	gccatttaaa	9120
tggtacctta	attaacgtac	gaagcttgca	tgacgcgggt	ctagagcggc	cgccctcagg	9180
taccgggccc	cccctcgagg	tcgacggat	cgataagctt	gcatgcctgc	agtgacagct	9240
gaccgggtcg	tgcccctctc	tagagataat	gagcattgca	tgtctaagtt	ataaaaaaatt	9300
accacatatt	ttttttgtca	cacttgtttg	aagtgacagtt	tatctatctt	tatacatata	9360
tttaaaacttt	actctacgaa	taataataatc	tatagtacta	caataatatac	agtgttttag	9420
agaatcatat	aaatgaacag	ttagacatgg	tctaaaggac	aattgagtat	tttgacaaca	9480
ggactctaca	gttttatctt	tttagtgtgc	atgtgttctc	cttttttttt	gcaaatagct	9540
tcacctatat	aatacttcat	ccattttatt	agtacatcca	tttagggttt	aggggtaatg	9600
gtttttatag	actaattttt	ttagtacatc	tattttattc	tatttttagcc	tctaaattaa	9660
gaaaaactaaa	actctatttt	agttttttta	tttaataaatt	tagatataaa	atagaataaa	9720
ataaagtgc	taaaaaattaa	acaataaccc	tttaagaaat	taaaaaaact	aaggaaacat	9780
ttttcttggt	tcgagtagat	aatgccagcc	gtttaaacgc	cgtcgacgag	tctaaccggac	9840
accaaccagc	gaaccagcag	cgtcgcgctc	ggccaagcga	agcagacggc	acggcatctc	9900
tgctcgtgcc	tctggacccc	tctcgagagt	tccgctccac	cgttggactt	gctccgctgt	9960
cggcatccag	aaatgctgtg	gctggagcggc	agacgtgagc	cggcacggca	ggcggcctcc	10020
tcctctctctc	acggcacggc	agctacgggg	gattcctttc	ccaccgctcc	ttcgctttcc	10080
cttctctgcc	cgccgtaata	aatagacacc	ccctccacac	cctctttccc	caacctcgtg	10140
ttgttcggag	cgcacacaca	cacaaccaga	tctcccccaa	atccacccgt	cggcacctcc	10200
gcttcaagg	acgcgcctcg	tcctcccccc	ccccccctct	ctacctctc	tagatcggcg	10260
ttccgggtcca	tggttagggc	ccggtagttc	tacttctgtt	catgtttgtg	ttagatccgt	10320
gtttgtgta	gatccgctgt	gctagcgttc	gtacacggat	gcgacctgta	cgtcagacac	10380
gttctgattg	ctaacttgcc	agtgtttctc	tttggggaat	cctgggatgg	ctctagccgt	10440
tccgcagacg	ggatcgattt	catgattttt	tttgtttcgt	tgcataggg	ttggtttgcc	10500
cttttctctt	atttcaatat	atgccgtgca	cttgtttgtc	gggtcatctt	ttcatgcttt	10560
ttttgtctt	ggttgtgatg	atgtggctctg	gttgggcggg	cgttctagat	cggagtagaa	10620
ttctgtttca	aactacctgg	tggattttat	aattttggat	ctgtatgtgt	gtgccataca	10680
tattcatagt	tacgaattga	agatgatgga	tggaaatatac	gatctaggat	aggtatacat	10740

```

gttgatgCGG gttttactga tgcataata gagatgcttt ttgttcgctt ggttgtgatg 10800
atgtggtgtg gttgggCGGT cgttcattcg ttctagatcg gagtagaata ctgtttcaaa 10860
ctacctggtg tatttattaa ttttggaaact gtagtgtgtg gtcataacac ttcatagtta 10920
cgagtttaaag atggatggaa atatcgatct aggataggta tacatggtga tgtgggtttt 10980
actgatgcat atacatgatg gcatatgCAG catctattca tatgctctaa ccttgagtac 11040
ctatctatta taataaacia gtatgtttta taattatttt gatcttgata tacttgatg 11100
atggcatatg cagcagctat atgtggattt ttttagccct gccttcatac gctattttatt 11160
tgcttggtac tgtttctttt gtcgatgctc accctgttgt ttgggtgtac ttctgcaggt 11220
cgactctaga ggatccagaa ttctgtgatca aatggccgca acaagcagca caagcagcca 11280
gtcttttgac atagagctcg acatcatcgg ccagcaaccg cctcttcttt caatctacac 11340
ccagatcagt ctctgtttacc ccgtctctga tccctccacc tatcccacca tctgcagca 11400
ccttgaggaa ggccataaaac gcctctctca aaccttccca tgggtcgcgg gccagggtca 11460
gaccgagggc atcagcgaag gaaacacagg aacttccaag atcattccat atgaggagac 11520
acccctctt gtggtgaaag acctccgtga tgattcctca gcgccaacga tcgaggggtt 11580
gagaaaggcg ggtttccctt tagagatgtt tgacgagaac gtcgtcgtc cgaggaagac 11640
attagctatc ggacctggca atggcccaaa cgaccggaag cctgtgttgc tattgcagct 11700
caacttcatt aagggcggac tcattctcac cgtcaacgga caacatggtg ctatggacat 11760
gacaggacia gatgcaatta ttctgtcttct ctccaaggcg tgccgcaacg aatcattcac 11820
cgaggaggaa atctcggcca tgaacctcga tgcgaagacg gtagtccctc tcctgaaaa 11880
ctacaaagt ggctctgagc tagaccacca gatcgccaaa cctgctcctg ctggcgagc 11940
tccaccgca cggccaagg caagctgggc gttcttttca tctactcca aggccctctc 12000
ggagctgaaa gacgcagcca caaagactct tgacgcgtcg tccaagttg tgtcaactga 12060
tgatgctctt tcggcgttta tctggcaatc aacctcgcgc gtacgtctcg caagattgga 12120

tgcttccaca cctactgaat tctgcccgcg tgctgacatg cggggcccaa tgggctgctc 12180
aagcacatac ccaggccttc ttcaaaacat gacctaccat gactcgaccg tcgcccgaat 12240
cgccaacgaa ccacttgcg caacagcacc acgctcgcgc tcggaactca acagtgatcg 12300
tttgcgcaga cgaacacaag ctttggcgac gtacatgcat ggcctgcctg acaagtcgag 12360
cgtctccctg accgcccgat cgaatccgtc aagcagcacc atgctgagtt cctgggcca 12420
ggtgggatgc tgggagtatg actttgggtt tggactgggt aagcctgaga gtgtgagaag 12480
acctcgcttt gaacctttt agagtttgat gtactttatg cccaagaagc ctgatgggga 12540
gtttacggcg tccatttctc tgagggatga ggatgtggag agactaaagg cggatgagga 12600
tgggacaaag tacgcaaatg atattgggta gatagtttac tagactactg caggatctcg 12660
tggatccccg aatttccccg atcgttcaaa catttggcaa taaagtttct taagattgaa 12720
tctgttgcc ggtcttgcca tgattatcat ataatttctg ttgaattacg ttaagcatgt 12780
aataattaac atgtaatgca tgacgttatt tatgagatgg gtttttatga ttagagtecc 12840
gcaattatac atttaatac cgatagaaaa caaaatatag cgcgcaaac aggataaatt 12900
atcgcgcgcg gtgtcatcta tgttactaga tcgggaattc ggcgcgcca 12949

```

Patentansprüche

1. Pflanze, die resistent gegen einen Pilz ist, der ein Trichotheceen erzeugt, das eine C-3-Hydroxyl-Gruppe umfaßt, wobei die Pflanze eine Pflanzenzelle umfaßt, worin die Pflanzenzelle folgendes umfaßt:
 - a) eine Nukleinsäuresequenz, dessen Komplement an SEQ ID NO: 1 in 7% Natriumdodecylsulfat, 0,5 M NaPO₄, 1 mM EDTA bei 50°C mit Spülung in 0,5 × SSC, 0,1% SDS bei 50°C hybridisiert;
 - b) eine Nukleinsäure mit wenigstens 90% Sequenzidentität zu SEQ ID NO: 1; oder
 - c) eine Nukleinsäuresequenz, die die Aminosäuresequenz von SEQ ID NO: 2 codiert, wobei die Nukleinsäuresequenz ein Protein codiert, das Trichotheceen-3-O-acetyltransferase-Aktivität aufweist.
2. Pflanze gemäß Anspruch 1, worin die Pflanzenzelle eine Nukleinsäuresequenz umfaßt, deren Komplement an SEQ ID NO: 1 in 7% Natriumdodecylsulfat, 0,5 M NaPO₄, 1 mM EDTA bei 50°C mit Spülung in 0,1 X SSC, 0,1% SDS bei 50°C hybridisiert.
3. Pflanze gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2, worin die Pflanze resistent gegen eine Fusarium-Infektion ist.
4. Pflanze gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, die eine einkeimblättrige Pflanze ist.
5. Pflanze gemäß Anspruch 4, die eine Getreidepflanze ist.
6. Saatgut der Pflanze gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, worin das Saatgut die Nukleinsäuresequenz von SEQ ID NO: 1 umfaßt.
7. Verfahren zur Erzeugung einer Weizenpflanze, die resistent gegen einen Pilz ist, der ein Trichotheceen erzeugt, das eine C-3-Hydroxyl-Gruppe umfaßt, umfassend die folgenden Schritte:

- a) Transformieren einer Weizenpflanzenzelle mit einem heterologen Gen, das die Nukleinsäuresequenz gemäß Anspruch 1 umfaßt;
- b) Exprimieren des Genprodukts des Gens auf einem biologisch signifikanten Niveau;
- c) Regenerieren der Pflanzenzelle zu einer Pflanze; und
- d) Selektieren einer Pflanze mit erhöhter Resistenz gegen den Pilz; und gegebenenfalls
- e) Selbsten oder Auskreuzen der in Schritt d) erhaltenen Pflanze.

8. Verfahren gemäß Anspruch 7, worin der Pilz aus der Gattung *Fusarium* ist.

9. Verfahren zur Prävention einer Mycotoxin-Kontamination einer Pflanze und/oder eines Pflanzensaatguts, umfassend das Kultivieren einer Pflanze gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 oder einer durch ein Verfahren gemäß Anspruch 7 oder 8 erzeugten Pflanze, bevorzugt in einem Gebiet mit moderatem bis schwerem Pilzbefall, worin der Pilz aus der Gattung *Fusarium* ist und worin das Mycotoxin ein Trichotecen ist, das eine C-3-Hydroxyl-Gruppe umfaßt.

10. Verfahren zur Reduzierung und/oder Prävention des Wachstums eines Pilzes der Gattung *Fusarium* auf einer Pflanze, wobei der Pilz ein Trichothecen erzeugen kann, das eine C-3-Hydroxyl-Gruppe umfaßt, wobei das Verfahren das Kultivieren der Pflanze gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 oder einer durch ein Verfahren gemäß Anspruch 7 oder 8 erzeugten Pflanze umfaßt, bevorzugt in einem Gebiet mit moderatem bis schwerem Pilzbefall.

11. Verfahren zur Erzeugung von Saatgut, worin die aus dem Saatgut kultivierte Pflanze pilzresistent ist, umfassend das Selbsten oder Auskreuzen der Pflanze gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 oder einer durch ein Verfahren gemäß Anspruch 7 oder 8 erzeugten Pflanze.

12. Verfahren gemäß Anspruch 11, worin das Saatgut resistent gegen Pilze der Gattung *Fusarium* ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen