



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2010151631/15, 15.12.2010

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
16.12.2009 IT MI2009A002198

(43) Дата публикации заявки: 20.06.2012 Бюл. № 17

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городиский и
Партнеры", пат.пов. А.В.Мицу, рег.№ 364

(71) Заявитель(и):

ЛАБОРАТОРИ БАЛЬДАЧЧИ СПА (ИТ)

(72) Автор(ы):

**БАЛЬДАЧЧИ Массимо (ИТ),
АМЕ' Клаудио Альдо (ИТ)****(54) БИСГЛИЦИНАТ-ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРОРАЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕЛИАКИЕЙ****(57) Формула изобретения**

1. Применение бисглицинат-хелата железа при пероральном лечении анемии у пациентов с целиакией в форме таблетки в полутвердой или жидкой форме.

2. Применение бисглицинат-хелата железа по п.1, где указанная таблетка является шипучей таблеткой.

3. Применение бисглицинат-хелата железа по п.2, где указанная таблетка содержит количество, варьирующее от 1 до 40 мг иона железа, предпочтительно от 2 до 20 мг иона железа.

4. Применение бисглицинат-хелата железа по п.3, где указанная таблетка содержит количество, равное примерно 14 мг иона железа.

5. Применение бисглицинат-хелата железа по п.2, отличающееся тем, что его вводят по две шипучие таблетки в день, содержащие примерно 14 мг иона железа на таблетку, в течение двадцати дней.

6. Применение бисглицинат-хелата железа по п.2, отличающееся тем, что его вводят по две шипучие таблетки в день, содержащие примерно 14 мг иона железа на таблетку, в течение двадцати дней, и по одной шипучей таблетке, содержащей 14 мг иона железа, в течение дополнительных сорока дней.

7. Применение бисглицинат-хелата железа по п.1, отличающееся тем, что указанная полутвердая или жидкая форма выбраны из суспензии или раствора.

8. Применение бисглицинат-хелата железа по п.7, где указанная полутвердая или жидкая форма содержит количество, варьирующее от 6 до 12 мг иона железа/мл, предпочтительно примерно 10 мг иона железа/мл.

9. Применение бисглицинат-хелата железа по любому из пп.1-4 и 7-8, отличающееся тем, что указанный бисглицинат-хелат железа введен в состав совместно с, по меньшей мере, одним подсластителем и/или ароматизатором.

10. Применение бисглицинат-хелата железа по пп.1-8, отличающееся тем, что указанный бисглицинат-хелат железа вводят совместно с, по меньшей мере, одним дополнительным действующим ингредиентом.

11. Применение бисглицинат-хелата железа по п.9, отличающееся тем, что указанный бисглицинат-хелат железа вводят совместно с, по меньшей мере, одним дополнительным действующим ингредиентом.

12. Применение бисглицинат-хелата железа по п.1, отличающееся тем, что анемия является сидеропенической анемией.

RU 2010151631 A

RU 2010151631 A