

422 Gorrión chillón



Gorrión chillón. Adulto en verano. 6 de julio.

GORRIÓN CHILLÓN (*Petronia petronia*)

IDENTIFICACIÓN

14-16 cm. Dorso pardo, con estrías pardas; partes inferiores blancas; cabeza con lista clara en capirote y cejas; cola parda, con círculos blancos en las plumas laterales; mancha amarilla en la base de la garganta; pico fuerte y amarillento.

ESPECIES SIMILARES

La mancha amarilla en la garganta y las plumas de la cola con círculos blancos hacen a esta especie inconfundible.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de los adultos, pero con colores plumaje nuevo y sin de mancha amarilla en la garganta.

Adultos con plumaje desgastado y mancha amarilla en la garganta.

Después de la muda **posnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, que suele estar terminada entre octubre-noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Sedentario. Repartido por toda la Comunidad faltando en las áreas más montañosas y zonas deforestadas de la Depresión del Ebro.



Gorrión chillón. Invierno (01-XI)



Gorrión chillón. Juvenil (18-VII).



Gorrión chillón. Diseño del pecho: izquierda adulto (01-XI); derecha juvenil (18-VII).

422 Gorrión chillón



Gorrión chillón. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (06-VII); abajo juvenil (18-VII).



Gorrión chillón. Ala de juvenil (21-VII).



Gorrión chillón. Ala de adulto en verano (06-VII).



Gorrión chillón. Desgaste del plumaje en verano: izquierda adulto (06-VII); derecha juvenil (18-07).



Gorrión chillón. Ala en invierno (01-XI)



Gorrión chillón. Desgaste de la cola en verano: izquierda adulto (06-VII); derecha juvenil (18-07).