

118 Gavilán común



Gavilán común. Adulto. Macho (28-XII)

GAVILÁN COMÚN (*Accipiter nisus*)

IDENTIFICACIÓN

Macho: 28-34 cm; **hembra:** 33-42 cm. Alas cortas y redondeadas y cola larga; ojos amarillos o anaranjados; cola con 4-5 bandas oscuras estrechas y una subterminal ancha; partes superiores gris-ceniza en **adultos**, amarronadas en **juveniles**; partes inferiores ondeadas de pardo-rojizo en el **macho**, pardo oscuro en la **hembra** y **juveniles**.

ESPECIES SIMILARES

Los **cernícalos vulgar** y **primilla** tienen la cola larga, pero sus ojos son oscuros y el dorso es pardo; el **alcotán** y el macho de **esmerejón** tienen el dorso gris, pero sus alas son puntiagudas y tienen los ojos oscuros; la hembra de **gavilán** puede confundirse con un macho de **azor**, que son siempre mayores (ala mayor de 289 mm.); los juveniles de **azor** tienen las partes inferiores moteadas.



Izquierda a derecha: cernícalo, alcotán y esmerejón



Azor. Juvenil y adulto.

SEXO

Macho adulto sin ceja prominente blancuzca; partes superiores color pizarra; partes inferiores barreadas de ante-naranja; ojo amarillo anaranjado, a veces rojo; ala menor de 212 mm., tarso menor de 55 mm. **Hembra adulta** con ceja prominente blancuzca; partes superiores varían del gris al marrón; partes inferiores barreadas de azul-gris; ojo amarillo; ala mayor de 217 mm., tarso mayor de 59 mm. Los **juveniles** tienen plumaje similar, pero pueden sexarse por el tamaño del ala y del tarso.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad: **Juvenil** con plumas del dorso marrones, con borde claro (que llegan a desaparecer por desgaste); pecho barreado de color ocre; garganta moteada; en primavera tienen algunas plumas cambiadas en nuca y dorso, que son grises y sin borde ocre.

2º año otoño/3º año primavera si han guardado plumas juveniles en el obispillo, pequeñas coberteras del ala, cola y secundarias.

Adultos sin restos de plumas juveniles en el cuerpo y alas.

CUIDADO: en los ejemplares en los que existan plumas corporales, de la cola o secundarias retenidas será necesario saber si son de tipo adulto o juvenil para asignar correctamente la edad.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, activa entre mayo y noviembre; algunos ejemplares pueden dejar sin mudar plumas corporales, de la cola y secundarias. No existe muda **postjuvenil**, si bien pueden cambiar alguna pluma en nuca y espalda. Después de su primera muda **postnupcial**, algunos ejemplares pueden guardar plumas juveniles en el obispillo, pequeñas coberteras del ala, plumas de la cola y secundarias.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, con aves europeas en invierno. Nidifica repartido por toda la Comunidad en las masas forestales apropiadas.

118 Gavilán común



Gavilán común. Adulto. Hembra (10-XI).



Gavilán común. Juvenil. Hembra (26-I)



Gavilán común. 2º año. Macho (30-XII)



Gavilán común. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).




Gavilán común. 2º año. Hembra (30-XII)



Gavilán común. 2º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Macho (10-I)




Gavilán común. Juvenil. Diseño de la cabeza: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).




Gavilán común. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).


118 Gavilán común



Gavilán común. 2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).




Gavilán común. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).




Gavilán común. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).




Gavilán común. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).

118 Gavilán común



Gavilán común. Juvenil. Diseño del obispillo: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).

Gavilán común. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).



Gavilán común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).

Gavilán común. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).

Gavilán común. 2º año. Diseño del obispillo: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).


118 Gavilán común



Gavilán común. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).




Gavilán común. Adulto. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho (28-XII); abajo hembra (10-XI).



Gavilán común. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: izquierda macho (28-XII); derecha hembra (10-XI).



Gavilán común. 2º año. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho (30-XII); abajo hembra (30-XII).



Gavilán común. 2º año. Diseño de las coberteras primarias: izquierda macho (30-XII); derecha hembra (30-XII).



Gavilán común. Juvenil. Diseño de las coberteras primarias: izquierda macho (10-I); derecha hembra (26-I).




Gavilán común. Juvenil. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho (10-I); abajo hembra (26-I).

118 Gavilán común



Gavilán común. Adulto. Macho: diseño de primarias (28-XII)

Gavilán común. 2º año. Macho: diseño de primarias (30-XII)



Gavilán común. Adulto. Hembra: diseño de primarias (10-XI)

Gavilán común. 2º año. Hembra: diseño de primarias (30-XII)

118 Gavilán común



Gavilán común. Juvenil. Macho: diseño de primarias (10-I)

Gavilán común. Adulto. Macho: diseño de secundarias (28-XII).



Gavilán común. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (26-I)


Gavilán común. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (10-XI).

118 Gavilán común



Gavilán común. 2º año. Macho: diseño de secundarias (30-XII).

Gavilán común. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (10-I).



Gavilán común. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (30-XII).

Gavilán común. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (26-I).

118 Gavilán común



Gavilán común. Adulto. Macho: diseño del ala (28-XII).

Gavilán común. 2º año. Hembra: diseño del ala (30-XII).



Gavilán común. Adulto. Hembra: diseño del ala (10-XI).

Gavilán común. Juvenil. Macho: diseño del ala (10-I)



Gavilán común. 2º año. Macho: diseño del ala (30-XII).

Gavilán común. Juvenil. Hembra: diseño del ala (26-I)