

408 Urraca



Urraca. Adulto (01-I).

URRACA (*Pica pica*)

IDENTIFICACIÓN

40-51 cm. (incluidos 16-20 de la cola). Plumaje muy contrastado con partes negro-iridiscente y blanco. Cola muy larga.

ESPECIES SIMILARES

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

SEXO

No hay diferencias en cuanto al plumaje, aunque el tamaño y el peso pueden ayudar a sexar a los individuos extremos: **macho** con ala mayor de 190 mm. y peso mayor de 245 gr.; **hembra** con ala menor de 180 mm. y peso menor de 170 gr. No obstante, una gran mayoría de ejemplares da valores intermedios y no es posible su sexado.


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo; mancha negra de las primarias 9ª y 10ª grande (más de 10 y 16 mm. respectivamente).

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas brillantes cambiadas del ala y las cobertoras primarias y álula no mudadas, que carecen de brillo; cola no mudada; mantienen las manchas negras grandes de la 9ª y 10ª primarias hasta su primera muda **postnupcial**.


Adultos con plumaje negro con brillo iridiscente en cola y todas las plumas del ala; mancha negra de las primarias 9ª y 10ª pequeña (menos de 13 y 15 mm. respectivamente).



Urraca. Determinación de la edad. Diseño de la mancha negra de las primarias 9ª y 10ª: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada desde mitad de septiembre y hasta octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las pequeñas y grandes cobertoras del ala, si bien unos pocos ejemplares dejan sin cambiar las más externas y otros la amplían a algunas terciarias. Los primeros individuos la terminan desde finales de agosto.



Urraca. Extensión de la muda postjuvenil

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII



ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria. Muy ubiquista, está repartida por toda la comunidad faltando sólo en zonas de montaña no cultivadas o en las áreas muy deforestadas del Valle del Ebro.

408 Urraca



Urraca. 2º año (07-I)



Urraca.
Color del iris: de arriba hacia abajo: adulto (01-I); 2º año (07-I); juvenil (08-VII); pollo (11-VI).



Urraca. Juvenil (13-VII)





Urraca. Pollo (11-VI)



Urraca. Diseño del pecho: izquierda adulto (01-I); derecha juvenil (29-VII)

408 Urraca




Urraca. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (01-I); arriba derecha 2º año (07-I); izquierda juvenil (08-VII)



Urraca. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (01-I); arriba derecha 2º año (07-I); izquierda juvenil (08-VII)


408 Urraca



Urraca. Adulto: diseño de la mancha oscura de 9ª y 10ª primarias (08-III).




Urraca. Adulto: diseño del álula (08-III).



Urraca. 2º año: diseño de la mancha oscura de 9ª y 10ª primarias (07-I).



Urraca. 2º año: diseño del álula (07-I).



Urraca. Juvenil: diseño de la mancha oscura de 9ª y 10ª primarias (08-VII).



Urraca. Juvenil: diseño del álula (08-VII).



Urraca. Adulto: diseño del ala (08-III).

408 Urraca



Urraca. 2º año: diseño del ala (07-I).



Urraca. Juvenil: diseño del ala (08-VII).